Linnean
QK91
.C117
1785
t.1-
pt.4

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS IV.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

CLASSIS V.

INSECTA.

In his tam parvis, atque tam nullis
Quae ratio? quanta vis!
Quam inextricabilis perfectio!

PLIN. XI. 2.

ANIMALCULA polypoda, *spiraculis* lateralibus respirantia, *cute* cataphracta aut pilis hirta; *antennis* mobilibus sentientibus instruuntur.

CORPUS horum dividitur in *caput*, *truncum*, *abdomen*, *artus*.

CAPUT plerisque distinguendum *instruitur* cerebro minuto, oculis, antennis, saepius ore; *destituitur* naribus, auribus, etsi, nonnullis certe, evidenter competat olfactus et auditus.

Oculi plerisque bini. absque palpebris, simplices parvi, aut compositi magni hemisphaerici vel polyedri, rarius mobiles aut stipitati; his vident colores.

Antennae binae, articulatae, sensu tactus, ut videtur, instructae, sunt *setaceae*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavatae*, *capitatae*, *fissiles*, *pectinatae*, *barbatae*, corpore *breviores*, *longiores*, *mediocres*.

Palpi articulati, ori affixi, plerisque quatuor s. sex: articulis 2, 4, 3.

Os paucioribus nullum, plurimis sub capite, quibusdam in pectore; *rostro*, *labio*, *maxillis* transversis ad latera mobilibus, *dentibus*, *lingua*, *palato*.

Stemmata verticis puncta tria elevata nitida.

TRUNCUS, inter caput et abdomen, pedatus, *thorace* supra *dorso*, posterius *scutello*, subtus *pectore sternoque*.

ABDOMEN ventriculo, intestinis, visceribusque foetum, incisuris 5, annulatum, *spiraculis* porosis lateribus pertusum, supra *tergo*, subtus *ventre*, posterius *ano* terminatum.

ARTUS sunt *cauda*, *pedes*, plurimisque *alae*.

Cauda abdomen terminans, est vel *solitaria*, vel *bicornis*; simplex vel armata *forcipe*, *furca*, *seta* vel *aculeo* simplici vel composito, laevi vel serrato.

Pedes trunci *femoribus*, *tibiis*, plantae *tarsis*, digitorum *unguibus*; manus (*chela*) nonnullis, simplex pollice mobili; posteriores pro usu *saltatorii*, *cursorii*, *natatorii*.

Alae duae vel quatuor sunt vel *planae*, *plicatiles*, *erectae*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexae* vel *reversae*, *dentatae*, *caudatae*, *reticulatae*, *maculis*, *fasciis*, *strigis*, *lineis*, *punctis* pictae, vel *stigmatibus* notatae, *ocellis* ornatae, idque vel in *primoribus* vel in *secundariis*, tam in *pagina superiore*, quam *inferiore*.

Elytra (alae superiores) crustacea bina, saepius mobilia, *truncata*, *spinosa*, *serrata*, *scabra*, *striata*, *porcata*, *sulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quasi alas inter et elytra.

Halteres sub alis dipterorum ex petiolo capitati.

SEXUS *Mas* et *Femina* generant perfecta.

Neutra nonnullis (formicae, vespae, api) societate foederatis.

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda structura, exutis ovi tunicis, una post alteram.

Ovum sub minima mole vesicaria excluditur.

Larva (Eruca) succosa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, interdum apus, saepeque polypus, vorax alimento proprio.

Pupa (Nympha, Chrysalis) siccior, coarctata, durior, *nuda* vel *folliculata*, saepe sine ore, vel *pedata* 1. 2. 3. vel *apus* 4. 5.

1. *completa*, omnibus partibus agilis (aranea, acarus, onisci.)

2. *semicompleta* solis alarum rudimentis (gryllus, cicada, cimex, libellula, ephemera.)

3. *incompleta*, alis pedibusque immobilis (apis, formica, tipula.)

4. *obtecta*, thorace abdomineque distincto corticata (lepidoptera, eaque vel nuda, vel folliculata).

5. *coarctata* intra globum (musca, oestrus).

Imago revelata, declarata, perfecta generans, agilis, antennis instructa.

triplex itaque structura et cognitio ejusdem animalis.

HAEC

Verbositas, praesente seculo calamitas artis insectorum, ut pauciloquium vermium.

HAEC *muta*, nisi alio proprio instrumento, tympano thoracico, alisve sonora; *surda*, (pleraque,) stridorem aetheris licet percipiant; *plura* ubique plantarum speciebus, sed ob regionem sibi magis patentem in orbe pauciora, *tropica*, *arctica* et *antarctica*; singula demum *minima*, annua, exceptis aquaticis aliisque paucioribus, sed universa maximae molis animantia, effectuque pariter maxima, et magis occulto magisque diserso, ideoque minus coercendo; totidem enim sunt naturae annui ministri, propriis negotiis peragendis praefixi, quot muniis sufficiant, proportionem inter plantas servando, erronea, superflua, mortua, putrida, consumendo, aliis demum, inprimis avibus in alimentum cedendo.

HABITANT insecta in iis tantum plantis, e quibus (non in quibus,) victitant, unde saepius nomina *trivialia* optima, ut ars cum *politia naturae* combinatur; aliis alia muneribus praefixa praeparant, purgant, destruunt necessaria.

ENTOMOLOGI praestantiores delineando figuras, designando attributa et characteres, disponendo ordines inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandi*, *Jonston*, *Rai*.

Metamorphosii *Goedart*, *Meriana*, *Albin*, *Frisch*, *Roesel*, *Wilkes*, *Kleemann*, *Ammiral*, *Harris*.

Philosophi *Swammerdam*, *Lesser*, *Reaumur*, *de Geer*, *Bonnet*, *Lyonnet*, *Goeze*, *Koch*.

Iconographi *Clerck*, *) *Sepp*, *Roesel*, *Hoeffnagel*, *Bradley*, *Robert*, *Petiver*, *Schaeffer*, *Voet*, *Fuesslı*, *Hollar*, *Amiral*, *Drury*, *Cramer*, *Esper*, *Knoch*, *Jablonsky*, *Bergstraesser*, *Herbst*, *Capieux*.

Descriptores *Rai*, Fauna suecica (*edit.* 2. *Holm.* 1761. 8.) Museum Reginae *Holm.* 1764. *Koelreuter*, *Pallas*, *Thunberg*, *Schranck*, *a Linsharting*, *Schreber*, *J. R. Forster*, *Pollich*, *Lang*, *Harrer*, *Bjercander*, *Knoch*, *Schaller*, *Scriba*, *Schroeter*, *Mayer*.

Monographi *Lister*, *Schaeffer*, *Clerck*, *v. Gleichen*, *O. Fr. Müller*, *Herbst*, *Kob*, *Loschge*, *Panzer*.

Systematici *Systema naturae*, *Poda*, *Sulzer*, *Geoffroi*, *Scopoli*, *Gronovius*, *T. Bergmann*, *de Geer*, *Schluga*, *Brünnich*, *Schiefermüller*, *Fabricius*.

*) Clerckii icones insectorum *pulcherrimum opus*, *quod Academia Regia scientiarum Holmiensis ab interitu vindicavit*.

ORDINES insectorum ab alis desumti.

Alae 4	Superiores	crustaceae	futura recta	*Coleoptera*	1.
		semicrustaceae	incumbentes	*Hemiptera*	2.
	Omnes	imbricatae	squamis	*Lepidoptera*	3.
		membranaceae			
		ano	inermi	*Neuroptera*	4.
			aculeato	*Hymenoptera*	5.
Alae 2, halteres loco posteriorum				*Diptera*	6.
Alae 0 s. absque alis et elytris				*Aptera*	7.

CHA-

Quaeso ne haec legentes,
quoniam in his spernunt multa,
etiam relata fastidio damnent,
cum in contemplatione naturae
nil possit videri supervacaneum.

PLIN.

CHARACTERES INSECTORUM.

I. COLEOPTERA.

* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

a) *clava* lamellata.

189. SCARABAEUS. *Tibiae* anteriores dentatae.
190. LUCANUS. *Penicilli* duo sub labio palpigeri.

b) *clava perfoliata.*

191. DERMESTES. *Caput* inflexum sub thorace vix marginato.
MELYRIS. *Labium* clavatum, emarginatum.
195. BYRRHUS. *Labium* porrectum, bifidum.
196. SILPHA. *Thorax* et *elytra* marginata.
TRITOMA. *Palpi* anteriores securiformes.
HYDROPHILUS. *Maxilla* bifida.

c) clava *solida.*

193. HISTER. *Caput* retractile intra thoracem.
PAUSUS. *Antennae* biarticulatae: clava uncinata.
BOSTRICHUS. *Caput* inflexum sub thorace vix marginato.
ANTHRENUS. *Maxilla* bifida.
NITIDULA. *Thorax* et *elytra* marginata.
198. COCCINELLA. *Palpi* anteriores securiformes, posteriores filiformes.
202. CURCULIO. *Rostrum* elongatum corneum.

** *Antennis moniliformibus.*

BRENTUS. *Rostrum* elongatum, corneum, rectum.
203. ATTELABUS. *Rostrum* elongatum, incurvum.
ERODIUS. *Labium* corneum, emarginatum.
217. STAPHYLINUS. *Elytra* dimidiata, alas tegentia. *Vesiculae* 2 *supra caudam exserendae.*
SCAURUS. *Labium* truncatum, integrum.
ZYGIA. *Labium* elongatum, membranaceum.
215. MELOE. *Thorax* subrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
214. TENEBRIO. *Thorax* marginatus. *Caput* exsertum. *Corpus* oblongum.
197. CASSIDA. *Corpus* ovatum. *Elytra* marginata. *Caput* tectum clypeo.
OPATRUM. *Thorax* et *elytra* marginata.

216. MORDELLA. *Laminae* ad basin abdominis. *Caput* inflexum.
199. CHRYSOMELA. *Corpus* ovatum, immarginatum.
HORIA. *Palpi* inaequales. *Maxilla* bifida. *Labium* rotundatum.

*** *Antennis filiformibus.*

APALUS. *Thorax* subrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
MANTICORA. *Maxillae* exsertae, dentatae. *Oculi* prominuli.
PIMELIA. *Thorax* marginatus. *Caput* exsertum. *Corpus* oblongum.
194. GYRINUS. *Antennae* rigidulae. *Oculi* 4.
CUCUJUS. *Labium* breve, bifidum: laciniis distantibus.
CRYPTOCEPHALUS. *Corpus* ovatum, immarginatum.
201. BRUCHUS. *Antennae* extrorsum crassiores.
192. PTINUS. *Thorax* caput recipiens. *Antennae* articulis ultimis longioribus.
200. HISPA. *Antennae* porrectae, approximatae, fusiformes.
211. BUPRESTIS. *Caput* dimidium intra thoracem retractum.
206. NECYDALIS. *Elytra* dimidiata: alis nudis.
207. LAMPYRIS. *Elytra* flexilia. *Thoracis* clypeus caput obumbrans recipiensque.
208. CANTHARIS. *Elytra* flexilia. *Abdomen* lateribus plicato-papillosum.
NOTOXUS. *Labium* bifidum: laciniis conniventibus obtusis.
209. ELATER. *Pectoris* mucro e poro abdominis refiliens.
CALOPUS. *Thorax* ad latera mucronato-callosus.
ALURNUS. *Maxilla* fornicata.
213. CARABUS. *Thorax* obcordatus, posterius truncatus.
LYTTA. *Thorax* subrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.

**** *Antennis setaceis.*

SERROPALPUS. *Palpi* anteriores profunde serrati.
204. CERAMBYX. *Thorax* ad latera mucronato-callosus.
205. LEPTURA. *Elytra* apice attenuata. *Thorax* teretiusculus.
RHINOMACER. *Antennae* rostro insidentes.
ZONITIS. *Labium* emarginatum.
210. CICINDELA. *Maxillae* exsertae dentatae. *Oculi* prominuli.

212.

Genera *naturalia auctorum*, metamorphosi demonstranda, vitam scientiae largiuntur.

Genera *falsa tironum*, ex ludicro principio deducta totidem foetidissimis ulceribus artem pulcherrimam commacularunt.

212. DYTICUS. *Pedes* posteriores ciliati, natatorii.
218. FORFICULA. *Elytra* dimidiata: alis tectis. *Cauda* forcipata.

II. HEMIPTERA.

219. BLATTA. *Os* maxillosum. *Alae* coriaceae, planae. *Pedes* cursorii.
PNEUMORA. *Os* maxillosum. *Alae* membranaceae, deflexae. *Pedes* cursorii. *Corpus* cavum, inflatum, diaphanum.
220. MANTIS. *Os* maxillosum. *Pedes* anteriores serrati: ungue unico.
221. GRYLLUS. *Os* maxillosum. *Pedes* posteriores saltatorii.
222. FULGORA. *Rostrum* inflexum. *Frons* producta, inermis. *Antennae* capitatae.
223. CICADA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* posteriores saltatorii.
224. NOTONECTA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* posteriores natatorii (ciliati.)
225. NEPA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* anteriores cheliferi.
226. CIMEX. *Rostrum* inflexum. *Pedes* cursorii. *Antennae* thorace longiores.
MACROCEPHALUS. *Rostrum* inflexum. *Antennae* brevissimae.
227. APHIS. *Rostrum* inflexum. *Abdomen* bicorne.
228. CHERMES. *Rostrum* pectorale. *Pedes* posteriores saltatorii.
229. COCCUS. *Rostrum* pectorale. *Abdomen* (maribus) posterius setosum.
230. THRIPS. *Rostrum* obsoletum. *Alae* incumbentes abdomini reflexili.

III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO. *Antennae* extrorsum crassiores. *Alae* erectae.
232. SPHINX. *Antennae* medio crassiores.
233. PHALAENA. *Antennae* introrsum crassiores.

IV. NEUROPTERA.

234. LIBELLULA. *Cauda* forcipata. *Os* multi-maxillosum. *Alae* extensae.
235. EPHEMERA. *Cauda* setis 2-3. *Os* edentulum. *Alae* erectae.
238. MYRMELEON. *Cauda* forcipata. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.
236. PHRYGANEA. *Cauda* simplex. *Os* edentulum. *Alae* deflexae.
237. HEMEROBIUS. *Cauda* simplex. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.
239. PANORPA. *Cauda* chelata. *Os* rostratum. *Alae* incumbentes.
240. RAPHIDIA. *Cauda* filo 1. *Os* bidentatum. *Alae* deflexae.

V. HYMENOPTERA.

241. CYNIPS. *Aculeus* ſpiralis!
242. TENTREDO. *Aculeus* ſerratus! bivalvis.
243. SIREX. *Aculeus* ſerratus ſub abdominis ſpina terminali.
244. ICHNEUMON. *Aculeus* exſertus! triplex.
245. SPHEX. *Aculeus* punctorius. *Alae* planae. Lingua *inflexa trifida.*

SCOLIA. *Lingua* inflexa, trifida. *Labium* apice membranaceum.

THYNNUS. *Lingua* breviſſima, involuta. *Labium* trifidum.

LEUCOSPIS. *Labium* maxilla longius emarginatum. *Antennae* clavatae.

TIPHIA. *Labium* breve, corneum, tridentatum.

CHALCIS. *Antennae* breves, cylindricae, fuſiformes.

246. CHRYSIS. *Aculeus* punctorius. *Abdomen* ſubtus fornicatum.
247. VESPA. *Aculeus* punctorius. *Alae* ſuperiores plicatae!
248. APIS. *Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa!
249. FORMICA. *Aculeus* obſoletus. *Alae* neutris nullae!
250. MUTILLA. *Aculeus* punctorius. *Alae* neutris nullae.

VI. DIPTERA.

* *proboſcide* et *hauſtello.*

DIOPSIS. *Caput* bicorne: oculis terminalibus.
252. TIPULA. *Hauſtellum* ſine vagina. *Palpi* 2 porrecti, filiformes.
253. MUSCA. *Hauſtellum* ſine vagina, ſetis inſtructum.
254. TABANUS. *Hauſtellum* vagina univalvi ſetisque inſtructum.
256. EMPIS. *Proboſcis* inflexa.
257. CONOPS. *Proboſcis* porrecta, geniculata.

** *hauſtello ſine proboſcide.*

251. OESTRUS. *Hauſtellum* retractum intra labia connata, poro pertuſa.
258. ASILUS. *Hauſtellum* rectum, bivalve, baſi gibbum.

STOMOXYS. *Hauſtellum* vagina univalvi convoluta, baſi geniculata.

255. CULEX. *Vagina* exſerta, univalvis, flexilis: ſetis 5.
259. BOMBYLIUS. *Hauſtellum* longiſſimum, rectum, ſetaceum, bivalve.
260. HIPPOBOSCA. *Hauſtellum* breve, cylindricum, rectum, bivalve.

VII. APTERA.

* *Pedibus sex, capite a thorace discreto.*

261. LEPISMA. *Cauda* setis exsertis.
262. PODURA. *Cauda* bifurca, inflexa, saltatrix.
263. TERMES. *Os* maxillis duabus. *Labium* corneum, quadrifidum.
264. PEDICULUS. *Os* aculeo exserendo.
265. PULEX. *Os* rostro inflexo cum aculeo. *Pedes* saltatorii.

** *Pedibus* 8-14, *capite thoraceque unitis.*

266. ACARUS. *Oculi* 2. *Pedes* 8. *Palpi* compressi.
HYDRACHNA. *Oculi* 2-8. *Pedes* 8 in anteriore corporis parte. *Papillae* textoriae.
268. ARANEA. *Oculi* 8. *Pedes* 8. *Papillae* textoriae. *Palpi* clavati.
267. PHALANGIUM. *Oculi* 4. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
269. SCORPIO. *Oculi* 8. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
270. CANCER. *Oculi* 2. *Pedes* 10: primo chelato.
271. MONOCULUS. *Oculi* 2. *Pedes* 12: decem chelatis.
272. ONISCUS. *Oculi* 2. *Pedes* 14.

*** *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

273. SCOLOPENDRA. *Corpus* lineare.
274. JULUS. *Corpus* subcylindricum.

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.

I. COLEOPTERA.

Elytra alas tegentia.

189. SCARABAEUS. *Antennae* clavatae: clava lamellata.
Palpi 4.
Mandibula cornea *subedentula*.
Tibiae anteriores saepius dentatae.

* *palpis filiformibus.*
† *mandibula arcuata.*
a) *plane edentula*, Scarabaei Fabricii.
N) *thorace cornuto.*
α) *scutellati.*

Hercules. 1. Sc. thoracis cornu incurvo maximo: subtus barbato unidentato, capitis recurvato: supra multidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 3. *Gronov. zooph.* 412. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *Voet coleopt. t.* 12. *f.* 98. *Drury inf.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. *Aubent. misc. t.* 41. *f.* 2. *Fabric. spec. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 1.
Marcgr. bras. 247. *f.* 3. Taurus volans s. Eruma.
Jonst. inf. t. 16. *f.* 1.
Olear. mus. t. 16. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 1. Rhinoceros americanus cinereus, rostro nigro nitente.
Edw. glean. t. 334.
Grew mus. 162.
Roes. inf. 11. *Kaef.* 1. *t.* A. *f.* 1. *inf.* IV. *p.* 45. *t.* 5. *f.* 3.
Degeer inf. 4. *p.* 304. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 9. Scarabaeus scutellatus niger &c.
Habitat in America, *varians elytris piceis et glaucis nigropunctatis.*
Femina mutica.

Alcides. 91. Sc. thoracis cornu incurvo subtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. *Fabr. spec. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat in India, *Hercule duplo minor, an ejus varietas?*

2. Sc.

Gideon. 2. Sc. thoracis cornu incurvo maximo subtus laevi apice bifido, capitis recurvato supra unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 3. *Gron. zooph.* 413. *Voet coleoptr. t.* 12. *f.* 100. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 1. *f.* 3.
Edw. av. t. 40.
Roef. inf. 2. *Kaef.* 1. *t.* A. *f.* 5.
Swammerdam bibl. nat. t. 30. *f.* 2.
Aubent. misc. t. 40. *f.* 3.
Habitat in America *australi et* India, *an vere* a praecedentibus *diversus?*

Centaurus. 92. Sc. thoracis cornu incurvo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. *Fabric. sp. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 4. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 1.
Drury inf. 1. *t.* 36. *f.* 1. Scarabaeus Gideon.
Habitat in India *et* Africa.

Oromedon. 93. Sc. thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 5. *Drury inf.* 1. *t.* 36. *f.* 5. *Aubent. misc.* 1. *t.* 40. *f.* 4. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 102. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in America *australi et* India.

Aegeon. 94. Sc. rufus, thoracis cornu brevi incurvo subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 6. *Drury inf.* 2. *t.* 30. *f.* 5. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in America *australi et* India.

dispar. 95. Sc. cornu (in mare) thoracis subulato protenso, capitis subulato subrecurvo, scutello cordato. *Fabric. sp. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 7. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Pall. it. 1. *p.* 461. Scarabaeus polyceros.
Pall. it. 3. *p.* 707. *ic. inf. Russ. indig.* 1. *t.* A. *f.* 8. A. B.
Habitat in regionibus Russici *imperii magis australibus, ater, stercorarii magnitudine.*
Feminae nec thorax, nec caput cornutum, sed utrumque antrorsum bidentatum.

Chorinaeus. 96. Sc. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 8. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 8. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 104. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Brasilia, *pani affinis.*

dichotomus. 89. Sc. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *Mant.* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 9. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 2. *f.* 6.
Aubent. miſc. t. 40. *f.* 5.
Voet coleopt. t. 14. *f.* 107.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali et* India.

claviger. 90. Sc. rufus, thoracis cornu elevato, capitis ſubulato recurvo. *Mant.* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 10.
Aubent. miſc. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 14. *f.* 108.
Habitat in America *auſtrali et* India.

haſtatus. 97. Sc. thoracis cornu brevi fornicato haſtato ſubtus hirto, capitis recurvo. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali.*

Enema. 98. Sc. thoracis cornu incurvo ſimplici baſi craſſiſſimo, capitis recurvo bifido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12.
Habitat in India, *pani affinis.*

Pan. 99. Sc. thoracis cornu incurvo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis recurvo unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 13.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Jaſon. 100. Sc. thoracis cornu craſſiſſimo apice emarginato, capitis unidentato trifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 15. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 3. *f.* 3.
Swammerd. bibl. nat. t. 30. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 13. *f.* 103.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 4.
Habitat in Sina, *Chorinaeo affinis.*

validus. 101. Sc. thorace anterius retuſo: cornu conico breviſſimo, capite bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 16.
Habitat in Braſilia, *rhinocerotis magnitudine.*

truncatus. 102. Sc. thorace retuſo, cornu brevi truncato, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 17.
Habitat in nova Seelandia, *naſicornis magnitudine.*

103. Sc.

Eurytus. 103. Sc. thorace anterius retuso: cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 18.
Habitat in America, *niger.*

Actaeon. 3. Sc. glaber, thorace bicorni, capitis cornu unidentato apice bifido, elytris laevibus. *Muf. Lud. Ulr.* 4.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 18. *mant. inf. p.* 5. *n.* 19. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 3. *f.* 4.
Marcgr. brafil. 246. Enema.
Roef. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 2.
Swammerd. bibl. nat. t. A. *f.* 2.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 12.
Seb. muf. 4. *t.* 90. *f.* 3. 4.
91. *f.* 3.
Aubent. ntifc. t. 5. *f. inf.*
Voet coleoptr. t. 16. *f.* 111. 112.
Meriau. fur. t. 72.
Huffn. pict. 1. *t.* 1.
Habitat in America, *omnium hactenus cognitorum infectorum, cancris monoculisque exceptis, maximum.*
Thoracis *cornua antrorfum verfa, conica.*

Simfon. 4. Sc. thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. *Muf. Lud. Ulr.* 5.* *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 8. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 20.
Habitat in America *auftrali et* India, *actaeoni affinis, at quadruplo minor, fupra laevis, piceus.*
Caput *anterius bidentatum;* thoracis *cornua lanceolata, porrecta, non capite, fed cornu capitis longiora.*

Elephas. 104. Sc. villofus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 8. *n.* 20. *mant. inf. p.* 5. *n.* 21.
Olear. muf. t. 16. *f.* 2.
Habitat in Guinea, *actaeoni affinis, at villofus.*

Boas. 105. Sc. thorace retufo excavato bidentato, capitis cornu recurvo fimplici. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 8. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 22.
Habitat ad Sierra Leona.

Coryphaeus. 106. Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 8. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae fpei, *vernalis magnitudine et ftatura.*

107. Sc.

bicornis. 107. Sc. thorace bicorni, capitis cornu recurvo unidentato, elytris rufis. *Lesk. Anf. der Naturg.* 1. *t.* 9. *f.* 1. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 1. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 24. *Aubent. misc. t.* 15. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, naſicornis magnitudine.*

Tityus. 5. Sc. thoracis cornu intermedio maximo ſimpliciſſimo, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo. *Amoen. ac.* 6. *p.* 39. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 26. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Scarabaeus ſcutellatus glaucus, thorace tricorni: lateralibus breviſſimis ſubulatis, medio ſubtus barbato, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo. *Gron. zooph. t.* 14. *f.* 8. Scarabaeus thorace tricorni laevi: intermedio maximo incurvo ſubtus barbato, capitis cornu maximo recurvo.
Aubent. misc. 1. *t.* 14. *f.* 8.
Voet Kaef. t. 12. *f.* 99.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat in America, *herculi ſimilis, at parvus.*
Elytra *nunc nigra glauco-maculata, nunc glauca, nigro-maculata.*

Atlas. 6. Sc. thorace tricorni: anteriore breviſſimo, capitis cornu adcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 6.*
Fabr. ſpec. inſ. 1. *p.* 9. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 27. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 5.
Marcgr. braſ. 247. *f.* 1.
Edw. av. t. 105. *f.* 1.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 3.
Merian. furin. in tit. F. G.
Swammerd. bibl. t. 30. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 15. *f.* 109. 110.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *magis auſtrali.*

Geryon. 108. Sc. thorace excavato tricorni, lateralibus compreſſis unidentatis, capitis recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 28. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 5. *Drury inſ.* 2. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

7. Sc.

Scarabaeorum *larvae hexapodes annulatae, piloſae, abdominis apice veſiculoſo, capite corneo inſtructae, vivunt tranquillae ſub terra, plurimae ſimo delectantur et paſcuntur, cetoniarum ligno putreſcente, melolonthiarum radicibus plurimarum; pupae intra glebam quieſcentes.*

Aloëus. 7. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite ſubmutico, elytris uniſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 7.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 29. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 302. *n.* 1. Scarabaeus ſcutellatus niger, thorace tricorni: intermedio longiori truncato.
Roeſ. inſ. 2. *Scarab.* 1. *t.* A. *f.* 6.
Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 10.
Aubent. miſc. t. 5. *f.* 1.
Voet Kaef. t. 18. *f.* 122. (mas) *et t.* 19. *f.* 122. (femina.)
Habitat in America, *naſicorni ſimillimus, at triplo major, tibiis anterioribus quinquedentatis.*

Antaeus. 109. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 30. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 4.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*
Femina *mutica.*

Syphax. 110. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 31.
Habitat in America, *antaeo perquam affinis.*

Maimon. 111. Sc. thorace tricorni: cornubus aequalibus breviſſimis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 32.
Habitat in America.

Typhoeus. 9. Sc. thorace tricorni: intermedio minore; lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Muſ. Lud. Ulr.* 8.* *Gronov. zooph.* 123.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 10. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 33.
Bergſtr. Nomencl. 1. *p.* 26. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 6. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 72. *t.* 1. *f.* 3.
Raj. inſ. 103. Scarabaeus ovinus 2.
Friſch inſ. 4. *t.* 8. Scarabaeus thorace cornuto.
Mouff. inſ. 152. *f.* 2. Taurocerus.
Petiv. gaz. t. 23. *f.* 3.
Schaeff. icon. t. 5. *f.* 1. ♀. *t.* 26. *f.* 4. ♂.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 124. 125.

Habitat in Europa, *sub stercore bovino sub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans, stercorarii magnitudine, ater.*

Caput *depressum, ad latera villosum, angustum;* antennarum *capitulum subgriseum;* thorax *glaber, cornubus nunc capiti aequalibus, nunc duplo longioribus, in femina exsoletis;* elytra *striata;* tibiae *admodum pilosae.*

Titanus. 112. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido; lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 34.
Sloane jam. 2. *p.* 205. *t.* 237. *f.* 4. 5. Scarabaeus major niger tricornis.
Drury inf. 1. *t.* 36. *f.* 3. 4. Scarabaeus Simson.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

Oenobarbus. 113. Sc. thorace tricorni: medio longiori emarginato; lateralibus obtusis, capite bituberculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 35.
Habitat in America, *titani statura, sed minor.*

quadrispinosus. 114. Sc. thorace retuso: prominentia quadridentata, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 38.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

quadridens. 115. Sc. thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 39.
Habitat in India, *parvus, gibbus.*

mobilicornis. 116. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. *Fabr. spec. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 40. *Laichart. inf. t.* 1. *f.* 11. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.
Habitat in Anglia *et* Germania, *niger.*
Femina *plane mutica;* elytra *striata.*

cylindricus. 11. Sc. thorace anterius truncato quinquedentato, capite anterius cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn. suec.* 380.
Laichart. inf. tyr. p. 4. *n.* 4. Lucanus cylindricus.
Scopol. introd. hist. nat. 5. 75. Lucanus tenebrioides.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 20. *f.* 131.
Habitat in Europae *magis borealis pruno cerasso.*

Candidae. 409. Sc. thorace excavato antrorsum cornuto tibiis anterioribus tridentatis. *Petagn. spec. inf. Calabr. p.* 3. *n.* 9. *f.* VI. *a.* 6.
Habitat in Calabriae *ulterioris* promontorio Lacinio.

β) exscutellati.

violaceus. 117. Sc. totus violaceus, maxillis prominentibus, fronte declivi, thorace sexspinosa. *Lepech. it.* 2. *p.* 208. *t.* 10. *f.* 13.
Habitat in Sibiria, *sub lapidibus, parvus.*
Elytra *punctis excavatis insignita.*

nemestrinus. 118. Sc. thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto subulato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 96. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 106.
Degeer inf. 7. *p.* 637. *t.* 47. *f.* 16. Scarabaeus tricornutus.
Habitat ad caput bonae spei, *jaccho affinis, subtus hirtus.*

Oedipus. 119. Sc. thoracis cornu plano subtus dentato, capitis truncato tridentato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 98. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 108.
Habitat ad caput bonae spei.

splendidulus. 120. Sc. thoracis aenei cornubus duobus compressis nigris, capitis erecto apice compresso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 100. *mant. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 110.
Habitat in America *australi, carnificis magnitudine.*

festivus. 52. Sc. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-aeneis. *Linn. sp. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 101. *mant. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 111.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 552. *n.* 52. *Gron. zooph.* 452. Scarabaeus exscutellatus muticus, thorace nigro-maculato, elytris rubro-aeneis, sterno porrecto.
Roes. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 8. (mas).
Voet coleoptr. t. 23. *f.* 5. 7.
Degeer inf. 4. *t.* 8. *f.* 15.
Drury inf. 3. *t.* 48. *f.* 5. (fem.)
Habitat in America, *melolonthae magnitudine, at brevior, niger.*

Pactolus. 121. Sc. thorace bidente, capitis cornu elongato recurvo medio bidentato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 12. *n.* 112.
Habitat in Brasilia, *mediae magnitudinis, viridi-aeneus.*

Pithecius. 122. Sc. thorace bicorni: cornubus breviſſimis, capitis cornu erecto ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 113.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſeniculus. 123. Sc. thorace anterius, clypeo poſterius bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 114.
β) Scarabaeus brevipes. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 10. *n.* 35. *t.* 19. *f.* 16.
Habitat in Coromandel, *bonaſi ſtatura.*

Catla. 124. Sc. thorace anterius bidentato, capitis clypeo lineis duabus elevatis transverſis carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 115.
Habitat in Coromandel, *nuchicornis magnitudine et ſtatura, an femina alius ſpeciei?*

Moloſſus. 8. Sc. thorace retuſo bidentato utrinque impreſſo, clypeo unicorni lunato integro, elytris laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 11.* *Amoen. ac.* 6. *p.* 391.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 134.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 2.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 11.
Habitat in Sina, *ibi officinalis, cornu dentibusque nunc longioribus nunc brevioribus, feminae nullis.*
Femora *ovata.*

Roſalius. 125. Sc. thorace anterius bicorni, poſterius elevato tricorni, capitis cornu compreſſo ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 104. *mant inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 116.
Habitat in America *meridionali.*

Ammon. 126. Sc. thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris ſtriatis. *Linn. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 117.
Fabr. ſyſt. entom. p. 21. *n.* 83. Scarabaeus Silenus.
Habitat in America.

Midas. 127. Sc. thorace tricorni, clypeo ſinuato bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 118.
Habitat in America.

Hamadryas. 128. Sc. thorace tricorni: intermedio plano acuto tridentato, clypeo reflexo bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 119.
Voet coleoptr. t. 27. *f.* 38?
Habitat ad caput bonae ſpei, *niger.*

lunaris. 10. Sc. thorace bicorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fn. suec.* 379.* *Scop. ent. carn.* 22. *Gron. zooph.* 453.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 108. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 120.
Fn. suec. 1. *p.* 341. Scarabaeus thorace submutico, capite lunato, clypeo emarginato.
Raj. inf. 103. Scarabaeus ovinus tertius.
Geoffr. inf. paris. 1. *p.* 88. *n.* 1. Copris capitis clypeo lunulato &c.
Frisch inf. 4. *p.* 25. *t.* 7.
Roes. inf. 2. *scar.* 1. *t.* B. *f.* 2.
Pet. gaz. t. 138. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 63. *f.* 2. 3. ♂. ♀.
Berg str. nomencl. t. 1. *f.* 9. *et t.* 4. *f.* 7.
Poda mus. t. 1. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 25. *f.* 24. 25. *et t.* 26. *f.* 26.
Habitat in Europae *stercoratis, aliquando minor, cornubus minoribus, feminae in thorace constanter nullis.*

Rhadamistus. 129. Sc. thorace late foveolato; anterius cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis: futura punctisque duobus nigris.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 25. *n.* 109. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 121.
Habitat Tranquebariae.

Lar. 130. Sc. thorace tridentato, capitis cornu erecto, clypeo fisso.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 13. *n.* 124.
Habitat in India *parvus niger.*

Faunus. 131. Sc. thorace quadricorni; intermediis brevissimis, capitis cornu recurvo serrato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 25. *n.* 112. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 125.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 15.
Drury inf. 3. *t.* 48. *f.* 6.
Habitat in Cayenna.
Feminae *cornua minora: lateralia acuta.*

capucinus. 132. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 25. *n.* 113. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 126.
Habitat in India, *carolini magnitudine et statura.*

Lemur. 133. Sc. thorace quadridentato cupreo, clypeo posterius transverso carinato, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 495. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 127.

Schaller act. soc. Hal. nat. cur. 1. *p.* 237. Scarabaeus 10 punctatus.

Habitat in Germaniae *inferioris stercore animali, niger, statura nuchicornis.*

Camelus. 134. Sc. thorace quadridentato, clypeo posterius subbicorni, corpore atro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 128.

Habitat in Germania.

Femina *non mutica.*

Daldorfii. 135. Sc. thorace sexdentato, clypeo rhombeo: centro prominulo, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 129.

Habitat in India, *vernalis magnitudine.*

Bison. 27. Sc. thorace anterius mucronato, capite cornubus duobus lunaribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 115, *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 131.

Habitat in Hispania, *et australi* Gallia, *ater, stercorario minor.*

Femina *thoracis margine anteriore carinato elevato, mucroneque capitis parvo distincta.*

sagittarius. 136. Sc. thorace anterius mucronato, capitis cornu solitario erecto. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 116. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 132.

Habitat ad caput bonae spei.

bucephalus. 137. Sc. thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 117. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 133.

Habitat in America *australi et* India.

lancifer. 13. Sc. violaceus, thorace dentato, capitis cornu angulato, elytris sulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 119. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 135.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 13. Scarabaeus exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris sulcatis.

Voet coleoptr. t. 23. *f.* 1. 2. Scarabaeus violaceus.

Maregr. bras. 247. Taurus.

Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 4.

Habitat in America *australi, et* India, *mima minor.*

Vitulus. 138. Sc. thorace quadridentato, occipite cornubus duobus erectis brevibus, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 127. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Auſtria.
Femina *mutica.*

Gazella. 407. Sc. thorace ſubinermi aeneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat - - - - *ſtatura et magnitudine Sc. Tauri.*

b) *thorace inermi, capite cornuto.*

α) *ſcutellati.*

bilobus. 12. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu ſimplici, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 14. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Edw. av. t. 105. *f.* 2.
Gron. zooph. p. 414. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 63. *f.* 2. 3.
Voet coleoptr. t. 14. *f.* 106.
Habitat in Europa *auſtrali, naſicorni ſimilis, piceus.*

Rhinoceros. 14. Sc. thorace retuſo ſubbituberculato, capitis cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 42.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 14. *Muſ. Lud. Ulr.* 10.* Scarabaeus ſcutellatus thorace inermi, capite cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis.
Petiv. gaz. t. 44. *f.* 9. *et t.* 100. *f.* 3. Rhinoceros Laconenſis &c.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 7.
Barrel. ic. t. 163.
Voet coleoptr. t. 18. *f.* 117. 118.
Habitat in Aſia, *piceus, ſubtus hirſutus, naſicorni ſimilis, ſed duplo major.*
Feminae *thorax excavatus.*

naſicornis. 15. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 36. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 6. *f.* 4. 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 15. *Fn. ſuec.* 378. *Scop. ent. carn.* 14. Scarabaeus ſcutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis.
Mouff. inſ. 53.

Imperat. nat. 924. *f.* 1. 2. *et* 925. *f.* 3. 4.
Hoeffn. pict. t. 13. *f. antepenult.*
Olear. muſ. 27. *t.* 16. *f.* 4.
Jacob. muſ. 1. *S.* 5.
Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 2.
Swammerd. bibl. nat. t. 27. *f.* 1. 2.
Friſch inſ. 3. *t.* 3. *f.* 4.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 7. *f.* 8. 10.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 68. *n.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 7. 8.
Voet coleoptr. t. 18. *f.* 120. 121.
Habitat in Europae *fimetis et vaporariis.*
Larva *griſea, capite, pedibus ſpiraculisque rufis*, *a* Swammerdamio *pro coſſo veterum habita.* Feminae *thorax rotundatus vix retuſus.*

Sylvanus. 139. Sc. thoracе retuſo: prominentia triplici, intermedia obſoleta, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 37.
Habitat in Braſilia.

Lazarus. 140. Sc. thorace bituberculato, capitis cornu brevi emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 25.
Habitat in Noveboraco.

Barbaroſſa. 141. Sc. thorace anterius ſcabro, capitis cornu recurvo brevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 43.
Habitat in nova Hollandia.

Satyrus. 142. Sc. thorace anterius truncato, capitis cornu recurvo, capite longiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 44.
Habitat in America *ſeptentrionali.*
Feminae *clypeus tuberculatus, thorax planus.*

jamaicenſis. 143. Sc. thorace anterius retuſo, capitis cornu recurvo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 45.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Habitat in America *meridionali.*
Femina *mutica.*

Silenus. 144. Sc. thorace anterius excavato, capitis cornu recurvo, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 46.

Forſter

Forſter cent. inſ. 1. 1. 1. Scarabaeus excavatus.
Voet coleopt. t. 18. *f.* 119.
Barrel. plant. Hiſp. t. 163.
Scopol. delic. inſubr. 1. *p.* 50. *t.* 21. *f.* c.
Habitat in Galloprovincia.

Syrichtus. 145. Sc. thorace rotundato, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 47.
Habitat in America.

Apelles. 146. Sc. capitis cornu breviſſimo, elytris cinereis: punctis elevatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus, pedibus flavis nigro-maculatis.*

Aries. 147. Sc. thorace rotundato, capitis cornu breviſſimo ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 49.
Habitat ad caput bonae ſpei.

coronatus. 148. Sc. capitis clypeo elevato poſterius emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 50.
Habitat in Java, *piceus.*

Hylax. 149. Sc. capitis cornu emarginato, tibiis poſterioribus breviſſimis apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 51.
Habitat in Africa.

didymus. 19. Sc. thorace foſſula exarato, capite tricuſpidi, elytris ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 14. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 52.
Gron. zooph. 420.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 126.
Habitat in America.
Feminae *thorax antrorſum mucrone parvo elevato armatus.*

Polyphemus. 150. Sc. capite tricorni: anteriore porrecto bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 53.
Habitat in Africa, *goliatho affinis, ſed minor, elytris viridibus macularum albarum ſerie triplici ornatis.*

Goliathus. 151. Sc. clypeo bifurco. *Mant. p.* 530. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 54.
Sulz. inf. t. 1. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 22. *f.* 51.
Drury inf. 1. *t.* 31. *et* 3. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat in Africa, *praesertim* Guinea.

Hircus. 152. Sc. thorace scabro, capite linea transversa carinata: clypeo bidentato. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 55.
Habitat Tranquebariae.

farctus. 153. Sc. brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-striatis apice nigris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 56.
Habitat in Pensilvania.

retusus. 154. Sc. thorace retuso, capitis cornu brevi plano, femoribus posterioribus incrassatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 57.
Habitat ad caput bonae spei, *nasicorni minor, niger, subtus ferrugineus hirtus, pedibus rufis.*

piceus. 155. Sc. piceus, thorace glabro, capite bicorni, elytris striatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 58. *Herbst apud Fuessl. Arch. Inf.* 4. *p.* 4. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in America *australi et* India, *fossoris magnitudine.*

maurus. 30. Sc. capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 16. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 68.
Habitat in Mauritania, *oblongus, thorace convexo.*

β) exscutellati.

Jacchus. 156. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo simplici. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 97. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 107.
Habitat ad caput bonae spei.
Feminae *cornu capitis brevissimum truncatum.*

Sabaeus. 157. Sc. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto simplici. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 99. *mant. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 109.
Habitat in Coromandel, *Jacchi statura et magnitudine.*
Feminae *cornu capitis, et thoracis tubercula minora.*

158. Sc.

Belzebul. 158. Sc. thorace prominentia triplici, capite tricorni: intermedio majore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 122.
Habitat in America.

bifaſciatus. 159. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu erecto, elytris nigris: faſciis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 111. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 123.
Habitat in Coromandel, *niger, nuchicornis magnitudine.*

Bonaſus. 160. Sc. thorace prominentia duplici, capite tricorni: lateralibus majoribus arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 114. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 130.
Pallas ic. inſ. Ruſſ. p. 5. *t.* A. *f.* 5.
Schroeter Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5. Scarabaeus Vacca.
Habitat in India.

valgus. 20. Sc. femoribus ſecundi paris remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 15. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 120. *mant. inſ. p.* 14. *n.* 136. Scarabaeus (Paniſcus) thorace retuſo elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fiſſo.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 8.
Roeſ. inſ. 2. *Scarab.* 1. *t.* B. *f.* 2.
Habitat in America.
Elytra *brevia*; digiti *magis hirſuti, quam congeneribus.*

carolinus. 16. Sc. thorace retuſo, capite ovali integro unicorni, elytris ſtriatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 27. *n.* 121. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 137. Scarabaeus capitis cornu erecto breviſſimo, clypeo integro, elytris ſulcatis.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 14.
Habitat in America *boreali, ater, obtuſus, gibbus, pollicem craſſus, ſtatura moloſſi.*

Sphinx. 161. Sc. thorace punctis quatuor impreſſis, capite ſubcornuto, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 122. *mant. inſ. p.* 24. *n.* 138.
Pall. it. 1. *p.* 462. *n.* 25. Scarabaeus humeroſus.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 4. *t.* A. *f.* 4. Scarabaeus Menalcas.
Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 10. *et apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 11. *n.* 37. *t.* 19. *f.* 17.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 8. Scarabaeus ſpinipes.
β) Scarabaeus fronte ruga, elytris ſtriis laeviſſimis. *Muſ. Lesk. p.* 1. *n.* 12.

Habitat

Habitat in America *meridionali, et deserto acidissimo* mari caspio *boream versus finitimo, sericeus ex viridi caeruleus.*

Nicanor. 162. Sc. thorace punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 27. *n.* 123. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 139.
Drury inf. 1. *t.* 35. *f.* 1. Scarabaeus sulcatus.
Habitat in America.

Fricator. 163. Sc. thorace anterius elevato acuto, capitis cornu truncato subemarginato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 140.
Habitat in India, *totus ater, nitidus, nicanoris magnitudine.*

Mimas. 17. Sc. thorace retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. *Mus. Lud. Ulr.* 9.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 28. *n.* 124. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 141.
Sulz. inf. t. 1. *f.* 4. *Voet coleoptr. t.* 23. *f.* 4. Copris viridis splendens.
Roes. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, clypeo integro.*

hispanus, 21. Sc. clypeo cornuto emarginato, elytris striatis, femoribus secundis remotissimis. *Mus. Lud. Ulr.* 12. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 130. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 148.
Pet. gazoph. t. 8. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 13.
Habitat in Barbaria *et australiore* Europa, *lunari similis, sed major, clypei incisura a molosso distinctus.*

tridens. 164. Sc. thorace cupreo, capite basi tridentato, elytris nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 129. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 147.
Habitat in Africa *aequinoctiali, niger, carnificis magnitudine.*

carnifex. 22. Sc. thorace plano angulato scabro, capitis cornu inflexo, corpore aeneo. *Gron. zooph.* 450.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 129. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 146. Scarabaeus exscutellatus, thorace inermi angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. *f.* ult.
Drury inf. 1. *t.* 35. *f.* 3-5.
Voet coleopt. t. 26. *f.* 31. 32.
Habitat in America, *stercorario brevior, latus, depressus; formatam e stercore pilulam conjunctis gregatim viribus per

per totam aestatem volvens volutansque, etiam non suam, usque in foveam determinatam, uti pilularis.
Cornu *retrorsum positum nigrum, laeve, feminae obsoletum.*

spinifex. 165. Sc. thorace rotundato, occipite spina recurva. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 131. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Coromandel, *niger viridi-nitens, nuchicornis statura et magnitudine.*

nuchicornis. 24. Sc. thorace rotundato, occipite spina erecta armato. *Fn. suec.* 381.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 132. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 150.
It. gotl. 41. Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebulosis.
Raj. inf. p. 103. *n.* 2. Scarabaeus ovinus tertius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 89. *n.* 3. (*mas*) *et* (*fem.*) 4.
Voet colept. t. 25. *f.* 18.
Gronov. zooph. 454.
Roes. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 4.
β) Scarabaeus coenobita. *Herbst apud Fuessl. Arch. Inf.* 4. *p.* 11. *n.* 40. *Voet coleopt. t.* 25. *f.* 18.
Habitat in Europae *stercore.*
Femina *mutica.*

Capra. 166. Sc. occipite spina erecta gemina, corpore nigro obscuro.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 15. *n.* 144.
Habitat Halae Saxonum, *vaccae statura et magnitudine.*

Vacca. 25. Sc. thorace acuminato, occipite spina erecta gemina.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 143.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 90. *n.* 5.
Schaeff. inf. t. 73. *f.* 4. 5. ♂. ♀.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Europa *temperata, nuchicorni thorace aeneo, elytrisque fuscis, caprae spina occipitis gemina similis.*

Taurus. 26. Sc. occipite cornubus binis reclinatis arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 142. *Schreber inf. t.* 1. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. 25. Scarabaeus illyricus.
Raj. inf. p. 103. *n.* 2. Scarabaeus ovinus alter.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 92. Copris niger, capite pone bicorni &c.
Sulz, hist. inf. t. 1. *f.* 5.

Schaeff.

Schaeff. inf. t. 73. *f.* 2. 3. ♂. ♀.
Voet coleopt. t. 24. *f.* 16.
Habitat in Germania *et* Europa *magis auſtrali, nuchicorni ſimilis, at cornubus diſtantibus arcuatis diverſus.*

nutans. 167. Sc. thorace anterius impreſſo, occipite ſpina erecta apice nutante, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 151.
Habitat Halae Saxonum, *nuchicornis ſtatura et magnitudine.*

ſcabroſus. 168. Sc. thorace rugoſo, capitis cornu erecto breviſſimo, elytris teſtaceis nigro-ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 133. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 152.
Voet coleopt. t. 25. *f.* 23.
Habitat in America *meridionali, nuchicorni paulo major.*

furcatus. 169. Sc. thorace rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breviori. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 134. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 153.
Laichart. inſ. tyr. p. 26. *n.* 20. *t.* 1. *f.* 20. Scarabaeus Vitulus.
Habitat in Gallia *meridionali.*
Feminae *cornuum loco linea transverſa elevata.*

verticicornis. 170. Sc. thorace griſeo nigro-punctato, capitis cornu erecto breviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 135. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 154.
Habitat in Anglia, *nuchicorni valde affinis, an varietas?*

truncaticornis. 171. Sc. aeneo-niger, thorace rotundato, occipite ſpina apice truncata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 238.
Habitat in - - - - *ſtatura nuchicornis, at minor.*
Femina *mutica.*

ſpiniger. 415. Sc. occipite ſpina erecta brevi, elytris lividis: maculis confluentibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 47.
Habitat in Europa.

novem maculatus. 416. Sc. teſtaceo fuſcus, clypeo rugis duabus, elytris fuſcis: maculis novem rufo teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 48.
Habitat extra Europam, *antennis, thoracis margine exteriori pedibusque lividis.*

recticornis. 427. Sc. ater, thorace ſubinermi, capite cornubus duobus erectis, clypeo rotundato. *Lesk. it. p.* 45. *t.* A. *f.* 8. 9.
Habitat in Luſatiae *valle, a fluvio* Pulonitz *irrigata, 5 lineas longus.*

c) *tho-*

c) *thorace et capite inermi:* Mutici:

α) *ſcutellati.*

Aygulus. 172. Sc. thorace quadripunctato, capite tuberculato, elytris teſtaceis, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 15. *n.* 57. *mant. inſ.* I. *p.* 8. *n.* 60.
Habitat in India, *Jnuo affinis, at duplo major, et tibiis anterius quoque dentatis diſtinctus.*

fimetarius. 32. Sc. ater, capite tuberculato, elytris rubris. *Fn. ſuec.* 385. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 16. *n.* 64. *mant. inſ.* I. *p.* 9. *n.* 70. *Scop. ent. carn. p.* 20. 21. *Geoffr. inſ. pariſ.* I. *p.* 81. *n.* 18. *Fn. ſuec.* I. *p.* 355. Scarabaeus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.
Raj. inſ. p. 106. *n.* 9. Scarabaeus pilularius nonus.
Friſch inſ. 4. *t.* 19. *f.* 3.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* I. *t.* A. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 144. *f.* 6.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 8.
β) Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris griſeis, pedibus pallidis. *It. oel.* 41.
Uddm. diſſ. nr. 2.
γ) Scarabaeus (rufus) rufus totus, ſolis oculis nigris, capite tuberculis tribus, elytris ſtriatis. *v. Moll apud Fueſſl. naturh. Mag.* I. 372.
Habitat frequens in Europae *ſtercore.*
Capitis *tubercula utplurimum tria.*

haemorrhoidalis. 33. Sc. capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. ſuec.* 386. *Fn. ſuec.* I. *p.* 358. Scarabaeus ater, elytris poſtice ferrugineis, pedibus rufis.
Habitat in Europae *fungis et putridis; an mera granarii varietas?*

conſpurcatus. 34. Sc. thoracis marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro-maculatis. *Fn. ſuec.* 387. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 17. *n.* 67. *mant. inſ.* I. *p.* 9. *n.* 73. *Raj. inſ. p.* 108. Scarabaeus pilularius decimus. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 82. *n.* 19. *Schaeff. ic. t.* 26. *f.* 8. *Pontopp. Atl. dan. t.* I. *f.* 82. *Voet coleoptr. t.* 21. *f.* 144.
β) Scarabaeus teſſulatus. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 162. *n.* 9.
Habitat in Europae *ſtercore, vere praeſertim frequens, ſordido affinis, ſed minor; β) dimidio minor.*

173. Sc.

ſordidus. 173. Sc. capite tuberculato, thorace nigro: margine pallido; puncto nigro, elytris griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 75. *Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *n.* 13. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat in Angliae *ſtercore.*

luridus. 174. Sc. ater, capite tuberculato, elytris griſeis nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 76. *Müll. prodr. zool. dan.* Scarabaeus teſſullatus.

marianus. 35. Sc. capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fuſco-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 78.
Habitat in America, *magnitudine aloëi; an forſan femina mutica Herculis?*

ſordens. 413. Sc. niger, capite tuberculato: intermedio prominulo, elytris ſordide teſtaceis: ſutura marginibusque ſordide brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 21.
Habitat in Europa.

nebulo-ſus. 414. Sc. fuſcus, thorace laevi: marginibus externis lividis, capite obſolete tuberculato, elytris ſtriatis, fuſco nebuloſis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 22.
Habitat in Europa.

Inuus. 175. Sc. thorace quadripunctato, capite quadrituberculato, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 59.
Fabr. ſyſt. entom. p. 14. *n.* 45. Scarabaeus Sphinx.
Habitat in Sierra Leon Africae, *ſupra ex viridi aeneus obſcurus.*

ſubterra-neus. 28. Sc. thorace glabro, capite tuberculis tribus, elytris ſtriis crenatis. *Fn. ſuec.* 382.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 61.
Gadol ſatag. 76. Scarabaeus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 2.
Habitat in Europae *ſtercore, foſſori affinis, at multo minor.*

Foſſor. 31. Sc. thorace retuſo, capite tuberculis tribus: medio ſubcornuto. *Fn. ſuec.* 384.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 62.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 82. *n.* 20.

Gunner.

Gunner. act. Nidr. 4. *p.* 266. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
Fn. fuec. 352. Scarabaeus ovatus ater glaber.
Schaeff. ic. t. 144. *f.* 78.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 7.
Voet coleopt. t. 21. *f.* 141.
Habitat in Europae *fabulosi ſtercoratis.*

foetens. 176. Sc. capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 63.
Habitat Halae Saxonum *ater, ano rufo, thoracis macula marginali ferruginea.*

analis. 177. Sc. niger, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris apice ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 64.
Habitat in India, *foſſoris ſtatura et magnitudine.*

ſcybalarius. 178. Sc. capite tuberculis tribus: intermedio acuto, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 65.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 17. *t.* 19. *f.* 6. Scarabaeus foetidus.
Habitat in Germania, *foſſore minor.*

terreſtris. 179. Sc. capite tuberculis tribus aequalibus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 66.
Habitat in Anglia, *foſſore triplo minor.*

conflagratus. 180. Sc. capite tuberculis tribus, clypeo ſcutelloque nitide nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 5. *n.* 11.
Habitat in Germaniae *ſtercore vaccino, erratico affinis.*
Elytra *punctis excavatis ſulcata.*

inquinatus. 181. Sc. capite tuberculis tribus, elytris luteis nigro ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *t.* 19. *f.* 5. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 74.
Habitat in Germania, *ſimetario tertia parte, ad conſpurcatum accedens.*
Scutellum *nitide nigrum.*

unifaſciatus. 182. Sc. thorace piceo: prominentia triplici; intermedia trituberculata, elytris teſtaceis: faſcia ſinuata fuſca. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 240.
Habitat in Malabar.

ſanguinolentus. 183. Sc. niger, capite tuberculis tribus obſoletis, elytris punctatim ſtriatis apice rubris. *Herbſt apud Fueſſli Arch.* 4. *p.* 6. *n.* 15. *t.* 19. *f.* 4.

Habitat in Germania, *fimetarium simulans, at tertia parte minor.*

bimaculatus. 184. Sc. capite subtrituberculato, elytris striatis: macula baseos rubra. *Fabr. mant. inf.* 1. 8. *n.* 67.
Habitat in Germania, *ater, terrestris statura et magnitudine.*

testaceus. 185. Sc. testaceus, capite bituberculato, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 16. *n.* 63. *mant. inf* 1. *p.* 9. *n.* 69.
Habitat in Angliae *stercoratis.*

pygmaeus. 186. Sc. clypeo marginato, thorace viridi: prominentia bifida, elytris testaceis nigro-maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 239.
Habitat in Malabar, *ovati magnitudine, nuchicornis statura.*

erraticus. 29. Sc. thorace laevi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Fn. suec.* 385. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 17. *n.* 66. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 72. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 5. *n.* 10. *t.* 19. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 9.
Voet coleoptr. f. 146?
Habitat in Europae *stercore, viis.*

bicolor. 187. Sc. thorace subinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 17. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 71.
Habitat in Germania.

granarius. 23. Sc. niger, clypeo tuberculo solitario, elytris posterius testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 17. *n.* 70. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 77. *Lesk. it. p.* 45. *t.* A. *f.* 10.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 547. *n.* 23. Scarabaeus scutellatus niger, thorace inermi: clypeo tuberculato, elytris substriatis margine postico testaceis.
Habitat in Europae *locis suffocatis, feminis tritici magnitudine.*
Elytra *interdum ultra dimidium testacea.*

futuralis. 188. Sc. niger nitidus, capitis tuberculo solitario minuto, elytris sordide flavis striatis minuto punctatis, scutello margine exteriore ad basin futuraque nigris. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 162. *n.* 10.
Habitat in vallis Salzburgensis Zillerthal *stercore equino, sordido affinis.*

Veter. 408. Sc. rufus, capite thoraceque linea carinata elevata. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in India, *cephi magnitudine.*

Gigas. 36. Sc. thorace retuso, capite supra margineque angulato. *Muf. Lud. Ulr.* 16.*
Habitat in Aegypto, *ater, primae magnitudinis.*

fcaber. 37. Sc. thorace elytrisque anterius fcabris. *Muf. Lud. Ulr.* 17.* *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 79. Scarabaeus fcutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice fcabris.
Habitat in America, *naficorni duplo major, Herculis feminae affinis.*

longimanus. 39. Sc. pedibus anterioribus arcuatis longiffimis. *Muf. Lud. Ulr.* 18.* *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 80.
Aubent. mifc. t. 41. *f.* 1.
Voet coleopt. t. 11. *f.* 97.
Habitat in India.
Femora *anteriora dente valido armata.*

ftercorarius. 42. Sc. ater glaber, elytris fulcatis, capite rhombeo: vertice prominulo. *Fn. fuec.* 388.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *Scop. ent. carn.* 26? *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 81.
Mouff. inf. 151.
Raj. inf. p. 74. *n.* 1.
Bauh. halluc. 212. *f.* ult.
Liff. mut. 17. *f.* 4.
fcar. angl. p. 380. *n.* 4.
Frifch inf. 4. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 9.
Degeer inf. 4. *t.* 9. *f.* 10. 11.
Voet coleopt. t. 20. *f.* 134.
Habitat in Europa *fub ftercore, acaris et ichneumone infeftatus, veſpere ingenti cum ſuſurro circumvolitando ſerenum diem praenuncians, ab Aegyptiis ſoli conſecratus, colore interdum in caeruleum aut virefcentem vergente, aut ſubtus aeneo, elytrisque obſcure rufis varians.*

vernalis. 43. Sc. elytris glabris laeviffimis, clypeo rhombeo: vertice prominulo. *Fn. fuec.* 389. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 77. *n.* 10. *Scop. ent. carn. p.* 27. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 82.

Sulz. hist. inf. t. 1. *f.* 6.
Voet coleopt. t. 20. *f.* 135.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat sub Europae *stercore, stercorario simillimus, at minor, glaber, nitidus, antennis rubris, colore caerulescente, virescente et obscuro varius.*

juvencus. 189. Sc. thorace anterius impresso mucronato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 76. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 83.
Habitat in America.

splendidus. 190. Sc. viridi-nitens, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 77. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 84.
Habitat in insulis Americae *australi oppositis.*

Cephus. 191. Sc. rufus, elytrorum sutura apicibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 78. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 85.
Hospitatur in museo Ill. Banks.

laborator. 192. Sc. ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 79. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 86.
Habitat in Brasiliae *stercore.*

globator. 193. Sc. thorace elytrisque obscure nigris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 80. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 87.
Habitat ad caput bonae spei, *fossoris magnitudine, subtus hirtus piceus.*

septemmaculatus. 194. Sc. elytris striatis pallidis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 81. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 88.
Habitat in Africa *aequinoctiali, piceus, conspurcati statura, at paulo major.*

bipunctatus. 195. Sc. thorace nigro rubro-marginato, elytris rubris puncto nigro. *Lepech. it.* 2. *p.* 324. *t.* 10. *f.* 7. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 89.
Laxmann nov. comm. Petr. 14. *p.* 593. *t.* 24. *f.* 1. Scarabaeus bimaculatus.
Pallas ic. inf. Russ. 1. *p.* 12. *t.* A. *f.* 12. Scarabaeus coccionelloides.
Habitat sub fimo equino Russiae *australis et ad* Volgam.
Thoracis *margo rufus, puncto nigro.*

arator. 196. Sc. niger, thorace laevi, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 102. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 90.
Habitat ad caput bonae spei.

197. Sc.

barbatus. 197. Sc. muticus laevis niger, ano barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 91.
Habitat in India.

quisquilius. 83. Sc. ater glaber, elytris livido-teſtaceis. *Fn. ſuec.* 297.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 91. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 100. *Scop. ent. carn.* 29.
Herbſt apud Fueſſl. Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 23. *t.* 19. *f.* 8.
β) Scarabaeus merdarius. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 90. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 7. *n.* 22.
γ) Scarabaeus cotericus. *v. Moll. naturh. Br.* 1. *p.* 168. *n.* 13. Scarabaeus Copris. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 5. *n.* 6.
Habitat in Europae *ſtercore et quisquiliis, ſeminis milii magnitudine,* β) *dimidio major.*

arcuatus. 198. Sc. niger nitidus, capitis clypeo anterius rufo, elytris ſtriato-punctatis, ſutura, puncto marginali baſeos vittaque abbreviata futuram verſus inflexa rubeſcentibus, pectore obſcuro, abdomine flaveſcente, palpis, antennis pedibusque ferrugineis. *v. Moll. naturh. Br.* 1. *p.* 160. *n.* 7.
Habitat in alpibus Salzburgicis.

Scrofa. 199. Sc. oblongus niger, elytris fuſcis ſubſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 99.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura teſtudinarii, at minor.*

teſtudinarius. 200. Sc. niger, elytris ſulcatis piceis ferrugineo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 89. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 98. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 7. *n.* 21. *t.* 19. *f.* 7. a. b.
Habitat in Anglia *et* Germania, *vere in agris ſtercoratis frequens.*

marginellus. 201. Sc. niger, thoracis elytrorumque margine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 88. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 97.
β) Melolontha nigro-marginata. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 155. *n.* 20. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *parvus, pedibus piceis.*

quadrimaculatus. 84. Sc. niger oblongus, elytris maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 398.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 86. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 94.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 10. *n.* 31. *t.* 19. *f.* 15. Scarabaeus quadriguttatus.
Habitat in Europae *ſtercore.*

Sus. 202. Sc. oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 95. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 9. *n.* 29. *t.* 19. *f.* 10.
Habitat in Germaniae *stercore humano, fimetario dimidio minor, statura quadrimaculati.*

plagiatus. 85. Sc. niger, elytris plaga rufescente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 96.
Habitat in Europa, *an varietas subterranei?*

Blackburni. 203. Sc. thorace nigro aeneo, elytris striatis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 85. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 93.
Habitat in America *boreali, rufipede paulo major.*

rufipes. 86. Sc. antennis pallidis, elytris laevibus. *Fn. suec.* 403.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 20. *n.* 84. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 92.
Scarabaeus thorace glabro nitido, elytris striatis.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 6.
β) Scarabaeus arator. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 9. *n.* 30.
Scarabaeus gagates. *v. Moll naturh. Br.* 1. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in Europae, *potissimum borealis stercoratis, β) fimetarium magnitudine vix superans.*

Ceratoniae. 87. Sc. thorace scabro lateribus tridentato, elytris griseis. *Mus. Lud. Ulr.* 31.*
Hasselq. it. 409. *n.* 99. Scarabaeus ceratoniae.
Habitat in Cairi *ceratonia.*

porcatus. 204. Sc. fuscus, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 92. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 101. *Herbst. apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 8. *n.* 24. *t.* 19. *f.* 9. a. b. c.
β) Scarabaeus foveolatus. *v. Moll. naturh. Br.* 1. *p.* 173. *n.* 19.
Habitat in Germaniae *stercore.*

stercorator. 205. Sc. ater laevis, elytris striato-crenatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 93. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 102.
Habitat in Brasilia.

asper. 206. Sc. capite thoraceque transversim sulcatis, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 94. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 103. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 8. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 10. a. b.
Habitat in Europae *plantis putridis.*

unipunctatus. 207. Sc. ater, coleoptris flavescentibus: puncto communi nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 95. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 104.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 579. *n.* 6. *Fn. suec.* 470.* Coccinella coleoptris flavescentibus: puncto communi nigro.

interpunctatus. 208. Sc. niger, elytris sordide flavis sulcis nigris: area intermedia maculis oblongis alternis nigris varia. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 8. *n.* 26. *t.* 19. *f.* 11.
Habitat in stercore vaccino Berolini.

varius. 209. Sc. niger, elytris dimiato flavis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 9. A. 27. *t.* 19. *f.* 12.
v. Moll naturh. Br. 1. *p.* 172. *n.* 18. Scarabaeus variegatus?
Habitat in stercore vaccino pratorum Berolinensium, *ad interpunctatum proxime accedens, an varietas?*

contaminatus. 210. Sc. niger, clypei surtellique margine luteo, elytris punctato-striatis hirtis pedibusque sordide flavis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 9. *n.* 28. *t.* 19. *f.* 13.
Habitat in Pomerania, *interpunctato similis, sed minor.*

minutus. 211. Sc. niger, elytris striatis pedibusque spadiceis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 1. *p.* 10. *n.* 32.
Habitat Berolini, *quisquilio aequalis, at magis oblongus.*

oblongus. 212. Sc. clypeo foveolato, elytris sulcatis, corpore oblongo.
v. Moll naturh. Br. 1. *p.* 171. *n.* 16. *et apud Fuesslı n. Mag. Entom.* 1. *p.* 371.
Habitat in Germaniae *stercore, fossori affinis.*

arenarius. 213. Sc. ater, elytris striatis, tibiis piceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 105.
Habitat in Sueciae *arena mobili, parvus.*

laevis. 417. Sc. ater, thorace laevi, elytris striatis. *Mus. Lesk. p.* 2. *n.* 34.
Habitat in Europa.

dichrous. 418. Sc. ater glaber, thoracis margine externo elytris pedibusque sordide testaceis. *Mus. Lesk. p.* 2. *n.* 35.
Habitat in Europa.

β) exscutellati.

decempunctatus. 214. Sc. thorace anterius tuberculis tribus, elytris testaceis fascia transversa oblongo-punctatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 237.

v. Moll naturh. Br. 1. *p.* 175. *n.* 21. Scarabaeus quadrituberculatus.
Habitat in Germaniae *ſtercore humano et vaccino.*

reflexus. 215. Sc. niger, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 157.
Habitat in Sina, *oblongus, foſſoris magnitudine.*

quadripuſtulatus. 216. Sc. ater, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 137. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 156.
Habitat in nova Hollandia.

ſulcator. 217. Sc. ater, capitis tuberculo unico, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 136. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 155.
Habitat in Cayenna.

criſtatus. 218. Sc. niger, thorace criſtato, clypeo tuberculato quadridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 138. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 158.
Habitat in Aegypto.

ſacer. 18. Sc. clypeo ſexdentato, thorace crenulato, tibiis poſterioribus ciliatis, vertice ſubbidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 13. *Amoen. acad.* 6. *t.* 3. *f.* 170. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 139. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 159.
Degeer inſ. 7. *p.* 638. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 18. Scarabaeus cornutus.
Oſb. it. 51. Scarabaeus laevis thorace inermi, capite antice ſexdentato.
Loeſl. it. 20. Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice ſerrato, elytris nebuloſe maculatis ſubmollibus planiuſculis.
Petiv. gazoph. t. 42. *f.* 2.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 3.
Voet coleopt. t. 27. *f.* 39. 40.
Habitat in partibus Orbis *antiqui auſtralioribus, in* Roſſiae *auſtralis aridis frequens cylindrum e ſtercore bovino volvens in columnis antiquis* Romae *exſculptus ab* Aegyptiis.

laticollis. 38. Sc. niger, clypeo ſexdentato, elytris ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 140. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 160.
Geoffr. inſ. 1. *p.* 89. *n.* 2. Copris niger, capite clypeato: margine ſerrato, thorace lato laevi, elytris ſtriatis.
Raj. inſ. p. 105. *n.* 4.
Voet coleoptr. t. 27. *f.* 41.
Habitat in Sina, *et auſtrali* Europa, *ſacro valde affinis.*

219. Sc.

variolosus. 219. Sc. clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris: punctis impressis variolosis. *Fabr. mant.* I. *p.* 16. *n.* 161.
Habitat in Istria, *laticollis statura, sed paulo minor.*

miliaris. 220. Sc. clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris: maculis elongatis atris. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 141. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 162.
Habitat in India.

Bacchus. 221. Sc. clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisque glabris. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 142. *mant.* I. *p.* 17. *n.* 163.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus, gibbus.*

gibbosus. 222. Sc. clypeo quadridentato, elytris basi gibbo notatis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 143. *mant. p.* 17. *n.* 164.
Habitat in America.

Hollandiae. 223. Sc. clypeo quadridentato, elytris sulcatis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 144. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 165.
Habitat in nova Hollandia.

Koenigii. 224. Sc. clypeo bidentato, thorace scabro, elytris variolosis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 145. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 166. *Pall. icon. inf. Rosf.* I. *p.* 7. *t.* A. *f.* 7. Scarabaeus scriptus.
Habitat Tranquebariae.

cupreus. 225. Sc. ex nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 146. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 167.
Habitat in Africa.

flagellatus. 226. Sc. niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 32. *n.* 147. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 168.
Habitat ad caput bonae spei, *et in australi* Europa.

pilularius. 40. Sc. niger opacus laevis subtus aeneus, thorace posterius rotundato. *Mus. Lud. Ulr.* 19.* *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inf.* I. *p.* 17. *n.* 170.
Geoffr. inf. I. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus &c.
Arist. Anim. l. 5. *c.* 18.
Plin hist. mund. II. 34. Pilularius.
Raj. inf. p. 105. *n.* 1.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. fig. sinistr.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleopt. t. 28. *f.* 49.
β) Scarabaeus Mopsus. *Pall. ic. inf. Rosf.* I. *t.* A. *f.* 3.
Scarabaeus Geoffroae. *Sulz. ic. inf. t.* I. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis australi, stercorarii magnitudine et statura; bini quotidie sisyphi instar volvunt globum e*

ſtercore inprimis humano confectum ſe ſaepe ſeptiesmajorem Loeſl. it. 20.

Schaeffe-ri. 41. Sc. thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus poſterioribus elongatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 148. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 169.
Scop. ent. carn. p. 84. Scarabaeus longipes.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 92. *n.* 9. Copris niger, pedibus longis &c.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 25. *f.* 17.
Habitat in Calabriae, Germaniae *et* Sibiriae *collibus apricis, globulos e ſtercore bovino factos volvens et ſepeliens, niger, horticolae magnitudine.*

braſilianus. 227. Sc. ater, clypeo emarginato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 150. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 171.
Habitat in Braſiliae *ſtercore bovino.*

calcaratus. 44. Sc. capite clypeato emarginato, femoribus poſterioribus dentatis.
Habitat in Aegypto.

Schrebe-ri. 45. Sc. ater glaber, elytrorum maculis duabus femoribusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 172.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 28. *f.* 49.
Habitat in Europa *temperata, nuchicornis fere ſtatura.*

bipuſtulatus. 228. Sc. ater, elytris baſi macula rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 173.
Habitat in nova Hollandia.

pallipes. 229. Sc. capite thoraceque pallido viridique variegatis, pedibus antennisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 174.
Habitat in Coromandel, *parvus.*

triangularis. 230. Sc. niger, thoracis margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 175.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 7.
Habitat in America *auſtrali, nuchicornis ſtatura.*

231. Sc.

cinctus. 231. Sc. niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 155. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 176.
Habitat in Sina.

flavipes. 232. Sc. nigricans, thoracis marginibus, elytris pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 177.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 24. *n.* 17. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 12. *n.* 46. *t.* 19. *f.* 19. Scarabaeus thoracocircularis.
Schaeff. ic. t. 74. *f.* 6.
Habitat in Germania, *cincti ſtatura.*

aeneus. 233. Sc. viridi-aeneus, thorace bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 178.
Habitat in Coromandel, *parvus, ſubtus niger.*

ſmaragdulus. 234. Sc. aeneus nitidus, clypeo bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 157. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 179.
Habitat in America *auſtrali, parvus, glaberrimus.*

ovatus. 46. Sc. niger, clypeo emarginato, thorace ſubaeneo, elytris abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 189.
Habitat in Calabriae, Germaniae, Angliae *ſtercore bovino, nuchicorni ſimilis, at quadruplo minor.*

amazonus. 47. Sc. teſtaceus thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriore callo fuſco.
Habitat Surinami, *laevis, ſtercorario dimidio minor.*

crucifer. 319. Sc. thorace ſubvilloſo virideſcente, elytris luteis corpore brevioribus: cruce nigra, trabe duplici. *Lepech. it.* 1. *p.* 240. *t.* 16. *f.* 14.
Habitat in Sibiriae *quercetis, pulpa foliorum victitans, ſubtus niger villoſus, an hujus generis?*

caeruleus. 320. Sc. totus cyaneus oblongus. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in Sibiriae *deſerto* uralenſi, 5 *lineas longus, ſubtus in atrum colorem vergens.*

uralenſis. 321. Sc. viridis, elytris flavis corpore brevioribus, apice acuminatis. *Lepech. it.* 1. *p.* 313.
Habitat in deſerti Sibiriae uralenſis *arenoſis, ſubtus villo albo tectus.*
Elytra *lineis villo albicante ſignatis a medio ad apicem diſtincta.*

419. Sc.

stictopterus. 419. Sc. niger elytris strictis punctatis. *Mus. Lesk. p.* 3. *n.* 32. *Habitat in* Europa.

guttatus. 420. Sc. niger, thorace rotundato: guttis eminentibus glabris, capitis clypeo impresso apice bifido, elytris profunde striatis crenatis: maculis oblongis e pilis luteis. *Mus. Lesk. p.* 3. *n.* 53.

b) *mandibula arcuata subdentata, abdomine apice nuda, oblique truncato.* Melolonthae.

Fullo. 57. Sc. testaceus albo-maculatus, scutello macula duplici antennis heptaphyllis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 553. *n.* 57. *Fn. suec. p.* 394. *Scop. ent. carn. p.* 123. Scarabaeus scutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro, pilis albis, scutello macula duplici alba.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 69. *n.* 2. Scarabaeus antennarum lamellis maximis.
Raj. inf. p. 93. *n.* 9. Scarabaeus Fullo.
Frisch inf. 11. *t.* 1. *f.* 1.
Mouff. inf. 160. *f.* 4.
Hoeffn. inf. 2. *t.* 7.
Eph. Nat. Cur. Dec. 2. *ann.* 6. *obs.* 239.
Aubent. misc. t. 16. *f. med.*
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 2.
Petiv. gaz. t. 138. *f.* 1.
Sulz. hist. inf. 1. 1.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 48. 49.
β) Scarabaeus albus. *Pall. it.* 2. *p.* 718. *n.* 4.
Pall. ic. inf. Rossi. 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* 21. Scarabaeus hololeucos.
Habitat in Europae *et* Barbariae *arenosis, quercu, elymo et arundine arenariis victitans, subtus hirsutus, unguiculis basi ramo unciuato.*

ruricola. 235. Sc. ater sericeus, elytris rufis: margine nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 45. *mant inf.* 1. *p.* 23. *n.* 58.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 80. *n.* 15. Scarabaeus niger elytris croceis &c.
Habitat in Angliae *graminosis.*

fruticola. 236. Sc. capite thoraceque caeruleo-pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Scop. ent. carn. 6. Scarabaeus cyathiger.

Poda

Poda inſ. 21. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 44. Scarabaeus agricola.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 15. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 24.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 67.
β) Scarabaeus campeſtris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 15. *n.* c. *t.* 19. *f.* 25.
Habitat in Germaniae *ſpicis ſecalinis, in* Calabria *etiam inquilinus, horticolae ſtatura, ſed minor.*

praticola. 237. Sc. thorace nigro flavoque vario ſubpiloſo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 55.
Habitat in Sibiria, *agricolae affinis, at clypeo non reflexo.*

arvicola. 238. Sc. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 54.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, horticolae affinis.*

agricola. 58. Sc. thorace villoſo, elytris lividis: limbo faſciaque nigris, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 23. *n.* 57.
Habitat in Germaniae *graminibus.*

floricola. 239. Sc. cyaneo-nigra glabra, elytris rufis: ſutura nigra, abdomine punctis faſciculatis albis, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 53.
Habitat in Africa; *horticolae proxime affinis.*

abdominalis. 240. Sc. capite thoraceque caeruleo-piloſis, elytris teſtaceis, abdomine albo villoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 52.
Habitat in Italia, *horticolae nimium affinis.*

horticola. 59. Sc. capite thoraceque caeruleo-piloſis, elytris teſtaceis, pedibus nigris. *Fn. ſuec.* 391.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 50.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 75. *n.* 8.
It. ſcan. 116. 321. Scarabaeus friſius.
Liſt. ſcar. 380. *n.* 3. Scarabaeus ex nigro vireſcens, pennarum theeis rufis.
Degeer inſ. 4. *p.* 278. *n.* 24. *t.* 10. *f.* 18. Scarabaeus viridicollis.
Raj. inſ. p. 380. *n.* 3.
Friſch inſ. 4. *t.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 9
Schaeff. ic. t. 23. *f.* 4.

Habitat

Habitat in Europae *hortis; larva radices braſſicae lotrydis, et capitatae deſtruit, intacta viridi et ſabauda; imago pomonam devaſtat, intacta pyro communi.*

regius. 241. Sc. cupreo-nitidus, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 49.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſplendentis ſtatura.*

ſplendens. 242. Sc. ater, elytris vitta abbrevjata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ferrugineus. 243. Sc. rufus thorace elytrisque vage punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 38.
Habitat in Coromandel, *rauco affinis, at duplo minor.*

raucus. 244. Sc. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 46.
Habitat in Coromandel, *ſubtus niger.*

rupicola. 245. Sc. villoſus vireſcens, capite nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 44.
Habitat ad caput bonae ſpei.

innubus. 246. Sc. glaber niger, thoracis margine, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 45.
Habitat in - - - *parvus, nitidus, thorace punctato, elytris ſubſtriatis.*

errans. 247. Sc. teſtaceus, thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 43.
Habitat in - - -

Cardui. 248. Sc. glaber viridi-aeneus, abdomine rufo-cinereo villoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 42.
Habitat in Africae *cardui pycnocephalo, Sc. Friſchii ſtatura, at paulo minor.*

Vitis. 249. Sc. viridis, thoracis lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 41.
Scop. ent. carn. Scarabaeus dubius.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 56. 57.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 11.
Habitat in Europae *et* Americae *vite, Sc. Friſchii valde affinis, varians elytris teſtaceis.*

Friſchii. 250. Sc. nigro-aeneus, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 40.
Friſch inſ. 4. *p.* 29. *t.* 14.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 55. *et t.* 7. *f.* 58.
Habitat in Germaniae *vite et roſa*, *in* Braſilia, *varius elytris thoraci concoloribus.*

janthinus. 421. Sc. obſolete violaceus, thoracis margine externo, elytris, abdomine pedibusque teſtaceis, ano fuſco violaceo femoribus anterius violaceis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 62.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine Sc. Friſchii.*

coriarius. 422. Sc. fuſco-violaceus, thorace fuſco-luteo piloſo, capitis clypeo apice reflexo, elytris teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 72.
Habitat in Europa.

holoſericeus. 251. Sc. ſupra viridis holoſericeus ſubtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 21. *n.* 39.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali*, *Sc. Friſchii ſtatura et magnitudine.*

auſtriacus. 252. Sc. glaber, elytris fuſcis: marginis exterioris plica elevata, ſcutelli macula quadrata. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 11. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 16. *n.* 12. *t.* 19. *f.* 26.
Habitat in Auſtria, *an varietas agricolae?*

laetus. 253. Sc. ſupra glaber aureus, thoracis linea dorſali ſcutelloque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 58.
Habitat in nova Seelandia.

feſtus. 254. Sc. ſupra glaber viridis, thorace linea dorſali, elytris ſutura nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat in nova Seelandia.

rufeſcens. 255. Sc. glaber rufeſcens, elytris teſtaceis, clypeo quinquedentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 76.
Habitat ad caput bonae ſpei.

obscurus. 256. Sc. obscure piceus, immaculatus, pilis brevissimis erectis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 35.
Habitat in Africa *aequinoctiali, rufescentis magnitudine.*

erythrocephalus. 257. Sc. glaber pallidus, capite rubro basi nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 34.
Petagn. sp. inf. Calabr. p. 5. *n.* 18. *f.* XXXV.
Habitat in Calabria *et* Coromandel, *melanocephalo affinis, at duplo minor.*

melanocephalus. 258. Sc. glaber rufescens, capite nigro, elytris pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 33.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 80.
Habitat in Brasilia.

serratus. 259. Sc. obscure testaceus, clypeo emarginato, thoracis margine serrato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 2.
β) Melolontha sibirica. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 35.
Habitat in Coromandel, *melolonthae magnitudine, β) triplo minor in* Sibiria.

Melolontha. 260. Sc. scutellatus muticus testaceus, thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis. *Fn. suec.* 392.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 70. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 16.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 35. *n.* 3. *mant. inf. p.* 19. *n.* 3. Melolontha (vulgaris) testacea, thorace villoso, incisuris abdominis albis.
Mouff. inf. 160. *f.* 2.
Lister scar. Angl. 379.
Aldrov. inf. 454. *t. sup. f.* 2.
Hoefn. inf. t. 1. *f.* 11.
Goed. inf. 1. *t.* 78.
Merian. europ. 1. *p.* 2. *f.* 4.
Frisch inf. 4. *t.* 14.
Raj. inf. p. 104. *n.* 1.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 2.
Alb. inf. 60.
Roes. inf. 2. *scar.* 1. *t.* 1.
Leeuwenh. epist. 1. *p.* 18.
Sulz. inf. t. 1. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 8. *f.* 3. *et. t.* 109. *f.* 5.
icon. t. 93. *f.* 1. 2.
Voet coleopt. t. 6. *f.* 45. 46.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 14.

Habitat

Habitat in Europae *parte magis boreali vulgatissimus, in* Calabria *quoque frequens, unguibus prope basin bidentatis, dente inferiori breviore, vespere circumvolitans, arborum foliis, tilia tamen intacta, victitans, auctumno copiosior morbos praenuncians, oleum infusum cimicifugum reddens, meleagridum gallinarum, vespertilionum gratus cibus, varians annuatim thorace rufo et nigro.*

Mas *cauda acuta inflexa distinctus;* larva *grisea, capite pedibusque testaceis, plantarum, segetis praesertim radices exedit, sexto demum anno exeunte scarabaeo.*

solstitialis. 61. Sc. scutellatus muticus testaceus thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fn. suec.* 393.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 74. *n.* 7. *Scop. ent. carn.* 3.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 57. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 9. Melolontha testacea, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus.
Mouff. inf. 160. *f.* 3.
Lister scar. angl. 301. *n.* 2.
Raj. inf. p. 105. *n.* 2.
Petiv. gaz. p. 36. *t.* 22. *f.* 9.
Frisch inf. 9. *t.* 15. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 93. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 51. 52.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat in Europae *arboretis, unguibus, ad basin unidentatis, melolontha serior, solstitio aestivo frequentissimus, an germinibus frumentaceorum, quorum radices larva rodit, inhaerendo, morbi epidemici* Kriebelkrankheit *caussa?*

Tau nigrum. 411. Sc. nigricans subtus lunatus canescens, elytris pilis albis brevissimis, scutello villoso albido T nigro inscripto.
Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien II. 2. *p.* 6.
Habitat in Hungaria, *unguibus medio unidentatis.*

lanugithorax. 412. Sc. unguibus bifidis, posterioribus minoribus posteriorum unico. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien* II. 2. *p.* 7. *n.* 9.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 31.
Habitat in Bavariae *montibus, ab hirtello distinctus.*

reflexus. 260. Sc. glaber testaceus, clypeo reflexo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 7.
Habitat in Africa *aequinoctiali, fervido affinis, at paulo minor.*

Alopex. 261. Sc. fulvo-hirtus, clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reflexi ſtatura.*

fervidus. 262. Sc. teſtaceus glaber, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 36. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 6.
Habitat in America *ſeptentrionali, quaſi rore caeruleſcente tectus.*

villoſus. 263. Sc. teſtaceus, clypeo marginato reflexo, corpore ſubtus lanato, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inf.* 2. *app. p.* 496. *mant. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 4.
Habitat in Italia, *melolonthae ſtatura et magnitudine.*

atomarius. 264. Sc. albo-farinoſus, thorace canaliculato atro, elytris fuſcis, abdomine albo: punctis lateralibus atris. *Fabric. ſp. inf.* 1. *p.* 43. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 59.
Habitat ad caput bonae ſpei, *farinoſi ſtatura et magnitudine.*

farinoſus. 64. Sc. ſcutellatus muticus niger, polline vireſcente, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 399.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 43. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 60. Melolontha ſupra caeruleo-ſubtus argenteo-ſquamoſa nitens, clypeo integro.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 79. *n.* 13. Scarabaeus violaceus.
Degeer inf. 4. *p.* 302. *n.* 30. *t.* 10. *f.* 23. Scarabaeus ſcutellatus niger, ſquamulis griſeo-viridibus &c.
Drury inf. 2. *t.* 32. *f.* 4. Scarabaeus caeruleus.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 71.
Habitat in Europa *magis auſtrali, unguibus poſterioribus breviſſimis.*

argenteus. 265. Sc. niger, ſubtus argenteo-nitens, clypeo marginato, elytris teſtaceis. *Fabr. ſpec. inf.* 1. *p.* 44. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 61.
Scop. ent. carn. 9. *Poda inf.* 20. Scarabaeus argenteus.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 68.
Habitat in Auſtria *interiori*, Calabria *et frequens in* Angliae *floribus.*

266. Sc.

Melolonthae *arborum foliis*, cetoniae *etiam floribus victitant*; trichii *delectantur floribus praeſertim umbellatarum*; melolonthatum *larva radicibus*, cetoniarum *ligno putreſcente ſubcecidulo victitat.*

proboſcideus. 266. Sc. niger hirtus, clypeo porrecto ſubreflexo, elytris teſtaceis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 62.
Habitat in India, *et* Africae *floribus.*

ſpinipes. 267. Sc. niger immaculatus, pedibus poſterioribus elongatis: femoribus baſi uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 63.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura craſſipedis.*

dentipes. 268. Sc. niger, elytris teſtaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 64.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſpinipedi affinis.*

podagricus. 269. Sc. niger, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 65.
Habitat in Coromandel, *dentipedis ſtatura.*

arthriticus. 270. Sc. niger, elytris griſeis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus incraſſatis ſublnermibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. 23. *n.* 66.
Habitat ad caput bonae ſpei, *podagrico minor.*

gonagricus. 271. Sc. griſeus, pedibus rufis, femoribus poſterioribus incraſſatis muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 67.
Habitat ad caput bonae ſpei, *arthritico minor.*

craſſipes. 272. Sc. ater albo-maculatus, pedibus poſterioribus elongatis craſſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 68.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pulverulentus. 273. Sc. corpore polline vireſcenti argenteo, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 69.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 8.
Habitat in Alſatia *et* Ruſſia, *argenteo duplo minor.*

ſylvicola. 274. Sc. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia, *elytris fuſcis varians.*

subinosus. 275. Sc. flavescens, pedibus rufis, thorace subspinoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 58. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 71.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

Bankfii. 276. Sc. capite thoraceque atris, elytris villosis pedibusque testaceis, abdomine brevi retuso. *Fabr. mant.* 1. *p.* 24. *n.* 72.
Hospitatur in museo Ill. Banks, *pulverulenti statura.*

aulicus. 65. Sc. scutellatus muticus pilosus luteus, capite nigro, pedibus posterioribus elongatis uniunguiculatis.
Fabr. mant. 1. *p.* 22. *n.* 51. Melolontha (regia) villosa supra lutea, capite nigro, subtus cinerea.
Habitat in Africa, *horticolae magnitudine et statura.*

abbreviatus. 277. Sc. villosus niger, clypeo tridentato, elytris abbreviatis testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 59. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 73.
Habitat ad caput bonae spei, *pilis aliquot albis hirtus.*

mutabilis. 278. Sc. ater, tomento cinereo villosus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 74.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 75.
Habitat Tranquebariae.

chrysomelinus. 279. Sc. ater, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 61. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 75. *Schranck inf. austr.* 16. *n.* 25.
Habitat in Americae *borealis*, Germaniae *ligno putrescente.*

versicolor. 280. Sc. obscure aeneus, elytris tomento cinereo nitidulis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 76.
Habitat in Sierra Leon Africae.

capicola. 281. Sc. niger hirtus, scutello abdomineque albidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 63. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 77.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 75.
Habitat ad caput bonae spei, *parvus.*

picatus. 282. Sc. glaber ferrugineus, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 78.
Habitat ad caput bonae spei, *statura capicolae.*

lineatus. 283. Sc. obscure virescens, elytris lineis duabus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 24. *n.* 79.
Habitat in Sierra Leon Africae, *parvus, gibbus.*

284. Sc.

gibbus. 284. Sc. gibbus teſtaceus, tomento cinereſcente nitidulus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 66. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 80.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lineato magis gibbus.*

monticola. 285. Sc. teſtaceus glaber, capite atro, clypeo integro reflexo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 67. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

humeralis. 286. Sc. ater, elytris baſi punctoque medio palliidis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 46. *n.* 68. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 82.
Habitat in Europae *graminoſis.*

Urſus. 287. Sc. ater hirſutiſſimus, pedibus quatuor anterioribus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 69. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 83.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pedibus aliquando omnibus nigris.*

Lynx. 288. Sc. niger hirtus, elytrorum margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 70. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 84.
Habitat ad caput bonae ſpei.

longipes. 66. Sc. ſcutellatus muticus atro-cyaneus, pedibus nigris, poſterioribus elongatis uniunguiculatis.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 47. *n.* 71. *mant. inſ.* I. *p.* 24. *n.* 85.
Melolontha (crinita) hirta, ſupra viridis, ſubtus nigra.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 17. Scarabaeus bombyliformis.
Habitat ad caput bonae ſpei.

hirtus. 289. Sc. hirtus, capite thoraceque viridibus, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 72. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 86.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 15. Scarabaeus Alopecias.
Habitat in Sibiria.

Vulpes. 290. Sc. aureus fulvo hirtus, abdomine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 73. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 87.
Habitat in Sibiria.

bombylius. 291. Sc. niger cinereo hirtus, elytris teſtaceis: lineis tribus apicis albidis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 88.
Habitat in Africae *plantis, vulpis magnitudine et ſtatura.*

vittatus. 292. Sc. cyaneus piloſus, elytris teſtaceis: lineis tribus albicantibus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 47. *n.* 74. *mant. inſ.* I. *p.* 25. *n.* 89.
Lepechin it. I. *p.* 508. *t.* 16. *f.* 9. Scarabaeus acuminatus.

Pall. it. 1. *p.* 462. *n.* 26. *icon. inf. Roſſ.* 1. *p.* 14. *t.* A. *f.* 14.
Scarabaeus oxypterus.
Petiv. gazoph. t. 11. *f.* 12.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 35.
Habitat in America *auſtrali et* India.

bimaculatus. 293. Sc. oblongus glaber teſtaceus, thorace utrinque macula abdomineque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 10.
Habitat in Sina, *ſolſtitiali maxime affinis.*

atriplicis. 294. Sc. oblongus villoſus pallidus, elytris ſutura apiceque nigris, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 19. *n.* 11.
Habitat in Barbariae *atriplice halimifolia, ruficornis ſtatura et magnitudine.*

ruficornis. 295. Sc. villoſus teſtaceus, abdomine albicante. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8. *mant. pl.* 1. *p.* 20. *n.* 12.
Habitat in Germania, *an varietas ſolſtitialis?*

teres. 296. Sc. oblongus glaber niger, elytris obſolete ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 13.
Scop. ent. carn. 19. Scarabaeus oblongus.
Habitat in Germania *ſuperiore, an ab oblongo diverſus?*

lanigerus. 67. Sc. ſcutellatus muticus, ſubtus lanatus, capite thoraceque lanatis, elytris luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 20.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 37. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 14.
Melolontha (lanigera) ſubtus lanata, capite thoraceque aureis, elytris luteis.

brunnus. 72. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 39. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 32.
Melolontha (brunnea) glabra teſtacea, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 83. *n.* 22. *Degeer inſ.* 4. *p.* 277. *n.* 23. *t.* 10. *f.* 17. Scarabaeus fulvus.
Voet coleoptr. t. 7. *f.* 53. 54.
Habitat in Europae *arboretis.*

ſignatus. 297. Sc. glaber pallidus thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 31.
Habitat in Jamaica, *ruficollis magnitudine.*

ruficollis. 298. Sc. glaber punctatus ferrugineus, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 30.
Habitat in Coromandel, *brunneo major.*

pallens. 299. Sc. glaber testaceus capite elytrorumque sutura nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 29. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 13. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 21. a. b. Melolontha spinipes.
Habitat ad caput bonae spei, *et in* India, *solstitiali simillis.*

hirticollis. 300. Sc. hirtus niger, elytris punctatis glabris rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 28.
Habitat in Africa, *fusci magnitudine.*

fuscus. 301. Sc. glaber testaceus, capite obscuriore, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 27.
Habitat in terra del fuego.

tristis. 302. Sc. thorace villoso obscuro, elytris laevibus testaceis, scutello albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in America *boreali, fusco affinis.*

striatus. 303. Sc. glaber aeneus, elytris striatis: sutura lineisque quatuor cupreis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in terra del fuego.

luridus. 304. Sc. thorace nigro: margine pallido, elytris griseis nigropunctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 38. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 24.
Habitat - - -

glacialis. 305. Sc. glaber piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 38. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 23.
Habitat in terra del fuego.

dorsalis. 306. Sc. glaber testaceus, capite, thoracis elytrorumque dorso nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 38. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 20 *n.* 22.
Habitat Tranquebariae.

bicoloratus. 307. Sc. glaber viridis, subtus testaceus, pedibus apice aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 38. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 21. *Voet coleoptr. t.* 8. *f.* 66.
Habitat ad caput bonae spei.

ſuturatus. 308. Sc. viridis, elytrorum ſutura flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 15. *mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 20.
Habitat in nova Scelandia.

aeratus. 309. Sc. glaber aeneus, abdominis lateribus albis, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 14. *mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

viridis. 310. Sc. glaber, ſupra viridis, ſubtus aureus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 13. *mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 18.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glabratus. 311. Sc. teſtaceus nitidus, ſterno anterius porrecto obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 30. *n.* 12. *mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 17.
Habitat in America *auſtrali et* India.

punctatus. 76. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris punctis tribus ſubfuſcis obſoletis diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 23.*
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 38. *n.* 11. *mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 16. Melolontha teſtacea, elytris punctis tribus fuſcis diſtantibus.
Gron. zooph. 438.
Drury inſ. I. *t.* 34. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 65.
Habitat in America, *laevis, aurati magnitudine, unguibus arcuatis acutiſſimis.*

longicornis. 312. Sc. ſupra glaber niger, elytris ferrugineis, antennarum clava elongata. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 20. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lanigeri ſtatura et magnitudine.*

unicolor. 313. Sc. totus ſpadiceus laevis, elytris punctis impreſſis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 154. *n.* 18. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in India, *brunno ſimilis, at quadruplo major.*

ciliatus. 314. Sc. niger ſubtus piloſus, elytris villoſis et thorace poſterius pilis longis albis ciliato punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 155. *n.* 19. *t.* 43. *f.* 6.
Habitat in India, *antennis ad fullonem accedens, his pedibusque fuſcis.*

pellucidus. 315. Sc. holoſericeus obſcurus albo-obumbratus, elytris coſtatis. *Sulz. hiſt. inſ. t.* I. *f.* 9.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 155. *n.* 21. Melolontha Berolinenſis.
Voet coleoptr. t. 21, *f.* 150.

Habitat

Habitat in Germania *et* Helvetia, *brunno similis, at brevior, magisque rotundatus et convexus.*

cerealis. 316. Sc. scutellatus, subtus hirsutus, abdominis latere utroque albo-maculato. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 49. *t.* 21. *f.* B. a. b. c.

Habitat in Insubria, *sub initium aestatis vespere frequens in celti australi aliisque arboribus, melolonthae valde affinis.*

sinuatus. 317. Sc. exscutellatus niger, tibiis toto margine exteriore denticulatis. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 52. *t.* 21. *f.* E.

Habitat in agro Ticinensi, *glaber, totus niger, supra punctulatus.*

fuscescens. 318. Sc. scutellatus fuscescens, scutello lineola transversa duplicata, tibiis posterioribus quadridentatis. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 53. *t.* 21. *f.* F.

Habitat in Insubria, *frequens inter segetes, aestate in arboribus, statura solstitialis, supra badius, subtus villis longioribus et rufescentibus hirsutus.*

deserti. 322. Sc. supra nigricans, subtus lanugine alba obsitus, elytris corpore brevioribus, scutello triangulari villoso albo. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 19. *f.* 7.

Habitat in deserto Sibiriae uralensi, 9 *lineas longus, an hujus tribus?*

sepicola. 55. Sc. scutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque pilosis. *Mus. Lud. Ulr.* 24.*

Habitat in India, *habitu horticolae, at triplo major.*

syriacus. 56. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. *Mus. Lud. Ulr.* 25.*

Habitat in India, *horticolae statura.*

Leei. 427. Sc. scutellatus muticus caeruleus nitidissimus, capitis disco, thoracis falcia interrupta, elytrorumque vittis quatuor aureis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 4.

Habitat in India, *facie fc. vitis, at duplo fere major.*

bivittatus. 428. Sc. flavus nitidissimus, capite thoraceque vittis duabus communibus, elytris striis plurimis abbreviatis viridibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 5.

Habitat in Brasilia, *fervidae facie, at paulo minor.*

†† *mandibula recta.*

a) *acuta*, Cetoniae.

Chryſis. 49. Sc. ſcutellatus muticus, ſterno porrecto, ſcutello elytris dimidio breviore. *Muſ. Lud. Ulr.* 21.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 15. Cetonia ſcutello elytris dimidio breviore, ſterno porrecto, corpore viridi.
Degeer inſ. 4. *p.* 319. *n.* 12. *t.* 19. *f.* 4. Scarabaeus, ſcutello longiſſimo &c.
Gron. zooph. p. 428. *t.* 15. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 10.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 63.
Habitat in America *magis auſtrali, aurati colore et magnitudine.*

ſurinamus. 50. Sc. ſcutellatus muticus niger, thoracis inciſurarumque marginibus flavis, ſterno porrecto. *Amoen. ac.* 6. *p.* 391.*
Habitat Surinami.
Caput *linea flava*, abdominis *ſegmentum ultimum maculis* 3-4 *flavis pictum.*

nitidus. 51. Sc. ſcutellatus muticus thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno porrecto. *Muſ. Lud. Ulr.* 26.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 13. Cetonia thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno cornuto.
Degeer inſ. 4. *p.* 321. *n.* 16. *t.* 19. *f.* 8. 9. Scarabaeus ſcutello minimo &c.
Gron. zooph. 455.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 5. 6.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 23.
Habitat in America, *praeſertim* Carolina.

Carmelita. 323. Sc. nigro-viridis, thorace elytrisque teſtaceis, ano albo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 14.
Habitat in Africa, *ſtatura nitidi, capite nigro.*

quadripunctatus. 324. Sc. niger, ano bipunctato, pedibus rufis: tibiis poſterioribus ſpinis annulatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 12.
Habitat in India, *antennis pedibusque ferrugineis.*

arcatus. 325. Sc. niger pubeſcens, elytris diſco rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 59.
Habitat in Virginia.

326. Sc.

cruentatus. 326. Sc. niger, elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 58.
Habitat ad caput bonae ſpei.

acuminatus. 327. Sc. obſcure aeneus pallido-maculatus, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 57.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

maculatus. 328. Sc. aeneus nitidus, thorace utrinque macula, elytris plurimum albis, ſterno obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 8. Antheus.
Habitat in Coromandel, *acuminati ſtatura.*

ſtolatus. 329. Sc. viridi-fuſcus, thorace margine punctisque, elytris faſcia media maculisque niveis poſterius acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 55.
Habitat in nova Hollandia.

philippenſis, 330. Sc. aeneus nitidus, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 54.
Habitat in inſulis Philippinis.

aurichalceus. 331. Sc. aeneus opacus, elytris acuminatis albo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 53.
Habitat prope Surate Indiae.

ſordens. 332. Sc. nigro-aeneus, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 42. *mant. inſ.* 1 *p.* 30. *n.* 52.
Habitat in Braſilia.

tetradactylus. 333. Sc. ſcutellatus muticus niger, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Mont. pl. p.* 530.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 58. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 51. Cetonia atra, ſcutello elytris dimidio breviore, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 7.
Sloan. jam. 2. 237. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

orichalcus. 88. Sc. scutellatus muticus aeneus glaber, subtus ferrugineo varius. *Syst. nat. T.* III. *app. p.* 224.
Habitat in India.

gagates. 334. Sc. ater nitidus, clypeo truncato reflexo, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 50. *Forster cent. inf.* 6. 6.
Habitat in Sierra Leona Africae.

Iris. 335. Sc. viridis nitidissimus fusco-micans immaculatus. *Fabr. spec. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 49.
Habitat Surinami, *fulgidi magnitudine, sterno porrecto.*

fulgidus. 336. Sc. aeneus nitidissimus, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 48.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 24?
Hospitatur in museo Jll. Banks.

tricolor. 337. Sc. viridi-aeneus hirtus, elytris testaceis: vitta media nigra suturaque aenea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 47.
Voet coleoptr. t. 7. *f.* 60.
Habitat in America.

quadricolor. 338. Sc. thorace nigro: margine rufo, elytris aeneo-nitidis: sutura nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 46.
Habitat in Africa.

africanus. 339. Sc. aeneus nitens, capitis spina incumbente, sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 45.
Drury inf. 2. *t.* 30. *f.* 4.
Habitat in Sierra Leon Africae.

venereus. 340. Sc. cupreus nitidus, thorace scutello elytrisque viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 44.
Herbst Arch. Inf. 7. *p.* 156. *n.* 10. Cetonia aeruginea.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 26.
Habitat in Jamaica.

aethiopicus. 341. Sc. viridis fulvo micans, elytris maculis duabus nigris, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 43.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

342. Sc.

elegans. 342. Sc. viridis nitidiſſimus, elytrorum ſutura punctoque apicis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 42.
Habitat in Coromandel, *aurati magnitudine.*

ſpecioſiſſimus. 343. Sc. ſcutellatus aurato-viridis, punctulatus laevis, tibiis interno latere rufo-ciliatis: poſterioribus edentatis biſpinoſis. *Scop. delic. inſubr. p.* 48. *t.* 21. *f.* A. a. b.
Habitat - - - *Eremita major, aurato affinis, at corpore utrinque ſplendidiſſimo, thoracis foveis nullis, abdomine poſterius non punctato, ejusque ſegmento primo abſque lateribus unidentatis diſtinctus.*

coruſcans. 344. Sc. cyaneus, thoracis margine elytrisque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 41.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 62.
Habitat in India.

limbatus. 345. Sc. niger, thoracis margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 40.
Habitat in Aegypto.

fuliginoſus. 346. Sc. ſcutellatus niger, ſupra opacus, ſubtus nitens, ſegmento femorali in dentem exeunte. *Scop. delic. inſubr.* 1. *p.* 51. *t.* 21. *f.* D. b.
Habitat Paviae *in hortis, campis, frequens in floribus onopordi acanthii, ſtatura nobilem ſimulans.*

quinquelineatus. 347. Sc. niger, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo ſpinaque incumbente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 39.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

ſemipunctatus. 348. Sc. viridis nitidus, thorace quadrilineato, elytris baſi lineatis, apice punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 38.
Habitat - - - *mediae magnitudinis, ſubtus albo villoſus.*

trilineatus. 349. Sc. niger, thorace lineis tribus, elytris faſcia flexuoſa ſcutelloque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 37.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pictus. 350. Sc. niger, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 36.
Habitat in Oriente.

olivaceus. 351. Sc. teſtaceus, thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transverſis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 35.
Habitat in Sierra Leona Africae.

thoracicus. 352. Sc. niger, thorace ferrugineo, elytris nigris ſubpurpuraſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 34.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

alexandrinus. 353. Sc. niger, thoracis margine elytrisque teſtaceis, elytris ſutura faſciaque dentata nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 33.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

ſinuoſus. 354. Sc. fuſco-viridis, thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 32.
Degeer inſ. 7. *p.* 639. *n.* 38. *t.* 47. *f.* 20. Scarabaeus punctato-marginatus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Ephippium. 355. Sc. niger, thoracis margine lineaque dorſali, elytris macula difformi ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 31.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in India, *lineolae ſtatura et magnitudine.*

lineola. 53. Sc. muticus niger, lineola flava a capite ad ſcutellum ducta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 30. *Degeer inſ.* 4. *p.* 320. *n.* 13. *t.* 13. *f.* 5. Scarabaeus ſcutellatus niger nitidus flavo-maculatus &c.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in America, *ſtercorario minor.*

ſtictícus. 54. Sc. ſcutellatus muticus niger glaber, punctis albis ſparſis, abdomine ſubtus punctis quatuor albis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 18. *n.* 5. *t.* 19. *f.* 27.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 59. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 61. Cetonia clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine ſubtus punctis quatuor albis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 79. *n.* 14. Scarabaeus nigro-caeruleſcens &c.
Raj. inſ. p. 104. *n.* 8.
Habitat in Galliae *et* Calabriae *carduis.*

funeſtus. 356. Sc. glaber niger, thorace elytrisque albo-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 62. *Scop. ent. carn.* 7.
Habitat in Carniola *et* Italia, *mediae magnitudinis.*

thebanus. 357. Sc. niger, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo punctatis, dorſo rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 64. *Herbſt Beſchr. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 1. *f.* 8. *et apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 18. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 28.
Habitat in Aegypto.

floralis. 358. Sc. glaber niger, thoracis, elytrorum abdominisque margine albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 63.
Habitat in Africae *floribus compoſitis, ſatis magnus.*

lugubris. 359. Sc. glaber ater, elytris macula laterali anoque albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 65.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Hiſtrio. 360. Sc. teſtaceus, capite, thoracis lineis duabus, elytrorum ſutura maculisque tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 66.
Habitat in Aegypto.

albellus. 361. Sc. ater, thorace, margine elytrisque maculis ſparſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 67. *Pall. it.* 1. *p.* 462. *n.* 17. *ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 17. *t.* A. *f.* 18.
Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ. 4. *p.* 18. *n.* 7. *t.* 19. *f.* 29.
Habitat Tranquebariae.

hottentottus. 362. Sc. ater glaber, elytris poſterius punctis duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 68.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cruentus. 363. Sc. ater glaber, thorace poſterius maculis duabus elytrisque vitta ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 69.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks, *ſtatura hottentotti.*

ſqualidus. 68. Sc. ſcutellatus muticus niger hirtus, thorace ſubcarinato. *Scop. ent. carn.* 13.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 33.
Habitat in Germania, *hirtello ſimillimus, an varietas?*

hirtellus. 69. Sc. ſcutellatus muticus hirtus teſtaceo-nigricans, elytris pallido-maculatis.
Fabr.

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 59. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 60. Cetonia (hirta) nigricans hirta elytris pallido maculatis, thorace carinato.
Scop. ent. carn. 8. *Poda inf.* 21. Scarabaeus hirtus.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 34.
Habitat in Europa *magis australi, vere etiam frequens in omnibus desertis* Volgae *finitimis ad* Terek *usque, vitis ibi gemmas foliiferas et floriferas exedens, fasciato dimidio minor.*

afer. 364. Sc. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 55. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africae.

marginatus. 365. Sc. glaber ater, thoracis elytrorumque marginibus rufis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 55. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 28.
Drury inf. 2. *t.* 32. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 4.

insignitus. 366. Sc. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: sutura margineque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 27.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 13.
Habitat ad caput bonae spei.

capensis. 73. Sc. scutellatus muticus rufus hirtus, adspersus punctis albis. *Mus. Lud. Ulr.* 30.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 54. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 28. *n.* 26. Cetonia hirta rufa albo-punctata.
Degeer inf. 7. *p.* 640. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2. Scarabaeus albo-punctatus.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 6.
Roes. inf. 2. *scar.* 1. *t.* B. *f.* 6.
Drury inf. 1. *t.* 33. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Africa.

cafer. 367. Sc. viridis nitidus, thoracis margine elytrorumque maculis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 28. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus, punctis inter oculos* 2 *albis.*

Eremita. 74. Sc. scutellatus aeneo-ater, thorace inaequali, thorace sulco longitudinali. *Scop. ent. carn.* 15. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 28. *n.* 23.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 300. *n.* 28. *t.* 10. *f.* 22. Scarabaeus coriarius &c.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 21. Scarabaeus lugubris.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 3. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 1.
Habitat in pyri, ſalicis *truncis putridis, recens corium ruſſicum olens.*

ſaſcicularis. 75. Sc. ſcutellatus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis inciſuris barbatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 26.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 24.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus lana helvola in faſciculos digeſta veſtitus.*

ſmaragdinus. 368. Sc. ferrugineo-flaveſcens, elytris vireſcentibus, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 22.
Habitat in America.

moeſtus. 369. Sc. piceus, abdominis ſegmentis margine albis, clypeo emarginato, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 21.
Habitat in America *boreali.*

aterrimus. 370. Sc. niger obſcurus, elytris obſolete rufo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura lanii.*

corniger. 371. Sc. niger obſcure immaculatus, thoracis margine anteriori ſubcornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura aurati.*

ruber. 372. Sc. ſcutellatus ruber, elytris nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 16.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

Lanius. 77. Sc. exſcutellatus muticus ruber, adſperſus punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 17.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 7. 8.

Drury inf. 1. *t.* 33. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 44.
Habitat in America *meridionali.*

S. Franciſci. 373. Sc. piceus, thoracis margine flaveſcente, ſterno porrecto.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 28. *n.* 16.
Habitat in India, *ſtatura chryſis.*

micans. 374. Sc. viridis nitens, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 1.
Drury inf. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Habitat in Sierra Leona Africae.

ſinenſis. 375. Sc. aeneus, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 2.
Forſter cent. inf. 2. 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 40.
Habitat in Sina.

nigrita. 376. Sc. glaber ater, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 3.
Hermann muſ. p. 17. *n.* 257.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 3.
Habitat in Zeylon.

auratus. 28. Sc. ſcutellatus auratus, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, clypeo planiuſculo. *Fn. ſuec.* 400. *Scop. ent. carn.* 17.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 50. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 4. Cetonia aurata, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, elytris albo maculatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 73. *n.* 5.
Hoeffn. pict. t. 6. *f.* prior.
Friſch inf. 12. 25. *t.* 3. *f.* 1.
Raj. inf. p. 76. *n.* 7.
Roeſ. inf. 2. *ſcar.* 1. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Degeer inf. 4. *p.* 279. *n.* 25, *t.* 11. *f.* 1. Scarabaeus Smaragdus.
Berg ſtr. nomencl. 1. 14. *n.* 5. 6. 7. *t.* 2. *f.* 5. 6. 7.
Schaeff. icon. t. 26. *f.* 2. 3. 7. *et t.* 50. *f.* 8. 9.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 1. 2. 3.
Drury inf. 1. *t.* 33. *f.* 1.

Pet.

Pet. gaz. t. 23. *f.* 12.
Worm mus. 342.
Ammir. inf. t. 12.
Habitat, magnitudine et colore varius, in Europa, *larva in lignis putrescentibus, et formicarum acervis, imago in floribus, praesertim paeoniae, forbi aucupariae, tacta per anum ejicit liquorem foetidissimum.*
Sternum *porrectum;* pectoris *latera posterius in dentem terminata.*

Morio. 377. Sc. niger obscurus, corpore subtus nitidiore. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 27. *n.* 6.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 14.
Habitat in Europa *australi, aurato proxime affinis.*

opacus. 378. Sc. obscure viridis opacus, capitis clypeo reflexo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 27. *n.* 5.
Habitat in Africae *floribus compositis, aurati magnitudine et statura.*

erythropus. 379. Sc. niger, capitis clypeo porrecto basi utrinque sinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 7.
Habitat ad caput bonae spei, *morionis statura et magnitudine.*

variabilis. 79. Sc. scutellatus laevis opacus ater, elytris albo-punctatis. *Fn. suec.* 402.*
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 11. Cetonia (octopunctata) nigra, thorace punctis quatuor albis.
Degeer inf. 4. *p.* 301. *n.* 29. *t.* 10. *f.* 22. Scarabaeus albopunctatus.
Schaeff. ic. t. 198. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 42.
Habitat in Germaniae *et* Sibiriae *quercubus, colore rubro et aureo varians; mas quintuplo minor.*

aeruginosus. 80. Sc. scutellatus auratus supra viridis. *Gron. mus.* 424. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat in regno Tunetano *et* Calabriae *lentisco, statura aurati.*

cordatus. 380. Sc. niger, thorace utrinque puncto baseos elytrisque duobus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 10.
Fabr. Sp. inf. 1. *p.* 51. *n.* 7. Cetonia octopunctata.
Habitat - - -

Lundii. 381. Sc. ater nitidus, capitis clypeo cordato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

nobilis. 81. Sc. ſcutellatus laevis auratus, abdomine poſterius albo-punctato. *Fn. ſuec.* 401.* *Scop. ent. carn.* 18.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 51. *n.* 6. Cetonia aurata, abdomine poſtice albo-punctato, elytris rugoſis.
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 8. Cetonia cuſpidata.
Udm. diſſ. 1. Scarabaeus viridi aeneus, thorace ſulcato, elytris rugoſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 297. *n.* 26. Scarabaeus viridulus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 73. *n.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 3. *f.* 1-5.
Schaeff. icon. t. 66. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 28.
Habitat in Europa, *larva* (*griſea, capite ſanguineo, pedibus flaveſcentibus,*) *in ligno putreſcente, imago in floribus praeſertim umbellatarum.*

aeneus. 82. Sc. ſcutellatus oblongus cyaneus glaber, abdomine teſtaceo, capitis apice tridentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 29.*
Habitat - - - *brunni magnitudine, ſubtus pubeſcens.*

caeruleus. 382. Sc. glaberrimus glaucus, elytris chalybeis punctato-ſtriatis, maculis quinque albis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 19. *n.* 8. *t.* 19. *f.* 30.
Habitat in India.

metallicus. 383. Sc. viridis auratus, ſubtus violaceus, annulis abdominis quatuor macula alba notatis. *Herbſt apud Fueſſli n. ent. Mag.* 1. *p.* 314.
Habitat in Europa.

bimucronatus. 384. Sc. teſtaceus, tibiis anterioribus majoribus barbatis, clypeo utrinque mucronato, villis fimbriato. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 13. *t.* A. *f.* 13.
Habitat in Amboina, *habitu longimani, eremita duplo major.*

aureolus. 385. Sc. depreſſo-ſubangulatus, polline aureolus, thorace elytrisque nigro-punctatis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 18. *t.* A. *f.* 20.
Habitat in Dauria, *Junio in rheo compacto florente frequens, farinoſo affinis, an hujus tribus?*

glaucus. 386. Sc. cylindraceus, totus teſtaceus glaber, commiſſura thoracis pallido-villoſa, abdomine glauco. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* A. 22.
Habitat in ſabuletis Anketeri *inter* Cumam *et* Caucaſum, *vere frequens fullonis magnitudine.*

ſanguinolentus. 387. Sc. depreſſo-angulatus niger, thorace ſupra elytrisque diſco rubris, punctis elytrorum abdominisque crebris albis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 21. *t.* B. *f.* A. 24.
Habitat in America *borcali, ſtillici forma et magnitudine.*

pulcher. 429. Sc. thorace elytrisque pulchre variegatis laevibus, capite nigro: ſpina incumbente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 6.
Habitat in inſula Tobago, *marginati facie et magnitudine, ſubtus totus, antennis pedibusque ater.*

trivittatus. 430. Sc. thorace vittis tribus albidis, elytris flavo-teſtaceis: ſutura limboque nigro, hoc albo maculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 7.
Habitat in Sierra Leon Africae, *aurato paulo minor, et magis depreſſus.*

ſubfaſciatus. 431. Sc. ſcutellatus muticus niger opacus, elytris faſciis quatuor lateralibus abbreviatis fulvis: poſteriori maxima. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 8.
Habitat ad caput bonae ſpei, *aurato paulo minor et magis depreſſus.*

ſcabriuſculus. 432. Sc. aureo-niger, elytris anterius glabris poſterius ſcabriuſculis: linea elevata glabra abdomine utrinque albomaculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 9.
Habitat - - - *aurati facie, at paulo major.*

b) *mandibula obtuſa*, Trichii.

faſciatus. 70. Sc. ſcutellatus niger tomentoſo-flavus, elytris faſciis duabus luteis coadunatis. *Fn. ſuec.* 395.* *Scop. ent. carn.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 1. Trichius niger tomentoſo flavus, elytris faſciis tribus nigris abbreviatis.
Mouff. inſ. 161. *f.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 80. *n.* 16.
Gunner act. Nidroſ. 4. *t.* 16. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 4.

Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 19.
Drury inf. 1. *t.* 36. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 43.
Habitat in Europae *borealis, etiam* Calabriae *ulterioris floribus syringae, filipendulae, umbellatarum.*

succinctus. 388. Sc. niger tomentoso cinereus; elytris nigris: fasciis duabus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 2. *Pall. ic. inf. Rossi.* 1. *t.* A. *f.* 19.
Habitat in Germania, *statura fasciati, at duplo minor.*

indus. 71. Sc. scutellatus thorace hirsuto, elytris lividis fusco-punctatis. *Mus. Lud. Ulr.* 27.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 25. *n.* 3.
Habitat in India, *statura fasciati, cetoniis affinis.*

punctulatus. 389. Sc. capite thoraceque viridi-aeneis glabris, elytris testaceis, abdominis ultimo segmento prominente bipunctato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 4.
Hospitatur in museo Ill. Banks.

bibens. 390. Sc. capite et thorace viridi-aeneis pilosis, elytris testaceis viridi nitentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 5.
Habitat in America.

hemipterus. 63. Sc. scutellatus thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 28. Scarabaeus variegatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 78. *n.* 17.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 10. *f.* 88-90.
Habitat in Europa, *larva in ligno, imago in floribus, femina aculeo ani rigido brevi munita.*

lunulatus. 391. Sc. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 7.
Habitat in Carolina.

virens. 392. Sc. viridis pubescens, ano albo bimaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 8.
Habitat in India.

393. Sc.

piger. 393. Sc. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 9.
Habitat in America *boreali.*

Delta. 394. Sc. thorace nigro: triangulo albo, elytris testaceis: puncto fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 10.
Forster cent. inf. 1. *p.* 7. *n.* 7. Scarabaeus scutellatus muticus flavus thorace atro: triangulo flavo, elytris testaceo-flavis nigro-maculatis.
Drury inf. 2. *t.* 30. *f.* 1. 2.
Habitat in Americae *floribus.*

fulvus. 395. Sc. pubescens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris testaceis: sutura fulva. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae spei.

nigripes. 396. Sc. hirtus fuscus, elytris subtestaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae spei, *statura fulvi.*

naevius. 397. Sc. supra glaber cinereo-maculatus, capite thoraceque nigris, elytris piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae spei, *statura nigripedis.*

carbonarius. 423. Sc. hirsutus totus niger, clypeo angusto apice bifido. *Mus. Lesk. p.* 4. *n.* 75.
Habitat extra Europam.

unguiculatus. 424. Sc. griseus tomentosus, thorace fusco, clypeo apice angusto sulcato bifido, elytris rufis margine nigris pilosis, pedibus posterioribus elongatis unguiculatis. *Mus. Lesk. p.* 4. *n.* 76.
Habitat extra Europam.

** *palpis capitatis*, Trox.

fabulosus. 48. Sc. scutellatus niger opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Fn. suec.* 390.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 34. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 1. Trox thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo.

Scop. ent. carn. 23. Scarabaeus rugoſus.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Europae *collibus ſabuloſis apricis.*

arenoſus. 398. Sc. thorace ſubcanaliculato, elytris ſtriatis, corpore obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 2.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura ſabuloſi, at duplo minor, fuſcus.*

ſuberoſus. 399. Sc. griſeus, thorace marginato: margine poſteriori dentato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 3.
Habitat in Braſilia.

horridus. 400. Sc. ater, thorace elytrisque ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 4.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 10. *t.* A. *f.* 10. Scarabaeus pectinatus.
Habitat in India.

ſilphoides. 401. Sc. niger, thorace marginato inaequali, elytris ſtriatis ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura horridi.*

ſpinicornis. 402. Sc. nigricans, thorace poſterius utrinque emarginato, antennis ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 6.
Habitat - - -

tenebrioides. 403. Sc. ovatus piceus glaber, punctato-ſcaber, clypeo margine cilioſo. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 9. A. 8. *t.* A. *f.* 9.
Habitat in Datuuriae *campis glareoſis aridis, inter* Ononem *et* Argunum *poſitis, Majo primo veris calore obvius, interdiu humi immobilis.*

mortitinii. 404. Sc. ſilphoides, clypeo inaequali ciliato, elytris ſtriatis convexe punctatis hiſpidulis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 11. *t.* A. *f.* 11.
Habitat in Tatariae *deſertis aridiſſimis, ad fluvios* Ural *et* Irtin, *ſub cadaveribus aeſtivo calore exſiccatis frequens, ani ad elytra attritu ſtridens, ut ſabuloſus, niger, opacus, foſſoris magnitudine.*

quadriguttatus. 410. Sc. teſtaceus, capite thoraceque aeneo nitidulis, abdominis ultimo ſegmento prominulo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in Sina, *ſtatura melolonthae.*

425. Sc.

miliarius. 425. Sc. elevato punctatus niger, thoracis dorso sulcato, elytris abdomen superantibus decussato striatis. *Mus. Lesk. p. 3. n. 54.*
Habitat extra Europam, *elytris striarum punctatarum ordinibus novem capitis punctis elevatis sex.*

coracinus. 426. Sc. niger, frontis tuberculis duobus, thorace tuberculato, elytris abdomen superantibus punctorum elevatorum ordinibus novem. *Mus. Lesk. p. 3. n. 55.*
Habitat extra Europam.

longipes. 433. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque nigro, elytris pallide testaceis: lunula communi nigra, pedibus posterioribus longissimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 10.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine horticolae, at supra magis depressus.*

*** *palpis cylindricis, antennarum clava tunicata,* Lathrus.

cephalotes. 405. Sc. clypeo emarginato-bilobo. *Pall. it.* 1. *app. p.* 461. *n.* 23.
Laxmann nov. comm. Petrop. 14. *p.* 59. *n.* 4. *t.* 24. *f.* 1. *Pall. ic, inf. Rossi.* 1. *t.* A. *f.* 1. Lucanus apterus.
Acharius nov. act. Stockh. 1781. *p.* 246. *t.* 5. *f.* 3-12. Bulbocerus cephalotes.
Scop. introd. in hist. nat. p. 439. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 2. Lathrus.
Habitat in Tatariae, Rossiae, Hungariae *desertis aridis sub terra, monogamus, laevis, niger, subopacus, subrotundus thorace convexo marginato, elytris coalitis, vix thoracis longitudinem superantibus, pedibus fossoriis, mandibula adunco-falcata intus denticula, medius inter scarabaeos et lucanos.*

hemisphaericus. 406. Sc. hemisphaericus, clypeo anterius obtuse bidentato. *Pall. ic. inf. Rossi.* 1. *p.* 20. A. 23. *t.* B. *f.* A. 23.
Habitat - - - - sacro major, cephalotae perquam affinis, an specie distinctus?

190. LUCANUS. *Antennae* clavatae: clava compressa, latere latiore, pectinatofissili.
Maxillae porrectae, exsertae, dentatae.
Penicilli duo sub labio palpigeri.

Alces. 8. L. mandibulis exsertis apice quadridentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 1. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 1, *n.* 1.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 15.
Habitat in Asia.

Cervus. 1. L. scutellatus: maxillis exsertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Fn. suec.* 405. *Scop. ent. carn.* 1.
Fn. suec. 1. *n.* 377. Scarabaeus cornibus duobus mobilibus aequalibus apice bifurcatis: introrsum ramis denticulisque instructis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 1. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 1. *n.* 2. Lucanus mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo: ruga transversali elevata.
Geoffr. inf. 1. *p.* 61. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Platycerus fuscus &c.
Mouff. inf. 148. Cervus volans.
Raj. inf. p. 74. *n.* 2. Scarabaeus maximus platyceros &c.
Olear. muf. t. 16. *f.* 5. Taurus volans.
Aldrov. inf. 151. *f.* 1.
Hoeffn. pict. t. 6.
Worm. muf. 242.
Jonst. inf. t. 14. *f.* 1. 2.
Merian. eur. t. 168.
Imperat. nat. 924. *f.* 3.
Roef. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* 4. 5.
Bergstr. nomencl. 1. *p.* 18. *n.* 1-3. *t.* 3. *f.* 1-3. *et t.* 4. *f.* 1.
Sulz. inf. t. 1. *f.* 4.
Degeer inf. 4. *t.* 12. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 133. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 1. 3.
Schluga t. 1. *f.* 1.
b) Scarabaeus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. *Fn. suec.* 338. (femina).
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 60. *n.* 2. Platycerus fuscus, elytris laevibus, capite laevi.
O. F. Müller prodr. zool. dan. p. 444. Lucanus Dorcas.

Imper.

Imper. nat. 925. *f.* 1. 2.
Gron. zooph. 446.
Roef. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* 5. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 9. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 25. *n.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 2. 3.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 2. 4.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *ligno quercino putrefcente, femina minor, larva obefa albida, capite pedibusque ferrugineis, a* Roefelio *pro craffo veterum habita.*

Elaphus. 9. L. mandibulis exfertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 2. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 1. *n.* 3.
Voet coleoptr. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Virginia, *femina minor, mandibulis haud exfertis.*

Capreolus. 2. L. ſcutellatus, maxillis exſertis, apice tantum furcatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 391. *n.* 4.* *Muſ. Lud. Ulr.* 30.*
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 2. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 1. *n.* 4. Lucanus mandibulis exſertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transverſa elevata interrupta.
Degeer inf. 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Merian. Europ. 168.
β) Lucanus platyceros. *Scriba Schr. der berl. Naturf.* 7. *p.* 728.
Geoffr. inf. pariſ. 1. *p.* 63. *n.* 5.
Habitat in America *boreali*, Alſatia, Calabria, *cervo dimidio minor.*

Dania. 10. L. mandibulis exſertis intus bidentatis longitudine capitis.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 2. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 1. *n.* 5.
Muſ. Lud. Ulr. 30. Lucanus Caprcolus *β.*
Habitat in Virginia.

Gazella. 11. L. mandibulis intus bidentatis, ater, elytrorum margine exteriori teſtaceo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 1. *n.* 6.
Habitat in Siam, *damae magnitudine.*

tridentatus. 3. L. maxilloſus depreſſus niger, thorace utrinque tridentato. *Fn. ſuec.* 406. *It. cel.* 152.* *Bonsdorf nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 216.
Habitat in Oelandia, *thorace trilobato; an cervi potius mera varietas minor?*

4. L.

interruptus. 4. L. exſcutellatus, antennis arcuatis, corpore oblongo depreſſo, vertice ſpina recumbente, thorace abdomineque remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 33.* *Muſ. Ad. Fr.* 82. *Gron. zooph.* 447. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 8.

Brown jam. 429. *t.* 44. *f.* 7. Dermeſtes.
Merian. ſurin. t. 50.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 2.
Degeer inſ. 4. *t.* 19. *f.* 13.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 1.
Habitat in America, *ſub ſaccharo putreſcente, ſcarabaeo vulgo proxime affinis; mas major ſpina capitis incumbente mandibulis truncato-tridentatis, elytrorumque ſulcis lateralibus punctatis, femina ſpina capitis elevata, arcuata, mandibulis acuto-tridentatis, elytrorumque ſulcis omnibus laevibus diſtincta.*

carinatus. 5. L. depreſſus, thorace mutico capite breviore: angulis poſterioribus excavatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 34.*
Habitat in India, *abdomine breviſſimo, pectore poſterius in angulum acutum terminato.*

parallelepipedus. 6. L. ſcutellatus depreſſus niger, maxillis dente laterali elevato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 7. *Pontopp. atl. dan.* 1. *p.* 666. *t.* 29. *f.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 62. *n.* 3. Platyceros niger &c.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 7.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 9.
Schaeff. elem. t. 101. *f.* 1.
icon. t. 63. *f.* 7.
Habitat in Calabriae, Galliae, Angliae, Germaniae, Daniae, Sueciae, Sibiriae *ſilvis, cervo feminae ſimilis, at* 8*ies minor, niger, magis depreſſus; femina mare minor, mandibulis minoribus, punctoque capitis duplici prominente diſtincta.*

cancroides. 12. L. mandibulis incurvis: intus dente incraſſato difformi, elytris punctato-ſubpubeſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 9.
Habitat in terra van Diemen, *vireſcente paulo major.*

vireſcens. 13. L. mandibulis tridentatis, corpore viridi-aeneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 10.
Habitat in America.

14. L.

tenebroides. 14. L. mandibulis lunatis unidentatis ater, thorace marginato, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 11.
Habitat in Novogorod *inferiori* Roſſiae, *ſtatura caraboidis, at paulo major, ater.*

caraboides. 7. L. ſcutellatus caeruleſcens, mandibulis lunatis, thorace marginato. *Fn. ſuec.* 407.* *Scop. ent. carn.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 12.
Udm. diſſ. n. 40. Carabaeus caeruleſcens.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 63, *n.* 4. Platyceros violaceo-caeruleus &c.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 8. *et t.* 75. *f.* 7. Platycerus.
Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 11.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 8.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis, varians colore viridi et caeruleo.*

piceus. 15. L. ater glaber ſtriatus, antennis, abdomine et pedibus piceis. *Bonsdorf nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 217. *t.* 8. *f.* a.
Habitat in Oſtrogothiae *et* Weſtrogothiae *lapidoſis, Junio frequens.*

capenſis. 16. L. exſcutellatus niger, elytrorum ſulcis punctatis. *Thunberg nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 5. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *cylindricus, glaber, tenebrione foſſore paulo major.*

Pilmus. 17. L. exſcutellatus ater, corpore depreſſo, thorace ſtriato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 184.
Habitat in provincia Chilenſi Makle, *arvis legumine conſitis infeſtus,* 8 *lineas longus; an hujus generis?*

Tarandus. 18. L. ſcutellatus ater glaberrimus, mandibulis exſertis apice tridentatis a latere interiori bidentatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 1. *t.* 8. *f.* 2.
Habitat in Sierra Leon Africae, *L. Cervo major.*

Antilope. 19. L. mandibulis exſertis a latere interiori bimarginatis: margine ſuperiori bidentato, inferiori quinquedentato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 2. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat in Sierra Leon Africae, *brunneus, ſubglaber, magnitudine capreoli.*

20. L.

Bubalus. 20. L. niger, mandibulis bifidis: altera parte porrecta, ſubluna-ta interius tridentata; altera majore deflexa arcuata integra. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in Georgia Americae, *caraboide duplo major.*

191. DERMESTES.

Antennae clavatae: clava perfoliata: articulis tribus craſſioribus.
Thorax convexus, vix marginatus.
Caput ſub thorace inflexum condens.

* *maxilla bifida.*

lardarius. 1. D. niger, elytris anterius cinereis. *Fn. ſuec.* 408. *Geoffr. inſ. pariſ.* 1. *p.* 100. *n.* 5. *Scop. ent. carn.* 34. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 1.
Goed. inſ. 2. *t.* 41.
Blank. inſ. t. 11. *f.* K. L. M.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 4.
Mer. inſ. 2. *t.* 33.
Friſch inſ. 6. *t.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 192. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 15.
Schaeff. elem. t. 7. *f.* 1. 2.
icon. t. 42. *f.* 3.
Habitat in Europa, *larva ovata cinerea hirſuta in animalibus diu aſſervatis, lardo, carnibus, repoſitoriis culinariis et muſeis libris potiſſimum corio ſuillo aut aſinino a pilis non ſatis repurgato tectis infeſta, imago, olea et pinguedines aliis inſectis lethalia appetens, ſcybala inter vorandum ex ano protrudit concatenata pendula; rarior elytris anterius ferrugineis conſpicua.*

elongatus. 2. D. niger, elytris baſi faſciaque poſteriore lividis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 409.*
Habitat in Europa, *fere filiformis.*

undatus. 3. D. oblongus niger, elytris faſcia alba lineari duplici. *Fn. ſuec.* 410.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 6.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 199. *n.* 5. Dermeſtes oblongus niger &c.
Schaeff. ic. t. 157. *f.* 7. a. b.
Habitat in Europae *putridis, ſuffocatis.*

pellio. 4. D. niger, coleopteris punctis albis binis. *Fn. ſuec.* 411.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 100. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 37.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 63. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 5. Dermeſtes niger, elytris puncto albo.
Degeer inſ. 4. *p.* 197. *n.* 3. Dermeſtes bipunctatus.
Raj. inſ. p. 85. *n.* 35.
Friſch inſ. 5. *p.* 22. *t.* 8.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 4.
β) Dermeſtes minor non punctatus. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 101.
Habitat in Europae *pellibus, lardo, aliis cibariis, libris vetuſtis.*
Larva *oblonga, piloſa, cauda ſetoſa.*

macellarius. 5. D. niger glaber, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 4.
Habitat in Germania, *lardario affinis.*

cadaverinus. 7. D. niger, ore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenae.

carnivorus. 8. D. niger, elytris anterius teſtaceis, abdomine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia *et* Seelandia.

trifaſciatus. 9. D. ovatus niger, elytris faſciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 34. *n.* 7.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 5. Byrrhus fuſcus &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, undati magnitudine et ſtatura.*

20guttatus. 10. D. oblongus ater, punctis viginti albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 7. *mant.* 1. *p.* 34. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 3.

bicolor. 11. D. oblongus niger ſubtus teſtaceus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 9.
Habitat in Germania, *ſtatura murini.*

12. D.

Dermeſtis *larvae exedunt et deſtruunt animalium cadavera, res culinares, pelles, libros;* apodes *lignum putreſcens.*

domeſticus. 12. D. niger, elytris griſeis margine nigris, thorace villoſo.
Fn. ſuec. 424.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 111. *t.* 1. *f.* 6. Byrrhus.
Habitat in Europa, *thorace fere hemiſphaerico.*

violaceus. 13. D. nigro-caeruleſcens, thorace villoſo. *Fn. ſuec.* 422.*
Scop. carn. 51. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 15.
Fn. ſuec. 373. Dermeſtes nigro-caeruleus.
Degeer inſ. 5. *p.* 163. *n.* 4. *t.* 5. *f.* 13. Clerus caeruleus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 304. *n.* 2. Clerus nigro-caeruleus.
Raj. inſ. 100. Scarabaeus antennis clavatis 12.
Habitat in Europae *cadaveribus frequens, etiam in floribus.*

rufipes. 16. D. nigro-caeruleſcens, thorace villoſo, pedibus rufis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 65. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 16.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *p.* 10. Anobium rufipes.
Habitat in Africa *aequinoctiali, an varietas violacei?*

ruficollis. 17. D. violaceus, thorace elytrorumque baſi rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 17.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 8. *f.* 7.
Habitat in Africa *et* India, *violacei magnitudine, totus hirtus.*

caeruleus. 24. D. caeruleus hirtus linearis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 10. Anobium caeruleum.
Habitat ad caput bonae ſpei, *violaceo ſimilis, at linearis.*

hirtus. 14. D. ater hirtus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 82. *n.* 6. Hiſpa (hirta) antennis ſerratis atra hirta.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 94. *n.* 18. Lagria atra.
Habitat in Europa, *undati magnitudine, pilis nigris hirtus.*

feneſtralis. 15. D. caſtaneus, capite nigricante, thorace fuſco. *Fn. ſuec.* 423.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 197. *n.* 7. Ips ſpinoſus &c.
Müll. prodr. zool. dan. p. 57. *n.* 505. Byrrhus feneſtralis &c.
Habitat in Europa *boreali, frequens in feneſtris.*

vulpinus. 25. D. oblongus laevis niger, thoracis lateribus cinereo-villoſis ſubtus albidus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, *carnivoro affinis et aequalis.*

28. D.

felinus. 28. D. oblongus villosus cinereus immaculatus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 34. *n.* 11.
Habitat in terra van Diemen, *an satis a vulpino distinctus?*

murinus. 18. D. oblongus tomentosus nigro alboque nebulosus, abdomine niveo. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 64. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 12.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 18. *Fn. suec.* 426.* *Scop. ent. carn.* 35. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 102. *n.* 7. Dermestes tomentosus oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutello luteo.
Degeer inf. 4. *p.* 197. *n.* 2. Dermestes nebulosus &c.
Frisch inf. 4. *p.* 34. *t.* 18.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 1. 2.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Europae *cadaveribus frequens.*
Larva *oblonga brunnea, ore atro.*

tessellatus. 31. D. oblongus tomentosus fusco cinereoque nebulosus, abdomine fusco. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 65. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 13.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 100. *n.* 8. Dermestes flavescens pilosus.

navalis. 32. D. elongatus ferrugineo-fuscus, oculis atris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 65. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia, *murino quadruplo minor.*

scaber. 33. D. griseus, thorace elytrisque scabris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 25.
Habitat in nova Seelandia.

testaceus. 34. D. oblongus testaceus, oculis abdominisque basi nigris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 24.
Habitat in Belgio.

fumatus. 22. D. oblongus testaceus, oculis nigris. *Fn. suec.* 432.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 104. *n.* 12. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 19.
Scop. ent. carn. 59. Dermestes rosae.
Degeer inf. 4. *p.* 195. *n.* 3. Ips testaceo-flavus &c.
Herbst apud Fuesslii Arch. Inf. 4. *p.* 20. *n.* 7. *t.* 20. *f.* 1?
Habitat in Europae *floribus, in viis, fimo equino.*

picipes. 35. D. oblongus nigricans, pedibus piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 23.
Habitat Halae Saxonum, *tomentosi statura et magnitudine.*

chinenſis. 36. D. oblongus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 27.
Habitat in ſeminibus e Sina allatis.

paniceus. 19. D. oblongus ferrugineus, oculis rufis. *Fn. ſuec.* 431. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 22. *Friſch inſ.* 2. *p.* 36. *t.* 8.
Habitat in Europae *pane diutius aſſervato; glutine bibliopegorum, et libris aliisque, quibus hoc adhaeret, ſeminis milii magnitudine.*
Larva *ovata alba nitida.*

ferrugineus. 21. D. oblongus ferrugineus ſemicylindricus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 433.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 91. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 6. Nitidula ferruginea?
Schranck apud Fueſſli n. entom. Mag. 1. *p.* 140. Dermeſtes teſtaceus.
Laicharting inſ. tyr. 1. *p.* 104. *n.* 2. Oſtoma ferruginea?
Lesk. it. p. 46. *t.* A. *f.* 11?
Habitat in Europa.

Euſtatius. 20. D. ater glaber obtuſiſſimus, pedibus ferrugineis.
Habitat in inſulae Euſtatii *fungis, pediculi magnitudine.*

pediculatus. 23. D. oblongus teſtaceus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 434.*
Schranck inſ. auſtr. n. 56. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 22. *n.* 13. *t.* 20. *f.* 6.
Fn. ſuec. 1. *n.* 441. Chryſomela dilute teſtacea hemiptera.
Habitat in Europae *floribus frequens.*

fuſcus. 37. D. oblongus villoſus fuſcus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 21.
Habitat Halae Saxonum *et* Kilonii, *tomentoſi ſtatura et magnitudine.*

tomentoſus. 38. D. oblongus villoſus griſeus, capite punctis duobus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 20. *Degeer inſ.* 4. *p.* 199. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 18.
Habitat in Angliae, Sueciae *floribus.*

ſanguinicollis. 39. D. elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 35. *n.* 18.
Habitat Halae Saxonum, *chryſomelae ſtatura, antennis dermeſtis.*

40. D.

limbatus. 40. D. fuſcus, elytris punctatis: limbo cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 28.
Habitat in nova Seelandia, *parvus.*

ſcanicus. 26. D. ater thorace punctoque elytrorum teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *n.* 27.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 26. *Fn. ſuec.* 437.* Dermeſtes fuſcus, thorace teſtaceo.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 21. *n.* 8. *t.* 20. *f.* 2.
Habitat in Suecia *et* Germania.

Colon. 27. D. thorace lateribus flavis, elytris griſeis: puncto nigro. *Fn. ſuec.* 430.*
Habitat in Europa.

ſurinamenſis. 29. D. teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato.
Habitat in Surinamo *et* Sibiria, *oblongus, pediculi magnitudine.* Rolander.

hemipterus. 30. D. elytris abbreviatis baſi exteriore apiceque teſtaceis.
Habitat Surinami, *pediculi magnitudine.* Rolander.
Antennae *capitatae;* pedes *ferrugineï;* elytra *abdomine dimidio breviora; ſingulis macula cuneiformis in apice, et punctum glaucum ad baſin exteriorem elytri.*

bifaſciatus. 41. D. niger, elytris faſciis binis undulatis luteis, thorace cinereo-teſſellato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *undati magnitudine, at latior.*

interruptus. 42. D. niger, faſcia baſeos elytrorum rubra interrupta. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 3.
Habitat - - - *undati magnitudine.*

bipuſtulatus. 43. D. ater glaber, capite, thorace punctoque baſeos elytrorum rubris. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *f.* 4.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 45. *n.* 7. Ips humeralis.
Habitat - - - *magnitudine pulicis.*

marginatus. 44. D. niger, thoracis lateribus, pectore inciſurisque abdominis albis. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *f.* 6.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *magnitudine et facie lardarii, ſed paulo major, et totus hirtus.*

piceus. 45. D. totus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 8.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *marginati magnitudine et ſtatura.*

capenſis. 46. D. ater hirtus, elytris flexilibus violaceis: faſciis duabus albis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. *f.* 8. Anobium capenſe.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine majoris pediculi.*

cafer. 47. D. niger glaber, elytris faſciis duabus luteis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *t.* 9. *f.* 9. Anobium biſaſciatum.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſublineari oblongus.*

viridis. 48. D. viridis hirtus, pedibus rubris.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. Anobium viride.
Habitat in Africa *et* India.

fimetarius. 49. D. flaveſcente fuſcus, thorace marginato, antennis pedibusque ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 21. *n.* 10. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat Berolini *in fimo et floribus, convexus,* $1\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

cellaris. 50. D. fuſceſcens, antennis longis, elytris ſtriatis. *Scop. ent. carn. n.* 42.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 22. *n.* 12. *t.* 20. *f.* 5.
Habitat in Germaniae *parietibus, vere frequens,* $\frac{2}{3}$ *lineae longus.*

longicornis. 51. D. fuſcus, antennis longis, thorace medio excavato, elytris punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 23. *n.* 15. *t.* 20. *f.* 8.
Habitat Berolini, *lineam longus, cellari affinis.*

flaveſcens. 52. D. ferrugineus ſubtus flaveſcens, capite obſcuriore, oculis nigris, thorace tereti. *Schranck apud Fueſſli n. ent. Mag.* 1. *p.* 140.
Habitat in Bavaria, *ferrugineo affinis.*

fulvipes. 53. D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.
Schranck apud Fueſſli n. ent. Mag. 1. *p.* 141. Dermeſtes leucophilus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 108. *n.* 21.
Habitat - - -

61. D.

Plura hujus nominis inſecta habent Scopoli et Geoffroi, Schranck, Laicharting, Moll.

ſulcatus. 61. D. fuſco ruber, oculis nigris, elytris ſulcatis punctatis.
Thunb. nov. act. Upſ. 4. *p.* 2. *n.* 1.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major.*

feneſtratus. 62. D. fuſcus, elytris maculis ſedecim pallidis, tibiis omnibus ſpinoſis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat Upſaliae, *ptini mollis magnitudine.*

ruber. 63. D. ruber, thorace glaberrime ferrugineo-nigro, lateribus rufis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 3.
Habitat Upſaliae, *pediculo vix major, ſilphae melanocephalae affinis.*

linearis. 64. D. corpore elytrisque linearibus ferrugineis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 4.
Habitat in Suecia, *feneſtrali ſimilis, at multoties major.*

ater. 658. D. ater nitidus, elytris tenuiſſime punctatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 5.
Habitat Upſaliae, *magnitudine coccinellae bipunctatae.*

bipuſtulatus. 66. D. niger, capite thoraceque rubris, elytris nigris: baſi macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 1. *p.* 4. *n.* 6.
Habitat Upſaliae, *pediculo vix major.*

faſciatus. 67. D. niger, elytris faſciis duabus undulatis luteſcentibus.
Thunb. nov. act. Upſ. 4. *p.* 5. *n.* 7.
Habitat Upſaliae, *pediculi magnitudine.*

** *maxilla unidentata:* Apate.

muricatus. 6. D. elytris reticulatis poſterius retuſis dentatis, thorace muricato gibbo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 1.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 3. Ligniperda terebrans.
Habitat in Americae *meridionalis lignis.*

hamatus. 54. D. elytris ante apicem uniſpinoſis thoracis margine anteriori bihamato denticulato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 2.
Habitat in Saxoniae *lignis, ſtatura muricati, at minor.*

Monachus. 55. D. elytris obtuſis, thorace gibbo truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 3.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 4. Ligniperda cornuta.
Habitat in Americae *meridionalis lignis.*

Jeſuita. 56. D. elytris integris varioloſis, thorace anterius truncato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 62. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

indicus. 57. D. elytris integris nigris, thorace anterius ſcabro, *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *minuto affinis, at paulo major.*

minutus. 58. D. niger, elytris integris piceis, thorace anterius ſcabro, *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 6.
Habitat in nova Seelandia.

exilis. 59. D. ater, elytris integris pallidis: margine omni nigro.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 33. *n.* 7.
Habitat Kilonii *ſub fagi cortice, parvus.*

villoſus. 60. D. thorace villoſo, elytris integris fuſcis: margine punctisque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 8.
Habitat Halae Saxonum.

pallipes. 68. D. oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Sueciae *floribus, minutus.*

lunatus. 69. D. oblongus niger, elytris lunula dorſali cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *ſub arborum corticibus, parvus.*

ruficornis. 70. D. fuſcus capite retracto, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 108. b.
Habitat in Europa, *minimus.*

BOSTRICHUS. *Antennae* clavatae: clava ſolida. *Thorax* convexus vix marginatus. *Caput* ſub thorace inflexo conditum.

Capucinus. 1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace retuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 416. Dermeſtes capucinus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 302. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Boſtrichus niger &c.
Schaeff. elem. t. 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 5. 6. c.
β) Dermeſtes capucinus abdomine nigro. *Lepechin it.* 2. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in Europae, β) Sibiriae *truncis, praeſertim emortuis, parietibus.*

2. B.

flavicornis. 2. B. piceus, elytris apice ſpinoſo-dentatis, antennis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 2. *Habitat in* America *boreali.*

elongatus. 3. B. elongatus ater, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 3. *Habitat in* Upſaliae *ligno antiquo.*

typographus. 4. B. teſtaceus piloſus, elytris ſtriatis retuſis praemorſo-dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 4. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 562. *n.* 7. *Fn. ſuec.* 418. *It. oel.* 26. 195. *Lepech. it.* 2. *p.* 202. *t.* 81. *f.* 21. Dermeſtes typographus. *Degeer inſ.* 5. *p.* 193. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. 2. Ips piloſus fuſcus &c. *Raj. inſ. p.* 100. *n.* 10. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 4. *Habitat intra* Europae, Americae, Sibiriae *cortices arborum, praeſertim piceae infeſtiſſimus, fertiliſſimus, voraciſſimus, intra corticem canalem effodiens, ex quo ad latus plures utrinque minores ſubparalleli exeunt, pro aetate magnitudine, magis adhuc colore flaveſcente, fuſceſcente, fuſco, ſubatro varians, vitae tenaciſſimus.*

chalcographus. 5. B. ater, elytris praemorſo-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 5. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 562. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 417. Dermeſtes chalcographus. *Habitat intra arborum* Europae *cortices, colore nigro et teſtaceo varians.*

polygraphus. 6. B. nigricans, elytris glaucis obtuſiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 6. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 562. *n.* 10. *Fn. ſuec.* 420. Dermeſtes polygraphus. *Degeer inſ.* 5. *p.* 196. *n.* 5. Ips rufo-fuſcus &c. *Habitat in* Europa *boreali ſub arborum corticibus, labyrinthos formans, inter nocentiores ſui generis.*

micrographus. 7. B. ferrugineus, elytris integris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 7.

Boſtrichi *fertiliſſimi larva et imago cortices arborum et ligna exedit, ſilvarum aliquando peſtis perniciоſiſſima. J. F. Gmelin Abh. von der Wurmtroknis. Lipſ.* 1787.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 9. *Fn. ſuec.* 419. Dermeſtes (micrographus) teſtaceus glaber, thorace nigro, elytris apice retuſo-dentatis.
Habitat in Europae *ligno, etiam intra cortices arborum, parvus, niger, elytris, antennis pedibusque teſtaceis.*

bidentatus. 8. B. niger, coleopteris teſtaceis apice retuſis bihamatis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 8.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 10. Boſtrichus bidentatus.
Lepech. it. 2. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 22. Scarabaeus thorace mutico, elytris apice excavatis mucronibus 4 inſtructis?
Habitat in Saxonia *et* Sibiria, *polygraphi magnitudine.*

Scolytus. 9. B. glaber nigricans, elytris truncatis integris, abdomine retuſo, fronte villoſa cineraſcente. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 68. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 9.
Geoffr. inſ. pariſ. I. *p.* 310. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 5. Scolytus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 112.
Habitat ſub Angliae *ulmorum cortice, quas miſere devaſtat.*

crenatus. 10. B. glaber ater, elytris integris piceis crenato-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 10.
Habitat in Germania, *ſcolyti ſtatura et magnitudine.*

pygmaeus. 11. B. ater nitidus, elytris integris rufis, abdomine retuſo. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 11.
Habitat Halae Saxonum, *ſcolyto proxime affinis, at triplo minor.*

ligniperda. 12. B. villoſus teſtaceus, corpore nigricante, tibiis quatuor poſterioribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 12.
Habitat in Germaniae *ligno, piniperda paulo major.*

piniperda. 13. B. niger ſubvilloſus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 68. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 37. *n.* 13. *Lesk. it. p.* 11. *t.* A. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 421. Dermeſtes piniperda.
Degeer inſ. 5. *p.* 194. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 8. 9. Ips ſubvilloſus niger nitidus &c.
Habitat in Europae *pini ramulis inferioribus, quos perforat, exſiccat, deſtruit, hortulanus naturae, curculionis fere ſtatura, colore elytrorum varians.*

14. B.

teſtaceus. 14. B. glaber teſtaceus, elytris laevibus, longitudine abdominis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 14.
Habitat in pini truncis, *piniperdae ſtatura oblonga.*

varius. 15. B. ſubvilloſus, corpore nigro cinereoque vario. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 15.
Habitat in Haſiniae *arboretis antennarum clava acuminata.*

vittatus. 16. B. ſubvilloſus fuſcus, elytris vitta abbreviata cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 16.
Habitat in Europae *truncis arborum, ſtatura varii, at duplo minor.*

minutus. 17. B. glaber ater immaculatus, elytris integris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 17.
Habitat Kilonii *in boleto verſicolore.*

maculatus. 18. B. niger, elytris faſcia undata punctisque rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 7. *f.* 5.
Habitat in Suecia, *ſtatura dermeſtis undati, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

bifaſciatus. 19. B. ater, elytris flavis: faſciis duabus nigro-caeruleſcentibus denticulatis.
Lepech. it. 2. *p.* 206. *t.* 10. *f.* 3. Dermeſtes bifaſciatus.
Habitat in Sibiria.

limbatus. 20. B. niger, elytris flaveſcentibus marginatis fuſco-limbatis.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 1. *p.* 24. *n.* 7. *t.* 20. *f.* 11.
Habitat in Pomerania, $1\frac{1}{2}$ *lineas longus thorace capucino ſimilis.*

fuſcus. 21. B. fuſcus, elytris ſtriatis: ſtriis apice cohaerentibus, tibiis extus dentatis, plantis rufis. *Muſ. Leſk. p.* 6. *n.* 112.
Habitat in Europa.

piloſus. 22. B. teſtaceus piloſus, elytris punctato-ſtriatis, apice retuſis dentatis. *Muſ. Leſk. p.* 6. *n.* 113.
Habitat in Europa.

fraxini. 23. B. fuſcus piloſus, elytris ſubquinquelineatis.
Habitat ſub cortice fraxini et celtidis, tenta maſſilibus et hypognathus ſub cortice pini. Aperit quoque ſulcos corticales, ſed rectiores, $1\frac{1}{2}$ lineas longos, capite nigro. Larva alba, rectus longa, capite fuſco in cortice alba.

MELYRIS. *Labium* clavatum emarginatum.
Antennae totae perfoliatae.
Maxilla unidentata acuta.

viridis. 1. M. viridis, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 36. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae spei.

nigra. 2. M. nigra, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 36. *n.* 2.
Habitat - - - *statura viridis, at triplo minor.*

192. PTINUS. *Antennae* filiformes: articulis ultimis majoribus.
Thorax subrotundus, non marginatus, caput excipiens.

* *palpis clavatis:* Anobia.

rugosus. 1. Pt. fuscus thorace inaequali, elytris striatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 1.
Habitat Kilonii, *pertinace duplo major, immaculatus.*

pertinax. 2. Pt. fuscus unicolor. *Fn. suec.* 414.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 71. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 2. Anobium fuscum immaculatum.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 112. *n.* 4. Byrrhus totus nigro-fuscus.
Degeer inf. 4. *p.* 227. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 24. 25. Byrrhus nigro-fuscus &c.
Habitat in Europa *captus mortui instar se contrahens immobilis, e ligno, patissimum querno confecta destruens, libris etiam infestus, ab attelabo formicario eradicatur.*

mollis. 3. Pt. testaceus oculis fuscis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 71. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 3. Anobium testaceum, oculis nigris.
Fn. suec. 415. *Bergius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 268. Dermestes mollis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 112. *n.* 2. Byrrhus testaceus glaber.
Degeer inf. 4. *p.* 230. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 29. Byrrhus rufo-fuscus, oculis nigris &c.

Habitat

Habitat in Europae *quisquiliis, herbariis etiam invisus, calore furni pellendus.*
Larva *alba frigoris patientissima.*

frumentarius. 7. Pt. testaceus, thorace ciliato: dorso plano carinato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat in pane diutius asservato, capitur in navi prope Brasiliam.

planus. 8. Pt. fuscus, thorace plano, elytris crenato-striatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat Kilonii.

flavipes. 9. Pt. villosus niger, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 4.
Habitat Hamburgi.

lineatus. 10. Pt. pilosus niger, elytris lineis sesquitertiis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 6.
Habitat in Brasilia, *statura cantharidis nigrae; an hujus generis?*

cyaneus. 11. Pt. subvillosus cyaneus, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 7.
Habitat in America *magis australi, cantharidis nigrae statura et magnitudine.*

minutus. 12. Pt. subvillosus niger thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *statura cyanei, at duplo minor, elytris interdum virescentibus.*

pulsator. 13. Pt. cylindricus opacus rugosus maculis griseis adspersus. *Schaller Abh. hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 249.
Habitat Halae Saxonum *in truncis vetustis salicis et domibus, noctu praesertim termitis instar pulsans, statura pertinacis, magnitudine dermestis lardarii.*

fagi. 14. Pt. niger, antennis spadiceis, elytris punctato-sulcatis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 26. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 12.
Habitat Berolini, 3. *lineas longus.*

ferrugineus. 15. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris obsolete striatis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 37. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 13.
Habitat in Marchia.

16. Pt.

testaceus. 16. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuesslí Arch. Inf.* 7. *p.* 158. *n.* 4.
Habitat Berolini, *an satis a ferrugineo distinctus?*

capensis. 26. Pt. ferrugineus, elytris striatis pallidioribus. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 378.
Habitat ad caput bonae spei, *statura pertinacis, at duplo minor.*

fuscus. 27. Pt. fuscus, corpore griseo irrorato, scutello griseo, antennis ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 6. *n.* 121.
Habitat in Europa.

rufus. 28. Pt. rufus luteo nitens, thorace utrinque posterius macula lutea, elytris punctato striatis. *Muf. Lesk. p.* 6. *n.* 122.
Habitat in Europa.

ferrugineus. 29. Pt. ferrugineus, thorace inaequali, elytris punctato striatis, antennis rufescentibus. *Muf. Lesk. p.* 6. *n.* 123.
Habitat in Europa, *antennarum articulis* 3 *ultimis majoribus, compressis obconicis.*

striatulus. 30. Pt. testaceus, elytris levissime striatis, antennorum articulis tribus ultimis majoribus. *Muf. Lesk. p.* 6. *n.* 127.
Habitat in Europa.

brunneus. 31. Pt. brunneus, elytris levissime striatis pubescentibus. *Muf. Lesk. p.* 6. *n.* 128.
Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus:* Ptini.

Gigas. 17. Pt. griseus, elytris posterius cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 1.

imperialis. 4. Pt. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris macula lobata alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 5. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 57. *n.* 507. Bruchus imperialis. *Sulz. hist. inf. t.* 2. *f.* 7.
Habitat in Europae *borealis et* Calabriae *arboribus, seminis tritici magnitudine.*
Antennae *longitudine corporis* pedesque *ferruginei;* scutellum *niveum;* elytra *nigra, macula alba aquilam insignium quodammodo referente notata.*

5. Pt.

Fur. 5. Pt. teſtaceus ſubapterus, thorace quadridentato, elytris faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 4.
Fn. ſuec. 651. Cerambyx Fur.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 164. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 6. Bruchus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 231. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 5. 6. Byrrhus rapax.
Scop. ent. carn. 210. Bupreſtis Fur.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 30.
Friſch inſ. 13. *t.* 15.
Habitat in Europae *ſeminibus, in muſeis peſſimus, deſtruens herbaria, inſecta, aves, pelles, utenſilia, libros, culinaria, imo pulverem tabaci, ambroſiacis non pellendus, frigoris et humiditatis amans, calore et ſiccitate arcendus, arſenico et alumine, certius mercurio corroſivo ſublimato albo occidendus, habitu, facie, moribus, metamorphoſi ad dermeſtes, dentibus thoracis lateralibus ad cerambyces accedens;* femina *aptera;* larva *hexapus obeſa, mollis, piloſa, ſegmentis dorſalibus prominulis;* puppa *intra globum glutinoſum.*

longicornis. 18. Pt. ater nitidus, pedibus flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 3.
Habitat in Germania, *furis magnitudine.*

germanus. 6. Pt. fuſcus, thorace transverſim rugoſo, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 40. *n.* 2. Ptinus fuſcus, thorace quadridentato, elytris villoſis cinereo-variis.
Habitat in Europae *quercu, furi affinis, ſed major.*
Antennae *ferrugineae, longitudine corporis.*

Latro. 19. Pt. teſtaceus immaculatus, thorace bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat Argentorati. Hermann.

ſpinicornis. 20. Pt. oblongus, antennarum articulis duobus prioribus longioribus ſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat in Sandwichii *inſulis.*

ſulcatus. 21. Pt. albidus, thorace quadriſulcato villoſo, elytris connatis fuſco-teſtaceis nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat in plantis ſiccis ex inſulis Canariis *miſſis, fure minor.*

22. Pt.

Scotias. 22. Pt. thorace laevi piceo, elytris connatis fuſco teſtaceis nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 8. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 27. *n.* 5 *t.* 20. *f.* 14. *Czenpinsk. diſſ.* 51. 155. *Jacquin miſcell. auſtr. t.* 23. *f.* 1. Scotias pſylloides. *Schranck inſ. auſtr.* Scotias Seminulum. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 164. *n.* 2. Bruchus totus teſtaceus &c. *Scop. introd. hiſt. nat.* 505. Gibbium? *Habitat in* Europae *magis auſtralis betula.*

ſtriatus. 23. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globoſis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 10. *Habitat* Halae Saxonum, *ſtatura ſcotiae.*

upſalienſis. 24. Pt. teſtaceus, oculis nigris, elytris ſtriatis, thorace convexo-plano. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 6. *n.* 9. *Habitat* Upſaliae, *pediculi magnitudine, molli duplo minor; an hujus tribus.*

Faber. 25. Pt. teſtaceo-obſcurus, elytris laevibus cinereo-undulatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 6. *n.* 10. *Habitat in* Hollandia, *pertinace major.*

apterus. 32. Pt. capite fuſco: fronte canaliculata, elytris annatis pedibus antennisque rufis, femoribus clavatis, tibiis ciliatis. *Muſ. Leſk. p.* 7. *n.* 130. *Habitat* - - -

193. HISTER.

Antennae clavatae: clava ſolida, infimo articulo compreſſo, decurvato.

Caput intra corpus retractile.

Os forcipatum.

Elytra corpore breviora.

Tibiae anteriores dentatae.

maximus. 1. H. maximus. *Muſ. Lud. Ulr.* 36.* Hiſter unicolor. *Habitat in* India, *unicolori ſimilis, ſed decuplo major, thoracis angulis rotundatis, pectoris apice non ad os usque extenſo.*

2. H.

major. 2. H. ater, elytris subſtriatis, thoracis marginibus ciliatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 1.
Voet coleopt. 1. 31. *f.* 6.
Habitat in Africa, *unicolori ſimillimus, at duplo major.*

niger. 7. H. niger, punctis elevatis ſcaber. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in Hiſpania, *unicoloris magnitudine.*

unicolor. 3. H. ater, elytris oblique ſtriatis. *Fn. ſuec.* 440.* *Scop. ent. carn.* 30. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 342. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 12. Hiſter niger nitidus, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 94. *t.* 1. *f.* 4. Attelabus totus niger &c.
Raj. inſ. p. 91. *n.* 7. Scarabaeus antennis globuloſis &c.
Gunner act. nidroſ. 4. *t.* 16. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10. *et t.* 208. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8. 9.
β) Hiſter elytris ſtriis quinque punctatis dimidiatis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 89.
γ) Hiſter elytris ſtriis tribus integris duabusque parvulis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 90.
Habitat in Europae *et* Americae *arena, terra, ſtercore,* β) *triplo,* γ) *quadruplo minor.*

cyaneus. 8. H. thorace aeneo, elytris caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

planus. 9. H. planus ater opacus, elytris laeviſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Helvetia.

brunneus. 10. H. ferrugineus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 6.
Habitat in Sueciae *ſtercore.*

pygmaeus. 4. H. ater, elytris laeviſſimis. *Fn. ſuec.* 441. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 344. *n.* 4. Hiſter nigro-fuſcus &c.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali, unicolori ſimillimus, at quadruplo minor.*

depressus, 11. H. depressus ater nitidissimus, elytris substriatis. *Fabr. mant. inf. p.* 32. *n.* 8.
Herbst apud Fuesslí Arch. Inf. 4. *p.* 20. *n.* 7. Hister compressus.
Habitat sub betulae *cortice.*

abbreviatus. 12. H. ater, elytris crenato-striatis: striis interioribus abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 32. *n.* 9.
Habitat in America *boreali, statura pygmaei.*

bimaculatus. 5. H. ater, elytris posterius rubris. *Fn. suec.* 442.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 6. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 33. *n.* 10.
Scop. ent. carn. 51. Hister fimetarius.
Degeer inf. 4. *p.* 343. *n.* 2. Hister niger nitidus &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 95. *n.* 2. Attelabus niger &c.
Udm. diss. 80. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 9.
elem. t. 24. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 1.
Habitat in Europae *stercore bovino.*

quadrimaculatus. 6. H. ater, elytris bimaculatis. *Fn. suec.* 443.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 61. *mant. inf.* 1. *p.* 33. *n.* 11.
Degeer inf. 4. *p.* 344. *n.* 3. Hister niger nitidus &c.
Gadd. satag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 2.
icon. t. 3. *f.* 9. *et t.* 14.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali, maculis elytrorum interdum cohaerentibus.*

aeneus. 13. H. aeneus, elytris basi striatis apice punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 62. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 33. *n.* 12.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 95. *n.* 3. Attelabus nigro cupreus.
Habitat in Anglia, Gallia.

detritus. 14. H. ater nitens, elytris piceis apice obscuris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 62. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 33. *n.* 13.
Habitat in nova Hollandia.

striatus. 152. H. ater, thorace elytrisque striatis. *Forster nov. sp. inf. cent.* 1. *p.* 11. *n.* 11.
Habitat in Anglia.

16. H.

pulicarius. 16. H. niger, elytris ſtriatis apice pallidis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 7. *n.* 11.
Habitat in Suecia, *pygmaei magnitudine.*

apterus. 17. H. fulvus, alis nullis. *Scop. ent. carn. n.* 32.
Habitat in Carniola.

194. GYRINUS.

Antennae cylindricae.
Maxilla cornea, acutiſſima.
Oculi 4: duo ſupra, duo infra.

Natator. 1. G. ſubſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 194. *t.* 3. *f.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 1.
Fn. ſuec. 779. *Scop. ent. carn.* 299. Dytiſcus ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtuſis.
Merret pin. 203. Pulex aquaticus.
Pet. gaz. 21. *t.* 13. *f.* 9. Scarabaeus niger noſtras, ſupra aquam velociter circumnatans.
Raj. inſ. p. 89. *n.* 9. Scarabaeus aquae ſubrotundus e caeruleo viridi ſplendente undique tinctus.
Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond. I. 3. *p.* 158. Gyrinus pygolampis.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 195. *t.* 31.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 43.
Poda inſ. 44. *n.* 4.
Schaeff. elem. t. 67.
Habitat in Europae *lacubus, frequens, nitidiſſimus, foetens, velociſſime ſupra aquam per orbes curſitans, dum vero urinatur, bullam aëream hydrargyri coloris ſecum trahens.*

bicolor. 3. G. niger ſubtus ferrugineus, pedibus poſterioribus compreſſis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 194. *n.* 2.
Habitat in Sueciae *aquis, natatore major.*

auſtralis. 4. G. ſubſtriatus viteſcens elytris abbreviatis unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 298. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 3.
Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond. I. 3. *p.* 159. *n.* 5.
Habitat in novae Hollandiae *aquis.*

americanus. 2. G. laevis ater opacus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 298. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 4. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 2.
Habitat in Americae *meridionalis aquis, natatori ſimilis, ſed duplo major.*

spinosus. 5. G. niger nitidus, thoracis elytrorumque margine flavo, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *congeneribus similis, at spinis elytrorum duabus elongatis acutissimis distinctus.*

grossus. 6. G. subtus ater, supra niger, laevis, glaberrimus, elytris apicibus rotundatis. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 156. *n.* 1.
Habitat in aquis claris ad caput bonae spei.

formosus. 7. G. subtus ater, pectore, sterno pedibusque ferrugineis, supra obscure aeneo-virescens, linea labii transversa, maculis binis frontis, thoracis linea transversa interrupta, striisque elytrorum rubro-subauratis. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 3.
β) Gyrinus minor non auratus. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157.
Habitat in aquis claris ad caput bonae spei, β) *duplo minor.*

orientalis. 8. G. subtus pallide ferrugineus, supra aeneo-niger, elytris utrinque compressis striatis subauratis, posterius quadridentatis. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 6.
Habitat - - - teretiusculus, elytris abdominis longitudine.

Viola aquatica. 9. G. subtus pallide ferrugineus, supra ater glaberrimus, subtomentoso murinus. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 7.
Aldr. inf. l. 7. *c.* 1. *Jonst. inf. l.* 4. *c.* 1. Viola aquatica.
Habitat in aquis salsis.

195. BYRRHUS.

Antennae clavatae: clava perfoliata.
Palpi aequales, subclavati.
Maxilla bifida.
Labium bifidum.

Gigas. 1. B. niger, elytris punctatis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 38. *n.* 1.
Habitat in Austria, *pilula major.*
Feminae *anus aculeo armatus.*

Pilula. 4. B. fuſcus, elytris ſtriis atris interruptis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 2.
Fn. ſuec. 427. Dermeſtes tomentoſus ovatus fuſco-nebuloſus.
Deeger inſ. 4. *p.* 213. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 23. Dermeſtes ovatus &c.
Geoffr. inſ. par. 4. *p.* 116. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 8. Ciſtela ſubvilloſa virideſcens &c.
β) Byrrhus maculatus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 25. *n.* 2.
Habitat in Europae *ſabuloſis*, *colore nigro interdum conſpicuus.*

ater. 2. B. niger immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3. Ciſtela nigra nitens glabra.
Habitat in Germania, *pilulae ſtatura et magnitudine.*

dorſalis. 3. B. nigricans, coleoptris macula transverſa ferruginea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *atro proxime affinis*, *at paulo minor.*

varius. 5. B. niger, thorace aeneo, elytris fuſcis; ſtriis tribus abbreviatis viridibus nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 5.
Habitat in Anglia.

aeneus. 6. B. totus aeneus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 6.
Habitat Upſaliae, *ſcutello albido.*

nitidus. 7. B. totus nitidus, ſupra aeneo-viridis, ſubtus niger. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 252.
Habitat Halae Saxonum *in ſaxoſis*, *vere infra ſaxa frequens.*

faſciatus. 8. B. nigricans, elytris faſcia lata fuſca. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 4.
Voet coleoptr. t. 32. *f.* 2?
Habitat Berolini.

vireſcens. 9. B. vireſcens, ſcutello luteo. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 116.
Habitat in Europa.

ANTHRENUS.

Antennae clavatae: clava solida.
Palpi inaequales, filiformes.
Maxilla membranacea, linearis, bifida.
Labium integrum.

Pimpinellae. 4. A. niger, elytris fascia alba apice ferrugineus, litura alba.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 70. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 114. *n.* 1. Anthrenus squamosus niger &c.
Habitat in pimpinellae floribus Galliae.

Scrophulariae. 1. A. niger, elytris albo-maculatis: sutura sanguinea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 569. Byrrhus Scrophulariae.
Fn. suec. 429. Dermestes tomentosus maculatus, sutura elytrorum rubra.
Degeer inf. 4. *p.* 200. *n.* 6. *t.* 7. *f.* 20. Dermestes ovatus niger &c.
Raj. inf. p. 85. *n.* 35.
Sulz. hist. inf. t. 2. *f.* 11. h.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 9. 10.
Schaeff. elem. t. 17.
icon. t. 176. *f.* 4.
Habitat in Europae *scrophulariis.*

museorum. 2. A. nebulosus, elytris subnebulosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 2. Byrrhus museorum.
Fn. suec. 430. Dermestes tomentosus maculatus, elytris puncto albo.
Degeer inf. par. 4. *p.* 203. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 11. 12. Dermestes ovatus fuscus &c.
Habitat in museis, *animalia observata destruens, libris quoque infestus, praecedenti similis, at minor.*

Verbasci. 3. A. niger, elytris fasciis tribus undatis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 4.

Syst.

An ad hoc genus spectat dubius Herbst apud Fuessli Arch. inf. 1. *p.* 41. *n.* 10. *t.* 21. *f.* k. k.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 3. Byrrhus fuſcus, elytris faſciis tribus undulatis pallidis.
Geoffroi inſ. par. 1. *p.* 115. *n.* 2. Anthrenus ſquamoſus niger, elytris fuſcis &c.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 11. 12.

vagus. 5. A. cinereus, elytris faſciis nigris tribus obſoletis.
Habitat in Europa, *Suecia; an hujus generis?*

glaber. 6. A. glaber niger, elytris, pedibus antennisque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 4.
Habitat Berolini, *magnitudine derm. pellionis.*

fuſcus. 7. A. fuſcus pilis luteis leviſſime tomentoſus apice pallida.
Muſ. Leſk. p. 20. *n.* 119. b.
Habitat in Europa.

196. SILPHA.

Antennae clavatae: clava perfoliata.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

germanica. 1. S. oblonga atra, clypeo obrotundo inaequali marginato, elytris obtuſiſſimis margine laterali ferrugineis.
Degeer inſ. 4. *p.* 173. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 4. Silpha tota atra, elytris truncatis abdomine brevioribus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 569. *n.* 1. Nicrophorus ater, thorace obrotundo inaequali.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 99. *n.* 2. Dermeſtes thorace marginato, elytris abſciſſis, totus niger.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 1.
Liſt. ſcar. angl. p. 381.
Voet coleoptr. t. 30. *f.* 4. 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 10.
β) Silpha ſpecioſa, elytris maculis duabus aurantiacis. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 95. *t.* 4.
γ) Silpha humator. *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 10. *f.* 9.
Habitat multiplici varietate in Germania, *cadavera ovo impraegnata ſepeliens.*

Silpharum *larva et imago animalium, inprimis cadaveribus paſcitur.*

Vespillo. 2. S. oblonga atra, clypeo orbiculato inaequali, elytris fascia duplici ferruginea. *Fn. suec.* 444.* *Mus. Lud. Ulr.* 37.* *Degeer inf. par.* 4. *p.* 168. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. Silpha nigra, elytris truncatis &c.

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 84. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 2. Nicrophorus ater, elytris fascia duplici ferruginea.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 98. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 5. Dermestes thorace marginato &c.

Scop. ent. carn. 33. Dermestes vespillo.

Raj. inf. 106.

Lister scar. p. 381. *n.* 2.

Mouff. inf. 149. *f.* 1.

Imp. alt. 692. *t.* 2. *f.* 2.

Blanck. inf. 160. *t.* 14. *f.* 1.

Gleditsch act. Berol. 1752. *p.* 53.

Petiv. gazoph. t. 13. *f.* 6.

Poda inf. t. 1. *f.* 2.

Voet coleoptr. t. 30. *f.* 1-3.

Roes. inf. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Frisch inf. 12. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 2.

Bergstr. nomencl. 1. 10. 14. *t.* 1. *f.* 14.

Schaeff. ic. t. 9. *f.* 4.

β) Silpha vespilloides. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 32. *n.* 3.

Habitat multiplici varietate, in Europa, America, *cadavera ovo impraegnata fepelicns, moschum non raro spirans, elytris erectis approximatis ocyssime volitans, acaris infestata; in* America *interdum decuplo major.*

bimaculata. 3. S. ovata nigra, antennarum capitulis globosis, pedibus ferrugineis.

Habitat in Barbaria, *oryzae magnitudine, thoracis margine subferrugineo, elytris in medio macula rubra notatis.*

quadripustulata. 5. S. oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Fn. suec.* 446.*

Degeer inf. 4. *p.* 185. *n.* 12. *t.* 6. *f.* 20. 21. Silpha nigra oblonga depressa &c.

Fabr. syst. ent. p. 69. *n.* 3. Tritoma quadripustulata.

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 80. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 5. Ips quadripustulata.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 106. *n.* 16?

Frisch inf. 9. 36. *t.* 19.

β) Silpha americana quadruplo major.

Habitat

Habitat in Europae *et* Americae *ligno putrescente, glaberrimus, statura scarabaei*, larva *oblonga hirsuta grisea.*

dorsalis. 4. S. oblonga supra pallida coleoptris macula media nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 4.
Habitat in Europa *australi, quadripustulata paulo major.*

notata. 17. S. atra elytris macula baseos rufa. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 3.
Habitat Halae Saxonum, *dorsalis statura.*

bipunctata. 53. S. ater, elytris rufis: macula magna atra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 2.
Habitat in Europa *magis australi.*

fasciata. 24. S. atra, elytris fasciis duabus rufis: anteriori nigro-maculata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 1.
Habitat in America *boreali.*

rufipes. 25. S. atra, capite, thorace pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 6.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 80. *n.* 2. Tritoma rufipes.
Habitat in Norwegiae *fungis arboreis, in* Germania *duplo major.*

quadrimaculata. 27. S. rufa, thorace elytrisque nigris: his maculis duabus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 256. Silpha quadrimaculata oblonga ferruginea, superne nigra, elytris striatis: maculis duabus ferrugineis.
Habitat Halae Saxonum, *ad rufficam accedens.*

punctulata. 32. S. oblonga nigra, elytris punctis fasciaque posteriore fulvis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 9.
Habitat Halae Saxonum, *parva.*

glabra. 34. S. oblonga nigra, thorace rufo, elytris nigris: maculis duabus obsolete rufis, pedibus rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 255.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 46. *n.* 10. Ips sanguinicollis.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, ad rufficam accedens.*

picea. 36. S. picea, elytris nigris, basi fasciaque posteriore ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 11.
Habitat in Germania, *quadripustulata minor.*

quadriguttata. 37. S. oblonga nitida atra, elytris maculis duabus albis, anteriore sinuata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 14. *Herbst. apud Fuesslii Arch. Inf.* 7. *p.* 158. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 17.
Habitat Kilonii.

nigricornis. 38. S. flava, antennis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 12.
Habitat Halae Saxonum, *aenea paulo major; an hujus generis?*

aenea. 39. S. oblonga rufa, elytris caeruleo-viridibus, antennis nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 254.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 46. *n.* 13. Ips aenea.
Habitat in silvis Magdeburgicis, *mediae magnitudinis.*

crenata. 40. S. oblonga nigra, thorace rugoso, elytris striato-crenatis: maculis duabus rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 15. *Herbst apud Fuesslii Arch. inf.* 4. *p.* 31. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 2.
Fabr. Syst. ent. p. 69. *n.* 4. Tritoma crenata.
Habitat in Suecia, *quadripustulata quadruplo minor.*

rufifrons. 41. S. oblonga glabra atra, fronte pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 16.
Fabr. Syst. ent. p. 69. *n.* 5. Tritoma rufifrons.
Habitat in Anglia.

bifasciata. 42. S. nigra, elytris fasciis duabus punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 17.
Habitat Halae Saxonum, *minuta.*

nigra. 43. S. oblonga nigra immaculata. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 18.
Habitat in Uplandiae *boletis, parva.*

haemorrhoidalis. 79. S. rufa, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *rufipedi proxime affinis.*

binotata. 80. S. testacea, elytris striatis: maculis duabus nigris. *Petagn. inf. Calabr. p.* 7. *n.* 31. *f.* XXXIII.
Habitat in sepibus circa Bellimontum Calabriae, *statura rufficae.*

81. S.

spadicea. 81. S. oblonga glabra, oculis apiceque elytrorum nigris. *Lesk. it. p.* 14. *t.* A. *f.* 3.
Habitat in Lusatiae *monte* Keulenberg, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

sexdentata. 44. S. nigra, thorace sexdentato, elytris angustis punctato-sulcatis. *Herbst apud Fuesslı Arch. Inf.* 4. *p.* 31. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 21.
Habitat in oryza, $1\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

collaris. 45. S. ovata nigra, thorace, pedibus antennisque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 256.
Habitat in ligno ducatus Magdeburgici, *russica dimidio minor.*

carnaria. 46. S. fusca, elytris obtusis pubescentibus: maculis duabus testaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 257.
Habitat in cadaveribus, *nitidulae rufipedi similis, at minor.*

indica. 6. S. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace anterius bidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 38.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 85. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 4.
Habitat in India.

americana. 7. S. ovata fusca, clypeo flavo, centro nigro intra annulum fulvum.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 85. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 5. Silpha depressa nigra, thorace flavo: centro nigro.
Catesb. Car. 3. *t.* 10. *f.* 5. Blatta americana.
Habitat in America, *vespillonis magnitudine.*

Seminulum. 8. S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro. *Fn. suec.* 447.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 79. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 44. *n.* 13. Sphaeridium atrum, abdomine pedibusque rufis.
Habitat in Europae *hortis et floribus, parva; testam dasypodis instar componens, terrefacta similis femini caput et pectus abdomini applicans, ut exacte granum glabrum lucidum referat, quiete jacieudo facile seducens inventorem.*

agaricina. 9. S. ovata atra glaberrima hemiptera. *Fn. suec.* 448.
Scop. ent. carn. 43. Dermestes agaricinus.
Habitat in agaricis.

russica. 10. S. oblonga rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris. *Fn. suec.* 449.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 85. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 48. *n.* 6.

Uddm. diſſ. 7. Dermeſtes elytris nigris, capite, clypeo et abdomine rubro.
Degeer inſ. 5. *p.* 283. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 12. Anthribus ruber &c.
Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 159. *n.* 14. *t.* 43. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali*, *et* Calabria.

livida. 47. S. fuſca thorace elytris pedibusque lividis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat in Germania, *littoralis ſtatura*, *ſed duplo minor.*

littoralis. 11. S. atra, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Fn. ſuec.* 450.* *Scop. ent. carn.* 55. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2.
Fn. ſuec. 380. Caſſida atra, elytris lineis tribus elevatis, antennis antice teſtaceis.
Degeer inſ. 4. *p.* 176. *n.* 4. Silpha rufo-clavata &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 120. *n.* 3. Peltis nigra &c.
Schaeff. ic. t. 218. *f.* 1.
Friſch inſ. 6. *p.* 12. *t.* 5.
Berg ſtr. nomencl. 1. 24. 6. *t.* 3. *f.* 6.
β) Silpha clavipes? *Sulz. hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 14?
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in Europae *cadaveribus.*
Larva *ovata*, *depreſſa*, *fuſca*, *voraciſſima.*

ſurinamenſis. 48. S. atra, elytris faſcia poſteriore flava, femoribus poſterioribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

inaequalis. 49. S. atra, elytris laevibus: lineis elevatis tribus, thorace inaequali emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *atratae affinis.*

granulata. 50. S. atra, elytris lineis elevatis tribus punctisque granulatis, thorace emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 12.
Habitat in Africa, *atrata paulo major.*

atrata. 12. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace integro. *Fn. ſuec.* 451.* *Scop. ent. carn.* 56. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 11.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 98. *n.* 10. Silpha tyrolenſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 177. *n.* 5. *t.* 6. *f.* 15. Silpha punctata &c.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 118. *n.* 1. Peltis nigra &c.
Schaeff. elem. t. 96. *f.* 1.
icon. t. 93. *f.* 5.
Habitat in Europae *agris et viis frequens.*

thoracica. 13. S. nigra, elytris obſcuris: linea elevata unica, thorace teſtaceo. *Fn. ſuec.* 452.* *Scop. ent. carn.* 54. *Stroem act. nidr.* 3. *p.* 384. *t.* 6. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 174. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 7. Silpha nigra &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 121. *n.* 6. Peltis nigra &c.
Gadol diſſ. 25. Caſſida nigra, clypeo latiſſimo pallide, rufo, macula lata nigra nitida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 10. Scarabaeus primo ſimilis parum canaliculatus, ſcapulis croceis.
Bergſt. nomencl. 1. 23. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 12.
Habitat in Europae *cadaveribus.*

laevicollis. 51. S. gibba nigra, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus, thorace laevi emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 8.
Habitat in nova Hollandia.

marginalis. 52. S. atra, thoracis margine pallido, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 9.
Forſter cent. inſ. 1. *p.* 17. *n.* 17. Silpha noveboracenſis.
Habitat in America *boreali*, *atratae magnitudine.*

quadripunctata. 14. S. nigra, elytris pallidis: puncto baſeos medioque nigro, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 453.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 20.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 2.
Schreb. inſ. 2. *f.* 5. Silpha quadripunctata nigra, elytris exalbidis: maculis 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 122. *n.* 7. Peltis nigra, thoracc elytrisque teſtaceis, thoracis macula coleoptrorumque 5 nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 181. *n.* 6. *t.* 4. Silpha corpore nigro &c.
Lepechin it. 1. *p.* 202. *t.* 16. *f.* 4. Silpha flavicans.
Habitat in Europae, *frequens in* Angliae *quercu.*

pedemontana. 54. S. teſtacea, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 123. *n.* 9.
Habitat in agris Pedemontanis.

55. S.

hirta. 55. S. nigricans villis flavis splendidis hirta, elytris lineis duabus et dimidia elevatis. *Herbst apud Fuesslí Arch. Inf.* 4. *p.* 34. *n.* 11.
Habitat Berolini, *sinuatae affinis.*

sinuata. 56. S. thorace emarginato scabro, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 19.
Sulz. hist. inf. t. 2. *f.* 15. Silpha appendiculata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 119. *n.* 2. Peltis nigra &c.
Habitat in Anglia *et* Germania.

carinata. 57. S. spadicea, clypeo glaberrimo, latissimo, marginato, anterius exciso, elytris margine carinatis glabris: lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuesslí Arch. Inf.* 4. *p.* 34. *n.* 12.
Habitat in Pomerania, *opacae affinis.*

opaca. 15. S. fusca, elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace anterius truncato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 18.
Müller prodr. zool. dan. p. 63. *n.* 585. Peltis opaca &c.
Schaeff. ic. t. 93. *f.* 6.

rugosa. 16. S. nigricans, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace rugoso posterius sinuato. *Fn. suec.* 445.* *Scop. ent. carn.* 53. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 49. *n.* 10.
Fn. suec. 1. *n.* 379. Cassida atra, elytris striis quinque punctisque elevatis.
Degeer inf. 4. *p.* 182. *n.* 7. *et inf.* 5. *p.* 43. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 21. Silpha nigra opaca &c. *et* Tenebrio rugosus &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 120. *n.* 4. Peltis nigra &c.
Raj. inf. 90. *p.* 9. Scarabaeus inter cadavera frequens &c.
Bergstr. nomencl. 1. 23. 4. *t.* 3. *f.* 4.
β) Silpha pellae ocephalos. *Bergstr. nomencl. t.* 9. *f.* 8.
Habitat frequentissima in Europa *et* Sibiria, *cadavera, pisces, carnes consumens, capta humorem foetidissimum evomens.*

canecllata. 58. S. nigra, thorace laevi, elytris rugosis: lineis elevatis tribus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 49. *n.* 17.
Habitat Halae Saxonum, *obscurae proxime affinis.*

18. S.

obſcura. 18. S. nigra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace anterius truncato. *Fn. ſuec.* 457. *Scop. ent. carn.* 57. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 16. *Udm. diſſ.* 8. Caſſida ovata nigra, lineis elevatis tribus: media longiſſima.

β) Silpha punctata. *Bergſtr. nomencl. t.* 9. *f.* 9?

Habitat in Europa *boreali, rarior.*

ferruginea. 19. S. ferruginea, elytris lineis elevatiſſimis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. ſuec.* 458. *Scop. ent. carn.* 60. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 22. *Degeer inſ.* 4. *p.* 183. *n.* 9. Silpha cimicoides &c. *Laichart. inſ. tyr.* 1. *p.* 102. *n.* 1. Oſtoma rubicunda. *Raj. inſ. p.* 84. *n.* 33. *Schaeff. ic. t.* 40. *f.* 7.

Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria.

reticulata. 20. S. ferruginea, elytris lineis elevatis ſenis, thorace emarginato ſerrato.

Habitat in Europa, *ferruginea duplo anguſtior.*

Clypeus *lunatus, latitudine thoracis, et ultra thoracem exſertus; hic elytris anguſtior, marginibus lateralibus crenulatis; elytra profunde ſulcata; inter ſingulos ſulcos ordine punctorum excavato.*

groſſa. 21. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, thorace transverſo emarginato. *Fn. ſuec.* 459. *Udm. diſſ.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 14. Silpha truncata.

Habitat in Europa, *ovata, punctis elytrorum confertis.*

laevigata. 59. S. atra, elytris laevibus ſubpunctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 15. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 122. *n.* 8. Peltis nigra tota &c. *Sulz hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 16.

Habitat in Europae *ſilvis.*

oblonga. 22. S. nigra, elytris ſtriato-punctatis, lineis elevatis ſenis, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 460. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 23. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *t.* 20. *f.* 22. *Degeer inſ.* 4. *p.* 185. *n.* 71. Silpha oblonga &c. *Fn. ſuec.* 381. Caſſida atra, elytris ſtriis 10 elevatis, punctis excavatis ſtriatis.

β) Silpha flavifrons. *Schaeff. elem. t.* 18?

scabra. 23. S. oblonga nigra, thorace anterius elytrisque ante apicem bidentatis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 50. *n.* 24. Silpha dentata?
Habitat in Europa, *statura et magnitudine oblongae.*

limbata. 60. S. nigra, thoracis elytrorumque margine subferrugineo, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 25.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *statura ferrugineae*, *at paulo minor.*

undata. 61. S. nigra nitida, elytris fasciis duabus undatis, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 26.
Habitat in Saxonia, *sub arborum cortice*, *dermestis undati statura et magnitudine.*

succincta. 26. S. ferruginea nitida, elytris medio nigris.
Habitat in Suecia, *pediculo major.*

fusca. 28. S. fusca elongata, subtus picea.
Habitat in Suecia, *pediculo major*, *statura cicindelae.*

depressa. 29. S. ferruginea, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. suec.* 463.*
Habitat in Europa.

uralensis. 62. S. supra atra, subtus ferruginea, thoracis atque elytrorum marginibus rubicundis. *Lepech. it.* 1. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in deserto Uralensi, *aliorum insectorum cadavera sepeliens*; *an hujus generis?*

grisea. 30. S. grisea, elytris laevibus, thorace emarginato. *Fn. suec.* 464.*
Habitat in Europa.

testacea. 31. S. testacea, thorace integro.
Habitat in Germania, *nitidula aestiva triplo major*, *an hujus generis?*

pulicaria. 33. S. nigra oblonga, elytris abbreviatis, abdomine acuto.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 79. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 44. *n.* 15. Sphaeridium pulicarium.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 24. *Fn. suec.* 370. Dermestes pulicarius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 308. *n.* 4. Anthribus niger.
Raj. inf. 108. *n.* 29.
Habitat frequens in Europa, *in floribus cursitans.*

63. S.

minuta. 63. S. atra, elytris ſtriatis, pedibus concoloribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 14.
Habitat in Anglia.

ſimetaria. 64. S. atra, immaculata, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 12. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 4. *t.* 20. *f.* 17.
Habitat in Angliae *ſtercore.*

cruentata. 65. S. atra nitida, thoracis margine elytrorumque macula ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

rufa. 66. S. atra nitida, thorace pedibusque anterioribus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura parva et gibba haemorrhoidalis.*

haemorrhoidalis. 67. S. atra, elytris apice rufis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 9.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 308. *n.* 5. Anthribus niger ovatus &c.
Habitat in Europae *ſtercore bovino.*

melanocephala. 68. S. atra glabra, elytris griſeis: macula communi baſeos nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 8. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 563. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 425. Dermeſtes melanocephalus &c.
Habitat in Europae *ſtercore frequens.*

atomaria. 35. S. nigra ſubovata, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 7. Sphaeridium laeve atrum, elytris crenato-ſtriatis, pedibus pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 19. Dermeſtes niger ſubrotundus &c.
Habitat in Europae *ſtercore.*

ſtriata. 69. S. ferruginea, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 6.
Habitat Kilonii, *ſtatura marginatae.*

marginata. 70. S. laevis atra, elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 5.
Habitat Halae Saxonum, *glabratae ſtatura et magnitudine.*

glabrata. 71. S. atra, antennis pedibusque rufis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 4.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura dyticoidis, at minor.*

dyticoides. 72. S. ferruginea, elytris atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenae.

ſtercorea. 73. S. atra nitida, elytrorum macula apicis rubra, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 2.
Habitat Kilonii *in ſtercore.*

ſcarabaeoides. 74. S. ovata atra, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 428. *Scop. ent. carn.* 36. Dermeſtes ſcarabaeoides.
Gadd ſatag. 76. Scarabaeus ovatus niger glaber, maculis 2 rubris in ſingulo elytro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 106. *n.* 17. Dermeſtes niger &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 345. *t.* 12. *f.* 17. Hiſter teſtudinarius &c.

inſignita. 75. S. nigra, elytris obſolete ſtriatis: maculis duabus magnis coccineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 5. *t.* 20. *f.* 18.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino.*

nigricans. 76. S. nigricans, elytris laeviſſimis: maculis quatuor flavis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 19.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino, ſtatura et magnitudine melanocephalae.*

hiſteroides. 77. S. nigra, antennis pedibusque rubris, elytris abbreviatis: macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 8. *n.* 12.
Habitat Upſaliae, *oblonga, anguſta, pediculo vix major.*

biguttata. 78. S. tota ferruginea, elytris linea punctoque pallido. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 13.
Habitat Upſaliae, *depreſſae magnitudine et facie.*

lutea. 81. S. lutea, elytris pubeſcentibus laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia.

ruficornis. 82. S. atra glabra, antennis abdomine pedibusque ferrugineis.
Muſ. Leſk. p. 7. *n.* 142.
Habitat in Europa.

exilis. 83. S. atra glabra minima, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 144. c.
Habitat in Europa.

ſpadicea. 84. S. ferrugineo fuſca glabra, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 144. A.
Habitat in Europa.

trilineata. 85. S. elytris punctatis: lineis elevatis tribus; intermedia longiſſima. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 154. b.
Habitat in Europa.

melanophthalma. 86. S. teſtacea, oculis nigris, elytris guttis quinque nigris: una communi ad ſcutellum. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 160.
Habitat in Europa.

multicolor. 87. S. nigra, antennis pedibusque rufis, thoracis teſtacei dorſo fuſco: punctis duobus impreſſis, elytris teſtaceis: punctis duobus, taenia media, faſcia inaequali verſus apicem apiceque ipſo nigris. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 171.
Habitat in Europa, *antennarum apice fuſco.*

bicolor. 88. S. fuſca, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 172. 174.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 89. S. teſtacea, capite, thorace elytrisque fuſco nebuloſis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 173.
Habitat in Europa.

rubiginoſa. 90. S. thorace anguſto: dorſo ſulcato, corpore fuſco, elytris rugoſis, capite, thorace, abdomine pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. b.
Habitat - - -

pallipes. 91. S. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque pallidis, oculis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. d.
Habitat in Europa.

ſqualida. 92. S. fuſco teſtacea, capite, thorace antennarumque teſtacearum apice teſtaceis, elytris ſordide teſtaceis, pedibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. e.
Habitat - - -

ſtriatula. 93. S. ferruginea, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. f.
Habitat in Europa.

tricolor. 94. S. nigra, antennis pedibusque rufis, elytris fuſco-brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 174. g.
Habitat in Europa.

NITIDULA. *Antennae* clavatae: clava solida.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiusculus, marginatus.

* *labio quadrato:* Elophori.

aquatica. 1. N. fusca, thorace rugoso elytrisque fusco-aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 573. *n.* 25. *Fn. suec.* 461.* Silpha cinerea, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 105. *n.* 15. Dermestes viridi-aeneus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.
Degeer inf. 4. *p.* 379. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 5. 6. Hydrophilus aeneus &c.
Habitat in Europae *aquis stagnantibus, parva, frequens inter confervas.*

elongata. 2. N. fusca, thorace rugoso, elytris sulcatis crenatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 257.
Habitat Halae Saxonum *in aquis stagnantibus sub lemna, magnitudine media ptini pertinacis, angusta et elongata, pedibus piceis.*

nubila. 3. N. grisea, thorace elytrisque sulcato-rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 2.
Habitat Hamburgi.

minuta. 4. N. fusca, thorace rugoso aeneo, elytris pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 3.
Habitat in Angliae *aquis stagnantibus, aquaticae affinis, at triplo minor.*

coccinelloides. 28. N. nigra, capite, thorace elytrisque fumatis. *Mus. Lesk. p.* 7. *n.* 137. b.
Habitat in Europa, *statura coccinellae.*

fusca. 29. N. fusco testacea, elytris punctato striatis, antennis pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p.* 7. *n.* 137. c.
Habitat in Europa.

nebulosa. 30. N. testaceo grisea, capite fusco: tuberculis inter oculos quatuor, thorace aspero, elytris lineis elevatis sex: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk. p. 7. n. 138. b.*
Habitat - - - an forte eadem cum nubila?

** *labio cylindrico.*

bipustulata. 5. N. ovata nigra, elytris puncto rubro. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 91. n. 1. mant. inf. 1. p. 51. n. 1.*
Syst. nat. XII. 2. *p.* 570. *n.* 4. *Fn. Suec.* 445. Silpha oblonga nigra, elytris singulis puncto unico rubro.
Laichart. inf. tyr. 1. p. 106. n. 3. Ostoma bipustulata.
Degeer inf. 4. p. 186. n. 13. t. 6. f. 22. 23. Silpha nigra &c.
Geoffr. inf. par. 1. p. 100. n. 3. Dermestes niger &c.
Habitat in Europae *cadaveribus, carnibus, lardo.*

obscura. 6. N. ovata nigra obscura, pedibus piceis. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 91. n. 2. mant. inf. 1. p. 51. n. 2. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 2. t. 20. f. 23.*
Habitat in Germania.

abbreviata. 7. N. ovata nigra obscura, elytris laevibus obtusis abbreviatis. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 91. n. 3. mant. inf. 1. p. 51. n. 3.*
Habitat in nova Scelandia, *obscurae statura et magnitudine, pedibus nunc flavis, nunc nigris.*

marginata. 8. N. ovata, elytris sulcatis: margine punctisque disci ferrugineis. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 91. n. 4. mant. inf. 1. p. 51. n. 4.*
Habitat in Italia, *statura bipustulatae.*

aestiva. 9. N. testacea subtomentosa, thorace emarginato, oculis nigris. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 91. n. 5. mant. inf. 1. p. 51. n. 5. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 36. n. 3. t. 20. f. 24.*
Syst. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 32. *Fn. Suec.* 465. Silpha aestiva.
Habitat in Europae *floribus.*

strigata. 10. N. ovata fusca, thoracis margine, elytris margine, lineola baseos strigaque apicis fulvis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 51. n. 7.*
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, subtus fusca.*

varia. 11. N. ovata, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis. *Fabr. Sp. Inf. 1. p. 92. n. 7. mant. inf. 1. p. 52. n. 8. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 76. n. 4. t. 20. f. 25.*
Habitat Kilonii *in hortis, statura dermestis ferruginei.*

bicolor. 12. N. ferruginea, elytris nigris, fascia baseos punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 9.
Habitat in arvis Kilonienſibus.

Colon. 13. N. nigra, elytris ferrugineo-variis, thorace emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 10. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 573. *n.* 27. *Fn. ſuec.* 462. *Degeer inſ.* 4. *p.* 117. *n.* 14. *t.* 6. *f.* 24. Silpha Colon.
Habitat in Europae *borealis graminoſis.*

limbata. 14. N. nigra, thoracis margine, elytrorumque limbo ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 52. *n.* 11.
Habitat Halae Saxonum *parva.*

haemorrhoidalis. 15. N. nigra, elytris apice ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 12.
Habitat Hamburgi.

diſcoidea. 16. N. nigra, thorace marginato, elytrorum diſco ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 13.
Habitat in Anglia.

pedicularia. 17. N. nigra, elytris laevibus, thorace marginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 14.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 34. *Fn. ſuec.* 466. Silpha pedicularia.
β) Dermeſtes (pſyllius) ovatus niger, abdomine obtuſo, thorace elytrisque marginatis.
Habitat in Europae *borealis hortis, floribus, pediculi magnitudine, ovato-oblonga.*

litura. 18. N. teſtacea, elytris litura arcuata nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 15.
Habitat Halae Saxonum, *parva.*

bipunctata. 19. N. teſtacea, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 16.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. Chryſomela ſcutellata.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura liturae.*

aenea. 20. N. viridi-aenea, thorace marginato, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

21. N.

viridescens. 21. N. viridi-aenea, thorace marginato, pedibus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *ſtatura aeneae.*

pubescens. 22. N. thorace elytrisque griſeis pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 19.
Habitat in Germania.

hirta. 23. N. atra, thorace elytrisque pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 20.
Habitat in Germania, *pubeſcenti affinis.*

rufipes. 24. N. nigra nitida, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 21.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 573. *n.* 24. Silpha nigra laevis, thorace ſubemarginato, pedibus pallidis.
Habitat in Europae *hortis.*

ſetacea. 25. N. ochracea immaculata, oculis nigris, elytris laeviſſimis. *Herbſt. apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 6.
Habitat - - - *ſtatura et magnitudine coli, dermeſti ferrugineo affinis.*

pectoralis. 26. N. fuſca, capite pedibusque ferruginea, antennarum clava flava. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 12. *t.* 21. *f.* M. m.

piloſa. 27. N. nigra, elytris villoſis, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 7. *t.* 21. *f.* G. g.
Habitat in Marchia, *lineam longa.*

OPATRUM. *Antennae* moniliformes, extrorſum craſſiores.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

griſeum. 1. O. cinereum, thorace plano marginato, elytris ſtriis tribus elevatis poſterius dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 1.
Habitat in Italia, *ſabuloſo major.*

fabulosum. 2. O. fuscum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 572. *n.* 17. *Fn. suec.* 456. Silpha fabulosa.
Udm. diss. 5. Dermestes niger, inter elytrorum lineas quatuor elevatas scrobiculis exaratus.
Fn. suec. 382. Cassida nigra, elytris striis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 350. *n.* 7. Tenebrio atra &c.
Habitat in Europae *et borealis* Americae *campis apricis fabulosis.*

gibbum. 3. O. nigrum, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 3.
Habitat in Suecine *collibus arenosis.*

laevigatum. 4. O. nigrum, clypeo anterius piceo, elytris subtriatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 50. *n.* 4.
Habitat in nova Seelandia, *statura gibbi.*

arenarium. 5. O. griseum, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae spei.

orientale. 6. O. cinereum, thorace elytrisque rugosis, tibiis anterioribus dilatatis triangularibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 511. *n.* 6.
Forsk. Fn. ar. p. 77. *n.* 1. Silpha multistriata.
Habitat in Orientis *arenosis.*

tibiale. 7. O. nigrum, elytris punctato subrugosis, tibiis anterioribus compresso-triangularibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 7.
Habitat sub Scaniae *lapidibus, parva.*

Agricola. 8. O. nigrum, thorace laevi, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 8. *Herbst apud Fuesslii Arch. Inf.* 4. *p.* 35. *n.* 2.
Habitat Berolini *et* Halae Saxonum, *parva.*

minutum. 9. O. cinereum, thorace rugoso, elytris lineis elevatis quatuor laevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Suecine *arenosis, primis speciebus quadruplo minor.*

10. O.

quisquiliarum. 10. O. nigrum, thorace granulato medio glabro, elytris glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 35. *n.* 3.

cinereum. 11. O. nigrum cinereo obumbratum, elytris punctato-ſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 159. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 10. *Habitat in* India.

Lithophilus. 12. O. nigrum, thorace et ſubtus coccineum, thorace emarginato poſterius utrinque acuminato, elytris glaberrimis, tarſis triarticulatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 37. *n.* 1. *t.* 21. *f.* A. a. *Habitat in* Marchia *ſub ſaxis, 2 lineas longum, dubii generis.*

melinum. 13. O. ochraceum glabrum, thorace elytrisque tenerrime punctatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 37. *n.* 2. *t.* 21. *f.* B. b. *Habitat rarior in* Marchiae *floribus*, 1½ *lineas longum, dubii generis.*

cinereum. 14. O. badium elongatum, elytris planis glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 38. *n.* 3. *t.* 21. *f.* C. c. *Habitat in* Pomerania.

bipuſtulatum. 15. O. ferrugineum, elytris tenerrime ſulcatis thoraceque poſterius ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 38. *n.* 4. *t.* 21. *f.* D. d. *Habitat in* Pomerania, 2 *lineas longum, anguſtum, elongatum.*

monilicorne. 16. O. fuſcum, thorace elytrisque villoſis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 5. *t.* 21. *f.* E. e. *Habitat in* Germania, 4 *lineas longum.*

ſiphoides. 17. O. nigrum glabrum, thorace retrorſum dilatato, elytris punctato ſtriatis: maculis duabus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 11. *t.* 21. *f.* L. l. *Habitat in* fungis quernis, *generis dubii.*

unipunctatum. 18. O. fuſcum hirtum, thorace ſubcylindrico immarginato media fovea excavato, antennarum articulis duobus ultimis diſtantibus majoribus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 40. *n.* 8. *t.* 21. *f.* H. h. Dermeſtoides unipunctatus. *Habitat - - - ultra duas lineas longum, utrum hujus, an cum ſequente proprii generis?*

bipunctatum. 19. O. fuscum, thorace subcylindrico immarginato: foveis binis, antennarum articulis duobus ultimis distantibus majoribus.
Herbst apud Fuesslii Arch. Inf. 4. p. 40. n. 9. t. 21. f. 1. i.
Habitat - - - unipunctato affine, at minus et magis depressum.

clathratum. 20. O. nigrum, elytris striatis: striis punctatis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 379.*
Habitat in Cayenna.

testaceum. 21. O. testaceus, oculis, thorace, elytris antennisque fuscis, his basi apiceque rufis, elytrorum basi lunula magna testacea, thorace punctis duobus impressis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 178.*
Habitat in Europa, *statura quadripustulati, elytris punctato striatis.*

brunneum. 22. O. brunneum luteo sericeum, elytris levissime punctato striatis: maculis sex luteis, antennis pedibusque lutescentibus. *Mus. Lesk. p. 10. n. 179.*
Habitat - - - -

TRITOMA. *Antennae* clavatae: clava perfoliata. *Palpi* anteriores securiformes.

bipustulatum. 1. Tr. atrum elytris macula laterali coccinea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 1. mant. inf. 1. p. 44. n. 1.*
Geoffr. inf. par. 1. p. 335. n. 1. t. 6. f. 2. Tritoma?
Habitat in Angliae *boletis arboreis.*

glabrum. 2. Tr. glabrum atrum, antennis pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 45. n. 2.*
Habitat sub Sueciae *arborum corticibus, statura bipustulati.*

dubium. 3. Tr. nigrum, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 80. n. 3. mant. inf. 1. p. 44. n. 3.*
Habitat Kilonii.

vittatum. 4. Tr. rufum, elytris nigris: vitta rufa. *Fabr. mant. inf. 1. p. 44. n. 4.*
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

5. Tr.

Morio. 5. Tr. atrum holoſericeum, antennis pedibusque concoloribus.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 44. *n.* 5.
Habitat Kilonii, *ſtatura dubii, at duplo major.*

ſericeum. 6. Tr. nigricans holoſericeum, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 6.
Habitat in Germania, *ſtatura dubii, ſed major.*

collare. 7. Tr. nigrum, thoracis lateribus abdomineque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

197. CASSIDA.

Antennae moniliformes.
Elytra marginata.
Caput ſub thoracis clypeo plano reconditum.

viridis. 1. C. viridis. *Fn. ſuec.* 467. *It. oel.* 153. *Scop. ent. carn.* 117. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 313. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ. p.* 107. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 174. *n.* 2. Caſſida cardui &c.
Goed. inſ. 1. *p.* 94. *t.* 43.
Blank. inſ. 89. *t.* 11. *f.* F.
Merian. europ. t. 115.
Volk. heſper. 1. *p.* 166. *f.* 4.
Raj. inſ. 107. *n.* 5.
Reaum. inſ. 3. *t.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. el. t. 35.
icon. t. 27. *f.* 5.
Habitat in Europae *carduis et verticillatis frequens.*
Larva *hexapus depreſſa, ſpinis lateralibus acutis et cauda biſeta armata proprio ſtercore obvoluta obambulat.*

Murraea. 2. C. nigra, clypeo rubro, elytris ſanguineis: punctis nigris ſparſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 6. *mant.* 1. *p.* 62. *n.* 8.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *p.* 50. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *n.* 5. *β.* Caſſida rubra maculis rubris variegata.
Habitat in Europae *plantis, ſtatura viridis.* J. A. Murray.

atrata. 32. C. atra, clypeo anterius ſanguineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 7.
Habitat in Auſtria, *ſtatura nebuloſae, at minor.*

nebuloſa. 3. C. pallido-nebuloſa, fuſco punctata. *Fn. ſuec.* 468.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 88. *n.* 13.
Friſch inſ. 4. *p.* 30. *t.* 15.
Goed. inſ. 1. *p.* 96. *t.* 44.
Liſt. goed. 287. *t.* 117.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 4.
Habitat in Europae *carduis.*

nobilis. 4. C. griſea, elytris linea caerulea nitidiſſima. *Fn. ſuec.* 469. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 3.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 6.
Habitat in Europae *carduis, et plantis ſtellatis.*
Linea *elytrorum cum vita perit, in aqua calida reviviſcens.*

cribraria. 33. C. rufeſcens, thorace punctis quatuor, elytris muneroſis nigris, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 20.
Habitat in America.

deuſta. 34. C. rufeſcens, thorace punctis duobus elytris numeroſis cyaneo nigris, clypeo integro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

octopunctata. 35. C. rufeſcens, thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 18.
Habitat in Siam, *ſtatura et magnitudine deuſtae.*

interrupta. 36. C. flaveſcens, thorace immaculato elytris ante marginem punctisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

ſexpunctata. 37. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco ferrugineo: punctis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 16.
Habitat in Cayenna.

38. C.

annulus. 38. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco atro: annulo faſciaque poſteriore flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *ſtatura judaicae.*

judaica. 39. C. ferruginea, coleoptrorum diſco punctis impreſſis maculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *hebraea minor.*

hebraea. 40. C. pallida, coleoptris lineolis numeroſiſſimis difformibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *parva, flaveſcens.*

cincta. 41. C. thorace elytrisque obſcuris: margine flaveſcente, elytris ante marginem macula albo-hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 12.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura interruptae.*

marginella. 42. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 11.
Habitat in Braſilia.

limbata. 43. C, capite thoraceque pubeſcentibus obſcure aeneis: margine pubeſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum *in diantho carthuſianorum, ſtatura et magnitudine ferrugineae.*

ferruginea. 44. C. nigra, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1, *p.* 108. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 9. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 28. *Schranck Beytr.* 62. 3. Caſſida ſubferruginea.
Habitat in Germania, *in* Calabria *viridi paulo minor.*

Vibex. 5. C. virens, ſutura dorſali ſanguinolenta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 5.
Habitat in Germaniae *plantis, viridi ſimilis, elytrorum tamen dorſo vireſcente.*

affinis. 45. C. elytris griſeis nigro-punctatis, thorace flaveſcente immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 4.
Habitat in Germania, *viridi valde affinis.*

maculata. 6. C. viridis, elytris rarius, ſutura dorſali confertius nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *t.* 5. *f.* 6. Caſſida viridis maculis nigris variegata.
Degeer inſ. 5. *p.* 175. *n.* 3. Caſſida ſupra viridis, ſubtus nigra &c.
Habitat in Germaniae *plantis, an varietas viridis?*

equeſtris. 46. C. viridis, elytrorum baſi argentea, abdomine atro: margine pallido. *Fabr. mant.* 1. *p.* 62. *n.* 2.
Habitat Halae Saxonum *in mentha aquatica, viridi major, pedibus flaveſcentibus.*

truncata. 47. C. ruſa, elytris ſubreticulatis nigro-maculatis dorſo gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 41.
Habitat - - - *magna.*

gibboſa. 48. C. atra, thorace maculis duabus villoſo-aureis, elytris vireſcenti-reticulatis: ſpina ſuturali obtuſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 40.
Habitat in Braſilia, *magna.*

bidens. 49. C. atra, elytris anterius porrectis: ſpina ſuturali erecta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 39.
Habitat in Braſilia, *magna.*

ſpinifex. 7. C. ferruginea, elytris angulo anteriore ſpina porrecta, thorace utrinque ſpina transverſali. *Amoen. acad.* 6. *p.* 92. *n.* 7.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 38.
Habitat in India, *ad baſin elytrorum linea nigra notata.*

bicornis. 8. C. cyanea, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 9.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 36.
Habitat in America *auſtrali et* India.

perforata. 50. C. teſtacea, elytris angulo anteriore ſpinoſo baſique perforatis. *Pall. ſpicil. zool.* 9. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 35.
Habitat in America *meridionali.*

51. C.

Caſſidarum *larvae plantarum folia ſubtus exedunt.*

margaritacea. 51. C. virens, elytris viridi-argenteis lucidis, capite pectoreque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 259. *Fabr. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 22.
Habitat Halae Saxonum *vere ſub lapidibus, nebuloſae proxime affinis, colore cum vita pereunte.*

faſtuoſa. 52. C. atra, elytris rubro-aeneis nigro maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 259.
Habitat varior Halae Saxonum *in populo alba, nobili vix major, colore cum vita pereunte.*

fuſca. 53. C. ſpadicea, elytris ſtriis duabus elevatis. *Laichart. inſ. tyr.* 1. *n.* 4. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Germania, *viridi minor.*

cruciata. 9. C. pallida, elytris diſco fuſco-cruciato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 110. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 23. Caſſida flaveſcens, coleoptris diſco nigro: maculis quatuor flaveſcentibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 187. *n.* 12. *t.* 15. *f.* 15. Caſſida hyalina pallide flava &c.
Habitat in Europae *plantis.*

Crux. 54. C. flava, thoracis linea dorſali ferruginea, coleoptrorum diſco ferrugineo: maculis quatuor flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 119. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *an vere a cruciata diverſa?*

11punctata. 55. C. flaveſcens, thoracis puncto medio, coleoptris undecim nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 25.
Habitat in America *meridionali, ſubtus dilute ferruginea.*

biſaſciata. 10. C. pallida, corpore faſciis duabus fuſcis.
Habitat in America *meridionali.*

flava. 11. C. flava immaculata, corpore teſtaceo, puncto ſcutellari nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 42.
Degeer inſ. 5. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 13. Caſſida pallide flava immaculata &c.
Habitat in Europa *auſtrali.*

purpurea. 12. C. flava, ſupra corpus purpurea.
Habitat in America, *parva.*

leucophaea. 13. C. teſtacea, margine punctis flavis. *Amoen. acad. 6. p. 392. n. 8. Fabr. ſp. inſ. 1. p. 113. n. 36. mant. inſ. 1. p. 65. n. 43.*
Habitat in America.

tuberculata. 14. C. teſtacea, margine thoracis elytrorumque flavo, coleoptris baſi tritubercularis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 110. n. 21. mant. inſ. 1. p. 64. n. 26.*
Syſt. nat. XII. 2. p. 576. n. 14. Caſſida marginata.
Degeer inſ. 5. p. 186. n. 11. t. 15. f. 14. Caſſida cincta.
Habitat in Sierra Leon Africae.

futuralis. 56. C. brunnea, elytris flavis: futuris brunneis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 111. n. 22. mant. inſ. 1. p. 64. n. 27.*
Habitat ad caput bonae ſpei.

biguttata. 57. C. thorace flavo, elytris rufeſcentibus: margine nigro; maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 111. n. 23. mant. inſ. 1. p. 64. n. 28.*
Habitat in Cayenna.

miliaris. 58. C. flava, thorace immaculato, elytris nigro-punctatis: margine bifaſciato. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 111. n. 24. mant. inſ. 1. p. 64. n. 29.*
Habitat in inſula S. Helenae.

punctata. 59. C. nigra, clypeo brunneo, elytris flavis nigro-punctatis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 64. n. 30.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *miliaris magnitudine.*

reticularis. 15. C. flava, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 113. n. 37. mant. inſ. 1. p. 65. n. 44. Degeer inſ. 5. p. 188. n. 14. t. 15. f. 17.* Caſſida pellucida albo-flaveſcens &c.
Habitat in America *meridionali, magna.*

variegata. 16. C. rufa, elytris caeruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 113. n. 38. mant. inſ. 1. p. 65. n. 45. Degeer inſ. 5. p. 178. n. 2, t. 15. f. 6.* Caſſida fuſco-rubra &c.
Habitat in America, *magna.*

trifaſciata. 60. C. rufa, elytrorum lateribus trifaſciatis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 65. n. 46.*
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

61. C.

annulata. 61. C. caerulea, thorace maculis duabus, elytris annulis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 47.
β) Caſſida ornata. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 8. *t.* 22. *f.* 30.
Habitat in America *auſtrali et* India *magna.*

groſſa. 17. C. ſanguinea, elytris diſco punctis nigris ſparſis: margine lineis ramoſis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 48.
Schulze Naturf. 6. *p.* 89. *t.* 4. *f.* 1.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *t.* 15. *f.* 5.
Habitat in America *meridionali, congenerum maxima.*

clathrata. 18. C. ferruginea, elytris margine omni, linea longitudinali et dimidiata transverſali nigris.
Habitat in India. De Geer.
Thorax *immaculatus;* elytra *latiſſima;* femina *lineis transverſis dimidiatis tribus diſtincta.*

7guttata. 19. C. nigra, coleoptris maculis ſeptem albis.
Habitat in India, *an varietas blattae Petiverianae?* Brünnich.

exclamationis. 20. C. flava, elytris lineis ternis nigris, intermedia ſignum! referente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 49.
Habitat in America *meridionali, viridi paulo major, ſubtus livida.*

lineata. 62. C. cineraſcens, lineis elytrorum quatuor albidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei, *caſſidae exclamationis magnitudine et ſtatura.*

jamaicenſis. 21. C. luteo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 34.
Sloan. jam. 2. *p.* 208. *t.* 233. *f.* 27. 28.
Habitat in America, *ad ſuturam anterius gibba, colorem in ſpiritu vini deperditum in aqua calida recuperans.*

dorſata. 63. C. thorace elytrisque obſcuris, elytris ſpina ſuturali margineque albicante: baſi obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 33.
Habitat in Siam, *ſtatura jamaicenſis, at duplo minor.*

quadripuſtulata. 64. C. thorace obſcuro, elytris ſanguineis: margine cyaneo; maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 32.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, atra.*

cyanea. 22. C. cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 39.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 37.
Petiv. gazoph. t. 57. *f.* 6.
Degeer inſ. 5. *p.* 181. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 9.
Habitat in America.

marginata. 23. C. elytris teſtaceis, corpore elytrorumque margine nigro, thorace aeneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 31. *Schulze Naturf.* 9. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 185. *n.* 10. Caſſida thorace violaceo nigro &c.
Habitat in America *auſtrali et* India.

inaequalis. 24. C. ferrugineo-aenea, elytris macula flava ſubovata diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 51. *Schulze Naturf.* 9. *t.* 2. *f.* 6. *Muſ. petrop.* 650. *n.* 130.
Degeer inſ. 5. *p.* 182. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 2. Caſſida bimaculata &c.
Habitat in America *meridionali.*

ſuppoſita. 25. C. elytris nigris anterius annulatis: puncto centrali fulvo.
Lederm. microſc. t. 28. *f.* F. g. *et t.* 44. *f.* b. c. d.
Habitat in America *calidiore.*

lateralis. 26. C. fuſco-aenea, elytris macula flava laterali. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 52.
Degeer inſ. 5. *p.* 184. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 12. Caſſida fuſco-aenea &c.
Sulz. hiſt. inſ. 1. *t.* 3. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, inaequali duplo minor.*

diſcoides. 27. C. viridi-aenea, elytris macula didyma flava diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 53.
Degeer inſ. 5. *p.* 183. *n.* 7. *t.* 15. *f.* 11. Caſſida quadrimaculata &c.
Habitat in America *meridionali.*

decuſſata. 28. C. nigro-caeruleſcens, elytris flavo-maculatis, maculis dorſalibus reticulatis, lateralibus diſtinctis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 57.
Habitat in Jamaica.

29. C.

bipuncta- 29. C. flaveſcens, elytris punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.*
ta. 1. *p.* 115. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 58.
Habitat in India, *nebuloſae magnitudine et facie, elytrorum punctis interdum tribus.*

bipuſtu- 30. C. viridis, elytris maculis duabus lateralibus ſanguineis.
lata. *Amoen. acad.* 6. *p.* 392. *n.* 8. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 91. *t.* 4. *f.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 54.
Habitat in Cayenna.

ſexpuſtu- 65. C. cayanea, elytris maculis tribus rubris. *Fabr. ſp. inſ.*
lata. 1. *p.* 114. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 55.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis.*

16puſtu- 66. C. nigra, thorace punctis duobus, elytris ſeptem rubris.
lata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 56.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

anguſtata. 31. C. flaveſcens, elytris poſterius anguſtatis.
Habitat in India.

bituber- 32. C. brunnea albo marginata, elytris nigro maculatis baſi
culata. unituberculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna, *tuberculatae affinis, at duplo minor.*

Taurus. 33. C. atra, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 380.
Habitat in Cayenna, *ſtatura bicornis, at paulo minor.*

retifor- 34. C. nigra thorace bimaculato, elytris flavis nigro-reticula-
mis. tis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *ſtatura tauri.*

palliata. 35. C. nigra, thorace villoſo vireſcente, elytris viridibus: margine lineaque media ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 370.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

cuprea. 36. C. ſupra cuprea, thoracis margine, elytriſque maculis duabus marginalibus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

rubigino- 37. C. ferruginea, thorace elytriſque fuſcis, punctatis: mar-
ſa. ginibus externis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 236.
Habitat in Europa.

nitens. 38. C. nigra, thorace elytrisque griseis aureo nitentibus, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p.* 13. *n.* 237.
Habitat . . .

superba. 39. C. nigro, elytris punctatis clypeoque viridi-aureis, antennis abdomine pedibusque viridibus. *Mus. Lesk. p.* 13. *n.* 238.
Habitat in Europa, *aureo nitore cum vita pereunte.*

sanguinolenta. 40. C. aureo-flava, elytrorum annulo ovali tuberculoque suturali sanguineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 11.
Habitat in Rio Janeiro, *subtus pallida, magnitudinis mediae.*

arcuata. 41. C. albida, disco communi nigro: limbo, annulo ovali arcuque posterius flavissimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 12.
Habitat in Rio Janeiro, *mediae magnitudinis, pectore et abdomine nigris.*

198. COCCINELLA.

Antennae clavatae: clava solida.
Palpi anteriores securiformes, posteriores filiformes.
Corpus hemisphaericum, thorace elytrisque marginatis, abdomine plano.

* *coleoptris rubris flavisve: punctis nigris maculatis.*

marginata. 1. C. coleoptris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.
Coccinella coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 1.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, nigra.*

immaculata. 155. C. coleoptris flavescentibus immaculatis, thoracis macula nigra: punctis duobus albis. *Mus. Lesk. p.* 11. *n.* 211.
Habitat in Suecia.

marginella. 6. C. coleoptris obſcure teſtaceis: margine flavo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 3.
Habitat in America, *magna.*

limbata. 50. C. atra, coleoptrorum diſco rubro: punctis duobus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 2.
Habitat Hamburgi, *mediae magnitudinis.*

ſurinamenſis. 2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace, capiteque nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 12.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

ſanguinea. 3. C. coleoptris ſanguineis immaculatis, thorace maculis nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 11.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali, parva, ſubtus atra.*

impunctata. 4. C. coleoptris rubris: puncto nullo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 6.
Habitat in Sueciae *hortis, minor.*

livida. 51. C. coleoptris rubris impunctatis, ſcutello nigro, thorace maculis quinque nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 1. *t.* 22. *f.* 1. a.
Habitat Berolini, *ſupra ex luteo pallide fuſceſcens, ſubtus fuſca.*

Colon. 52. C. coleoptris rubris: puncto nigro, ſcutello maculaque thoracis obſolete nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 2. *t.* 22. *f.* 1. b.
Habitat Berolini, *magnitudine et colore ad lividum accedens.*

fimbriata. 53. C. elytris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine poſteriori punctis quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - *magnitudine quinquepunctatae.*

minuta. 54. C. elytris rubris thoraceque immaculatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 11.
Habitat in India, *minima.*

dimidiata. 55. C. coleoptris ſanguineis apice atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 7.
Habitat in Coromandel, *magna.*

albida. 56. C. coleoptris flavis: margine albido; punctis utrinque duobus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 260. Coccinella margine punctata.
Habitat Halae Saxonum, *magna.*

Lineola. 57. C. elytris rubris: lineola baseos apicisque nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

unifasciata. 58. C. coleoptris rubris: fascia media atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 10.
Habitat Hamburgi, *punctis duobus capitis thoracisque margine albis varians.*

annulata. 5. C. coleoptris rubris: macula sublunari nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 11.
Habitat in Germania, *nigra, mediae magnitudinis.* D. Schreber.
Thorax *marginibus lateralibus pallidus;* elytra *sanguinea; fascia media nigra, alteraque posteriore, exterius cum priore connexa.*

trinotata. 59. C. elytris rubris hirtis: punctis tribus nigris, capite rubro. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 11. *f.* 11.
Habitat ad caput bonae spei, *congenerum minima.*

trilineata. 60. C. coleoptris flavis: lineis tribus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 12.
Habitat in America, *parva, atra.*

sexlineata. 61. C. coleoptris flavis: lineis sex punctisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 15.
Habitat in Sibiria, *magna, nigra.*

moscovica. 62. C. coleoptris flavis: lineis quatuor abbreviatis punctis sex atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 54. *n.* 13.
Habitat in Russia *magis australi, magna.*

abbreviata. 63. C. coleoptris rubris: fascia posteriore abbreviata punctisque duobus nigris, thorace atro: lineis duabus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 14.
Habitat in America *boreali, oblonga, atra.* Blagden.

bipunctata. 7. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. *Fn. fuec.* 471.*
Scop. ent. carn. 234. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 16.
Petiv. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 4.
Merian. inf. 69. *t.* 136.
Raj. inf. 86. *n.* 2.
Lift. loq. 383. *n.* 8.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 4.
Reaum. inf. 3. *t.* 31. *f.* 16.
Frifch inf. 9. *p.* 33. *t.* 16. *f.* 4.
Sulz. inf. hift. t. 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 9.
Stroem act. Nidrof. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Degeer inf. 5. *p.* 389. *n.* 2.
Habitat in Europae *hortis et filvis frequens, victitans aphidibus.*

tripunctata. 8. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus. *Fn. fuec.* 472.*
Fabr. mant. 1. *p.* 54. *n.* 17.
Habitat in Germania, *ftatura feptempunctatae.*

quadripunctata. 9. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuor. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 28.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis, fubtus nigra.*
Thorax *flavus: punctis quatuor nigris;* pedes *flavi.*

hebraea. 10. C. coleoptris luteis: maculis luteis fex longitudinalibus difformibus. *Fn. fuec.* 473.*
Habitat in Europa.

quadrinotata. 64. C. coleoptris rubris: punctis quatuor baſeos nigris, thoracis marginibus albidis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 29.
Habitat Kilonii.

quadrimaculata. 65. C. coleoptris rubris: punctis quatuor nigris, thorace atro: macula marginali alba. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 30.
Habitat Halae Saxonum, *nigra.*

quinquepunctata. 11. C. coleoptris ſanguineis: punctis nigris quinque. *Fn. fuec.* 474.* *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 31.
Degeer inf. 5. *p.* 370. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 8.
Merian. europ. t. 69.
Habitat in Europae *arboribus.*

quinque-maculata. 66. C. oblonga, coleoptris flaveſcentibus: punctis nigris quinque, thorace atro: margine anteriore triradiato albo.
Fabr. mant. 1. *p.* 56. *n.* 32.
Habitat Halae Saxonum.

ſexpunctata. 12. C. coleoptris fulvis: punctis nigris ſex. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 33.
Habitat in Europae *hortis, parva, atra, thoracis margine punctisque duobus albis.*

glacialis. 67. C. coleoptris rubris: punctis ſex nigris; intermediis majoribus ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 34.
Habitat in America *boreali.*

ſexmaculata. 68. C. coleoptris rubris: punctis ſex nigris: anterioribus quatuor transverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 35.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 262. Coccinella (undulata) coleoptris rufis: falciis binis interruptis undulatis nigris, poſtice puncto unico.
Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 7. *p.* 160. *t.* 43. *f.* 12.
Habitat in India, *mediae magnitudinis, pallide flaveſcens.*

ſexnotata. 69. C. elytris flavis: arcubus quatuor punctisque duobus nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 15. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat in Suecia, *thorace flavo punctis 5 nigris contiguis variis, bipunctatae magnitudine.*

trifaſciata. 13. C. coleoptris rubris, faſciis nigris tribus. *Fn. ſuec.* 475.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 26. *Raj. inſ. p.* 87. *n.* 9. Scarabaeus hemiſphaericus minor &c.
Habitat in Europae *hortis.*

bifaſciata. 70. C. coleoptris ferrugineis: faſciis duabus punctisque quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 27.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *f.* 24. Coccinella flexuoſa.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magna nigra, capite, thorace pedibusque ferrugineis.*

71. C.

Species diverſas conjunctas vidi, ut bipunctatam cum ſexpuſtulata; ſpecies maculis interdum variant, unde incautis plures numerantur, niſi rationem thoracis habeat.

inaequalis. 71. C. coleoptris flavis: punctis anterioribus tribus futura fasciaque apicis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 25.
Habitat in nova Hollandia.

cingulata. 72. C. coleoptris luteis: punctis quatuor baseos fascia posteriore punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 24.
Habitat Tranquebariae, *magna, nigra, capite, thorace pedibusque flavis.*

flexuosa. 73. C. ovata, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thoracis margine albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 23.
Habitat Hamburgi.

undata. 74. C. oblonga, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae spei, *magna, atra.*

arcuata. 75. C. ovata, coleoptris rubris: punctis quatuor, fasciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 21.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, nigra, capite albido.*

tricincta. 76. C. ovata, coleoptris rubris: fasciis tribus atris; anteriore abbreviata tricuspidata. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 20.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, nigra.*

rivularis. 77. C. coleoptris luteis: fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thorace atro-flavo-bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 19.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.*

hieroglyphica. 14. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Fn. suec.* 476.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 18.
Degeer inf. 4. *p.* 382. *n.* 15. Coccinella coleoptris flavo-rubris &c.
Sulzer hist. inf. t. 3. *f.* 4.
Habitat in Europae *hortis, affinis decempustulatae.*

septempunctata. 15. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Fn. suec.* 477.* *Scop. ent. carn.* 235. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 321. *t.* 6. *f.* 1. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 36.
Frisch

Frisch inf. 4. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Petiv. gaz. 33. *t.* 21. *f.* 3.
Goed. inf 2. *p.* 58. *t.* 18.
Raj. inf. 86. *n.* 1.
Merian. europ. 24. *f.* 11.
Albin. inf. 61. *f.* C.
Roes. inf. 2. *scar.* 3. *p.* 7. *t.* 2.
Reaum. inf. 3. *t.* 31. *f.* 18.
Bradl. nat. t. 27. *f.* 4.
List. sc. angl. 382. *n.* 7.
Ammir. inf. t. 14.
Sulz. inf. t. 3. *f.* 13.
Hollar t. 4. *f.* 8.
Degeer inf. 5. *p.* 370. *n.* 4. *t.* 10. *f.* 14.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 7.
Habitat in Europae *plantis frequens.*
Elytrorum *puncta in triangulum posita.*

septem-maculata. 78. C. oblonga, coleoptris rubris: punctis nigris septem; communi trilobo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 37.
Habitat in Germania.
Thorax *ater*, *margine albus.*

octopunctata. 79. C. coleoptris rubris: punctis nigris octo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 38.
Habitat in Germania, *an varietas sexpunctatae?*

transversalis. 80. C. coleoptris luteis: maculis octo nigris; anterioribus quatuor transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *mediae magnitudinis*, *nigra.*

octomaculata. 81. C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anterioribus sex transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 40.
Habitat - - - *magna*, *nigra*, *capite et thorace luteis.*

novemmaculata. 82. C. coleoptris rubris: punctis novem nigris; posteriori communi, thorace bipunctato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 41.
Fabr. syst. ent. p. 81. *n.* 15. Coccinella novempunctata.
Habitat in nova Hollandia.

16. C.

Coccinellarum *larvae aphides consumunt*, *eoque plantas a pbthiriasi hae purgant.*

novem-punctata. 16. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. *Fn. fuec.* 478.* *Scop. ent. carn.* 236. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 42.

Uddm. diff. 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.

Fabr. fyft. ent. p. 81. *n.* 16. Coccinella decempunctata.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 322. *n.* 4.

Degeer inf. 5. *p.* 373. *n.* 6.

β) Coccinella coleoptris rufescentibus: punctis 1. 2. 1. cum puncto communi ad scutellum, thorace albido: macula scutiformi nigra: punctis duobus albis, capite posterius falcia nigra. *Muf. Lesk. p.* 10. *n.* 193.

Habitat in Europae *hortis et juniperetis.*

decem-punctata. 17. C. coleoptris fulvis; punctis nigris decem. *Fn. fuec.* 479.* *Scop. ent. carn.* 237. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 43.

Degeer inf. 5. *p.* 374. *n.* 7.

β) Coccinella coleoptris flavo rufescentibus: punctis 1. 3. 1. thorace maculis 4 punctisque interpositis 3 nigris. *Muf. Lesk. p.* 11. *n.* 195.

Habitat in Europae *plantis.* Thorax *maculis quatuor.*

decem-maculata. 83. C. oblonga, elytris fulvis: punctis nigris decem; duobus communibus. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 44.

Habitat in America *boreali, atra, ftatura tredecimpunctatae.*

dilatata. 84. C. fubrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis nigris decem, thorace bipunctato. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 45.

Habitat in America.

11punctata. 18. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim. *Fn. fuec.* 480.* *Ström act. nidr.* 3. *p.* 388. *t.* 6. *f.* 2. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 325. *n.* 9. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 46.

Merian. europ. 168.

Degeer inf. 5. *p.* 375. *n.* 8.

β) C. thorace albo: punctis quinque feptemve nigris, coleoptris rubicundis; punctis 11, aliis 6, aliis 4 nigris. *Muf. Lesk. p.* 10. *n.* 181.

γ) C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim 1. 3. 1. una cum communi ad scutellum, thorace flavescente: guttis 5 nigris et utrinque punctulo nigro. *Mus. Lesk. p.* 11. *n.* 194.
Habitat in Europa *boreali.*

11macu-lata. 85. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 47. *Schaeff. ic. t.* 254. *f.* 3. a. 3. b?
Habitat in Hispania, *11punctata duplo major.*

11puncta-ta. 19. C. coleoptris flavis: punctis nigris sex; extimo lineari repando. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 48.
Herbst apud Fuesslii Arch. Inf. 4. *p.* 45. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 8. h?
Habitat in Europa, *minuta, flava, subtus nigra.*

variegata. 86. C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim fasciaque media nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 49.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis, flava.*

chryso-melina. 87. C. coleoptris rufis: punctis nigris duodecim, thorace immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 50.
Thunb. nov. sp. inf. 1. *p.* 16. *f.* 21.
Habitat in cacto opuntia Africae, *et in* Calabria, *ovata, gibba, oculatae magnitudine.*

borealis. 88. C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim; duobus communibus, ultimis orbiculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 51.
Thunb. nov. inf. spec. 1. *p.* 15. *f.* 20. Coccinella elytris rufis: punctis duodecim nigris, thorace quadripunctato.
Habitat ad caput bonae spei, *gibba, subtus lutea, ocellatae magnitudine.*

cassidea. 89. C. oblonga rubra, coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 52.
Habitat in America *boreali.*

13macu-lata. 90. C. coleoptris flavis: punctis nigris tredecim, corpore orbiculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 53.

Forster

Forſter nov. inſ. ſp. cent. 1. *p.* 18. *n.* 18. Coccinella coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, thorace albo nigro-punctato.

Habitat in Europa *boreali.*

13notata. 91. C. elytris flavis; punctis nigris tredecim thorace luteo: punctis ſeptem nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 10. *n.* 16. *t.* 1. *f.* 4.

Habitat in Europa, *bipunctatae magnitudine, flava, antennis rubris.*

13puncta- ta. 20. C. coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, corpore oblongo. *Fn. ſuec.* 481. *Scop. ent. carn.* 238. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 323. *n.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 54.

Degeer inſ. 5. *p.* 375. *n.* 9.

Reaumur inſ. 3. *t.* 31. *f.* 79.

Schaeff. ic. t. 48. *f.* 6.

β) Coccinella oblonga. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 43. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 4. d.

Habitat in Europa *frequens.*

urſicolor. 92. C. coleoptris flavis: punctis quatuordecim nigris; duobus communibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 55.

Habitat in Sina, *orbiculata, gigantea, flava, olivacea aut nigra.*

14puncta- ta. 21. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim; quibusdam contiguis. *Fn. ſuec.* 482. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 56.

Scop. ent. carn. 243. Coccinella teſſulata.

Schaeff. ic. t. 62. *f.* 6.

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. *t.* 22. *f.* 5. c.

Habitat in Europae *hortis, frequens.*

14macu- lata. 93. C. coleoptris luteis: ſutura punctisque quatuordecim nigris diſtinctis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 57.

Habitat Halae Saxonum, *14punctata major, thorace nigropunctato et capite albis.*

16puncta- ta. 22. C. coleoptris flavis: punctis nigris ſedecim. *Fn. ſuec.* 483.* *Scop. ent. carn.* 240. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 59. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 44. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 6. f.

Habitat

Habitat in Italia, *et* Germania *major*, *oblonga*, *albida*, *capite quadripunctato.*

16maculata. 94. C. coleoptris rubris: punctis nigris sedecim, capite immaculato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 60.

Habitat Halae Saxonum, *majuscula*, *oblonga.*

oculata. 95. C. elytris rubris: punctis novem nigris, circulo flavo circum oculos. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 14. *f.* 18.

Habitat ad caput bonae spei, *atra*, *magnitudine septempunctatae.*

ocellata. 23. C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim subocellatis. *Fn. suec.* 484.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 58.

Gadd sat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis quindecim nigris ocello flavo cinctis.

Degeer inf. 5. *p.* 376. *n.* 10. *t.* 11. *f.* 1.

Merian. inf. eur. 48. *f.* 5.

Sulz. inf. t. 13. *f.* 14.

Schaeff. ic. t. 1. *f.* 2.

elem. t. 47. *f.* 1.

Habitat in Europae *hortis*, *congeneribus plurimis major.*

18punctata. 24. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo arcuato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 61. *Mus. Lesk. p.* 10. *n.* 184.

Coccinella gemella. *Herbst apud Fuesslli Arch. Inf.* 4. *p.* 44. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 7. g.

Habitat in Europa *boreali*, *thoracis lateribus flavis.*

19punctata. 25. C. coleoptris flavis: punctis nigris novendecim. *Fn. suec.* 485. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 325. *n.* 10. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 62.

Müll. prodr. zool. dan. p. 67. *n.* 632. Coccinella lutea &c.

Herbst apud Fuesslli Arch. Inf. 4. *p.* 45. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 9. I.

Habitat in Europae *plantis.*

20punctata. 96. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 329. *n.* 17. *Scop. ent. carn.* 242. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 63.

Herbst apud Fuesslli Arch. Inf. 4. *par. t.* 22. *f.* 10. k.

Habitat rarior in Europa.

22puncta- 26. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus. *Fn. ſuec.* 486. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 64.
Degeer inſ. 5. *p.* 379. *n.* 12.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10.
Habitat in Europae *hortis, parva.*

23puncta- 27. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti tribus diſtinctis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 101. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 65.
Habitat in Europae *plantis, parva, rubra, ſubtus rufa.*

24puncta- 28. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. *Fn.*
ſuec. 487. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 66. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 45. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 11. I.
Degeer inſ. 5. *p.* 381. *n.* 14. Coccinella coleoptris rufo-fuſcis &c.
Habitat in Europae *hortis.*

25puncta- 29. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque. *Fn.*
ſuec. 488.
Habitat in Europa.
Puncta *quadrata, paſſim ovalita.*

28puncta- 97. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti octo. *Fabr.*
ſp. inſ. 1. *p.* 101. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 67.
Habitat Tranquebariae.

conglo- 30. C. coleoptris rubris: punctis nigris plurimis ſubcontiguis.
bata. *Fn. ſuec.* 489.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 326. *n.* 12.
Degeer inſ. 5. *p.* 378. *n.* 11. Coccinella roſea.
Friſch inſ. 9. *p.* 34. *t.* 17. *f.* 6.
Habitat in Europa, *an mera conglomeratae varietas?*

conglo- 31. C. coleoptris flaveſcentibus: punctis nigris plurimis con-
merata. tiguis. *Fn. ſuec.* 490.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 68.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 316. *n.* 12.
Degeer inſ. 5. *p.* 383. *n.* 17.
Raj. inſ. p. 87. *t.* 5.
Liſt. loq. p. 383. *n.* 9.
Friſch inſ. 9. 34. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Schaeff. ic. t. 171. *f.* 1. a. b.

Herbſt

Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ. 4. t. 22. f. 14. 15?
Habitat in Europae *hortis frequens.*

tricolor. 98. C. coleoptris flavis: punctis decem rubris, maculisque decem atris marginalibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 69.
Habitat in inſula Amſterdam *maris auſtralis.*

detrita. 99. C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 102. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

japonica. 100. C. elytris flavis, cruce ſuturae duplici maculisque quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 12. *f.* 12.
Habitat in Japonia, *magnitudine hieroglyphicae.*

grandis. 101. C. elytris flavis: punctis nigris tredecim thorace nigro: marginibus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 12. *f.* 13.
Habitat in Sina, *coccinellarum maxima.*

gibba. 102. C. elytris rubris, faſcia punctisque ſex nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *tenuiſſime hirta, rubra, pectore nigro, magnitudine ſeptempunctatae.*

capenſis. 103. C. elytris rubris: punctis octo nigris, thorace immaculato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *rubra, magnitudine ſeptempunctatae.*

Pſi. 104. C. elytris flavis: margine exteriore maculis quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine fere ſeptempunctatae, flavicans, pectore nigro.*

iridea. 105. C. elytris rubris: punctis novem nigris ocellaribus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 14. *f.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glabra, rubra, magnitudine fere ſeptempunctatae.*

ſimilis. 106. C. elytris rubris: faſciis duabus punctisque quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 15. *f.* 19.
Habitat - - magnitudine ſeptempunctatae, ſupra pilis breviſſimis cinereis hirta, ſubtus nigra.

puſilla. 107. C. elytris flavis: punctis octo nigris quadrifariis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 16. *f.* 22.
Habitat - - - flaveſcens, glabra, pulice vix major.

108. C.

distincta. 108. C. elytris rubris: punctis sedecim nigris distinctis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 17. *f.* 23.

Habitat ad caput bonae spei, *nigra, supra pilis minimis cinereis adspersa, quinquepunctatae magnitudine.*

repanda. 109. C. elytris flavis: fasciis tribus undatis nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 18. *f.* 25.

Habitat ad caput bonae spei, *glabra, nigra, septempunctatae magnitudine.*

flavicollis. 110. C. elytris sanguineis: punctis decem nigris, thorace flavo. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 18. *f.* 26.

Habitat ad caput bonae spei, *flavicans, pilis tenuissimis hirta, septempunctatae magnitudine.*

undulata. 111. C. elytris rubris: fasciis undatis dentatisque variis nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 18. *f.* 27.

Habitat ad caput bonae spei, *septempustulatae magnitudine, supra pilis brevissimis cinereis hirsuta flavescens, subtus nigra.*

lunaris. 112. C. elytris flavis: fasciis duabus, arcu punctisque quinque nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 19. *f.* 28.

Habitat ad caput bonae spei, *septempunctatae fere magnitudine, glabra, nigra.*

Crux. 113. C. elytris flavis: lineis duabus cruceque nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 20. *f.* 29.

Habitat ad caput bonae spei, *subtus nigra.*

Comma. 114. C. elytris flavis: sutura, margine lineaque nigris. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. *p.* 20. *f.* 30.

Habitat ad caput bonae spei, *quinquepunctatae magnitudine, supra flava.*

lineata. 115. C. elytris rubris: margine omni maculisque duabus oblongis nigris. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. *p.* 21. *f.* 31.

Habitat ad caput bonae spei, *glabra, quinquepunctatae magnitudine, flava, abdomine femoribusque nigris.*

octoguttata. 116. C. elytris rubris: maculis octo flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 24. *f.* 37.

Habitat in Japonia, *ocellata paulo major, glabra, rubra.*

117. C.

variabilis. 117. C. elytris rubris: maculis undecim nigris, thoracis quatuor cordatis. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 3. c.
Habitat Berolini, *bipunctata paulo major, magis oblonga, macularum punctorumque numero varians.*

centumpunctata. 118. C. elytris fulvis: punctis nigris plurimis; multis confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 45. *n.* 17. *t.* 22. *f.* 13.
Habitat in India, *ſeptem lineas longa.*

quadrilineata. 119. C. elytris flavis: lineis tribus longitudinalibus transverſaque maculisque duabus confluentibus nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 46. *n.* 18. *t.* 22. *f.* 12. m.
Habitat - - - oblonga, nigra.

ſparſa. 120. C. elytris ſpadiceis: punctis viginti quatuor nigris. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 160. *n.* 37. *t.* 43. *f.* 11.
Habitat in India, *ſeptempunctatae magnitudine, pilis albicantibus hirſuta, ſpadicea.*

Punctum. 121. C. elytris fulvis immaculatis, thoracis macula media angulosa nigra. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 161. *n.* 40. *t.* 43. *f.* 14. g. h.
Habitat - - - 1½ lineas longa, capite nigro, thorace fulvo.

** *coleoptris rubris flavisve, albo-maculatis.*

bimaculoſa. 122. C. elytris fulvis: lituris duabus obſoletis albis ſemilunaribus. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 7. *p.* 160. *n.* 39. *t.* 43. *f.* 13. e. f.

punctatoguttata. 32. C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, nigris tribus. *Fn. ſuec.* 491.*
Habitat in Europa, *an ſolo ſexu a decempuſtulata diſtincta?*

biguttata. 123. C. coleoptris rufis: punctis duobus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 72.
Habitat - - - parva, thorace glabro atro, margine laterali flavo.

camtſchatcenſis. 124. C. coleoptris obſcure rufis: punctis octo albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 71.
Habitat in Camtſchatca, *mediae magnitudinis, atra.*

10gutta-ta. 33. C. coleoptris luteis: punctis albis decem. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 73. *Herbſt apud Fueſſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 20. *t.* 22. *f.* 16. p. g.

β) Coccinella 10guttata minor, coleoptris rubris, puncto anteriori marginali lunato. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 263.

Habitat in Sueciae *hortis*, *minor*. Fabricius.

12gutta-ta. 125. C. coleoptris ex luteo fuſcis: punctis albis 12. *Herbſt apud Fueſſli Arch. inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 26. *t.* 22. *f.* 10. v.

β) *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 61. *n.* 111.

γ) C. coleoptris flavo rufeſcentibus: guttis ſex albis 1. 2. 2. 1. *Muſ. Leſk. p.* 11. *n.* 210.

Habitat - - -

biſeptemgutta-ta. 126. C. coleoptris luteis: punctis quatuordecim albis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 265.

Habitat - - - *citrea*, 16*guttatae ſtatura et magnitudine.*

14gutta-ta. 34. C. coleoptris rufis: punctis quatuordecim albis. *Fn. ſuec.* 492.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 327. *n.* 13. *Scop. ent. carn.* 248. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 74.

Raj. inſ. p. 86. *n.* 3.

Liſt. loq. 383. *n.* 10.

Degeer inſ. 5. *p.* 385. *n.* 20.

Schaeff. ic. t. 9. *f.* 11.

Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 21. *t.* 22. *f.* 17. r.

Habitat in Europae *ſalicibus*, *ex teſtaceo lutea*, *capite nigro.*

cayen-nenſis. 156. C. coleoptris fulvis: punctis duodecim lunulisque utrinque duabus connatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.

Habitat in Cayenna, *rufa*, *mediae magnitudinis.*

15gutta-ta. 127. C. coleoptris luteis: punctis quindecim albis; communi medio obſoleto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 75.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 327. *n.* 14.

Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 22. *t.* 22. *f.* 18. f.

Habitat in Europa *magis auſtrali.*

16gutta-ta. 35. C. coleoptris luteis: punctis albis ſedecim. *Fn. ſuec.* 493. *Scop. ent. carn.* 249. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 76.

Degeer inſ. 5. *p.* 385. *n.* 21.

Sulz. hist. inf. t. 3. f. 5.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 7. p. 161. n. 42. t. 43. f. 16. l. m.
Habitat in Europa.

18gutta- 36. C. coleoptris rubris: punctis albis octodecim. *Fn. suec.* 494. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 55. mant. inf. 1. p. 60. n. 77. Scop. ent. carn. 241.*
Schaeff. ic. t. 9. f. 12.
β) Coccinella ornata. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4 p. 47. n. 23. t. 22. f. 19. t.*

20gutta- 37. C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. *Fn. suec.* 495. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. n. 78. Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4. p. 47. n. 24. t. 22. f. 20. u.*

oblongo- 38. C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis. *Fn. suec.* 496. guttata. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103. n. 56. mant. inf. 1. p. 60. n. 79. Scop. ent. carn. 242.*
Degeer inf. 5. p. 384. n. 19.
Schaeff. ic. t. 9. f. 10.
Bergstr. nomencl. 1. t. 9. f. 6.
Sulz. hist. inf. t. 3. f. 14.
Habitat rarior in Europae *hortis.*

oblitera- 39. C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis; anterioribus ta. obsoletis. *Fn. suec.* 497.*
Habitat in Europa.

pallida. 128. C. elytris flavis: lineis quatuor fuscis. *Thunb. nov. act. Upf. 4. p. 9. n. 14. t. 1. f. 1.*
Habitat Upsaliae, *flava, bipunctatae magnitudine.*

*** *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

impustu- 40. C. coleoptris nigris: puncto nullo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 103.* lata. *n. 58. mant. inf. 1. p. 60. n. 80.*
Habitat in Germaniae *nemoribus, statura quadripustulatae, tota atra, thoracis lateribus flavis: puncto nigro.*

analis. 129. C. coleoptris atris apice rubris immaculatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 60. n. 81.*
Habitat Halae Saxonum, *haemorrhoidali affinis, at duplo minor.*

haemor- 130. C. coleoptris atris apice rubris: fascia nigra. *Fabr. sp.* rhoidalis. *inf. 1. p. 104. n. 59. mant. inf. 1. p. 60. n. 82.*

Habitat

Habitat Hamburgi, *frequenter puncto sanguineo communi in dorso notata.*

flavipes. 131. C. elytris nigris, thorace nigro: maculis duabus flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 21.

Habitat ad caput bonae spei, *bipustulatae magnitudine, impustulatae affinis, at punctum nigrum nullum ad latera thoracis.*

Cacti. 41. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris.† *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 83.

Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda utrinque.

Merian. surin. p. 2. *t.* 2. *f.* summa.

Pet. gaz. t. 1. *f.* 5.

Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 31-33. *et t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Americae *cactis, saepius inter coccos cacti lecta, bipustulatae similis.*

bipustulata. 42. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. *Fn. suec.* 498.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 61. *mant.* 1. *p.* 60. *n.* 84. *Laichart. inf. tir.* 1. *p.* 134.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 334. *n.* 26.

Degeer inf. 5. *p.* 387. *n.* 27. *t.* 10. *f.* 25.

Frisch inf. 9. *p.* 34. *t.* 16. *f.* 6.

Roes. inf. 2. *scar.* 3. *p.* 10. *t.* 3.

β) *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 48. *n.* 27. *t.* 22. *f.* 22. w.

Habitat in Europae *hortis frequens, etiam in* America *septentrionali.*

Elytrorum *singula puncta e tribus conflata.*

mutabilis. 132. C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus, corpore oblongo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 85.

Habitat Hamburgi.

Elytra *junioribus lutescentia; puncto flavescente.*

frontalis. 133. C. coleoptris nigris: punctis duobus rubris, fronte pedibusque anterioribus rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 86.

Habitat Halae Saxonum; *capite interdum nigro, punctisque elytrorum quatuor.*

tripuſtulata. 157. C. coleoptris nigris: baſi macula magna lutea, medio puſtulis duabus apiceque unica rubra. *Lesk. muſ. p.* 12. *n.* 215.
Habitat in Europa.

lunulata. 158. C. coleoptris nigris margine reflexis: puncto medio baſeosque lunula media rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 317.
Habitat - - -

limbata. 159. C. coleoptris nigris: lunula ad marginem baſeos exteriorem rubra thorace nigro: margine albo. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 219.

leucocephala. 160. C. nigra, thorace anterius, capite, punctisque elytrorum ſeptem albis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 223.
Habitat - - - *macula capitis trigona nigra, punctis elytrorum tribus ad marginem externum poſitis margine connexis.*

nigra. 161. C. nigra, elytris ſingulis poſterius gutta rubra notatis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 224.

ruficauda. 162. C. rubra, elytris nigris apice rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 225.
Habitat in Europa.

bifaſciata. 163. C. nigra, thoracis margine externo elytrisque flavis: faſcia media longitudinali et communi futurae nigrae. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 226.
Habitat in America.

quadripuſtulata. 43. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn. ſuec.* 449.* *Scop. ent. carn.* 244. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 87.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 333. *n.* 25.
Degeer inſ. 5. *p.* 389. *n.* 24.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 16. 17.
Habitat in Europae *hortis, aliquando cum bipunctata copula conjuncta.*

erythrocephala. 134. C. coleoptris atris: punctis rubris ſex, capite thoracisque margine pallide rufeſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 88. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 220.
Habitat Kilonii, *ſexpuſtulata minor, capite et abdomine rubris.*

44. C.

sexpustulata. 44. C. coleoptris nigris: punctis rubris sex. *Fn. suec.* 500.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 331. *n.* 20. *Scop. ent. carn.* 245. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 89. *Degeer inf.* 5. *p.* 390. *n.* 25. *Raj. inf. p.* 87. *n.* 4. *Schaeff. ic. t.* 30. *f.* 12. β) *Sulz. hist. inf. t.* 3. *f.* 6. *Bergstr. nomencl.* 1. *t.* 9. *f.* 4. *Habitat in* Europae *hortis, rarius varians puncto adhuc minutissimo ad suturam rubro.*

lunata. 135. C. coleoptris nigris: maculis decem rubris, sex lunatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 90. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 22. *f.* 33. Coccinella rivosa. *Habitat in insula* S. Helenae *et ad* caput bonae spei, *gibba, glabra, ocellatae magnitudine.*

hirta. 136. C. elytris nigris: maculis duodecim rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 23. *f.* 35. *Habitat ad* caput bonae spei, *ocellatae magnitudine, atra, pilis cinereis hirta.*

Reppensis. 137. C. oblonga elytris nigris: maculis fulvis orbicularibus duabus. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 48. *n.* 28. *t.* 22. *f.* 23. x. *Habitat in* Marchia, *nigra.*

campestris. 138. C. subrotunda, elytris nigris: maculis duabus orbicularibus fulvis, pedibus anterioribus fulvis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 48. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 24. y. *Habitat in* Marchia.

fasciata. 139. C. elytris nigris: fascia transversa maculis quatuor fulvis conflata. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 49. *n.* 30. *t.* 22. *f.* 25. z. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 334. *n.* 26. *Habitat in* Gallia *et* Germania.

decempustulata 45. C. coleoptris nigris: punctis fulvis decem. *Fn. suec.* 501.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 66. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 91. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 330. *n.* 19. *Degeer inf.* 5. *p.* 391. *n.* 26. *Schaeff. ic. t.* 30. *f.* 10. *et t.* 171. *f.* 2. *List. loq.* 383. *n.* 9.

Frisch inf. 9. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Raj. inf. 87. *n.* 15.
Habitat in Europae *hortis, varians elytrorum punctis flavis et rubris.*

russica. 140. C. elytris nigris: punctis duodecim fulvis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 49. *t.* 22. *f.* 26.
Habitat in Russia, *septempunctatae magnitudine.*

16pustulata. 47. C. coleoptris nigris: punctis fulvis sedecim. *Fn. suec.* 503.
Habitat in Europa.

20pustulata. 141. C. elytris nigris: punctis fulvis viginti. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 24. *f.* 36.
Habitat ad caput bonae spei, *septempunctatae magnitudine, gibba, nigra, tenuissime hirta.*

guttatopustulata. 142. C. coleoptris nigris: punctis duobus flavis quatuorque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 69. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 94.
Habitat in nova Hollandia.

**** *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

atra. 143. C. elytris nigris: maculis duabus flavis, thoracis marginibus anoque flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 21.
Habitat - - - bipustulata minor, valde gibba, glaberrima.

laevis. 144. C. elytris nigris: punctis sex flavis, thoracis angulis anterioribus flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 22. *f.* 32.
Habitat - - - glabra, nigra, capite pedibusque flavis, bipustulatae magnitudine.

dentata. 145. C. elytris nigris: margine exteriore linea tridentata punctisque sex flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 23. *f.* 34.
Habitat ad caput bonae spei, 14*punctatae magnitudine, nigra, capite, thoracis et abdominis margine pedibusque flavis.*

pantherina. 48. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo. *Fn. suec.* 504. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 71. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 96. *Degeer inf.* 5. *p.* 392. *n.* 28.
Habitat in Europa *boreali.*

146. C.

humeralis. 146. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo: anterioribus duobus uncinatis. *Schaller. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 266.
Habitat Halae Saxonum, *flavicans, ad* 14*pustulatam accedens.*

14pustulata. 46. C. coleoptris nigris: punctis flavis quatuordecim. *Fn. suec.* 502.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 330. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 246. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 68. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 93.
Uddm. diss. 15. Coccinella coleoptris nigris: maculis decem pallide flavis.
Pod. inf. 26. Coccinella 14maculata.
Degeer inf. 5. *p.* 391. *n.* 27.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10.
Habitat in Europae *floribus.*

tigrina. 49. C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti. *Fn. suec.* 505.* *Uddm. diss.* 11. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 100.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4. *p.* 49. *n.* 36. *t.* 22. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali, an varietas* 20*guttatae?*

felina. 147. C. coleoptris atris: punctis sex albis, corpore globoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 70. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

pardelina. 148. C. coleoptris nigris: punctis decem margineque sinuato albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 97.
Habitat - - - *magna, atra.*

ursina. 149. C. coleoptris atris: punctis decem albis, capite thoracisque margine anteriore albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 98.
Habitat in America *boreali, parva, nitida, atra, capite pedibusque albis.*

12pustulata. 150. C. coleoptris nigris: punctis duodecim albis; exterioribus margine connexis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 67. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 92.
Habitat Hamburgi.

leonina. 151. C. coleoptris nigris: punctis albis sedecim. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

canina. 152. C. coleoptris nigris: punctis albis viginti, capite thoraceque villosis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 62. *n.* 101.
Habitat ad caput bonae spei, *magna, nigra.*

Thunbergii. 153. C. elytris nigris: margine punctisque duobus albis, capite nigro: punctis albis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 10. *n.* 17.
Habitat Upsaliae, *bipustulatae magnitudine, nigra.*

villosa. 154. C. villosa nigra, elytrorum marginibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *magna.*

ALURNUS. *Antennae* filiformes. *Palpi* sex breviſſimi. *Maxilla* cornea, fornicata.

grossus. 1. A. ater, thorace coccineo, elytris flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 115. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 1.
Habitat in America *australi et* India.

femoratus. 2. A. viridi-aeneus, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 115. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 2. *Drury inf.* 2. *t.* 34. *f.* 5. Tenebrio femoratus. *Sulz. hist. inf. t.* 7. *f.* 8. Tenebrio viridis.
Habitat in India, *magnus, laevis, nitidus, antennis corpore dimidio brevioribus: articulis ultimis nigris.*

dentipes. 3. A. niger, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae spei, *laevis, immaculatus, femorato affinis.*

199. CHRYSOMELA. *Antennae* moniliformes.
Palpi sex extrorsum crassiores.
Thorax, nec elytra, marginatus.
Corpus (plerisque) ovatum.

* *femoribus posterioribus aequalibus.*

tenebrioides. 1. Chr. aptera atra, antennis pedibusque violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 1. *Herbst apud Fuesslı arch. inf.* 4. *t.* 23. *f.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio (laevigatus) apterus niger laevis, elytris laevibus, thorace lunato, subtus caeruleus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 265. *n.* 19. Chrysomela atro-purpurea &c.
Habitat in Europa *magis australi.*
Larva *gibba, violacea, ano rufo, polyphaga, plantis vilitat.*

Morio. 2. Chr. atra, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 2.
Habitat in terra van Diemen, *tenebrioide paulo minor.*

goettingensis. 4. Chr. atra, pedibus violaceis. *Fn. suec.* 506.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 3.
Degeer inf. 5. *p.* 298. *n.* 8. Chrysomela violaceo-nigra &c.
Laichart. inf. tyr. 1. *p.* 143. *n.* 2. Chrysomela coriaria.
Habitat in Europa.

vittata. 3. Chr. cyanea, elytris margine vittaque media flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 4.
Habitat in America, *magna, crassa.*

bicolor. 72. Chr. viridi-aenea, subtus violacea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 63. *n.* 5.
Forsk. Fn. ar. p. 77. *n.* 2. Chrysomela viridi-aenea.
Habitat Alexandriae.
Elytra *punctato-striata.*

affinis. 73. Chr. obſcure aenea, ſubtus violacea, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 6.
Habitat ſub lapidibus Barbariae, *bicolori affinis, at duplo minor.*

luſitanica. 74. Chr. thorace cupreo, elytris aeneis: punctis impreſſis caeruleſcentibus, ſubtus violacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 7.
Habitat in Luſitania, *major Chr. Bankſii.*

ferruginea. 75. Chr. ferruginea, ſubtus nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 8.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

Bankſii. 76. Chr. ſupra aenea, ſubtus teſtacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 7. *mant. inſ. p.* 67. *n.* 9.
Habitat in Luſitania *et* Calabria.

Sophiae. 77. Chr. caerulea, tibiis plantisque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 86.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 272. Chryſomela ovata viridis, elytris poſtice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.
Habitat Halae Saxonum *in Siſymbrio Sophia, laevis, glabra, ſtatura et magnitudine chr. ermoraciae.*

pallipes. 78. Chr. nigra, elytris pedibusque palleſcentibus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 215.
Habitat Kilonii, *parva.*

bimaculata. 79. Chr. oblonga atra, elytris teſtaceis: macula atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 87.
Habitat in America.

faſciata. 80. Chr. oblonga atra, elytris faſciis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 88.
Habitat in America.

ruficollis. 81. Chr. oblonga viridi-aenea, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 89. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 61. *t.* 45. *f.* 3. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 263. *n.* 16. Chryſomela nigra &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, etiam* Germania.

82. Chr.

Chryſomelarum *et* cryptocephalorum *larvae conſument folia, relictis eorum vaſis, pulpa contentae.*

flavicornis. 82. Chr. oblonga punctata viridi-aenea, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 90.
Habitat in Cayenna, *minor.*

crenata. 83. Chr. oblonga subtus aenea, supra cuprea, antennis flavis: articulo quinto et ultimo fuscis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 91.
Habitat in Cayenna, *flavicorni major.*

littoralis. 84. Chr. oblonga atra, elytris porcatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 74. *n.* 92.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 252. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Galleraca atro fusca, lineis tribus elevatis punctis numerosis.
Habitat ad Europae *australis littora*, *statura chr. tanaceti, at major.*

cayennensis. 85. Chr. oblonga atra, capite, thorace, femoribusque quatuor anterioribus obscure rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 93.
Habitat in Cayenna, *statura chr. tanaceti, at paulo major.*

tanaceti. 5. Chr. atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Fn. suec.* 507. *It. gotl.* 270.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 128. *n.* 70. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 94.
Degeer inf. 5. *p.* 299. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 27. Chrysomela oblonga nigra punctata, elytris coriaceis.
Merian. inf. eur. t. 68.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 14.
Habitat in Europae *tanaceto*, *rarius tota obscure grisea.*

rustica. 86. Chr. oblonga nigra, thorace elytrisque griseis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 95.
Schaller Abh. hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 274. Chrysomela ovata nigra, elytris griseis: striis quinque eminentibus.
Habitat in Europae *fruticibus*, *affinis chr. tanaceti.*

12punctata. 87. Chr. oblonga, thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 71. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 96.
Habitat - - -

haemorrhoidalis. 6. Chr. nigra nitida, antennis basi flavescentibus, ano supra rubro. *Fn. suec.* 508.* *Scop. ent. carn.* 225. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 78.
Degeer inf. 5. *p.* 287. *n.* 6.
Habitat in betula *et* alno, *elytris striato-punctatis.*

88. Chr.

fucata. 88. Chr. atra, thorace elytrisque viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 79.
Habitat in Italia, *ſtatura et magnitudine haemorrhoidalis.*

fuſcicornis. 89. Chr. viridi-aenea, antennis tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 62. *mant. inſ. p.* 73. *n.* 80.
Habitat in Ruſſia, *magnitudine et ſtatura haemorrhoidalis.*

graminis. 7. Chr. viridi-caerulea nitida, antennis pedibusque concoloribus. *Fn. ſuec.* 509. *Scop. ent. carn.* 220. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 260. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 304. *n.* 16.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.
Habitat in Europae *plantis*, *praeſertim gramine.*

cuprea. 90. Chr. capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 22.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 15.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 144. *n.* 3. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 26. *t.* 23. *f.* 14. Chryſomela metallica?
Habitat in Germania.

aſiatica. 91. Chr. viridi-aenea nitidiſſima elytris cyaneis. *Pall. it.* 1. *p.* 463. *n.* 10. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 20.
Habitat in Sibiria, *ſurinamenſi major.*

glaberrima. 92. Chr. cyanea glaberrima, antennis plantisque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 16. Chryſomela americana.
Habitat Surinami, *rarior in* Europa *boreali*, *aliquando tota aenea.*

ignita. 93. Chr. cyanea nitida, elytris aeneis, antennis plantisque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *maxima.*

aenea. 8. Chr. viridis nitida, abdomine poſterius ferrugineo. *Fn. ſuec.* 510.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 420. Chryſomela viridis nitida, thorace antice excavato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 130. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 106. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 261. *n.* 12.
Degeer inf. 5. *p.* 305. *n.* 18. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in betula alno, *etiam in* Calabria.

dresdensis. 95. Chr. oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris nigro-aeneis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 105.
Habitat Dresdae, *statura et magnitudine vitellinae.*

alni. 9. Chr. violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. *Fn. suec.* 511.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 97.
Degeer inf. 5. *p.* 314. *n.* 21. *t.* 9. *f.* 18.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 332. *n.* 1.
Frisch inf. 7. 13. *t.* 8.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 13.
Schaeff. elem. t. 53. *f.* 1. 2.
Habitat in betula alno.

absinthii. 97. Chr. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis tribus nigris. *Pall. it.* 2. *p.* 725. *n.* 70. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 98.
Habitat in Sibiria, *magnitudine Chr. tanaceti.*

concolor. 98. Chr. oblonga flavescens nitida, oculis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 99.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *Chr. tanaceti paulo major.*

picea. 99. Chr. oblonga picea, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 100.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magna*, *glabra*, *nitida.*

betulae. 10. Chr. violacea, elytris punctato striatis. *Fn. suec.* 514. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 76. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 101. *Scop. ent. carn.* 221.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 264. *n.* 17. Chrysomela nigro-purpurea &c.
Degeer inf. 5. *p.* 318. *n.* 24. *t.* 9. *f.* 24. a. b. Chrysomela caerulea salicis &c.
Roes. inf. 2. *scar.* 3. *t.* 1.
Raj. inf. 90. *f.* 5.
Mus. Lesk. p. 14. *n.* 267?
Habitat in betulae albae *foliis*, *paginam inferiorem exedens.*

tricolor. 100. Chr. oblonga, thorace fulvo-viridi punctato, elytris viridibus nitidis, abdomine nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 77. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 102.

Habitat

Habitat - - - major Chr. betulae, capite viridi, ore, pectore pedibusque fulvis, antennis fuſcis.

haemoptera. 11. Chr. violacea, plantis alisque rubris. *Fn. ſuec.* 512.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 23. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 258. *n.* 5. Chryſomela tota violacea. *Degeer inſ.* 5. *p.* 312. *n.* 20. *t.* 9. *f.* 13. Chryſomela hyperici? *Pod. inſ.* 26. Chryſomela graminis.
Habitat in Europa.

fuſcipes. 250. Chr. violacea, antennis tibiis plantisque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 243.
Habitat in Europa.

nitens. 251. Chr. oblonga violacea nitida, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 261.
Habitat - - -

ſemiſtriata. 101. Chr. nigra, elytris flavis: faſcia media nigra, anterius et poſterius nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 26.
Habitat in Braſilia.

centaurei. 102. Chr. cuprea nitens, ſubtus viridi-aenea, pedibus cupreis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 25.
Habitat in Germaniae *centaureo, variantis ſtatura et magnitudine.*

varians. 103. Chr. caerulea ſ. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 24.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p* 271. Chryſomela ſubgloboſa nitida, colore varians, antennis nigris.
Habitat in Saxonia, *ſtatura et magnitudine faſtuoſae.*

occidentalis. 12. Chr. viridi-aenea, pedibus antennisque flavis.
Habitat in America, *chr. vitellinae ſimilis.* Rolander.

ceraſi. 13. Chr. livida, antennarum apicibus, oculisque nigris. *Fn. ſuec.* 570.*
Habitat in pruni padi *foliis, quae cribri inſtar perforat ſubtus haerens larva, depreſſa, viridis, ſetoſa.* T. Bergman.
Magnitudo *cimicis lectularii*; thoracis *margo anterior nigricans.*

14. Chr.

padi. 14. Chr. nigra, elytris apice lividis. *Fn. ſuec.* 813.*
Habitat in pruno pado, *pulice major.*

minutiſſima. 15. Chr. nigra opaca.
Habitat in Suecia, *pulice quadruplo minor, elytris abdomine brevioribus.*

armoraciae. 16. Chr. nigra nitidiſſima ſubcaeruleſcens, ſubtus nigra. *Fn. ſuec.* 515.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 84. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *t.* 44. *f.* 7. c. d. *Degeer inſ.* 5. *p.* 322. *n.* 25. Chryſomela plantaginis.
Habitat in plantagine, cochlearia armoracia, ranunculo aquatili, flammula.

melanoſtoma. 254. Chr. oblonga nigra, capite, thorace elytrisque rubris: illo poſterius puncto oreque, iſto utrinque puncto, dorſo ſcutelloque, his ſutura nigris. *Muſ. Lesk. p.* 14.

carbonaria. 255. Chr. nigra, elytris laeviſſime punctatis: punctorum ſeriebus novem. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 285.
Habitat in Europa.

decempunctata. 256. Chr. nigra, elytris ordinibus punctorum quinque parium. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 266.
Habitat in Europa.

luteicornis. 257. Chr. nigra, antennis luteo-rufeſcentibus, elytris laeviſſime punctatis: punctorum ſeriebus novem; margine inflexo teſtaceo. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 275.
Habitat in Europa.

ſubpunctata. 258. Chr. nigra aeneo nitens, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 276.
Habitat in Europa.

erythromelas. 259. Chr. atra, elytris laevibus punctatis margine ſanguineis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 270.
Habitat in Europa, *an diſtincta ſatis a limbata?*

cyanomelas. 260. Chr. violacea, capite thorace elytrisque nigris: his profunde punctatis, antennarum baſi rubra. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 265.
Habitat in Europa.

dichroa. 261. Chr. oblonga violacea, thorace, elytris tibiisque viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 280.
Habitat in Europa.

262. Chr.

elegans. 262. Chr. oblonga violaceo-aenea, capite, thorace, elytris profunde punctatis pedibusque viridi-aeneis. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 281.
Habitat in Europa.

ruſſica. 104. Chr. cyanea antennarum baſi, thorace pedibusque ruſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 55.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura chr. polygoni, at paulo minor.*

brunnea. 105. Chr. teſtacea, elytris ſutura lineolaque media fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 56.
Habitat in nova Hollandia, *parva.*

quinque-maculata. 252. Chr. oblonga teſtacea, elytris punctis profundis ſtriatis: ſingulis maculis quinque nigris notatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 260.
Habitat in Europa.

erythroptera. 253. Chr. aenea, capite thoraceque fuſco aeneis, elytris rubris baſi gibbis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 257.

cerealis. 17. Chr. aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 57.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 262. *n.* 14. Chryſomela aurea.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 3.
Habitat in Europae *magis auſtralis ſegete*, montis vogeſi *ſpartio ſcoparia, mediae magnitudinis, ſubtus obſcure violacea, rarius tota purpurea.*

americana. 106. Chr. viridi-aenea, elytris ſtriis quinque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 58.
Habitat in America *et* Galliae *auſtralis lavandula, verticis macula coccinea.*

feſtiva. 107. Chr. nigro-aenea, elytris lineis tribus ſuturaque anteriore flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 59.
Habitat in America.

faſtuoſa. 18. Chr. aurea, coleoptris lineis tribus caeruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 60. *Scop. ent. carn.* 232. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 53. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 6.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 11. Chryſomela viridis nitida &c.
Gron. zooph. 561.
Habitat in Europae *lamio albo, urticis, rubis.*

glorioſa. 108. Chr. viridis nitida, elytris linea caerulea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 61.
Habitat in Italia, *faſtuoſae affinis, at duplo major.*

ſpecioſa. 19. Chr. viridi-ſericea, elytris lineis duabus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 62. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 54. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 7?
Scop. ent. carn. 231. Chryſomela ſpecioſiſſima.
Hollar inſ. t. 6. *f.* 2.
Habitat in Germaniae *ſilvis.*
Elytrorum *lineae anterius et poſterius coeunt.*

cyanea. 109. Chr. thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 63.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

nitida. 110. Chr. thorace rotundato viridi-aeneo, antennis cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 64.
Habitat in Siam, *auratae affinis, at paulo major.*

aurata. 111. Chr. thorace rotundato cyaneo, elytris aureis margine cyaneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 65.
Habitat in America *boreali.*

limbata. 112. Chr. atra, coleoptrorum limbo ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 66.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 260. *n.* 9. Chryſomela nigro-caerulea &c.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 20.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

hypochaeridis. 21. Chr. aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. ſcan.* 210. *Fn. ſuec.* 516.
Scop. ent. carn. 193. Bupreſtis ſyngeneſiae.
Habitat in hypochaeridis maculatae *floribus.*

vulgatiſſima. 22. Chr. oblonga caerulea, antennis baſi ferrugineis. *Fn. ſuec.* 517.* *Scop. ent. carn.* 223. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 104.

Degeer inſ. 5. *p.* 317. *n.* 23. Chryſomela caerulea betulae.
Habitat in Europa, *potiſſimum in ſalice.*

vitellinae. 23. Chr. viridi-caerulea. *Fn. ſuec.* 519.* *Scop. ent. carn.* 224. *Fn. ſuec.* 426. Chryſomela aenei coloris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 130. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 103. Chryſomela oblonga viridi-aenea.
Degeer inſ. 5. *p.* 323. *n.* 27.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 5. *t.* 1.
Habitat in Europae *ſalicibus glabris populoque, vulgatiſſima paulo minor, folia ſubtus conſumens.*
Larvae, *dum peſcuntur, per lineas parallelas diſpoſitae.*

polygoni. 24. Chr. caerulea, thorace, femoribus anoque rufis. *Fn. ſuec.* 520.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 54.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 283. *n.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 322. *n.* 26.
Raj. inſ. 100. *n.* 4.
Reaumur inſ. 3. *t.* 17. *f.* 14. 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 5. *et t.* 161. *f.* 4. *et t.* 173. *f.* 4.
Habitat in polygono aviculari, rumice acetoſa, *pedibus interdum rufis, ut tamen plantae nigrae ſint.*
Femina *ovis gravida ultra coleoptra ventricoſa.*

18gutta-ta. 113. Chr. elytris fuſcis: punctis octo pallidis; quibusdam connexis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

pallida. 25. Chr. flaveſcens, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 521.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 44.
Fn. ſuec. 1. *n.* 423. Chryſomela pallido-griſea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. Cryſomela pallida, oculis nigris.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

ſtriata. 114. Chr. atra nitida, elytris ſtriatis teſtaceis, ſutura atra.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 122. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *gibba, mediae magnitudinis.*

notata. 115. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro-variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 46.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pallida, capite fulva, ſtatura pallidae.*

116. Chr.

rumicis 116. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris fulvis: ſutura vittaque media nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 47.
Habitat in Hiſpaniae *rumice ſpinoſo*, *ſtatura et magnitudine pallidae.*

vulpina. 117. Chr. atra, elytris margine, punctis quatuor apiceque nigro-maculato albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura notatae.*

eraſſicornis 118. Chr. flaveſcens, elytris maculis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 49.
Habitat in nova Hollandia.

ſtaphylaea. 26. Chr. obſcure teſtacea tota. *Fn. ſuec.* 518.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 15. Chryſomela ſupra rubro-cuprea &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 24. Chryſomela cuprea.
Habitat in Europae *pratis.*

fervida. 119. Chr. teſtacea, elytris aeneis: margine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 30.
Habitat in inſula Java.

polita. 27. Chr. thorace aurato, elytris rufis. *Fn. ſuec.* 522.* *Scop. ent. carn.* 229.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 119. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 31. Chryſomela ovata, thorace aurato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 257. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 2. 3.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 9.
Habitat in ſalice, populo.

lurida. 28. Chr. nigra, elytris caſtaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 33.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 3.
Habitat in Galliae *vite*, Germania, *ſtatura politae, at dimidio minor.*

lunata. 120. Chr. ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 32.
Habitat - - - *ſtatura et magnitudine politae.*

clavicornis. 29. Chr. nigra, elytris abdomineque nigris, antennis clavatis. *Habitat in* America, *chr. populi facie.* Rolander.

tremula. 121. Chr. caeruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 69. *n.* 28.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 2.
Habitat in Europae *populo*, *chr. populi duplo minor.*

populi. 30. Chr. thorace caeruleſcente, elytris rubris apice nigris. *Fn. ſuec.* 523.*
Scop. ent. carn. 228. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *Pod. inſ.* 27. Chryſomela 7 punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 290. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 16.
Liſt. ſcar. angl. 381. *n.* 6.
Merian. inſ. eur. 14. *t.* 27.
Albin. inſ. 63. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 9. *et t.* 9. *et t.* 47. *f.* 4. 5.
Habitat in populo tremula, *folia ſaepe devaſtans, quae excorticata rudis vaſis relinquit.*
Larva *foetens, hexapus, albo nigroque varia ex tuberculorum duplici ſerie humorem lacteum fundit.*

viminalis. 31. Chr. nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 590. *n.* 31. *Fn. ſuec.* 524.* Chryſomela ovata nigra, thorace bimaculato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 265. *n.* 18. Chryſomela rubra &c.
Scop. ent. carn. 233. Chryſomela ſignata.
Degeer inſ. p. 297. *n.* 6.
Habitat in Europae *ſalicibus, aliquando cum haemorrhoidali copia conjuncta.*

cyanipes. 122. Chr. rufa, elytris punctis poſteriusque cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 40.
Habitat in nova Hollandia.

cyanicornis. 123. Chr. rufa, thorace macula dorſali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 41.
Habitat in nova Hollandia.

10punctata. 32. Chr. thorace rubro poſterius nigro, elytris rufis: punctis ſubquinis nigris. *Fn. ſuec.* 525. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 42.

Fn.

Fn. ſuec. 1. *n.* 436. Chryſomela ſupra rufa, thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 4. Chryſomela rubra &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 25. Chryſomela rufipes.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 13.
β) Chryſomela rubra, elytro ſingulo maculis quinque nigris.
Fn. ſuec. 1. *n.* 1354.
Habitat in Europae *populo*, *punctorum in elytris numero varians.*

ſexpunctata. 124. Chr. nigra, thorace rufo: punctis duobus, elytris rufis: punctis tribus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 43.
Habitat in Europae *plantis*, *decempunctatae affinis.*

varioloſa. 33. Chr. nigra, elytris rubris: punctis ſparſis impreſſis caeruleis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 122. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 50.
Habitat in Africa.

lapponica. 34. Chr. thorace viridi, elytris rubris, faſcia inter punctum maculamque lunatam caerulea. *Fn. ſuec.* 526.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 302. *n.* 12. *t.* 9. *f.* 3. Chryſomela curvilinea.
Schaeff. ic. t. 44. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali*, Saxoniae *fraxino*, *elytrorum ſutura caerulea.*

undulata. 35. Chr. rufa, elytris faſciis tribus atro-caeruleis undulatis.
Amoen. ac. 6. *p.* 393. *n.* 14. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 52.
Habitat in India.

boleti. 36. Chr. nigra, elytris faſciis tribus flavis repandis. *Fn. ſuec.* 527.* *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 34.
Uddm. diſſ. 4. *f.* 3. Dermeſtes ater nitens, elytris nigris: faſciis duabus flavis undulatis.
Scop. ent. carn. 247. Coccinella faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 337. *t.* 6. *f.* 3. *Schaeff. elem. t.* 58. *ic. t.* 77. *f.* 6. Diaperis.
Degeer inſ. 5. *p.* 49. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 3. Tenebrio boleti.
Habitat in boletis *arboreis.*

novem-vittata. 125. Chr. thorace nigro aeneo, coleoptris flavis: vittis novem fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine chr. boleti.*

ſtolida. 126. Chr. ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 36.
Habitat in America.

nigricornis. 127. Chr. nigro-aenea, capite, thoracis lateribus, elytrorumque macula duplici baſeos ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 37.
Habitat in nova Hollandia.

collaris. 37. Chr. violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro. *Fn. ſuec.* 528.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 38.
Degeer inſ. 5. *p.* 302. *n.* 13.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 11. 12.
Habitat in Europae *et borealis* Americae *ſalicibus.*

ſanguinolenta. 38. Chr. atra, elytris margine exteriori ſanguineis. *Fn. ſuec.* 529.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 67.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 259. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 8. Chryſomela nigro-caerulea &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 298. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 26. Chryſomela rubro-marginata.
Scop. ent. carn. 203. Buprestis ſanguinolenta.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 10.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 15.
Habitat in Europae *ſalicetis.*

margina-ta. 39. Chr. nigro-aenea, elytris margine luteis. *Fn. ſuec.* 529.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 68.
Degeer inſ. 5. *p.* 303. *n.* 14.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 19.
Habitat in Europae *pratis apricis.*
Elytra *ſtriato-punctata.*

auſtr. 128. Chr. thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis: margine rubro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 69.
Habitat Dresdae, *magnitudine et ſtatura marginatae.*

40. Chr.

marginel-la. 40. Chr. nigro-caerulea, thorace elytrisque margine luteis. *Fn. ſuec.* 530. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 70. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *t.* 23. *f.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 304. *n.* 15. Chryſomela ranunculi.
Raj. inſ. 99.
Habitat in Europae *ranunculis.*

hannove-riana. 129. Chr. cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 71. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 54. *n.* 22. *t.* 23. *f.* 10.
β) Chryſomela potentillae. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 11.
γ) Chryſomela ranunculi. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 11.
Habitat in Germania.

5puncta-ta. 130. Chr. nigra, thorace rufo, coleoptris teſtaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 72.
Habitat Hamburgi, *mediae magnitudinis.*

ſcutellata. 131. Chr. rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 73.
Habitat in Germania, *parva.*

litura. 132. Chr. rufeſcens, elytris ſutura lineaque longitudinali nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 74. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 57. *n.* 30. *t.* 23. *f.* 18. a.
Habitat in Anglia *et* Germania.

flavicans. 133. Chr. flaveſcens, elytris viridi-cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 75.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine liturae.*

caſtanea. 41. Chr. fuſca, elytris margine exteriore caſtaneo. *Amoen. ac.* 6. *p.* 394. *n.* 15.
Habitat Surinami.

analis. 42. Chr. atra, elytris fuſcis: margine exteriore teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 107.
Habitat in Europa, *capta primum ad praedium* Hammarby. Fabricius.

cruenta. 134. Chr. oblonga ſanguinea, thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 108.

Habitat in India, *coccineae ſtatura.*

coccinea. 43. Chr. thorace marginato ſanguineo: macula nigra, elytris ſanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. ſuec.* 532.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 109.

Uddm. diſſ. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis quatuor nigris.

Degeer inſ. 5. *p.* 301. *n.* 10. *t.* 9. *f.* 1. Chryſomela quadrimaculata.

Habitat in Europae *borealis corylo.*

cruciata. 135. Chr. oblonga rubra, coleoptris cruce nigra. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 273. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 110.

Habitat Halae Saxonum, *coccinea minor, elytris &c. marginatis a plurimis congeneribus diſtans, an forte cum chr. ruſtica, et cryptocephalis capreae, nymphaeae &c. proprii generis?*

quadri-maculata. 136. Chr. oblonga, thorace teſtaceo immaculato, elytris teſtaceis: maculis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 111.

Habitat in nemoribus Kilonienſibus.

decem-maculata. 137. Chr. oblonga nigra, coleoptris rubris: punctis decem nigris; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 112.

Habitat in America.

20punctata. 138. Chr. oblonga viridi-aenea thoracis marginibus albis, elytris albis: maculis decem aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 86. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 112.

Berg ſtr. nomencl. 1. *p.* 87. *t.* 13. *f.* 10. Chryſomela vicies maculata.

Petiv. gazoph. t. 29. *f.* 5.

Habitat in Anglia.

bipunctata. 139. Chr. teſtacea, elytris macula fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 82.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura philadelphicae, at major.*

philadelphica. 44. Chr. viridis, elytris flavis: punctis virescentibus oblongiusculis; antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 83.
Degeer inf. 5. *p.* 353. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 13.
Petiv. gaz. t. 26. *f.* 11.
Habitat in Pensylvania, *elytrorum futura nunc viridi, nunc flava.*

trimaculata. 45. Chr. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 11.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 592. *n.* 45. Chrysomela ovata nigra, elytris flavis, maculis tribus oblongis nigris, intermedia futurae communi.
Habitat in America, *minuta, forma coccinellae.*

Adonidis. 140. Chr. atra, thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris flavis: futura vittaque nigris. *Pall. it.* 1. *p.* 463. *n.* 29. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 12.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 4. *p.* 56. *n.* 39. *t.* 23. *f.* 17.
Habitat in Tibiriae *adonide et* Austria.

dorsalis. 141. Chr. atra, thoracis margine testaceo: puncto nigro, elytris testaceis: futura abbreviata atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 13.
Habitat in Austria.

clavata. 142. Chr. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta flavescente. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 14.
Habitat . . . *nigra, mediae magnitudinis.*

bifasciata. 143. Chr. testacea, elytris aeneis nitidis: punctis duobus fasciisque duabus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *magna.*

futuralis. 144. Chr. aenea, elytris flavis; futura vittaque aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 1. 2. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 16.
Habitat in America *boreali.*

barbarica. 46. Chr. viridi-aenea, elytris lineis quinque rubris, alis sanguineis.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 16.
Habitat in Barbaria, *inter coccos officinarum lecta, ex caeruleo virescens, subtus ex piceo aenea.*

Lineola. 47. Chr. flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 58. *mant. inſ. p.* 72. *n.* 76.
Habitat in America, *pulicis magnitudine, capite et thorace pallidis, oculis nigris.* Brünniche.

aeſtuans. 48. Chr. ferruginea, elytris maculis quatuor flavicantibus difformibus. *Gron. zooph.* 565.
Habitat in America, *coccinellae maximae magnitudine, elytris glabris obſolete punctato-ſtriatis.*

ſacra. 49. Chr. ſupra rufa, thoracis linea, punctis duobus, elytrorumque ſutura nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 40.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 77.
Habitat in Palaeſtina, *alis ſanguineis.*

14puncta-ta. 94. Chr. teſtacea, coleoptris flavis: punctis ſedecim nigris; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 17.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. Chryſomela cylindrica, femoribus poſticis incraſſatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis punctis XIV nigris.
Habitat in India, *bipunctatae ſimilis, at major.*

obſcura. 96. Chr. nigra, thorace rotundato anguſtiori, pedibus poſterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 81.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *Fn. ſuec.* 561.* Chryſomela ſubcylindrica, thorace pedibusque nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 336. *n.* 40. Chryſomela nigro-quadrata.
Habitat in Europae *plantis, thorace gibbo, elytris anguſtiore.*

violacea. 145. Chr. violacea, elytris lineis quatuor virideſcentibus. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 270.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.
Habitat aeſtate gregaria in Europae *ſalicibus, chr. alni major, ceterum cereali ſimilis.*

olivacea. 146. Chr. aeneo-olivacea, thoracis marginibus lateralibus craſſis, elytris punctato-ſtriatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 272.
Habitat in Germaniae *plantis, ſtaphyleae ſtatura et magnitudine, nitida, punctorum excavatorum in elytris ſeriebus* 9.

147. Chr.

ſternicornis. 147. Chr. violacea, ſterno porrecto. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 274. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in India, *ſcarabaei vernalis magnitudine, punctis plurimis in thorace et elytris excavatis.*

globoſa. 148. Chr. elytris nigris, thorace ſanguineo, pedibus ruſofuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 11. *n.* 18.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, globoſa, nigra.*

hollandica. 149. Chr. ſupra aenea, elytris punctatis, ſubtus nigra, cinereo-tomentoſa. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 11. *n.* 19.
Habitat in Hollandia Sueciae, *ſtatura et magnitudine Chr. vitellinae.*

undata. 150. Chr. elytris teſtaceis: punctis faſciisque duabus nigris, capite thoraceque teſtaceis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 12. *n.* 20.
Habitat Upſaliae, *pallidae ſtatura et magnitudine, ſubtus teſtacea.*

bipuſtulata. 151. Chr. elytris nigris: apicis macula flava, capite thoracisque lateribus flavis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 13. *n.* 21.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, nigra, glabra, ſubdepreſſa.*

gibba. 152. Chr. oblonga, elytris brunneis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 14. *n.* 24.
Habitat Upſaliae, *magnitudine vulgatiſſimae, ſubdepreſſa.*

gigas. 153. Chr. tota cyanea, oculis ex luteo-fuſcis, elytris glaberrimis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 51. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat in India.

Gronovii. 154. Chr. nigra nitida, thoracis faſcia duplici et margine nigris, elytris luteis: macula, vitta interrupta, punctisque duobus nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 4.
Habitat - - - ultra dimidium pollicem longa, faſcia thoracis priore dentata.

indica. 155. Chr. nigra, abdomine luteo, elytris ſubdiaphanis fuſcis: faſciis tribus luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 5.
Habitat in India.

156. Chr.

lomata. 156. Chr. nigra, capite, thorace, elytrisque cyaneis, his obſolete punctatis margine ſanguineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 8.
Habitat in Germania, *marginatae affinis.*

centaura. 157. Chr. viridi-aurea, thorace elytrisque rubris punctatis, antennis nigris, tarſis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 56. *n.* 27. *t.* 23. *f.* 15.
Habitat Berolini, *ultra* 2 *lineas longa.*

taraxacon. 158. Chr. rubro aurea, ſubtus viridi-aurea, elytris punctato-ſtriatis, antennis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 56. *n.* 28. *t.* 23. *f.* 16.
Habitat Berolini *in taraxacone.*

exilis. 159. Chr. nigra, capite et thorace glaberrimis pedibusque fulvis, elytris punctis fuſcis ſeriatis maculisque duabus nigris confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 57. *n.* 31. *t.* 23. *f.* 19. b.

unicolor. 160. Chr. livida, elytris glabris: punctis ſparſis excavatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 161. *n.* 56. *t.* 44. *f.* 1.
Habitat in America, *maxima.*

griſea. 161. Chr. ex virescente griſea ſubvilloſa, pedibus antennisque flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 161. *t.* 44. *f.* 2. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam ſuperans.*

rubi. 162. Chr. auguſta chalybea, elytris glabris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 562. *n.* 59. *t.* 44. *f.* 4. c. f.
Habitat Berolini.

cacaliae. 163. Chr. virens, elytris ſtria longitudinali ſuturaque caeruleis, alis rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 62. *t.* 45. *f.* 2.
Habitat in Auſtria.

bulgarenſis. 164. Chr. atra, elytris nigro-aeneis punctatis, unguiculis rubris. *Schrank inſ. auſtr. p.* 70. *n.* 127. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 25. *t.* 23. *f.* 13.
Habitat in Auſtria.

165. Chr.

Huc referas quoque Chryſomelam bimaculatam. *Schaeff. ic. inſ. t.* 51. *f.* 7. *et lit.* M. *t.* 21. *f.* 1. 2.

binotata. 165. Chr. testacea, elytris basi ferrugineis. *Müll. fn. fridrichsd. p. 8. n. 73.*
Habitat in Dania.

Fridrichsdalensis. 166. Chr. thorace macula nigra, elytris sanguineis immaculatis, abdomine nigro. *Müll. fn. fridr. p. 8. n. 74. prodr. zool. dan. p. 81. n. 885.*
Schaeff. ic. t. 194. f. 4.
Habitat in Europa *boreali.*

similis. 167. Chr. nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque basi rubris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 81. n. 880.*
Habitat in Dania.

orichalcea. 168. Chr. nigra, supra aenea, elytris punctis striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 82. n. 889.*
Habitat in Dania.

grossa. 169. Chr. atra, subtus violacea, tarsis spongiosis subtus fuscis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 81. n. 875.*
Schaeff. ic. t. 126. f. 1.
Habitat in Dania.

punctata. 170. Chr. violacea, elytris punctato-striatis, ano rubro. *Müll. zool. dan. prodr. p. 82. n. 890.*
Habitat in Dania.

obtusa. 171. Chr. violacea, thorace pedibusque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 82. n. 895.*
Habitat in Dania.

thoracica. 172. Chr. violacea, thoracis margine laterali dilatato, elytris punctato-striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 82. n. 898.*
Habitat in Dania.

bilineata. 173. Chr. viridi-aurea, thorace anterius excavato, elytrorum linea duplici caerulea. *Müll. zool. dan. prodr. p. 83. n. 904.*
Act. nidr. 4. p. 8. t. 16. f. 5.
Habitat in Scandinavia.

serotina. 174. Chr. nitida rufa, oculis nigris, tibiis posterioribus arcuatis. *Müll. prodr. zool. dan. p. 83. n. 905.*
Habitat in Dania.

caerulea. 175. Chr. caerulea, thorace violaceo. *Geoffr. inf. par. 1. p. 259. n. 6.*
Habitat in Gallia.

176. Chr.

atrata. 176. Chr. atra, alis ſanguineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 259. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

decem-ſtriata. 177. Chr. viridis nitida, ſtriis decem cupreis, punctorum ſerie duplici diviſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 261. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

ruficauda. 178. Chr. viridi-aenea obſcura nitida, abdominis lateribus, ano alarumque margine rubris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 305. *n.* 17.
Habitat - - -

viridula. 179. Chr. viridis aurata nitida, thorace anterius aequali, abdomine ſupra toto nigro. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 421. 2. *n.* 520. B.
Goed. inſ. 1. *t.* 45.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 11.
Degeer inſ. 5. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat in Europa.

amethyſtina. 180. Chr. ſupra ex caeruleo violacea, ſubtus ex violaceo viridis, punctis excavatis ſparſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat - - - *thorace amplo, antennis brevioribus nigris.*

longicornis. 181. Chr. oblonga, thorace teretiuſculo, ſupra ex griſeo fuſca nitida, ſubtus nigra capite nigro.
Degeer inſ. 5. *p.* 325. *n.* 29. *t.* 9. *f.* 35.
Habitat in Europa, *antennis longis.*

eruentata. 182. Chr. nigra, elytris glabris: faſciis transverſis undulatis maculisque rubris.
Degeer inſ. 5. *p.* 350. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 9.
Habitat in America *auſtrali.*

haemoſtata. 183. Chr. capite thoraceque viridi-aeneis obſcuris, elytris nigris: maculis plurimis rubris punctisque excavatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 350. *n.* 3. *t.* 16. *f.* 10.
Habitat in America *auſtrali.*

fuligino-ſa. 184. Chr. fuſca depreſſa, thorace elytrisque griſeo-fuſcis, antennis nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 354. *n.* 8. *t.* 16. *f.* 15.
Habitat Surinami.

aſclepiada. 185. Chr. obſcure caerulea nitida, antennis nigris, thoracis punctis ſparſis, elytrorum lineatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 69.
Habitat ad Volgam *et* Irtin Sibiriae *in Aſclepiada.*

186. Chr.

ſapphirina. 186. Chr. cyanea nitida, ore oculisque rubris, antennis nigris. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 19. *n.* 19.
Habitat - - - *ſanguinolenta triplo major, thorace elytrisque punctis minutiſſimis conſperſis.*

anglica. 187. Chr. atro-caerulea, elytris nigro-aeneis ſtriato-punctatis, alis rubris. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 20. *n.* 20.
Habitat in Angliae *hypericone perforato, faſtuoſae magnitudine.*

rhois. 188. Chr. ferruginea, capite, thorace et ſtriis aliquot elytrorum pallidis. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 21. *n.* 21.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis rhoe glabro, politae magnitudine.*

noveboracenſis. 189. Chr. thorace rufo: diſco punctis nigris, elytris rufis: ſutura, punctis lineolisque nigris. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 22. *n.* 22.
Habitat in Noveboraco, *habitu chr. populi, magnitudine fere politae.*

vernalis. 190. Chr. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque olivaceis, elytris ſtria longitudinali et ſutura nigra. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 23. *n.* 23.
Habitat in Anglia, *primo vere in arena conſpicua, magnitudine et habitu chr. vitellinae.*

frontalis. 191. Chr. nigra, capite antennarum baſi, elytrorum margine et pedibus ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 24. *n.* 24.
Habitat in America *ſeptentrionali, mediae magnitudinis.*

ſiſymbrii. 192. Chr. capite atro, thoracis elytrorumque marginibus undique ſanguineis. *Lepechin it. 1. p.* 10. *t.* 4. *f.* 16.
Habitat in Ruſſiae *Siſymbrio Sophia.*

Lepechini. 193. Chr. capite caeruleo, thorace elytrisque rubris: faſciis duabus caeruleis. *Lepech. it. 1. p.* 29. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

rubicunda. 194. Chr. atra, thorace elytrisque rubicundis, inciſuris abdominis albis. *Lepech. it. 1. p.* 311. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat in Ruſſiae *auſtralis polygono frutescente.*

diſtincta. 195. Chr. obſcure viridis, thoracis elytrorumque limbo interrupto flaveſcente. *Lepech. it. 1. p.* 312. *t.* 20. *f.* 6.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

196. Chr.

quadri-punctata. 196. Chr. capite nigro, thorace nigro, margine rubro, elytris miniatis: punctis quatuor nigris. *Lepech. it.* 2. *p.* 208. *t.* 11. *f.* 20.
Habitat in Sibiria.

menthae. 197. Chr. nigro-aenea nitida. *Schrauck Beytr. z. Naturg. p.* 63. §. 5.
Habitat in mentha aquatica; *an propria ſpecies?*

pruni. 198. Chr. nigra, capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis. *Schrauck Beytr. z. Naturg. p.* 63. §. 6.
Habitat in pruno.

cognata. 199. Chr. caerulea, pedibus nigris, ano ſupra, primisque antennarum articulis fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 58. *n.* 37.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine chr. vitellinae, ceterum haemorrhoidali affinis.*

erythropus. 200. Chr. viridis nitens granulata elytris obtuſe mucronatis, antennis fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 59. *n.* 38.
Habitat Berolini *in ſalicibus, ſtatura et magnitudine chr. vitellinae.*

raphani. 201. Chr. viridis nitens, elytris granulatis, antennarum ultimis articulis tarſisque nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 59. *n.* 42. *t.* 23. *f.* 21.
Habitat Berolini *in armoracia.*

aeroſa. 202. Chr. nigra caeruleſcenti irrorata, ſubtus fuſca, antennis pedibusque nigris, punctorum in elytris ſeriebus ſeptem. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 60. *n.* 43. *t.* 23. *f.* 22.
Habitat in Pomerania.

melanopus, 203. Chr. caerulea ſubtus fuſca, antennis pedibusque nigris, elytrorum punctis ſparſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 60. *n.* 44.
Habitat Berolini, *aeroſae affinis.*

japonica. 248. Chr. teſtacea, thorace livido: margine poſteriori punctisque 5 nigris, elytris nigro caeruleis. *Hornſtedt Schrift. der berl. Naturf.* 8. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Japonia, *chr. alni magnitudine.*

249. Chr.

malaccen- 249. Chr. capite, thorace pedibusque ferrugineis, elytris ni-
sis. gro-aeneis: margine interiori ferrugineo. *Hornst. Schrift. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in Malacca, Sumatra *et* Java, *marginatae magnitudine.*

crassipes. 263. Chr. testacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, femoribus crassis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 277.
Habitat in Europa.

janthina. 264. Chr. oblonga, fusco aenea, elytris violaceis: punctorum ordinibus novem, tibiis compressis rufis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 286.
Habitat in Europa.

bimacula- 265. Chr. oblonga rufa, elytris testaceis, punctato striatis:
ta. maculis duabus oblongis obsolete fuscis. *Mus. Lesk. p.* 15. *n.* 287.

** *Saltatoriae, femoribus posterioribus incrassatis:* Alticae.

flava. 204. Chr. flava, thorace nigro punctato, elytris violaceis: *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 113. *Fabr. Syst. ent. app. p.* 821. Altica thoracica.

carolinia- 205. Chr. flavescens, thorace punctis duobus, coleoptris vittis
na. quinque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 75. *n.* 114.
Fabr. Sp. inf. 1. *p.* 156. *n.* 38. Crioceris caroliniana.
Habitat in America *boreali.*

olera- 51. Chr. virescenti-caerulea. *Fn. suec.* 534. *Fabr. Sp. inf.*
cea. 1. *p.* 133. *n.* 94. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 126.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 245. *a.* 1. *Scop. ent. carn.* 212. Altica oleracea.
Degeer inf. 5. *p.* 344. *n.* 49.
Habitat in Europae *plantarum, praesertim tetradynamarum, cotylidonibus, quas misere destruit, nisi forte ante seminationem immorsis seminibus, cineribus herbarum, pessimum tabaci, pollenda.*

albicol- 206. Chr. thorace pallido elytris aeneis: maculis duabus fasciaque aureis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 95. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 127.
Habitat in nova Hollandia.

fulvicollis. 207. Chr. thorace rufescente, elytris pallidis: sutura maculisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 96. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 128.

Habitat - - *mediae magnitudinis, pallida, capite pedumque geniculis nigris.*

bicolor. 52. Chr. rufa, elytris femoribusque posterioribus caeruleis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 132. *n.* 192. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 124. *Degeer inf.* 5. *p.* 357. *n.* 12. *t.* 16. *f.* 20.

Habitat in America.

Corpus *colore et magnitudine chr. polygoni.*

famelica. 208. Chr. flavescens, elytris viridibus: margine pallida. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 123.

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 132. *n.* 91. Chrysomela marginata.

leucopicta. 209. Chr. nigra, thorace albo, elytris obscure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 122.

Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

quadrifasciata. 210. Chr. ferruginea, elytris strigis quatuor albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 121.

Habitat in Cayenna, *magna.*

cincta. 211. Chr. nigra, elytris viridi-aeneis: margine punctisque duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 132. *n.* 90. *mant. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 119.

Habitat in Lusitania, *magna.*

equestris. 212. Chr. thorace elytrisque albis: margine baseos fasciaque media ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 118.

Habitat in America, *magna.*

quadriguttata. 213. Chr. ferruginea, thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 132. *n.* 89. *mant. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 117.

Habitat in Cayenna, *biguttatae affinis.*

biguttata. 214. Chr. ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 132. *n.* 88. *mant. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 116.

Habitat in America.

215. Chr.

glabrata. 215. Chr. thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 115. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 39. Crioceris glabrata.

nobilitata. 216. Chr. ferruginea, elytrorum margine faſciaque albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 120.
Habitat in Cayenna, *magna.*

chryſocephala. 53. Chr. atro-caerulea, capite pedibusque quatuor anterioribus luteis. *Fn. ſuec.* 535. *Scop. ent. carn.* 213.
Habitat in Suecia.

hyoſcyami. 54. Chr. vireſcenti-caerulea, pedibus teſtaceis, femoribus poſterioribus violaceis. *Fn. ſuec.* 536.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 129.
Fn. ſuec. 540. Mordella ovata caerulea nitida, tibiis ferrugineis.
Degeer inſ. 5. *p.* 345. *n.* 51. Chryſomela ovata ſaltatoria. &c.
Geoffr. inſ. par 1. *p.* 248. 11. Altica caerulea &c.
Raj. inſ. 98. 9. Capricornus exiguus ſaltatorius.
Habitat in Europae *hyoſcyamo*, *braſſica.*

quadripuſtulata. 217. Chr. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 139.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 259. *n.* 15.
Habitat in Angliae, Galliae *hortis.*

anglicana. 218. Chr. atra, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 138.
Habitat in Angliae *plantis.*

dorſalis. 219. Chr. nigra, thorace elytrorumque margine pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 137.
Habitat in Anglia, *ſtatura atricillae, an varietas?*

atricillae. 55. Chr. nigra, thorace, elytris tibiisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 537.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 135. *n.* 104. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 136. Chryſomela ſaltatoria nigra, thorace elytrisque cinereis.
β) Chryſomela melanocephala. *Degeer inſ.* 5. *p* 348. *n.* 57. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 251. *n.* 19.
Habitat in Europae *plantis.*

erythrocephala. 56. Chr. atro-caerulea, capite geniculisque pedum rufis. *Fn. ſuec.* 538.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 135.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 246. *n.* 4. Altica nigro-aenea &c.
Habitat in Europae *plantis.*

Modeeri. 57. Chr. aenea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posterioribus luteis. *Fn. suec.* 539.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 134. *n.* 102. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 134. Chrysomela saltatoria viridi-aenea, elytris macula postica pedibusque anticis flavis.
Habitat in Europae *plantis.*

helxines. 58. Chr. viridi-aenea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Fn. suec.* 543. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 100. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Fn. suec. 539. Mordella atro-aenea subrotunda.
Degeer inf. 5. *p.* 345. *n.* 52. Chrysomela viridi-aurata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 269. *n.* 14. Altica aurea, pedibus flavis.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 12.
Habitat in polygono fagopyro *altisque.*

exoleta. 59. Chr. ferruginea, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 143.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 594. *Fn. suec.* 541.* Chrysomela saltatoria livida, elytris testaceis, abdomine capiteque fusco.
Fn. suec. 533. Mordella flava.
Degeer inf. 5. *p.* 338. *n.* 42.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 250. *n.* 16.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 7. *p.* 163. *n.* 63. *t.* 44. *f.* 7. l. m.
Habitat in Europae *salicibus floribus, quos consumit.*

nitidula. 60. Chr. viridis nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 99. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 131.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 594. *Fn. suec.* 542.* Chrysomela saltatoria, elytris caeruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis.
Degeer inf. 5. *p.* 346. *n.* 54.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 249. *n.* 13.
Schaeff. ic. t. 87. *f.* 5.
Habitat in Europae *salice.*

trifasciata. 61. Chr. supra albida, fasciis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 101. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Habitat in Europae *plantis, mediae magnitudinis.*
Capitis *fascia una, elytrorum duae.*

nigripes. 220. Chr. viridi-aenea, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 98. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 130.
Habitat in Anglia.

tabida. 221. Chr. pallida oculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 113. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 145.
Habitat in Angliae *plantis.*

brassicae. 222. Chr. atra, elytris pallide testaceis: margine omni fasciaque media atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 78. *n.* 146.
Habitat in Germaniae *oleribus*, *parva.*

nemorum. 62. Chr. elytris flavis: margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 114. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 147.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 595. *Fn. suec.* 543.* *Scop. ent. carn.* 215. Chrysomela saltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis.
Fn. suec. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.
Degeer inf. 5. *p.* 347. *n.* 55. Chrysomela fasciata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 247. *n.* 9.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 11.
Habitat in pulmonaria, dentaria, cardamine, *polyphaga.*

atra. 223. Chr. atra nitida, antennarum basi plantisque piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 148.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 247. *n.* 8.
Habitat Hafniae.

rustica. 63. Chr. atra, antennis, pedibus elytrorumque apicibus testaceis.
Habitat in Europa, *elytris subtilissime punctatis.*

pulicaria. 64. Chr. nigra, elytris posterius macula ferruginea.
Habitat in Europa, *pulicis magnitudine.*

rufipes. 65. Chr. caerulea obovata, capite, thorace, pedibus antennisque rufis. *Fn. suec.* 545.* *Scop. ent. carn.* 212. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 108. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 140.
Degeer inf. 5. *p.* 343. *n.* 47. *t.* 10. *f.* 11.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 245. *n.* 2.
Schaeff. ic. t. 166. *f.* 5.
β) Chrysomela africana. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 135.
Habitat in Europae *plantis*, *praesertim malva parviflora*, *β*) *major in* Africa *aequinoctiali.*

fuſcipes. 224. Chr. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 141.
Habitat in Angliae *plantis*, *an varietas rufipedis?*

teſtacea. 225. Chr. teſtacea gibba, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 142.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 17.
Habitat in Angliae *plantis.*

faſcicornis. 66. Chr. caerulea obovata, capite, thorace pedibusque rufis, antennis fuſcis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 8. *n.* 9. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Germania, *et* Java, *ad rufipedem proxime accedens, at paulo major.*

holſatica. 67. Chr nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 144.
Habitat in Holſatia *frequens*, *olera devaſtans.*

hemiſphaerica. 68. Chr. ſubborbiculata depreſſa nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 116. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 149.
Degeer inſ. 5. *p.* 348. *n.* 8.
Habitat in Saxoniae *corylo.*

ſurinamenſis. 69. Chr. flaveſcens, elytris margine faſciaque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 117. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 150.
Degeer inſ. 5. *p.* 355. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat Surinami.

S. litterata. 70. Chr. pallida, elytris nigris: linea longitudinali flexuoſa alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 151.
Degeer inſ. 5. *p.* 357. *n.* 13. *t.* 16. *f.* 21.
Habitat Surinami.

aequinoctialis. 71. Chr. thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor albis alternis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 115.
Degeer inſ. 5. *p.* 356. *n.* 11. *t.* 16. *f.* 19.
Habitat in America *meridionali.*

226. Chr.

Chryſomelae *ſaltatoriae plantarum cotyledonibus et tenellis foliis infeſtae; an huc ſpectat chryſomela manlica. Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 183. *aurata, antennis caeruleis, in umbellis vinnagae in provincia* Chilenſi Maule *habitans, muſcae magnitudine?*

Lens. 226. Chr. tota caerulco-nigra, elytris punctatis. *Thunberg nov. act. Upf.* 4. *p.* 13. *n.* 22.
Habitat Upfaliae *glabra*, *lentis magnitudine.*

exclamationis. 227. Chr. thorace nigro, elytris nigris: maculis quatuor flavis. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 14. *n.* 23.
Habitat Upfaliae, *pulice fere minor.*

flavipes. 228. Chr. chalybea, elytris obfolete granulatis, pedibus antennarumque articulis primis luteis. *Herbft apud Fueffli arch. inf.* 4. *p.* 61. *n.* 53.
Habitat Berolini.

pediculatia. 229. Chr. viridi-aurea, granulata fubtus nigra, pedibus antennisque fufcefcentibus: articulis extremis nigris. *Herbft apud Fueffli arch. inf.* 4. *p.* 61. *n.* 54.
Habitat Berolini, *vix pediculi magnitudine.*

minima. 230. Chr. ex atro virens, elytris tenerrime punctatis, antennis exortum fufcis, verfus finem nigris. *Herbft apud Fueffli arch. inf.* 4. *p.* 61. *n.* 55.
Habitat Berolini, *pulice dimidio minor.*

tamaricis. 231. Chr. capite nigro, thorace flavo: difcis macula nigra, elytris glaberrimis ex fufcefcente nigris. *Herbft apud Fueffli arch. inf.* 7. *p.* 163. *n.* 64. *t.* 45. *f.* 6. g. h.
Habitat in Auftria.

fimbriata. 232. Chr. oblonga, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide teftaceis linea nigra cinctis, femoribus rufis. *Forft. nov. inf. gen. p.* 25. *n.* 25.
Habitat in America *feptentrionali*, *magnitudine et ftatura cryptocephali capreae.*

hudfonias. 233. Chr. atra oblongiufcula, antennarum bafi ferruginea. *Forft. nov. inf. fp. p.* 26. *n.* 26.
Habitat in America *feptentrionali*, *nitens*, *magnitudine cryptocephali cyanotae.*

quadrinotata. 234. Chr. nigra, antennarum bafi flavefcente, elytrorum maculis quatuor teftaceis. *Pontoppid. Naturg. Daeunem. p.* 204. *t.* 16.
Habitat in Dania.

pusilla. 235. Chr. nigra, antennis pedibusque pallidis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 923.
Habitat in Dania.

luteola. 236. Chr. lutea, oculis, pectore antennarumque apice nigris. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 924.
Habitat in Dania.

flaveola. 237. Chr. nigra, thorace capiteque rufo, elytris, antennis pedibusque luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 925.
Habitat in Dania.

latiuscula. 238. Chr. ex nigro fusca, tibiis tarsisque subluteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 926.
Habitat in Dania.

caerulescens. 239. Chr. viridi-caerulea nitidissima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus nigris. *Degeer inf.* 5. *p.* 346. *n.* 53.
Habitat in Europa.

cyanopicta. 240. Chr. thorace punctato virescenti-caeruleo, elytris violaceis punctato-striatis, pedibus rufis. *Degeer inf.* 5. *p.* 344. *n.* 50.
Habitat in Europa.

striata. 241. Chr. caerulea, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris striatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 343. *n.* 48.
Habitat in Europa.

ferruginea. 242. Chr. ferruginea, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 216.
β) Chryſomela (lurida) fusco-rufa, abdomine oculisque nigris. *Scop. ent. carn. n.* 219.

truncata. 243. Chr. nigra, elytris truncatis apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 218.
Habitat in Carniola.

verficolor. 244. Chr. nigra, elytris nigro-aeneis striatis, thorace rubro. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 245. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Altica bicolor.
Habitat in Gallia.

ovalis. 245. Chr. nigro-aenea, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 246. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

246. Chr.

crucifera-rarum. 246. Chr. nigro-aenea oblonga, pedibus nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 6.
Habitat in Galliae *tetradynamis.*

ochropus. 201. Chr. nigra, pedibus rufis, elytris non ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

denigrata. 248. Chr. nigra, thorace elytrisque flavis: oris nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 248. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

laevigata. 247. Chr. caerulea, elytris punctis ſparſis, tibiis ferrugineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 249. *n.* 12.

picipes. 266. Chr. viridi-aenea punctata pedibus piceis, elytris ſpadiceis futuram verſus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 324.
Habitat in Europa.

concolor. 267. Chr. fuſco aenea, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus fuſco-aeneis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 325.
Habitat in Europa.

crenata. 268. Chr. nigra, elytris aeneis: ſtriis crenatis antennarum baſi tibiisque piceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 331.
Habitat in Europa.

diſcolor. 269. Chr. capite thoraceque nigro, elytris teſtaceo-fuſcis glabris, pedibus quatuor anterioribus tibiisque poſterioribus ſubteſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 332.
Habitat in Europa.

annulata. 270. Chr. fuſco-aenea, elytris ſtriis crenatis, antennarum baſi tibiisque quatuor anterioribus rufis: annulo fuſco-aeneo. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 333.
Habitat in Europa.

CRYPTOCEPHALUS.

Antennae filiformes.
Palpi quatuor.
Thorax, nec elytra, marginatus.
Corpus subcylindricum.

* *palpis aequalibus filiformibus.*
† *maxilla unidentata.*
‡ *labio integro, cylindrici.*

longipes. 1. Cr. niger obscurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 1.
Laichart. inf. tir. 1. *p.* 166. *n.* 1. Clytra longipes.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Germaniae, Calabriae *corylo, salice.*

sexmaculatus. 2. Cr. niger, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 2.
Habitat in Italia, *quadripunctato paulo major.*

quadripunctatus. 3. Cr. niger, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus serratis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 76. *Fn. suec.* 432. *Degeer inf.* 5. *p.* 32. *t.* 10. *f.* 7. Chrysomela quadripunctata.
Scop. ent. carn. 206. Buprestis quadripunctata.
Laichart. inf. tir. 1. *p.* 167. *n.* 2. Clytra quadripunctata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4. Melolontha coleoptris rubris &c.
Schaeff. elem. t. 83. *f.* 1.
ic. t. 6. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Europae *corylo frequens.*
Larva *saccata: sacco ovato scabro anterius oblique truncato.*

quadrinotatus. 4. Cr. cyaneo-niger, elytris rubris: maculis duabus cyaneis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 4.
Habitat in Barbaria, *statura quadripunctati, at quadruplo minor.*

5. Cr.

atraphaxidis. 5. Cr. niger, thorace rubro trimaculato, elytris teſtaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 5.
Pall. it. 2. *p.* 725. *n.* 68. Chryſomela atraphaxidis.
Habitat in Sibiriae *atraphaxide, magnitudine quadripunctati.*

lunulatus. 6. Cr. ater nitidus, elytris flavis: lunula, faſcia punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 6.
Habitat - - - *quadripunctato paulo minor.*

12maculatus. 7. Cr. niger, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei, *lunulati ſtatura et magnitudine.*

obſitus. 8. Cr. teſtaceus, antennis elytrorumque margine nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali.*

tridentatus. 9. Cr. caeruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 9.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 73. *Fn. ſuec.* 546. Chryſomela tridentata.
Degeer inſ. 5. *p.* 333. *n.* 36. *t.* 10. *f.* 10. Chryſomela caerulea nitida &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 196. *n.* 3. Melolontha nigro-viridis &c.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 5.
Habitat in corylo, Lonicera xyloſteo, *etiam in* Calabria.
Feminae *pedes anteriores elongati.*

lineatus. 10. Cr. rufeſcens, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 10.
Habitat in Braſilia.

venuſtus. 11. Cr. griſeo-fuſcus, thorace margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 11.
Habitat in America, *mediae magnitudinis.*

Gorteriae. 12. Cr. ater glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 12.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 74. *Amoen. acad.* 6. *p.* 394. *n.* 16. Chryſomela Gorteriae.

Habitat in capitis bonae ſpei *Gorteriis.*

octopunctatus. 13. Cr. niger, thorace rufo, elytris teſtaceis: punctis quatuor nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 13.

Habitat in Barbariae *plantis, ſtatura et magnitudine Cr. Gorteriae.*

maxillo-ſus. 14. Cr. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: puncto baſeos ſcutelloque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 14.

Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, antennis ſerratis.*

auritus. 15. Cr. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 15.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 75. Chryſomela aurita.

Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 163. *n.* 19. *t.* 44. *f.* 5. g. h.

Habitat in Saxoniae *corylo, in* Calabria.

didymus. 16. Cr. rufus, elytris maculis tribus nigris, anteriore poſterius didyma. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 16.

Habitat in nova Hollandia.

quadri-maculatus. 17. Cr. rufus, capitis baſi elytrorumque maculis duabus cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 17.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 77. *Fn. ſuec.* 547.* Chryſomela quadrimaculata.

Fn. ſuec. 432. Chryſomela oblonga nigra, coleoptris rubris: maculis quatuor nigris.

Scop. ent. carn. 206. Bupreſtis quadripunctata.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4.

Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29.

Schaeff. ic. t. 6. *f.* 6. 7.

Habitat in Germania, Calabria, *abdomine cinereo.*

flavicollis. 18. Cr. niger, thorace fulvo: punctis ſex nigris, elytris pallidis: punctis duobus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 18.

Habitat in Sibiria, *quadrimaculato proxime affinis.*

19. Cr.

longimanus. 19. Cr. obſcure aeneus, elytris teſtaceis: puncto baſeos nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 19. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 599. *n.* 95. *Fn. ſuec.* 562. *Pall. it.* 2. *app. n.* 67? Chryſomela longimana.

Habitat in Europae *borealis trifolio montano, euphorbia cyparissia, tridentato affinis, ſed minor, pedibus anterioribus in altero ſexu longiſſimis.*

Larva *ſaccata.*

Lar. 20. Cr. rufus, elytris fuſcis cyaneo nitidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 20.

Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

marginatus. 21. Cr. nigro-aeneus, elytris flavis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 21. *Schaller Abh. der hall. Nat. Geſ.* 1. *p.* 276. Chryſomela phalerata.

Habitat in Germania, *longimano affinis.*

hirſutus. 22. Cr. thorace elytrisque obſcure aeneis pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 22.

Habitat in America *boreali.*

bipunctatus. 23. Cr. niger nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 23.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 234. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 3. Cryptocephalus niger &c.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 78. *Fn. ſuec.* 548. Chryſomela bipunctata.

Uddm. diſſ. 22. Chryſomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.

Petiv. gaz. t. 31. *f.* 4.

Degeer inſ. 5. *p.* 332. *n.* 35.

β) Uddm. diſſ. 21. Chryſomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinali.

Gadd diſſ. 25. Caſſida nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris &c.

Habitat in Europae *borealis corylo.*

bimaculatus. 24. Cr. niger obſcurus, thorace fulvo, elytris teſtaceis: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 120. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 24.

Schaller

Schaller Abh. der hall. Nat. Geſ. 1. *p.* 274. Chryſomela melanocephala.
Habitat in Italia *et* Saxonia.

cordiger. 25. Cr. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 235. *n.* 7. Cryptocephalus niger.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 91. *Fn. ſuec.* 558. Chryſomela cordigera.
Uddm. diſſ. 23. Chryſomela nigra, elytris ſubflavis, punctis quatuor nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 330. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 1.
Habitat in Europae *coryló, ſalice, thoracis macula mediâ interdum cordata.*

bothnicus. 26. Cr. ater, thorace linea longitudinali rubra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 90. *Fn. ſuec.* 557. Chryſomela bothnica.
Degeer inſ. 5. *p.* 335. *n.* 39. Chryſomela cylindrica nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 164. *n.* 21. *t.* 44. *f.* 8. n. o.
Habitat in Suecia, *cum decempunctato copula interdum connexus.*

vitis. 27. Cr. niger glaber, elytris rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 233. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 27.
Habitat in Europae *magis auſtralis vite vinifera, quam miſere aliquando devaſtat.*

coryli. 28. Cr. niger, thorace elytrisque teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 28.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 88. *Fn. ſuec.* 555.* Chryſomela coryli.
Habitat in Europae *corylo.*

pallens. 29. Cr. niger, thorace, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 81. *n.* 29.
Habitat in Sina, *Cr. coryli proxime affinis.*

variegatus. 30. Cr. niger, thorace linea dorſali abbreviata marginibusque rubris, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 31.
Habitat in Italia, *ſtatura cr. coryli.*

31. Cr.

trifasciatus. 31. Cr. supra testaceus, thorace fascia, elytris tribus atris.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 81. *n.* 31.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine cr. coryli.*

ruficollis. 32. Cr. niger, thorace rufo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 32.
Habitat in insula S. Helenae.

nigripes. 33. Cr. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 33.
Habitat in America *boreali.*

sexpunctatus. 34. Cr. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 34.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 92. *Fn. suec.* 559.* Chrysomela sexpunctata.
Degeer inf. 5. *p.* 331. *n.* 34. *t.* 10. *f.* 9. Chrysomela rubra &c.
Scop. ent. carn. 208. Buprestis sexpunctata.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 18.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 1-3.
Habitat in Europae *borealis corylo, etiam in* Calabria.

caeruleus. 35. Cr. cyaneus nitidus, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 35.
Habitat in Africa *aequinoctiali, oblongus.*

cupreus. 36. Cr. rubro-cupreus nitidus subtus cyaneus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *calcarati statura et magnitudine.*

rubrifrons. 37. Cr. cyaneus nitidus, fronte, thoracis fascia, femoribusque rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 37.
Habitat - - - - *statura calcarati.* Leske.

calcaratus. 38. Cr. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 38.
Habitat in Sierra Leon Africae.

sapphirinus. 39. Cr. cyaneus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 39.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 197. *n.* 4. Melolontha caerulea, thorace pedibusque ferrugineis.
Habitat in Gallia.

40. Cr.

cinctus. 40. Cr. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 82. *n.* 40.
Habitat in America *meridionali*, *sapphirini statura*, *sed triplo minor.*

bucephalus. 41. Cr. cyaneus, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 82. *n.* 41.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 276. Chrysomela bucephala.
Habitat in Saxoniae *anthyllide vulneraria.*

collaris. 42. Cr. cyaneus nitidus, thoracis lateribus, elytrorum apicibus femoribusque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 42.
Habitat in Sibiria, *fericeo major.*

fericeus. 43. Cr. viridi-caeruleus antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 43.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 233. *n.* 3. Cryptocephalus viridi-auratus fericeus.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 86. *Fn. suec.* 554. Chrysomela fericea.
Degeer inf. 5. *p.* 334. *n.* 37.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 13.
Habitat in Europae *salicibus*, *varius tota aenea.*

nitens. 44. Cr. viridis nitens, ore pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 44.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 84. *Fn. suec.* 551. Chrysomela nitens.
Degeer inf. 5. *p.* 334. *n.* 38.
Habitat in Europae *salicis.*

glabratus. 45. Cr. violaceus, thorace elytrisque aeneis, antennis fuscis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 144. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 45.
Habitat in Brasilia.

leuadrum. 46. Cr. ater, elytris flavis: vitta media abbreviata atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 46.
Habitat in Germania.

vittatus. 47. Cr. niger, elytris margine striaque abbreviata flava. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 47.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 233. *n.* 4.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 62. *n.* 10. *t.* 23. *f.* 23.
Habitat in Europae *magis australis graminosis.*

48. Cr.

limbatus. 48. Cr. ferrugineus, thorace rufo, elytrorum futuris cyaneo-nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 498. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 48.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

Moraei. 49. Cr. ater, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 49.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 234. *n.* 5. Cryptocephalus niger &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 82. *Fn. ſuec.* 550. Chryſomela Moraei.
Scop. ent. carn. 202. Bupreſtis Moraei.
Uddm. diſſ. 28. Caſſida nigra nitida, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem et baſin elytrorum lutea.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Europae *hypericonibus.*

octoguttatus. 50. Cr. ater, elytris maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 50.
Habitat in Saxoniae *fraxino*, *magnitudine cr. Moraei.*

15guttatus. 51. Cr. rufus, thorace maculis tribus, elytris ſex flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 51.
Habitat in Braſilia.

decempunctatus. 52. Cr. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis: punctis decem nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 52. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *t.* 45. *f.* 4. a. b.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 93. *Fn. ſuec.* 561. Chryſomela decemmaculata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 64. *n.* 18. *t.* 43. *f.* 26. c. Cryptocephalus hieroglyphicus?
Habitat in Europa.

bipuſtulatus. 53. Cr. ater, elytris macula apicis rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 53.
Laicharr. inſ. tir. 1. *p.* 197. *n.* 7. Cryptocephalus Podae.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 7.
Habitat in Europae *chryſanthemo coronario.*

bifaſciatus. 54. Cr. rufus, thorace maculis duabus, elytris faſciis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 54.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

quadripustulatus. 55. Cr. niger, elytris laevibus rufo bimaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 55.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 80. *Fn. suec.* 549.* Chrysomela quadripustulata.
Habitat in Sueciae *nemoribus.*

notatus. 56. Cr. niger, elytris punctato-striatis: fascia punctoque apicis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 56.
Habitat in America, *parva, immaculata.*

Histrio. 57. Cr. niger, thorace elytrisque ferrugineo-variegatis, pedibus ferrugineis: geniculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 57.
Habitat in Italia, *magnitudine Cr. Scopolii.*

Scopolii. 58. Cr. niger, thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus cyaneis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 58.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 81. Chrysomela Scopolina.
Habitat in Europa *australi et* America, *mediae magnitudinis.*

Koenigii. 59. Cr. rufus, elytris punctis duobus caeruleſcentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 59.
Habitat Tranquebariae, *ad Cr. Scopolii proxime accedens.*

Paracenthesis. 60. Cr. elytris flavis: lineola punctisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 60.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 1. Chrysomela Paracenthesis.
Habitat in Europae *salice, betula, supra flavus, thorace nigro variegato.*

hordei. 61. Cr. aeneus nitidus, fronte cuprea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 61.
Habitat in Barbariae *hordeo marino, parvus, antennis serratis.*

pini. 62. Cr. testaceus, elytris pallidis, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 62.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 89. *Fn. suec.* 556.* Chrysomela pini.
Habitat in Sueciae *pino.*

reticulatus. 63. Cr. thorace elytrisque albis, testaceo reticulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 63.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

64. Cr.

pusillus. 64. Cr. thoracе fulvo, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 64.
Habitat Hamburgi.

nitidulus. 65. Cr. thoracе aeneo nitido, elytris cyaneis, capite, antennarum basi pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 65.
Habitat in Russia *meridionali, labiato major.*

labiatus. 66. Cr. ater nitidus, ore, pedibus basique antennarum lutescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 65.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 87. *Fn. suec.* 553.* Chrysomela labiata.
Habitat in Europae *rosis.*

flavilabris. 67. Cr. obscure aeneus nitidus, ore lutescente, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 67.
Müll. prodr. zool. dan. n. 519.
Geoffr. inf. par. 1. *n.* 8.
Habitat in Saxoniae *betula, labiato affinis, at elytra striato-punctata.*
Larva *faccata.*

flavipes. 68. Cr. ater nitidus, capite pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 68.
Habitat in Italia, *labiato affinis, at quadruplo major.*

cyaneus. 69. Cr. ex fusco cyaneus, thoracе laevi marginato, antennis nigris.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 72. Chrysomela cyanea.
Habitat in America, *magnitudine chrysomelae graminis.*

bilineatus. 70. Cr. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 83. Chrysomela bilineata.
Habitat in Europa, *minutus.*

Barbareae. 71. Cr. antennis basi oreque ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 85. *Fn. suec.* 552.* Chrysomela barbareae.
Habitat in Eryſimi barbareae *floribus; an varietas labiati?*

glaucocephalus. 72. Cr. niger nitidus, capite pedibusque flavis, thoracе elytrisque anterius albo-marginatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 277. Chrysomela glaucocephala.

Habitat Halae, *rarior in betula, ſtatura et magnitudine cr.* Moraei.

biguttatus. 73. Cr. niger, capite, apicibus elytrorum pedibusque flavis.
Schranck enum. inſ. auſtr. n. 169?
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 278. Chryſomela biguttata.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 163. *n.* 20. *t.* 44. *f.* 6. i. k?
Habitat rarior Halae Saxonum, *magnitudine chryſomelae nemorum.*

Martinius. 74. Cr. caeruleus nitidus, elytris rubris.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 278. Chryſomela Martinia.
Habitat in Malabar, *ſtatura et magnitudine ad quadripunctatum accedens.*

caſſimilis. 75. Cr. ex caeruleo niger, capitis maculis duabus, pedibus anterioribus antennisque flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat Berolini, *labiato ſimilis, ſed major.*

ornatus. 76. Cr. niger, capitis macula biloba fulva, thoracis linea et margine flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 24.
Habitat - - - *labiato ſimilis, at major.*

peregrinus. 77. Cr. niger glaberrimus, capite, thorace elytrisque caeruleis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 63. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 25.
Habitat in India, 5 *lineas longus.*

laticlavius. 78. Cr. niger, capite, thorace elytrisque rufis, ſutura et margine elytrorum nigris, antennis ſerratis.
Forſt. nov. inſ. ſpec. p. 27. *n.* 27. Chryſomela laticlavia.
Habitat in America *ſeptentrionali, ſericei magnitudine.*

viridans. 79. Cr. viridis, elytris marginatis.
Lepech. it. 1. *p.* 312. *t.* 20. *f.* 6. Chryſomela obſcure viridis.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

octonotatus. 80. Cr. thorace elytrisque flavis: ſingulis punctis quatuor nigris.
Lepech. it. 2. *p.* 207. *t.* 11. *f.* 19. Chryſomela octopunctata.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

sexnotatus. 81. Cr. niger, thoracis margine rufo, elytrorum punctis duobus maculisque quatuor nigris.
Lepech. it. 2. *p.* 207. *t.* 10. *f.* 14. Chrysomela sexpunctata.
Habitat in Russia *australi.*

Mülleri. 82. Cr. niger villosus, elytris punctis duobus rubris.
Müll. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 511. Chrysomela bimaculata.
Habitat in Dania.

muscifor-mis. 83. Cr. viridi-caeruleus, thorace rubro: macula caerulea, tibiis ferrugineis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 197. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

Vibex. 84. Cr. niger, elytris rubris striatis: maculis quatuor limboque nigris.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 234. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in Gallia.

livens. 85. Cr. ex caeruleo violaceus punctato-striatus, antennarum basi maculaque oris pallida.
Müll. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 519. Cryptocephalus parvulus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 235. *n.* 8.
Habitat in Europa.

punctatus. 86. Cr. caeruleus sparsim punctatus, tibiis anterioribus ferrugineis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 236. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

parisinus. 87. Cr. niger striatus, pedibus rufis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

rufipes. 88. Cr. niger striatus, thorace pedibusque rufis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 236. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

fulvus. 89. Cr. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 237. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ferrugi-nosus. 90. Cr. niger nitidus antennis corpore duplo longioribus, elytris apice macula lutea.

Schranck Beytr. z. Naturg. p. 64. §. 7. Chryſomela ferrugata.
Poda muſ. Graec. p. 38. *ſp.* 9.
Habitat in Germania *ſuperiore.*

multicolor. 246. Cr. elytris flavis: faſciis duabus coccineis.
Hornſt Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 3. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 6. Chryſomela bifaſciata.
Habitat in Java, *magnitudine chryſomelae vulgatiſſimae, thorace rubro, abdominis apice nigro.*

ſumatranus. 247. Cr. elytris luteis: macula in medio caſtanea.
Hornſt. Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 4. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 4. Chryſomela bimaculata.
Habitat in Sumatra, *rarior in* Java, *magnitudine chryſomelae vulgatiſſimae.*

coffeae. 248. Cr. thoracis ſulco transverſo, abdomine viridi, elytris flaveſcentibus. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat in Bantam *in hortis, in quibus coffea colitur, hujus orillos magnitudine, facie, colore referens.*

orientalis. 249. Cr. flavus, thorace rufo: ſulco transverſo, elytris nigro caeruleis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Malacca, Java, *aliisque* oceani indici *inſulis, cr. phallandrii magnitudine.*

batavienſis. 250. Cr. capite, thorace, elytris pedibusque lividis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 6. *n.* 7. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in Java, *magnitudine chr. nympheae; an hujus generis et tribus?*

javanus. 251. Cr. ater, thorace elytrisque rubris nigro-maculatis, antennis nigris baſi rufeſcentibus.
Hornſt. Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 7. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 2. 5. 8. 11. Chryſomela cryptocephala.
Habitat in Java, 4*punctati magnitudine et facie; an idem cum* 10*maculato?*

cyanocephalus. 252. Cr. capite, thoracis margine, elytris femorum baſi et apice violaceis, vertice et thorace coccineis. *Muſ. Leſk. p.* 15. *n.* 298. b.
Habitat extra Europam.

253. Cr.

flavifrons. 253. Cr. ater nitidus, fronte, ore, pedibus, antennarum baſi elytrorumque margine luteſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 306.
Habitat in Europa.

fuſcatus. 254. Cr. fuſcus, capite thorace elytrisque violaceis: his profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 310.
Habitat in Europa.

ochrocephalus. 255. Cr. niger, capite anterius, elytrisque flavis: his guttis quatuor punctoque apicis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 312.
Habitat in Europa, *thorace flavo, maculis utrinque* 2 *connatis.*

ſuturalis. 256. Cr. ater glaber, elytris flavis: ſutura vittaque atra apico connata. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 314.
Habitat in Europa.

chryſopus. 257. Cr. ater glaber, elytris punctato-ſtriatis, capite, elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 315.
Habitat in Europa.

†† *labio bifido, oblongi,* Ciſtelae.

Gigas. 91. Cr. villoſus fuſcus, elytris, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 1.
Habitat in Gallia *magis auſtrali, praegrandis.*

cervinus. 92. Cr. lividus, pedibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. ſuec.* 575. Chryſomela cervina.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria.

cinereus. 93. Cr. lividus, elytris pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 3.
Habitat in Italia, *cervino proxime affinis, an varietas?*

lividus. 94. Cr. lividus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 4.
Habitat in terra del fuego, *cinereo affinis, at duplo minor.*

ceramboides. 95. Cr. ater, thorace anterius anguſtato, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 576. Chryſomela ceramboides.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 354. *n.* 3. Mordella nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 27.
Habitat in Europa *boreali, et* Calabria, *thorace rarius teſtaceo.*

rufitarſis. 96. Cr. ater, thorace quadrato, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 6. *Lesk. it.* 1. *p.* 15. *n.* 5. *t.* A. *f.* 4.
Habitat in Europae *magis auſtralis ſpicis ſecalinis, ceramboidi affinis.*

teſtaceus. 97. Cr. niger, thorace, elytris et abdomine teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 7.
Habitat in chryſanthemo, ſambuco, aliisque Barbariae *plantis, polyphaga.*

ſulphureus. 98. Cr. flavus, elytris ſulphureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 114. Chryſomela ſulphurea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 351. *n.* 11. Tenebrio luteus.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 28.
Habitat in Europae *umbellatarum floribus.*

rubricollis. 99. Cr. ater, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 9.
Habitat in Europae *ſantolina, ſtatura et magnitudine ſulphureae.*

caeruleſcens. 100. Cr. ater, elytris ſtriatis caeruleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 10.
Habitat in Barbariae *plantis, rubricollis ſtatura et magnitudine.*

analis. 101. Cr. ruſeſcens, antennis, macula elytrorum anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 11.
Habitat Tranquebariae, *macula elytrorum interdum duplici.*

varians. 102. Cr. teſtaceus, oculis nigris, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 12.
Habitat Halae Saxonum, *murinae proxime affinis, at paulo major, antennis pedibusque interdum teſtaceis.*

murinus. 103. Cr. niger, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 118. *Fn. ſuec.* 577. Chryſomela murina.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 355. *n.* 4. Mordella nigra &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 29.
Habitat in Europa *boreali.*

humeralis. 104. Cr. niger, elytris puncto baſeos ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 141.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

Morio. 105. Cr. niger obſcurus, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 15.
Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, anguſtus, villoſus.*

anguſtatus. 106. Cr. thorace elytrisque obſcure ruſis medio nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 16.
Habitat in Anglia, *murini ſtatura, ſed anguſtior.*

pallidus. 107. Cr. pallidus, capite elytrorumque apicibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

aerugineus. 108. Cr. flavus, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 18.
Habitat in Africae *plantis.*

feſtivus. 109. Cr. ferrugineus, elytris cyaneo-viridibus: margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

aulicus. 110. Cr. ater, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

innubus. 111. Cr. niger, thorace rufo, elytris nigris: margine vittaque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 21.
Habitat in America.

americanus. 112. Cr. thorace flavo, elytris pallidis: vitta media nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 22.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

quinquevittatus. 113. Cr. teſtaceus, elytrorumque marginibus vittaque media nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 23.
Habitat in America *boreali.*

hirtus. 114. Cr. hirtus, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 24. *Habitat ad* caput bonae ſpei, *ad lagrias accedens.*

ſexlineatus. 115. Cr. ferrugineus, elytris flavis: lineolis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 25. *Habitat* - - -

minutus. 116. Cr. niger, elytris pubeſcentibus pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 26. *Syſt. nat* XII. 2. *p.* 593. *n.* 50. *Fn. ſuec.* 533.* Chryſomela minuta. *Habitat in* Europae *plantis aquaticis, dytici facie.*

lepturoides. 117. Cr. obſcure aeneus, antennis plantisque ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 30. *n.* 30. *Habitat in* Noveboraco, *leptura melanura major.*

alpinus. 118. Cr. niger nitens, elytris caſtaneis rugoſis: ſutura nigra. *v. Moll naturh. Br. üb. Oeſtr. &c. vol.* 1. *p.* 49. *Habitat in* alpibus Salzburgicis.

Luperus. 119. Cr. niger, elytris virenti nitentibus, pedibus antennarumque longarum articulo primo fulvis, ultimo palporum praegrandi cordato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 30. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 15. *Schaeff. elem. t.* 80. *Habitat in* Germania, *an hujus tribus?*

betulae. 120. Cr. niger, thorace ſuborbiculato piloſo, elytris fuſcescentibus obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 31. *Habitat* Berolini, 5 *fere lineas longus.*

reppenſis. 121. Cr. niger, thorace anterius anguſtato, poſterius dilatato, elytris laevibus pedibusque fulcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 32. *Habitat rarior in* Marchia, 2 *circiter lineas longus.*

ſtrigoſus. 122. Cr. rubeſcens, abdomine nigro, fronte dua[illegible], thorace tribus, elytrisque quatuor faſciis nigris. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 16. *Habitat* - - - *an hujus tribus?*

Forſteri. 240. Cr. ſubvilloſus fuſcus, faſciis longitudinalibus nigricantibus interruptis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 12. *n.* 12. Ciſtela faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 116. *t.* 1. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 3.
Habitat in Europae *arena, obovatus, chryſomelae politae magnitudine.*

puſtulatus. 241. Cr. niger ovatus, macula elytrorum rufa undata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 116. *n.* 2.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 13. *n.* 13.
Habitat in Europae *arena, magnitudine chryſomelae faſtuoſae.*

denigratus. 242. Cr. totus niger nitens glaber.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 14. *n.* 14. Ciſtela nigra.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3.
Habitat in Europae *arena, puſtulato minor.*

quadrifaſciatus. 243. Cr. obovatus niger, elytris ſtriatis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 15. *n.* 15. Ciſtela ſtriata.
Habitat in Angliae *arena, ſtatura et magnitudine cr.* Forſteri.

holoſericeus. 244. Cr. ovatus, fuſco-viridis, elytrorum faſciis longitudinalibus interruptis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 16. *n.* 16.
Habitat in Europae *arena, magnitudine denigrati.*

capucinus. 258. Cr. ferrugineus, capite, thorace elytrisque fuſcis: his crenato-ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 335.
Habitat in Europa.

conſperſus. 259. Cr. ſupra polline luteo, ſubtus argenteo conſperſus, antennis fuſcis, pedibus fuſco ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 337.
Habitat in Europa, *curculionis facie.*

ſulphuratus. 260. Cr. fuſcus, antennis elytris pedibusque ſulphureis, plantis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 338.
Habitat in Europa, *ſtatura ſulphurei, an varietas?*

truncatus. 261. Cr. fuſcus, elytris laevibus, antennis pedibusque flavo-rufeſcentibus, thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 339.
Habitat in Europa.

262. Cr.

brunneus. 262. Cr. brunneus, abdomine fusco, elytris laevibus. *Mus. Lesk. p.* 17. *n.* 340.
Habitat in Europa.

rufitarsis. 268. Cr. oblongus, corpore capite antennis pedibusque nigro-aeneis pilosis, elytris testaceis punctatis, tarsis rufis. *Lesk. it. p.* 15. *t.* A. *f.* 4.
Habitat in Lusatiae monte Keulenberg.

†† *maxilla bifida, oblongi*, Criocerides.

trilobus. 123. Cr. capite thoraceque flavescentibus nigro-maculatis, elytris griseis, corpore nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus niger.*

Lineola. 124. Cr. griseus, thorace linea dorsali, elytris puncto baseos nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 2.
Habitat in Italia, *statura Cr. nymphaeae.*

nymphaeae. 125. Cr. fuscus, elytrorum margine prominulo flavescente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 99. *Fn. suec.* 565. Chrysomela nymphaeae.
Degeer inf. 5. *p.* 326. *n.* 31. *t.* 20. *f.* 1. 2. Chrysomela orata nigro-fusca.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 254. *n.* 4. Galleruca pallida &c.
Habitat in Europae *nymphaeis, tardus.*

capreae. 126. Cr. thorace nigro-maculato elytrisque griseis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 4.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 100. *Fn. suec.* 516. Chrysomela capreae.
Degeer inf. 5. *p.* 325. *n.* 30. Chrysomela grisea alni.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 254. *n.* 5. Galleruca nigra &c.
Fn. suec 1. *n.* 424. Chrysomela nigra, thorace elytrisque griseis.
Habitat in Europae *salicibus.*

atratus. 127. Cr. pallidus, elytrorum omni margine atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 5.
Habitat Tranquebariae.

pallia-tus. 128. Cr. luteus, elytris nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 6. *Schall. Abh. hall. Nat. Ges.* 1. *p.* 279. Chrysomela oblonga lutea, oculis elytrisque nigris.
Habitat Tranquebariae.

129. Cr.

calmarienſis. 129. Cr. ovatus cinereus, elytris vitta lineolaque baſeos nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 150. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 101. Chryſomela calmarienſis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 253. *n.* 3. Galleruca pallida &c.
Habitat in Europae *ſalice*, *alno.*

abdominalis. 130. Cr. flavus, antennis abdomineque fuſcis, ano flavo. *Fabr.*
ſp. inſ. 1. *p.* 151. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8.
Habitat in India, *et ad* caput bonae ſpei.

capenſis. 131. Cr. niger, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151.
n. 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *minor*, *opacus.*

ſanguineus. 132. Cr. ovatus rufus, antennis oculisque nigris. *Fabr. ſp.*
inſ. 1. *p.* 151. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *pedibus utplurimum cinereis.*

tenellus. 133. Cr. ferrugineus, thorace elytrorumque margine flavis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 151. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 102. *Fn. ſuec.* 564. Chryſomela
tenella.
Habitat in Europae *ſalice.*

pictus. 134. Cr. fuſcus, capite thoraceque flavis nigro - maculatis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 87. *n.* 12.
Habitat in India, *tenelli ſtatura.*

halenſis. 135. Cr. flaveſcens, capitis baſi elytrisque aeneis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 589. *n.* 20. Chryſomela halenſis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 164. *n.* 15. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Germania *chryſomela polygoni major.*

bituberculatus. 136. Cr. fulvus, elytris pallidis: margine omni fulvo. *Fabr.*
ſp. inſ. 1. *p.* 151. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *ſtatura melanocephali.*

bidentatus. 137. Cr. flavus, elytris nigris apice flaveſcentibus. *Fabr. ſp.*
inſ. 1. *p.* 151. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 15.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *ſtatura bituberculati.*

melanocephalus. 138. Cr. rufus, capite nigro, elytris violaceis. *Fabr. ſp. inſ.*
1. *p.* 152. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

139. Cr.

cantharoides. 139. Cr. violaceus, capite, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 17.
Habitat in Anglia, *ſtatura cr. nymphaeae.*

melanogaſter. 140. Cr. pallidus, elytrorum maculis duabus abdomineque atris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 18. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf.* 4. *p.* 66. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 33. Crioceris quadrimaculata.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Germania.

pygmaeus. 141. Cr. rufus, capite abdomineque atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *minutus.*

indicus. 142. Cr. niger, capite, thorace, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 20.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

exilis. 143. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis immaculatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

erythrocephalus. 144. Cr. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura exilis.*

ſiamenſis. 145. Cr. niger, elytris maculis duabus teſtaceis, thorace cylindrico. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 23.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at duplo major.*

impreſſus. 146. Cr. ater elytris rubris, thorace cylindrico utrinque ſubimpreſſo. *Fabr. mant. inf* 1. *p.* 88. *n.* 24.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at paulo major.*

merdiger. 147. Cr. ſupra ruber, thorace cylindrico utrinque impreſſo. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 25. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 599. *n.* 97. *Fn. ſuec.* 563. Chryſomela merdigera.
Degeer inſ. 5. *p.* 338. *n.* 43. Chryſomela rubra liliorum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 239. *n.* 1. Crioceris rubra.
Scop. ent. carn. 112. Attelabus lilii.
Blank. inſ. 91. *t.* 11. *f.* 1.
Valiſn. nat. 1. *p.* 265. *t.* 32.
Merian. inſ. eur. 3. *t.* 21.
Reaum. inſ. 3. *t.* 17. *f.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 14.

Schaeff.

Schaeff. elem. t. 52. *f.* 1.
icon. t. 4. *f.* 4.
Habitat in convallaria majali, liliis, *etiam* Calabriae.

12punctatus. 148. Cr. ruber thorace cylindrico, elytris punctis sex nigris.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 153. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 26.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 110. *Fn. suec.* 568. Chrysomela 12punctata.
Scop. ent. carn. 114. Attelabus 12punctatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 241. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Crioceris rubra, punctis 13 nigris.
Frisch inf. 13. *t.* 28.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 5.
Habitat in asperago, *frequens.*

14punctatus. 149. Cr. thorace cylindrico fusco: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis septem. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 27.
Scop. ent. carn. 116. Attelabus 14punctatus.
Habitat in Germania *magis australi.*

cayennensis. 150. Cr. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: fasciis duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

fucatus. 245. Cr. cyaneus, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in insula S. Barthomaei.

quinquenotatus. 151. Cr. niger, thorace rufo, coleoptris flavescentibus: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 29.
Habitat in Germania *superiori, statura cayennensis.*

ebraeus. 152. Cr. flavescens, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *pedibus albis.*

australis. 153. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fasciis duabus albis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 153. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

unifasciatus. 154. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fascia atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 32.
Habitat in nova Hollandia, *an varietas australis?*

155. Cr.

novae Hollandiae. 155. Cr. flavus, thorace cylindrico, antennis, pectore pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 33.
Habitat in nova Hollandia.

griſeus. 156. Cr. pallidus, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiiſque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 34.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

oculatus. 157. Cr. flavus, thorace cylindrico, elytris baſi nigris: puncto flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 35.
Habitat in nova Hollandia.

biocula-tus. 158. Cr. teſtaceus, thorace immaculato, elytris maculis duabus occllaribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 36.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura oculati.*

nigricor-nis. 159. Cr. pallidus, thorace ſubcylindrico, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 37.
Habitat - - - - *oculato paulo minor.*

nitidus. 160. Cr. viridi-aeneus nitidus, elytris teſtaceis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 38.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Cyanella. 161. Cr. caeruleus, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 39
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 104. *Fn. ſuec.* 572. Chryſomela cyanella.
Degeer inſ. 5. *p.* 340. *n.* 44. Chryſomela caeruleo-violcea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. *n.* 5. Crioceris tota caeruleo viridis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 67. *n.* 10. *t.* 23. *f.* 34.
Habitat in Europae *plantis.*

melano-pus. 162. Cr. caeruleus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 40.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 105. *Fn. ſuec.* 573. Chryſomela melanopa.
Degeer inſ. 5. *p.* 342. *n.* 46.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 19.
Habitat in Europa, *in* Calabriae quercu.

163. Cr.

ochropus. 163. Cr. niger, thorace pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 41.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 106. Chryſomela flavipes.
Habitat in Germania, *frequens*, *melanopodi affinis.*

ſubſpinoſus. 164. Cr. niger, capite, thorace ſubſpinoſo, pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 42.
Habitat in Anglia, *ſtatura ochropodis.*

ſaxonicus. 165. Cr. ater nitidus, antennarum baſi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 43.
Habitat in Saxoniae *fruticibus*, *melanopode paulo major.*

cyanocephalus. 166. Cr. cyaneus, thorace rufo, antennis pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 44.
Habitat in nova Hollandia.

aſparagi. 167. Cr. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 45.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 112. *Fn. ſuec.* 567. Chryſomela aſparagi.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 241. *n.* 3. Crioceris thorace rubro &c.
Scop. ent. carn. 113. Attelabus aſparagi.
Friſch inſ. 1. *p.* 27. *t.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *t.* 4.
Schaff. ic. t. 52. *f.* 9. 10.
β) Cr. elytrorum maculis duabus baſi connatis.
γ) Cr. elytrorum faſciis duabus anguſtis rubris.
Habitat in Europa, *aſparagos depaſcens*, β) *in* Italia, γ) *in* Gallia.

phellandrii. 168. Cr. niger, thoracis margine, elytrorumque lineis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 46.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 14. *Fn. ſuec.* 569. Chryſomela phellandrii.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 266. *n.* 20. Chryſomela oblonga nigra.
Degeer inſ. 5. *p.* 324. *n.* 28. *t.* 9. *f.* 34. Chryſomela oblonga nigro-aenea.
Habitat ad phellandrii aquatici *radices.*

campeſtris. 169. Cr. nigro-caeruleſcens, thoracis limbo nigro, elytris punctis tribus poſterius margine flavo connexis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 47.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 113. Chryſomela campeſtris. *Valiſn. op.* 1. *t.* 7. Cancarella aſparagi.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtatura et magnitudine cr. aſparagi.*

longus. 170. Cr. elongatus niger, elytris vitta flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 48.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magis elongatus, quam reliqui hujus tribus.*

trilineatus. 171. Cr. pallidus, thorace maculis tribus, elytris ſtriis abbreviatis tribus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 49.
Habitat ad caput bonae ſpei.

equeſtris. 172. Cr. capite thoraceque teſtaceis, elytris brunneis: margine, lineola baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 50.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

ſtolatus. 173. Cr. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 51.
Habitat in Carolina, *pedibus flaveſcentibus: geniculis nigris.*

cratae-gi. 174. Cr. ruber, elytrorum linea longitudinali punctoque nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 28. *n.* 28.
Habitat in Angliae *crataego oxyacantha, ſubtus niger, ſtatura et magnitudine cr. nymphaeae.*

trifuſcatus. 175. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis, elytris margine et ſutura, furca tridente, punctisque octo nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine et habitu ochropodis.*

parvus. 176. Cr. fuſcus, capite bimaculato, antennarum baſi fulva. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 66. *n.* 4.
Habitat Berolini, *cupreo dimidio minor.*

palleſcens. 177. Cr. pallidus, capite nigro, antennis flaveſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 66. *n.* 5.
Habitat Berolini, *cr. nymphaeae paulo major.*

erythropus. 178. Cr. totus ruber, femoribus ſolis ad finem nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 67. *n.* 8.
Habitat Berolini, *merdigero proxime affinis.*

179. Cr.

berolinenſis. 179. Cr. capite et thorace coccineis glaberrimis, elytris granulatis oculisque nigris, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 67. *n.* 12.
Habitat Berolini, *melanopode duplo minor.*

ochraceus. 180. Cr. ochraceus, thoracis puncto et abdomine nigris, ano fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 16. *t.* 44. *f.* 9. p. 9.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

fulvipes. 181. Cr. ater nitens, antennarum baſi pedibusque ſupra fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 17.
Habitat in Auſtria, 2 *lineas longus.*

triſtis. 182. Cr. niger, elytris caeruleis punctato-ſtriatis, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 18.
Habitat in Auſtria, *cyanellae ſimilis, ſed minor, ſeſquilineam longus.*

nigricans. 183. Cr. niger, thorace pedibusque rubris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 231. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Luperus niger.
Habitat in Gallia.

erytromelas. 184. Cr. niger, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 231. *n.* 2. Luperus rufipes.
Habitat in Gallia.

aeruginoſus. 185. Cr. pallidus, capite et pectore nigris, elytris viridibus politis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 84. *n.* 913. Luperus aeruginoſus.
Habitat in Dania.

aquaticus. 186. Cr. niger, thorace maculato, elytrorum margine ſuturaque lata, pedibusque flavis.
Müll. zool. dan. prodr. p 83. *n.* 908.
Habitat in Daniae *aquis; an hujus tribus?*

veris. 187. Cr. niger, thorace cupreo, elytris viridibus, pedibus rufis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 83. *n.* 910. Galleruca veris.
Habitat in Dania, *vere conſpicuus.*

ſtriatus. 188. Cr. ater, capite ſupra, elytris et abdomine apice albidis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 85. *n.* 940. Crioceris ſtriata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 307. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 2. Anthribus &c.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 6.
Habitat in Europa.

rufficus. 189. Cr. viridis, elytris flavis, pedibus anterioribus longioribus.
Lepech. it. 1. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 10. Chryſomela longipes.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

luſitanicus. 190. Cr. teſtaceus, capite, pectore pedibusque nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 2. Chryſomela luſitanica.
Habitat in Luſitania, *habitu tridentati.*

tricolor. 263. Cr. nigra, thorace cylindrico ad latera gibbo capite elytrorum futura marginibusque ferrugineis, elytris teſtaceis, pedibus antennis palpisque flavo-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk.* *p.* 17. *n.* 354.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 264. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo luteo-rufeſcente, capite rufo poſterius nigro, elytris polline rufo, abdomine argenteo conſperſis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 3. 55.
Habitat in Europa.

gibbus. 265. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo, capite, thorace pedibusque flavo-rufeſcentibus, elytris nigris profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 356.
Habitat in Europa.

fuliginoſus. 266. Cr. niger, thorace pedibusque rufis, elytris laeviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 357.
Habitat in Europa.

ochropus. 267. Cr. niger, elytris fuſcis, thorace antennarum baſi pedibusque flavis, femoribus baſi fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 358.
Habitat in Europa.

** *palpis inaequalibus, anterioribus ſecuriformibus.*

† *labio corneo*, Erotyli.

giganteus. 191. Cr. ovatus niger, coleoptris punctis fulvis numeroſiſſimis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 157. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 1. Chryſomela gigantea.
Degeer inſ. 5. *p.* 349. *t.* 16. *f.* 8. Chryſomela oblonga nigra &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 8. *et f.* 15. Coccinella gigantea.
Habitat in India.

192. Cr.

cancellatus. 192. Cr. ater, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 2.
Habitat in Braſila, *magnus, fere globoſus.*

Hiſtrio. 193. Cr. ater, elytris nigro flavoque faſciatis: macula baſeos apicisque coccinea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

lugubris. 194. Cr. teſtaceus, antennis tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 4.
Habitat in America.

gibboſus. 195. Cr. niger, elytris flaveſcentibus nigro-punctatis: faſcia media et poſteriore nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 2. *Amoen. ac.* 6. *p.* 393. *n.* 13. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 8? *mant. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 10? Chryſomela gibboſa.
Gron. zooph. 606. *t.* 14. *f.* 5. Coccinella.
Habitat in America *meridionali.*

puſtulatus. 196. Cr. ater elytris faſciis quinque punctorum fulvorum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 498. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 6.
Habitat - - - *giganteo affinis, ſed non gibboſus.*

concatenatus. 197. ater, elytris flavo nigroque reticulatis: faſciis duabus atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 7.
Habitat --- *magnus.*

quinquepunctatus. 198. Cr. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 3. Chryſomela quinquepunctata.
Gron. zooph. 613. *t.* 16. *f.* 7. Coccinella coleoptris nigris punctato-impreſſis: maculis decem rubris.
Habitat in America.

punctatiſſimus. 199. Cr. niger, elytris flavis: punctis numeroſiſſimis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 9.
Habitat in America.

varius. 200. Cr. ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 10.
Habitat Surinami, *ſtatura punctatiſſimi, at minor, thorace atro, punctis quaſi cicatricibus notato.*

macrocheiros. 201. Cr. ater, elytris fasciis atris flavisque undatis alternis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 11.
Habitat in India, *variegato affinis, at paulo major.*

fasciatus. 202. Cr. ater, elytris fasciis tribus flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 12.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

Zebra. 203. Cr. flavescens, capite, thoracis basi, fasciis tribus elytrorum pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *reliquis hujus tribus minor, capite atro.*

immaculatus. 204. Cr. ater immaculatus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 14.
Habitat in nova Hollandia.

venereus. 205. Cr. ater, thorace elytrisque cupreis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia.

nebulosus. 206. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 16.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis*, *mediae magnitudinis.*

dilatatus. 207. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae spei.

smaragdulus. 208. Cr. ater, elytris striatis viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

amethystinus. 209. Cr. ater, thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

bicolor. 210. Cr. ater, supra aeneus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 20.
Habitat in nova Hollandia.

kilonicnsis. 211. Cr. niger, pedibus piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 21.
Habitat Kilonii.

212. Cr.

jamaicensis. 212. Cr. viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 22.
Habitat in Jamaica, *antennis elongatis, ore piceo.*

cichorei. 213. Cr. ore porrecto, rostro depresso elongato oblongo. *Hasselq. it. p.* 449. *n.* 101.
Habitat in Orientis *cichoreo, medius quasi inter cryptocephalos, dermestes, curculiones, cantharides; an ex hac tribu?*

†† *labio membranaceo*, Lagriae.

aeneus. 214. Cr. obscure aeneus immaculatus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 1.
Habitat in Americae *meridionali oppositis insulis.*

tahitiensis. 215. Cr. lividus, oculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 2.
Habitat in insula Tahiti.

pacificus. 216. Cr. lividus, thorace lineis, elytris vitta fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia.

fuscicornis. 217. Cr. cyaneus, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

meridionalis. 218. Cr. rufus, elytris fuscis: marginibus lineaque media rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali, eleganti affinis, at duplo major.*

elegans. 219. Cr. rufus, elytris vitta abdomineque apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

rufifrons. 220. Cr. cyaneus, capite thoraceque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 7.
Habitat in America *boreali.*

elongatus. 221. Cr. ater, thorace rufo villoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 8.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 603. *n.* 122. Chrysomela elongata.
Habitat in Europa, *praesertim* Anglia.

ambulans. 222. Cr. glaber ater, elytris punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 9.
Habitat in Germania, *elongato proxime affinis, at thorax ater.*

tuberculatus. 223. Cr. ovatus glaber ater, elytris tuberculatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 93. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *villoso major.*

villosus. 224. Cr. villosus ater, thorace elytrisque viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae spei, *hirto proxime affinis.*

pubescens. 225. Cr. niger, thorace marginato villoso, elytris glabris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 12.
Syst. nat XII. 2. *p.* 603. *n.* 120. Chrysomela pubescens.
Habitat in Germania, *hirto affinis.*

hirtus. 226. Cr. villosus niger, thorace tereti, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 13.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 119. *Fn. suec.* 578.* Chrysomela hirta.
Degeer inf. 5. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 23. 24. Tenebrio alatus villosus niger &c.
Habitat in Europae *saponariis.*

indus. 227 Cr. cyaneus, pedibus longitudine corporis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 603. *n.* 121. Chrysomela inda.
Habitat in India, *magnitudine scarabaei stercorarii.*

ventralis. 228. Cr. villosus cyaneus, elytris lineis elevatis tribus, abdomine rufo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 14.
Habitat in India, *tomentoso affinis.*

tomentosus. 229. Cr. villosus cyaneus, abdomine femoribusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia, *elytris rarius fuscis.*

glabratus. 230. Cr. glaber, thorace rufescente, elytris flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 16.
Habitat in Anglia.

scutellaris. 231. Cr. niger, cinereo-hirtus, scutello albo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 17.
Habitat in Hispania, *statura et magnitudine triticei.*

niger. 232. Cr. pilosus niger, elytris laeviusculis serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 19.

Syst.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 439. Dermeſtes niger.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis biloſa.

barbarus. 233. Cr. antennis ſerratis, hirtus, obſcure aeneus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 23.
Habitat in Barbariae *floribus compoſitis, dermeſti hirto affinis.*

antherinus. 234. Cr. niger, elytris faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 829. Meloë antherinus.
Syſt. nat. X. *p.* 418. *n.* 7. Tenebrio pedicularius.
Habitat frequens in floribus, agilis, curſitans, vix pediculo major.

floralis. 235. Cr. niger thorace ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 15. *Fn. ſuec.* 829? Meloë floralis.
Habitat in Europae *plantis.*

Marchiae. 236. Cr. niger villoſus, thorace cylindrico capitisque margine poſteriore rubris, elytris ſtriato punctatis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 68. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 35.
Habitat Berolini, 4 *lineas longus.*

++ *dubiae ſpecies.*

caraboides. 237. Cr. niger, elytris ſubcaeruleis, plantis ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. ſuec.* 574. Chryſomela caraboides.
Habitat in Europa.

punctulatus. 238. Cr. viridi-aeneus punctatiſſimus, pedibus ferrugineis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 108. *Amoen. ac.* 6. *p.* 394. *n.* 18. Chryſomela punctatiſſima.
Habitat Surinami.

lampyroides. 239. Cr. elytris ſubtomentoſis nigris: linea longitudinali margineque pallidis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 107. Chryſomela tomentoſa.
Habitat in Carolina, *cr. capreae affinis, facie lampyridis, lividus.*

2co. HISPA. *Antennae* cylindricae, baſi approximatae, inter oculos ſitae.
Palpi fuſiformes.
Thorax et *elytra* ſaepius aculeata.

atra. 1. H. corpore toto atro. *Schr. der berl. Naturf. Geſ.* 4. *t.* 7. *f.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 9. Hiſpa antennis fuſiformibus, thorace elytrisque ſpinoſis, corpore atro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243, *n.* 7. Crioceris atra ſpinis horrida.
Habitat in Europa *auſtrali et* Africa *boreali ad radices graminum.*

teſtacea. 2. H. corpore teſtaceo, antennis aculeisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 10.
Habitat in Barbaria, *atrae magnitudine; thorace ſpina ſextuplici armato.*

bihamata. 3. H. inermis nigra, rubro-maculata, elytris truncatis hamatis.
Habitat in India, *oblonga, depreſſa, cr. capreae magnitudini.*

mutica. 4. H. inermis, antennis piloſis.
Fn. ſuec. 413. Dermeſtes (clavicornis) niger, antennis clavatis piloſis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 7. Hiſpa antennis piloſis, nigra, elytris ſtriatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 47. *t.* 3. *f.* 1. Tenebrio hirticornis.
Habitat in Europae *quisquiliis, muſeis.*

ſanguinicollis. 5. H. inermis atra, thorace ſanguineo. *Mant.* 530.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 11. Hiſpa antennis fuſiformibus, thorace elytrorumque baſi ſanguineis, elytris ſerratis.
Habitat in America *meridionali.*

ſerrata. 6. H. antennis fuſiformibus, nigra, elytris rufeſcentibus apice ſerratis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 12.
Habitat Surinami, *ſtatura ſanguinicollis.*

piſipes. 7. H. antennis fuſiformibus, atra, elytris pedibusque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 8.
Habitat Halae Saxonum, *congeneribus longior.*

8. H.

cornuta. 8. H. tota atra, thorace anterius poſteriusque ſpinoſo, elytris porcatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in Suecia, *opatri ſabuloſi magnitudine, ſed anguſtior.*

ſcabra. 9. H. tota nigra, thorace alato elytrisque margine ſerrato-ciliatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Suecia, *ſilphae ferrugineae magnitudine.*
Huic et cornutae, et ſcabrae antennae fuſiformes.

capenſis. 10. H. picea hiſpida, thoracis ſpina palmata. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 66. *f.* 76.
Habitat ad caput bonae ſpei, *pediculi majoris magnitudine, colore nigro et piceo varians.*

angulata. 11. H. antennis fuſiformibus, flava, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque margine ſinuato nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna.

dentata. 12. H. antennis filiformibus, nigra, thoracis margine, elytrorum ſerratorum macula baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna.

caerulea. 13. H. antennis ſubſerratis caerulea hirta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 7.
Habitat in Germania.

bipuſtulata. 14. H. antennis ſerratis, atra hirta, elytris macula baſeos rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 6.
Habitat in Italia, *dermeſte hirto minor.*

cornigera. 15. H. antennis ſerratis, thorace rufo, elytris caeruleis, capite bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 5.
Habitat in Anglia, *an proprii generis.*

ſerraticornis. 16. H. fuſca, antennis ſerratis, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 5. *n.* 8. Ptinus ſerraticornis.
Habitat Upſaliae, *ptini mollis magnitudine.*

pectinicornis. 17. H. fuſca, antennis pectinatis, pedibus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 565. *n.* 1. Ptinus pectinicornis.
Fn. ſuec. 412. Dermeſtes pectinicornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 65. *n.* 2. Ptinus atro-fuſcus &c.
Suls. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 6.
Habitat in Europae *quisquiliis, coryli foliis.*

18. H.

bicornis. 18. H. antennis pectinatis, thorace elytrisque viridi-aeneis, capite bicorni. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 4.
Habitat in America *boreali, an hujus generis?*

flabellicornis. 19. H. nigra, antennis pectinatis, elytris striatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 2.
Schaeff. ic. t. 215. *f.* 3?
Habitat in Anglia.

mystacina. 20. H. antennis pectinatis, elytris striatis albo punctatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 1.
Drury inf. 3. *t.* 48. *f.* 7.
Habitat in nova Hollandia, *praegrandis.*

201. BRUCHUS. *Antennae* filiformes. *Palpi* aequales, filiformes. *Labium* acuminatum.

pisi. 1. Br. elytris nigris albo-maculatis, podice albo: punctis binis nigris. *Muf. Lud. Ulr.* 35. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 4.
Syst. nat. X. *p.* 356. Dermestes pisorum.
Amoen. ac. 3. *p.* 347. Curculio pisorum.
Kalm it. 2. *p.* 294. Bruchus Americae septentrionalis.
Degeer inf. 5. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 3. 4. Bruchus nigro-fuscus &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 267. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 9. Mylabris fusca cinereo-nebulosa &c.
Scop. ent. carn. 63. Laria salicis.
Ledermüll. micr. 195. *t.* 100.
Gron. zooph. 569.*
Habitat in America *septentrionali, nuperius quoque in* Europa *australi, pisorum agros devastans, pomonae etiam floribus infestus, devoratur a gracula quiscula.*

umbellatarum. 8. Br. squamosus supra griseus subtus cinereus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 3.
Habitat in Barbariae *ambulatis, magnus.*

Robiniae. 9. Br. griseo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 5.

Habitat

Habitat in Robiniae Pseudacaciae *ex* America *allatis seminibus, magnus.*

gibbosus. 10. Br. thorace gibboso cupreo, elytris nigris tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 6.
Habitat in America *boreali.*

scabrosus. 11. Br. niger, elytris rufis elevato-striatis: punctis nigris sparsis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 7. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 28. *n.* 1. *t.* 20. *f.* 15.
Habitat in Europae *potissimum aesculo.*

clathratus. 12. Br. totus niger, thorace albido-cancellato, elytrorum striis ex nigro et griseo variis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 158. *n.* 5.
Habitat Berolini, *scabrosi statura et magnitudine.*

Cacao. 13. Br. corpore fusco griseo-maculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 8.
Habitat in Theobromatis *seminibus.*

undatus. 14. Br. niger, elytris fuscis: strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 9.
Habitat in Africae *floribus, mediae magnitudinis.*

Theobromatis. 2. Br. elytris griseis nigro-maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 10.
Habitat in Theobromatis *seminibus, indicus, ex nigro canescens, br. pisi dimidio minor.*

marginalis. 15. Br. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 11.
Habitat in Germania.

canalis. 16. Br. subferrugineus, elytris apice atris, ano atro: linea media alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 12.
Habitat in India, *parvus.*

bipunctatus. 17. Br. cinereus, elytris fuscis: puncto baseos ocellari atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 13. *Sulz. hist. inf. t.* 4. *f.* 2.
Habitat in Helvetiae *plantis.*

18. Br.

varius. 18. Br. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis striatis, femoribus muticis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 14.
Habitat in Suecine *pinetis, statura bipunctati.*

Gleditschiae. 3. Br. elytris striatis longitudine abdominis, corpore piceo, antennis nigris.
Amoen. ac. 6. *p.* 392. *n.* 5. Dermestes Gleditsiae.
Habitat in Americae *septentrionalis Gleditsiae seminibus.*
Femora *mutica.*

spinosus. 19. Br. griseus, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 1.
Habitat in Jamaica.

Bactris. 4. Br. cinereus, elytris sublaevibus, femoribus posterioribus ovatis, tibiis incurvis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 392. *n.* 6. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 2.
Jacq. hist. stirp. amer. t. 170.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4. *p.* 28. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 16.
Habitat in Bactris, *palmae americanae, nucleis.*

rufipes. 20. Br. niger, elytris albo-punctatis, pedibus anterioribus rufis, posterioribus nigris unidentatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 29. *n.* 4.
Habitat in Pomerania, *granario proxime affinis, at minor, an varietas?*

granarius. 5. Br. elytris nigris: atomis albis, femoribus posterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 15.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 605. *n.* 5. Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, posticis dentatis.
Fn. suec. 628. Curculio atomarius.*
Habitat in Europae *plantarum seminibus.*

cisti. 21. Br. ater immaculatus, femoribus muticis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 12. *maut. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 16.
Habitat in cisti helianthemi *floribus frequens.*

abdominalis. 22. Br. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus anterioribus testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 17.
Habitat in India, *parvus.*

6. Br.

seminarius. 6. Br. ater, antennarum basi pedibusque anterioribus testaceis, femoribus muticis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 18.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 268. *n.* 3. Mylabris nigra, abdomine albo sericeo.
Habitat in Europae *floribus, pediculi magnitudine.*

maculatus. 23. Br. elytris punctatis testaceis nigro-maculatis, podice griseo: punctis binis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 14. 15. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 19.
Habitat in Americae *seminibus.*

mimosae .24. Br. testaceus immaculatus, elytris substriatis femoribus posterioribus acute dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 20.
Habitat in mimosae Americae *meridionalis seminibus, seminario paulo major.*

serraticornis. 25. Br. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griseo fusco maculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 21.
Habitat in Oriente.

pectinicornis. 7. Br. antennis pectinatis corpore ferrugineo, longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 22.
Syst. nat. X. *p.* 386. *n.* 79. Curculio chinensis.
Degeer inf. 5. *p.* 201. *n.* 2. Bruchus rufus.
Schaeff. elem. t. 86. *f.* 1.
Habitat in seminibus e Sina *allatis.*

PAUSUS. *Antennae* biarticulatae, clavatae; clava solida, uncinata.

microcephalus. 1. P. *Dall. diss. big. insect. sist. Upsal.* 1725. *Fuesslii arch. inf.* 3. *p.* 1. *t.* 13.
Habitat in America *septentrionali, totus niger, magnitudine dermestidis lardarii, capite minutissimo, thorace angusto: anterius margine transverso elevato, elytris abdomine posterius fere truncato paulo longioribus truncatis.*

ZYGIA. *Antennae* moniliformes.
Palpi inaequales, filiformes.
Labium elongatum, membranaceum.
Maxilla unidentata.

oblonga. 1. Z. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 1.
Habitat in Oriente, *oblonga, rufa, capite elytrisque obſcure cyaneis.*

ZONITIS. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor filiformes, maxilla integra breviores.
Labium emarginatum.

chryſomelina. 1. Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1.
Habitat in Oriente, Aegypto, *ſubtus atra, ano rufeſcente.*

flava. 2. Z. rufeſcens, elytris flavis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 2.
Habitat in Oriente.

APALUS. *Antennae* filiformes.
Palpi aequales, filiformes.
Maxilla cornea, unidentata.
Labium membranaceum, truncatum, integrum.

bimaculatus. 1. Ap. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1. *Syſt. nat.* 2. *p.* 680. *n.* 9. *Fn. ſuec.* 828. *Uddm. diſſ.* 82. Meloë (bimaculatus) alatus niger, elytris luteis macula nigra poſtica.
Degeer inſ. 5. *t.* 1. *f.* 18. Pyrochroa bimaculata.
Habitat primo vere in Sueciae *arenoſis.*

BREN-

BRENTUS. *Antennae* moniliformes, ultra medium roſtri exſertae.

Os roſtro porrecto, recto, cylindrico.

* *femoribus ſimplicibus.*

barbicornis. 1. Br. cylindricus, roſtro longiſſimo ſubtus barbato, elytris elongato-elevatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 59. Curculio barbicornis. *Habitat in* nova Seelandia.

aſſimilis. 2. Br. cylindricus, roſtro apice glabro atro, elytris ferrugineo-ſubfaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 60. Curculio aſſimilis. *Habitat in* nova Seelandia.

monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis uniſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 3. *Habitat in* nova Hollandia, *ſtatura barbicornis, at minor.*

ſemipunctatus. 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 4. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 61. Curculio ſemipunctatus. *Habitat in* nova Hollandia.

** *femoribus dentatis.*

Druryanus. 5. Br. aeneus, thorace tereti, antennis roſtro longioribus, elytris apice ſpinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 16. *n.* 3. *Drury inſ. t.* 42. *f.* 37. *Habitat* - - -

Anchorago. 6. Br. linearis, elytris flavo-ſtriatis, thorace elongato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 118. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 613. *n.* 56. *Muſ. Lud. Ulr.* 52. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 118. Curculio anchorago. *Degeer inſ.* 5. *p.* 273. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 28. Curculio longicollis. *Gron. zooph.* 583. *t.* 15. *f.* 4. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 4. *f.* 6. *Habitat in* America *auſtrali et* India.

haſtile. 7. Br. aterrimus roſtro tenuiſſimo longo ad apicem ſubarcuato, thorace medio coarctato, elytris ſubtulcatis, apice ſubacuminatis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 25. *n.* 2.
Habitat - - - *ſesquipollicem longus, craſſitie vix libellae puellae.*

naſutus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 6.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 182. *n.* 119. Curculio naſutus.
Habitat in Jamaica, *anchoragini affinis, at paulo major.*

diſpar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro-ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 96. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 55. *Muſ. Lud. Ulr.* 50. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 120. Curculio diſpar.
Pall. inſ. ruſſ. 1. *p.* 24. *t.* B. *f.* 4. Curculio anomaloceps.
Habitat in America.

cylindricornis. 10. Br. thorace rotundato nigro-aeneo, elytris ferrugineis flavo ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *ſtatura et magnitudine diſparis.*

bifrons. 11. Br. niger, elytris ſtriatis: maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 9.
Habitat in Cayenna, *ſtatura anchoraginis.*

202. CURCULIO. *Antennae* clavatae, inſidentes roſtro corneo, prominenti. *Palpi* quatuor filiformes.

* *Longiroſtres.*
† *femoribus ſimplicibus.*

Gigas. 55. C. thorace elytrisque ſcabris, antennis apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 1.
Habitat in Japonia.

palmarum. 1. C. ater, thorace ſupra plano, elytris abbreviatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 42.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 269. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 26. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.

Rumpf

Rumpf amb. 1. *p.* 79. *t.* 17. *f.* g. Coſſus ſaguarius.
Petiv. gazoph. t. 35. *f.* 5.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 89. *n.* 40.
Gron. zooph. 578. *t.* 16. *f.* 4.
Merian. ſurin. t. 48. *f.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 20.
Habitat in Indiae *palmis.*
Larva *aſſata in deliciis. Jacq. ſtirp. am.* 278.

cruentatus. 56. C. ater, thorace lineis, elytrisque punctis duobus ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 3.
Habitat in Carolina, *c. palmarum minor.*

longipes. 96. C. nigricans, elytris ferrugineis, roſtro emarginato, pedibus anterioribus longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 4.
Drury inſ. 2. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei.

zaniae. 550. C. ruber, thoracis linea nigra, roſtro ſetaceo longiſſimo. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in cycade caffra, larva hexapus, ſetis albidis obſeſſa intra ſquamas ſtrobili feminei, nucibus rubraque carne hanc obvelanti victitans.*

exoticus. 554. C. griſeus, thorace baſi impreſſo, dorſi ruga brevi, elytris poſterius gibbis: punctorum alborum ordinibus decem; interſtitiis, profunde nigro punctatis. *Muſ. Lesk.* *p.* 18. *n.* 368.
Habitat extra Europam.

brachypteros. 555. C. ater, thorace plano punctato: linea media parum elevata, elytris abbreviatis ſubſtriatis: interſtitiis punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 374.
Habitat in Europa.

undatus. 556. C. niger, elytris ordine punctatis: faſciis undulatis interruptis albis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 379.
Habitat in Europa.

atomarius. 557. C. fuſcus, elytris ſtriatis: interſtitiis laeviſſime punctatis atomis griſeis piloſis adſperſis, tibiis rufis. *Muſ. Lesk.* *p.* 18. *n.* 380.
Habitat in Europa.

coccineus. 558. C. coccineus, elytris punctatis: punctorum ordinibus decem. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 381.
Habitat in Europa.

ſuturalis. 559. C. griſeus, elytris ſtriatis: ſutura albida nigro punctata, macula communi oblonga verſus apicem marginumque exteriorum poſteriorum punctis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 384.
Habitat in Europa.

indus. 2. C. ater, thorace ſubovato excavato punctato, elytris rugoſo-ſulcatis, tibiis ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 43.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 265. *n.* 1. *t.* 15. *f.* 22.
Habitat in India.

paganus. 97. C. griſeus, thoracis dorſo fuſco: arcubus cinereis, roſtro biſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 6.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Elephas. 98. C. fuſcus, thorace elytrisque varioloſis, elytris poſterius ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 7.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnus.*

hemipterus. 3. C. obſcure purpuraſcens, elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 44.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 271. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 25. Curculio rufo-faſciatus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 5.
Habitat in India.

variegatus. 99. C. rufo nigroque varius, roſtro apice nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

alliariae. 4. C. violaceus totus. *Fn. ſuec.* 580.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 53.
Fn. ſuec. 468. Curculio nigro-caeruleſcens.

Degeer

Curculionum *longiroſtrium larvae plurimae fructus et ſemina, breviroſtrium vero folia conſumunt; aliae etiam caules conſumunt.*

Degeer inſ. 5. *p.* 251. *n.* 39. Curculio caeruleus.
Friſch inſ. 9. 35. *t.* 18.
Habitat in cryſimi alliariae *caulibus, quos perforat.*

cryſimi. 100. C. niger, thorace bituberculato vireſcente, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 54.
Habitat Kilonii, *cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.*

cyaneus. 5. C. ater, elytris violaceis, ſcutello albo. *Fn. ſuec.* 581.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 55.
Degeer inſ. 5. *p.* 252. *n.* 41. Curculio longiroſtris, antennis rectis &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 70. *n.* 11. *t.* 24. *f.* 5. c.
Habitat in Europae *borealis potiſſimum ſalicibus.*

craccae. 6. C. gibbus ſupra ater, ſubtus cinereus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 56.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 606. *n.* 6. Curculio longiroſtris niger ovatus, roſtro ſubulato, abdomine pallido.
Degeer inſ. 5. *t.* 6. *f.* 31. 32? Curculio viciae.
Habitat in Europae *viciarum ſeminibus, pediculi magnitudine.*

malvae. 101. C. griſeus, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 57.
Habitat in Angliae *malvis.*
Roſtrum *et abdomen atra.*

campanulae. 7. C. niger ovatus elytris ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *Lesk. it. p.* 16. *t.* A. *f.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 226. *n.* 23. Curculio longiroſtris, antennis fractis fuſcis &c.
Habitat in campanulae rotundifoliae *pericarpiis increaſſatis.*

fuſciroſtris. 102. C. griſeus, pedibus rufis, roſtro femoribusque baſi nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41.
Habitat in Germaniae *plantis.*

roboris. 103. C. roſtro thoraceque rufis, elytris violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 42.
Habitat in Saxoniae *quercu, ſtatura et magnitudine fuſciroſtris.*

cupriroſtris. 104. C. oblongus viridi aeneus, elytris ſtriatis, roſtro cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 43.
Habitat Dresdae *in betula, parvus.*

nigrirostris. 105. C. viridis rostro atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 44.
Herbst apud Fuesslli arch. inf. 4. *p.* 69. *n.* 8. *t.* 24. *f.* 3.
Habitat in Angliae *arvis.*

variabilis. 106. C. subtestaceus, thorace viridi lineato, rostro apice fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 45.
Habitat Hamburgi.

rufirostris. 107. C. niger, rostro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 46.
Habitat in Anglia.

picirostris. 108. C. oblongus niger argenteo-holosericeus, rostro dimidiato pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 47.
Habitat Hafniae, *rufirostri affinis, at major.*

salicariae. 109. C. niger, antennarum basi, coleoptrorum disco tibiisque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 48.
Habitat in Angliae *lythro salicaria, parvus.*

badensis. 8. C. niger, pedibus piceis.
Habitat in Germania, *magnitudine c. cerasi, thorace laeviusculo ovato, elytris obsolete striatis, femoribus clavatis.* Dr. Blom.

aequatus. 9. C. aeneus elytris rubris, rostro nigro elongato.
Habitat in Germania, *statura c. nucum, sed dimidio minor.*

cerasi. 12. C. ater, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 138.
Habitat in foliis pruni cerasi.

quadrituberculatus. 110. C. thorace quadrituberculato nigro, elytris striatis cinereo variegatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 39.
Habitat Kilonii, *parvus.*

acridulus. 13. C. piceus, abdomine ovato. *Fn. suec.* 584. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 62.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 291. Curculio pyriformis nigro-caeruleseens.
Degeer inf. 5. *p.* 235. *n.* 22. Curculio longirostris antennis fractis fuscis &c.
Herbst apud Fuesslli arch. inf. 4. *t.* 24. *f.* 12.

Habitat

Habitat frequens in Europae *borealis et* Calabriae *floribus tetradynamis.*

flavipes. 111. C. ater, femoribus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 63.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 272. *n.* 8. Rhinomacer ſubgloboſus &c.
Habitat frequens primo vere in Europae *locis apricis calidis.*

purpureus. 14. C. purpureus nitens, roſtro longiſſimo. *Fn. ſuec.* 585. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 64.
Degeer inſ. 5. *p.* 250. *n.* 38. Curculio roſtro longiſſimo &c.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 5.
Liſt. ioq. 394.
Bergſtr. nomencl. 1. 16. 12. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in Europae *plantis, frumentario proxime affinis.*

frumentarius. 15. C. ſanguineus. *Fn. ſuec.* 586. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 65. *Degeer. inſ.* 5. *p.* 251. *n.* 40.
Act. Stockh. 1750. *p.* 186. *n.* 1.
Act. nidroſ. 3. *p.* 391.
Leeuwenh. arc. nat. 168. *augm.* 6. *p.* 83. *f.* 3.
Habitat in Europae frumento *diutius aſſervato, peſſimus.*

bituberculatus. 112. C. ferrugineus, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorſalibus elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 76.
Habitat in nova Seelandia, *granario proxime affinis.*

oryzae. 113. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 75.
Amoen. acad. 6. *p.* 395. *n.* 19. Curculio (oryzae) longiroſtris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Habitat in oryza, *diutius aſſervata.*

granarius. 16. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. ſuec.* 587. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 74. *Scop. ent. carn.* 89.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 285. *n.* 18. Curculio rufo-teſtaceus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 239. *n.* 25. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.
Raj. inſ. 88. Scarabaeus parvus ſordide fulvus &c.

Joblot obſ microſcop. 1754. *t.* 7. *f.* 1.
Wilcke act. Stockh. 37. *tr.* 4. *nr.* 2.
Habitat in frumento *diutius in granariis aſſervato, peſſimus; iſatide, hyoſcyamo, ſambuco, thlaſpide pelli dicitur.*

dorſalis. 17. C. elytris rubris: ſutura nigra. *Fn. ſuec.* 588. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 66.
Fn ſuec. 1. *n.* 475. Curculio niger elytris in medio rufeſcentibus.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 44. *f.* 10. r. ſ.
Habitat in Europae *borealis ranunculo ficaria.*

melanocardius. 18. C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fuſca.
Muſ. Lud. Ulr. 18. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. 40. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in India.

cruciatus. 114. C. niger, thorace ſubſpinoſo: lineis, elytris poſterius cruce albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

ſtriatulus. 115. C. niger, elytris holoſericeo-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 12.
Habitat in inſula terrae novae.

Rubetra. 116. C. ater laevis immaculatus, femoribus ſulcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c. pini.*

pini. 19. C. elytris teſtaceis: faſciis nebuloſis. *Fn. ſuec.* 589.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 14.
Degeer inſ. 5. *p.* 222. *n.* 15. Curculio longiroſtris, antennis fractis &c.
Friſch inſ. 11. *t.* 23. *f.* 5.
Habitat in pinus ſylveſtris *cortice, cum c. abietis aliquando copula junctus.*

onopordi. 117. C. niger cinereo-villoſus, roſtro atro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 15.
Habitat in Africae *onopordis, vittato affinis, at major.*

ſtolatus. 118. C. ferrugineo-fuſcus albo-lineatus, roſtro nigro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 16.
Habitat in Italia, *majuſculus.*

119. C.

jaceae. 119. C. niger cinereo irroratus, elytris puncto baſeos diſtincto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 17.
Habitat in Centaurea Jacea, *adultior magis glaber.*

punctulatus. 120. C. flavo fuſcoque varius, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 18.
Habitat in America, *ſtatura c. jaceae, at paulo minor.*

cynarae. 121. C. niger vireſcenti irroratus, roſtro nigro ſubcarinato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 19.
Habitat in Africae *floribus cynarae, c. jaceae affinis, at dupio fere major.*

Colon. 122. C. griſeus, elytris puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 20.
Mant. p. 531. Curculio longiroſtris caneſcens, femoribus anticis ſubdentatis, thorace utrinque linea, elytrisque puncto albo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 280. *n.* 6. Curculio oblongus fuſcus.
Scop. ent. carn. 104. Curculio paluſtris.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 4. *p.* 68. *n.* 3. *t.* 24. *f.* 1.
β) Curculio (lemnicolon) nigricans. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 4. *p.* 69. *n.* 4.
Habitat in Germania.

bimaculatus. 123. C. fuſcus, elytris puncto cinereo, roſtro pedibusque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 21.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura C. Colon, at paulo minor.*

biguttatus. 124. C. niger, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque poſterioribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 22.
Habitat in Germania.

bilineatus. 125. C. fuſcus, elytris lineis duabus punctorum alborum. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 23.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

teſſellatus. 126. C. cinereus, elytris apice ſtriis albis nigro punctatis: *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 24.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

decurtatus. 127. C. ater, thorace plano punctato, elytris abbreviatis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 25.

Habitat Halae Saxonum, *statura fere c. palmarum, at quadruplo minor.*

equiseti. 128. C. thorace laevi, elytris muricatis nigris: punctis duobus apiceque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 26.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4. *p.* 69. *n.* 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat in Angliae *equiseto arvensi.*

Bufo. 129. C. fuscus, elytris subreticulatis: fascia media alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 27.
Habitat in Sibiria.

atrirostris. 130. C. cinereus, rostro arcuato atro. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 28.
Habitat Lipsiae, *magnitudine et statura c. equiseti.*

cupreus. 21. C. obscure aeneus subtus obscurior. *Fn. suec.* 593. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 608. *n.* 21.
Habitat in Europa.

Tragiae. 131. C. aeneus, rostro pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 35.
Habitat in Tragiae volubilis *feminibus e* Brasilia *allatis.*

aeneus. 132. C. niger, elytris aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 36.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

curvirostris. 133. C. ater nitidus, rostro arcuato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 37.
Habitat in nova Hollandia, *parvus.*

scaber. 22. C. cinereus, pedibus rufis, elytris scabris. *Fn. suec.* 592.*
Habitat in Europae *urticis.*

T. album. 23. C. ater, abdomine ad latera et posterius lacteo. *Fn. suec.* 594.*
Habitat in Westerbothnia.

ruficollis. 24. C. ferrugineus, elytris capitisque basi atro-caeruleis. *Fn. suec.* 595.*
Habitat in Europa.

Dryados. 134. C. cinereus, thoracis dorso fusco, elytris testaceis cinereo-undatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 67.
Habitat in Sueciae *quercu, parvus.*

135. C.

futuralis. 135. C. ovatus fuscus, linea longitudinali alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 68.
Habitat in Germaniae *salice.*

crux. 136. C. ater, thorace punctis duobus baseos, elytris sutura punctisque sparsis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 69.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 4. *p.* 70. *n.* 14. *t.* 24. *f.* b. d.
Habitat Hamburgi.

exclamationis. 137. C. ater, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

venustus. 138. C. fuscus, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 54. *mant inf.* 1. *p.* 102. *n.* 71.
Habitat in Anglia, *parvus.*

plantaginis. 139. C. elytris cinereis: macula media fusca. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 72.
Habitat Halae Saxonum, *statura c. rumicis.*

viscariae. 27. C. subrotundus cinereus, thorace elytrisque cinereo-virentibus. *Fn. suec.* 598.*
Habitat in lychnidis viscariae *fructificationibus.*

bipunctatus. 28. C. cinereus, elytris macula nigra, tibiis flavescentibus. *Fn. suec.* 599.*
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 29. C. nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. suec.* 600.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 58.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 287. *n.* 22. Curculio cinereus &c.
Habitat in Europa.

unifasciatus. 140. C. supra fuscus, fascia media cinerea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 59.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis.*

bifasciatus. 141. C. niger, elytris fasciis duabus cinereis: baseos majore undata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 60.
Habitat in Kilonii *plantis.*

142. C.

lythri. 142. C. ater, elytris fascia media abbreviata punctoque posteriore albis, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 61.
Habitat in Uplandiae *floribus lythri, parvus.*

quinque-maculatus. 30. C. griseus, coleoptris maculis quinque albis. *Fn. suec.* 601.*
Habitat in Europa.

pericarpius. 31. C. subglobosus nebulosus, elytrorum futura basi alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 49. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 609. *n.* 31. *Fn. suec.* 602.* Curculio longirostris subglobosus nebulosus, coleoptris macula cordata alba.
Habitat in scrophulariae *pericarpiis.*

sisymbrii. 143. C. albo-fuscoque varius, elytris puncto baseos elevato atro, rostro nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 50.
Habitat Kilonii, *in sisymbrio amphibio.*

caprеae. 144. C. coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 51.
Habitat in Angliae *salice caprea, parvus.*

Rana. 145. C. thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis: fasciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *parvus, gibbus.*

paraplecticus. 34. C. cylindricus subcinereus, elytris mucronatis. *Fn. suec.* 604.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 77.
Fn. suec. 445. *It. scan.* 184. Curculio fuscus oblongus, elytris rectis acuminatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 279. Curculio oblongus &c.
Degeer inf. 5. *p.* 224. *n.* 18. *t.* 7. *f.* 8. Curculio phellandrii.
Schreber Samml. 11. *p.* 336. *t.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 44. *f.* 1.
Habitat in Europae *et* Sibiriae *umbellatis aquaticis, praesertim phellandrio, larva intra caulem, saepe sub aqua latente, et paraplegiae, ut fertur, apud equos caussa, suis siercore antidoto.*

umbellatarum. 146. C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griseis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 78.
Habitat in Barbariae *umbellatis, statura fere paraplectici, at duplo fere minor.*

filiformis. 147. C. cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 63. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 79.
Habitat in Italia, *statura paraplectici, at quadruplo minor.*

cylindricus. 148. C. cylindricus supra niger, elytris acuminatis: fascia pallida. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 80.
Habitat in Sibiria, *statura paraplectici, sed minor.*

notatus. 149. C. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis; fascia sesquialtera testacea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 81.
Habitat in Barbariae *plantis, cylindricus.*

barbirostris. 150. C. niger, rostro barbato, tibiis anterioribus tridentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 82. *Seb. mus.* 4. *t.* 95. *f.* 5.
Habitat in America *australi, et* India.

angustatus. 151. C. cylindricus ater, elytris obtusis punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 66. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 83. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 71. *n.* 18. *t.* 24. *f.* 7.
Habitat rarior in Anglia.

bardanae. 152. C. cylindricus griseo tomentosus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 84.
Habitat Dresdae *in arctio lappa, statura et magnitudine paraplectici.*

anguinus. 35. C. cylindricus canus, fusco lineatus.
Habitat in Germania, *statura paraplectici, subtus pedibusque canus nigro punctatus; rostro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici serie punctorum excavatorum minutissimorum ornatis, apice mucronatis.*

Ascanii. 36. C. cylindricus ater, lateribus subaeruleiscentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 67. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 85. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 71. *n.* 19. *t.* 24. *f.* 8.
β) Curculio cylindricus. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 71. *n.* 20.

Habitat

Habitat in Europa *auſtrali, ſtatura paraplectici, ſubtus caneſcens, elytris acutis.* Aſcanius.

lineola. 153. C. cylindricus niger, elytris vitta teſtacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 86.
Habitat in nova Hollandia.

linearis. 154. C. elongatus niger, antennis pedibusque piceis, roſtro baſi attenuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 87.
Habitat Argentorati, *rarior totus ferrugineus.* Hermann.

craſſipes. 155. C. femoribus anterioribus ſubclavatis, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 88.
Habitat Argentorati. Hermann.

atriplicis. 156. C. elongatus ater, thorace nitido, elytris ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 89.
Habitat in littoris Kilonienſis *et* Norwegici *atriplice littorali.*

Bacchus. 38. C. cupreus, roſtro plantisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 4. Rhinomacer niger &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 37. *f.* 13.
Habitat in Europae *magis auſtralis vite, corylo, ſupra ſubvilloſus.*

betulae. 39. C. corpore viridi-aurato, ſubtus concolore. *Fn. ſuec.* 605.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 165. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 30.
Degeer inſ. 5. *p.* 248. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 25. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 2. Rhinomacer totus viridi-caeruleus.
Friſch inſ. 12. 17. *t.* 8. *f.* 2.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 4.
Habitat in betula alba, *et frequentiſſimus in* vite, *folia contorquens, aliquando totus caeruleus, alterius ſexus thorace antrorſum ſpinoſo.*

populi. 40. C. corpore viridi-ignito, ſubtus atro-caeruleſcente. *Fn. ſuec.* 606. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 24. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 31.

Degeer

Degeer inſ. 5. *p.* 249. *n.* 37. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 270. *n.* 3. Rhinomacer viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.

Habitat in betula, populo, *alterius ſexus thorace antrorſum ſpinoſo.*

bicolor. 157. C. niger, thorace elytrisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 32.
Habitat in America.

caeruleocephalus. 158. C. violaceus nitens, thorace elytrisque teſtaceis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 282. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 99. *n.* 33.
Habitat in Saxoniae *crataego, ſtatura bicoloris.*

ſturnus. 159. C. ovatus niger flavo-irroratus. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 280.
Habitat Halae Saxonum *gregarius in urticis, c. jaceae affinis, c. pini magis ovatus.*

pariſinus. 160. C. elytris thoraceque viridibus, roſtro pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 16. *n.* 27.
Habitat Lutetiis Pariſiorum, *pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.*

cylindroides. 161. C. elongatus flavo irroratus, elytris punctato-ſtriatis apice obtuſiuſculis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *paraplectico affinis.*

porifer. 162. C. thorace ſubgloboſo: ſpinulis brevioribus trifariis apice pertuſis, elytrisque nigricantibus albo-lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus cinereo-pubeſcens.*

caffer. 163. C. ater thorace ſcabro, antennis utrinque cicatrice notato, elytris punctato-ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 39. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus griſeo-pubeſcens, antennarum clava ſericeo-argentea.*

armillatus. 164. C. thorace utrinque ſubſpinoſo, femoribus ad apicem cingulo griſeo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 40. *n.* 10.

a) Cur-

α) Curculio totus ex fusco cinereus.
β) Curculio elytris cinereo-nebulosis: maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.
Habitat ad caput bonae spei.

ulicis. 165. C. cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 31. n. 31.*
Habitat in Anglia, *in floribus ulicis europaei, primo vere conspicuus, vix pediculi magnitudine.*

latus. 166. C. ater depressus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transversa, elytris sulcatis. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 4. p. 71. n. 21. t. 24. f. 9.*
Habitat in Hungaria, *c. Ascanii affinis.*

rumicis. 60. C. griseus nigro-nebulosus, antennis fuscis. *Fn. suec. 590. Fabr. sp. inf. 1. p. 170. n. 55. mant. inf. 1. p. 103. n. 73. Degeer inf. 5. p. 231. n. 20. t. 7. f. 10. 11. Raj. inf. 85. n. 36.*
Habitat in Europae *rumice.*

ungaricus. 167. C. niger, thorace elytrisque purpureis. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 4. p. 71. n. 22. t. 24. f. 10.*
Habitat in Hungaria, *statura et magnitudine bacchi.*

cyanocephalus. 168. C. niger villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris subspadiceis punctato striatis, femoribus virescentibus. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 4. p. 72. n. 23. t. 24. f. 11.*
Habitat frequens in Marchiae *betula, 2 lineas longus.*

striatus. 169. C. cinereo-pubescens, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 4. p. 72. n. 25. t. 24. f. 13.*
Habitat Berolini, *rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.*

canus. 170. C. subglobosus cinereo-pubescens, elytris abbreviatis. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 5. p. 73. n. 26. t. 24. f. 14. c.*
Habitat Berolini.

cruciger. 171. C. nigerrimus, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo maculatis. *Herbst apud Fuesslí arch. inf. 5. p. 73. n. 27. t. 24. f. 15.*
Habitat Berolini, *2 circiter lineas longus.*

172. C.

Grus. 172. C. niger, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato-striatis scabris, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 73. n. 28.*
Habitat in Pomerania, *vix sesquilineam longus.*

alauda. 173. C. cinereus, subgloboſus thoracis dorso fascia transversa maculisque nigris, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*
Habitat in Pomerania.

urticarius. 174. C. fuscus: fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 74. n. 30.*
Habitat in Pomerania, *vix pulicis magnitudine.*

Punctum album. 175. C. nigerrimus, subtus et ad latera ochroleuco irroratus, antennis fulvis, elytrorum sutura puncto medio albo. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.*
Habitat in nymphaeae luteae *floribus, magnitudine et structura c. scrophulariae.*

albovittatus. 176. C. flavo-cinereus, elytris vitta utrinque alba, rostro nigro. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 74. n. 32.*
Habitat in Marchia.

Lineola alba. 177. C. convexus piceus, elytris striatis albo villosis: sutura linea alba abbreviata. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 74. n. 33.*
Habitat in Marchia, *pulicis magnitudine.*

versicolor. 178. C. piceus albido-pubescens, rostro nigro. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 75. n. 34.*
Habitat in Marchia, *statura et magnitudine granari.*

melas. 179. C. angustus nigerrimus, tenuissime punctatus. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 7. p. 166. n. 94.*
Habitat in Austria, *vix sesquilineam longus.*

rosarum. 180. C. subgloboſus niger albido-pubescens, elytris striatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf. 7. p. 167. n. 97.*
Habitat Berolini, *sesquilineam longus.*

quadripunctatus. 181. C. griseus, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis. *Lepechin it. 2. p. 204. t. 11. f. 23.*
Habitat in Russia *australi.*

varius. 182. C. albo nigroque varius, elytris apice acuminatis. *Lepech. it. 2. p. 204. t. 11. f. 33.*
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

piceus. 183. C. piceus, elytris abdomen aequantibus. *Pall. it. 1. app. n. 34. inſ. muſ. 1. p. 23. t. B. f. 3.*
Habitat in muria lacus Inderienſis, *c. palmarum affinis, at quadruplo minor.*

nomas. 184. C. oblongus, ſubtus albo-tomentoſus, elytris caneſcentibus: ſtriis punctato-ſulcatis. *Pall. it. 1. app. n. 31.*
Habitat in Sibiria.

picatus. 185. C. oblongus ex nigro piceus, antennis fuſcis. *Degeer inſ. 5. p. 221. n. 14.*
Habitat - - - 4½ lineam longus.

gibboſus. 186. C. ovatus niger, elytris tuberculatis, poſterius cinereis. *Degeer inſ. 5. p. 224. n. 17.*
Habitat - - - 2½ lineas longus.

caſtaneus. 187. C. oblongus caſtaneus, ſubtus niger, elytris ſtriato-punctatis gibboſis. *Degeer inſ. 5. p. 231. n. 19.*
Habitat - - - 3½ lineas longus.

faſciatus. 188. C. cinereus oblongus, faſciis longitudinalibus dilutioribus. *Fn. ſuec. ed. 2. n. 2274. Degeer inſ. 5. p. 234. n. 21.*
Habitat - - -

naevius. 189. C. ovatus griſeus, thorace faſciis, elytris macula magna punctisque fuſcis. *Degeer inſ. 5. p. 237. n. 24. t. 7. f. 17. 18.*
Habitat in plantagine, *Julii ſine frequens.*

roſtratus. 190. C. oblongus rufus, capite elytrisque viridi-caeruleis nitidis. *Degeer inſ. 5. p. 252. n. 42. t. 7. f. 27. 28.*
Habitat in Sueciae *hortis.*

melanocephalus. 191. C. ſubgloboſus fuſcus, capite roſtroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inſ. 5. p. 272. n. 6. t. 15. f. 27.*
Habitat Surinami, *4 lineas longus.*

frugilegus. 192. C. oblongus caſtaneus coleoptris thoracem aequantibus: maculis quatuor rufis. *Degeer inſ. 5. p. 273. n. 7.*
Habitat Surinami *et in* Oriente, *parvus, fruges conſumens.*

193. C.

An ſpecies a Schaeffero ic. t. 56. f. 4. et t. 95. f. 6. 7. depictae, teſtaceus et Schaefferi hujus ordinis?

pulverulentus. 193. C. fuscus, thorace granulato, elytris transversim rugosis. *Scop. ent. carn. n.* 75.
Habitat in Carniola.

centaureae. 194. C. ovatus fuscus subrufo-villosus, rostro deflexo marginato: linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn. n.* 76.
Habitat in centaureis.

auratus. 195. C. viridi-auratus, antennis rostrique apice dilatato nigris. *Scop. ent. carn. n.* 77.
Habitat in Carniolia.

icosandriae. 196. C. atro-caeruleus, rostro porrecto, elytris octo-striatis. *Scop. ent. carn. n.* 87.
Habitat in plantis icosandris.

oleraceus. 197. C. globosus nigricans, elytris puncto lunulaque apicis albis. *Scop. ent. carn. n.* 88.
Habitat in Carniolia.

pellucens. 198. C. flavicans, oculis rostrique apice nigris. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 90. *n.* 41.
Habitat circa Schemniz Hungariae, *vix 2 lineas longus.*

gibbus. 199. C. ovatus niger, elytris violaceis sulcatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1014.
Habitat in Dania.

similis. 200. C. ater, elytris ovatis punctato-striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1015.
Habitat in Dania.

nemoralis. 201. C. niger, oculis fuscis, elytris punctato-striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1016.
Habitat in Daniae *nemoribus.*

politus. 202. C. niger, elytris cyaneis striatis nitidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1017.
Habitat in Dania.

ochropus. 203. C. niger ovatus, femoribus ex flavo rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1018.
Act. Nidros. 4. 15.
Habitat in Scandinavia.

griseus. 204. C. oblongus cinereus, antennis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 974.
Habitat in Dania.

nitens. 205. C. oblongus ex nigro violaceus, thorace elytrisque ex nigro virentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 975. *Habitat in* Dania.

arvenſis. 206. C. griſeus, thorace trilineato, elytris rufis obſcure teſſellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 978. *Habitat in* Dania.

tuberculatus. 207. C. niger, thorace rugoſo, elytris lineis tuberculisque muricatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 979. *Habitat in* Dania.

glaucus. 208. C. niger, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 88. *n.* 989. *Habitat in* Dania.

trifolii. 209. C. niger, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syſt. nat.* XII. 3. *add. p.* 224. *Habitat in* trifolii montani *ſpicis, intra quas declaratur, pulicis magnitudine.*

longus. 210. C. anguſtus elongatus niger, thorace faſciis quatuor albicantibus. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 269. *n.* 1. *Habitat in* Gallia.

fuliginoſus. 211. C. ex atro fuſcus glaber punctato-ſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 271. *n.* 6. *Habitat in* Gallia.

teres. 212. C. ex nigro virideſcens oblongus ſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 272. *n.* 7. *Habitat in* Gallia.

Pulex. 213. C. ſubgloboſus villoſus niger, pedibus elytrisque rufis. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 272. *n.* 9. *Habitat in* Gallia.

rugoſus. 214. C. totus fuſcus rugoſus. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 278. *n.* 2. *Habitat in* Gallia.

ſulcatus. 215. C. fuſco-nebuloſus, thorace ſulcato, elytris ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 278. *n.* 3. *Habitat in* Gallia.

carduelis. 216. C. niger ſtriatus, maculis villoſo-fuſcis nebuloſis. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 281. *n.* 8. *Habitat in* Galliae *carduis.*

217. C.

napobrassicae. 217. C. ex atro cinereus, capite globoso, rostro elytrisque nigris, antennis fuscis. *Bjerkander nov. act. Stockh.* 1780. 3. *n.* 4. *p.* 185.
Habitat in napobrassicae *caulibus, quos exedit, lineam longus, an hujus ordinis?*

erythropus. 560. C. griseus, elytris striatis, rostro pedibusque nigris, tibiis apice incurvis plantisque rubris. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 385.
Habitat in Europa.

chalybeus. 561. C. glaber nigro-caeruleſcens, rostro arcuato, thorace punctato, elytris striatis. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 388.
Habitat in Europa.

crenulatus. 562. C. niger glaber, rostro longitudine corporis, elytris striatis: striis profunde crenatis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 390.
Habitat - - -

foveolatus. 563. C. viridi-aureus, rostro pedibusque nigris, abdomine violaceo elytris profunde punctatis, antennas inter oculosque fovea oblonga. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 391.
Habitat in Europa.

virens. 564. C. cylindricus viridis nitens, rostro pedibusque cupreis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 392.
Habitat in Europa.

crassicornis. 565. C. niger, rostro compresso, antennis non fractis apice crassioribus, thorace elytrisque levissime punctatis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 393.
Habitat in Europa.

glabratus. 566. C. niger glaber, elytris nigro-aeneis striatis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 398.
Habitat in Europa, *statura c. olliarii.*

atomarius. 567. C. fuscus, elytris striatis: atomis griseis pilosis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 399.
Habitat in Europa.

striatulus. 568. C. niger, elytris sulcatis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 400.
Habitat in Europa, *statura aterrimi.*

rugosus. 569. C. fuscus, elytris rugosis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 19. *n.* 405.
Habitat in Europa.

crinitus. 570. C. niger globoſus griſeo piloſus, roſtro glabro incurvo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 407.
Habitat in Europa.

haemato-pus. 571. C. niger, thorace punctato, elytris ſtriis crenatis, antennis tibiisque ſanguineis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 417.
Habitat in Europa.

†† *femoribus poſterioribus incraſſatis*, ſaltatorii.

quercus. 25. C. pallide flavus, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 596.* *Uddm. diſſ.* 25.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 184. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 155. Curculio (viminalis) longiroſtris, femoribus ſaltatoriis, corpore teſtaceo.
Degeer inſ. 5. *p.* 260. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 5. Curculio ulmi.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 19. Curculio rufus.
Reaumur inſ. 3. 31. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Europae *ſalicis*, *ulmi*, *quercus foliis*, *inter venas majores ſubcutaneus*, *folia maculans*, *magnitudine pediculi.*

multidentatus. 572. C. rufus, oculis nigris, pedibus poſterioribus multidentatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 441.

meticuloſus. 218. C. griſeo fuſcus, ſubtus elytrisque poſterius albidus villoſus, roſtro inflexo nigro. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pudicus. 219. C. pallide griſeus, roſtro inflexo ſanguineo, capite pedibusque rubicundis, elytris ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei.

ilicis. 220. C. nigricans, elytris ſtriatis cinereo variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 156.
Habitat in Uplandiae *quercu*, *parvus*, *ſtatura c. quercus.*

Jota. 221. C. ater, elytris ſtriatis, ſutura baſi alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 157.
Habitat in Uplandia, *parvus.*

alni. 42. C. niger, elytris teſtaceis: maculis duabus obſcuris. *Fn. ſuec.* 608.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 123. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 151.

Fn.

Fn. ſuec. 1. *n.* 473. Curculio lividus, coleoptris maculis quatuor obſcuris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 20. Curculio rufus.
Degeer inſ. 5. *p.* 262. *n.* 49. Curculio alni ſaltator.
Habitat in Europae *alno.*

piloſus. 222. C. niger, cinereo variegatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 124. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 152.
Habitat in Anglia, *parvus.*

Calcar. 223. C. niger, femoribus unidentatis, antennis plantisque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 153.
Habitat Kilonii, *parvus.*

ſalicis. 43. C. elytris atris: faſciis duabus albis. *Fn. ſuec.* 610.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 125. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 154.
Degeer inſ. 5. *p.* 264. *n.* 51.
Habitat in ſalicis *floribus.*

fagi. 44. C. corpore atro, femoribus pallidis. *Fn. ſuec.* 609. *It. ſcan.* 111. *Scop. ent. carn.* 73. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 127. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 158.
Habitat in fagi ſylvaticae *foliis.*

ſegetis. 45. C. corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. ſuec.* 611.
Habitat in agris ſuper ſpicas.

rhei. 279. C. ater opacus, thorace ſubpunctato, elytris punctato-ſtriatis, ſubtus albido-pubeſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 50.
Habitat Berolini, *ſine roſtro* 3 *lineas longus.*

rhamni. 280. C. ater opacus, roſtro nitido, thorace grundato, elytris ſubſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 51.
Habitat in Marchia, *absque roſtro* 4 *lineas longus, c. rhei ſimilis.*

curviroſtris. 282. C. nigricans albido-pubeſcens, thorace punctato, elytris ſtriatis, roſtro incurvo, antennarum clavis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 53.
Habitat in Marchia, 1½ *lineam longus.*

Vanellus. 283. C. capite thoraceque ſubvilloſo brevibus elytris ſtriatis, pedibus fuſcoſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 79. *n.* 55. *t.* 24. *f.* 23. I.
Habitat Berolini, *vix lineam ſuperans.*

arator. 284. C. subovatus, thorace fusco: lineis tribus pallidis, elytrorum futura nigro dentata, pedibus fuscis. *Mant. p.* 531.
Habitat - - - *cimicis magnitudine.*

maricatus. 285. C. ex fusco nigricans, elytris verrucoso-striatis, femoribus unidentatis. *Drury inf.* 2. *t.* 34. *f.* 4.

varicosus. 454. C. elytris connatis sulcatis supra sextuberculatis, posterius bimucronatis. *Pall. inf. Rosf.* 1. *p.* 22. *t.* B. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, inter maximos congeneres, vaginali affinis, ater.*

rhynchoceros. 455. C. elytris connatis tuberculatis mucronatis, rostro basi bicorni. *Pall. inf. Rosf.* 1. *p.* 23. *t.* B. *f.* 2.
Habitat in America, *varicoso paulo brevior et latior.*

exesus. 456. C. corpore nigro lutescente irrorato, thorace elytrisque maculis exesis albis. *Pall. inf. Rosf.* 1. *p.* 33. *t.* H. *f.* B. 15.
Habitat Surinami, *germano affinis, at major.*

danubialis. 478. C. elytris cervinis: punctis nigris sparsis.
Habitat in insulis danubialibus Viennensibus *in corticibus arborum, 2 lineas longus.*

††† *femoribus dentatis.*

aterrimus. 10. C. ater, elytris nitidis. *Fn. suec.* 582.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 103. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 132.
Habitat in Europae *plantis frequentissimus, statura et magnitudine ocelliariae.*

cerasi. 11. C. ater, elytris opacis oblongis. *Fn. suec.* 583. *Scop. ent. carn.* 84. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 104. *mant. inf.* 1. *p.* 108 *n.* 133.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 299. *n.* 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.
Frisch inf. 11. 31. *t.* 23. *f.* 1. 3.
Habitat in cerasi pyrique *foliis, epidermidem exedens, cum maculans,* 1750 *in Suecia frequentissimus.*

beccabungae. 41. C. niger, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 130.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 614. *n.* 41. *Fn. suec.* 607.* Curculio fuscus, elytris subsanguineis: margine anoque fuscis?
Habitat in Sueciae *beccabunga, magnitudine et statura C. cerasi.*

Troglodytes. 224. C. thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testaceis, pedibus fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 131.
Habitat Kilonii, *parvus.*

lapathi. 20. C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. *Fn. suec.* 591.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 109.
Degeer inf. 5. *p.* 223. *n.* 16. *t.* 7. *f.* 1. 2. Curculio albi caudis.
Habitat in Europae *salicibus et rumicibus, pectoris lateribus elytrisque posterius albidis.*

irroratus. 225. C. albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco annulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine C. lapathi.*

sexguttatus. 226. C. niger, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 111.
Habitat in America.

luridus. 227. C. ovatus obscure niger, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 88. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 112.
Habitat in nova Hollandia.

stolidus. 228. C. fuscus, tibiis posterioribus incurvis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 89. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 113.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

meditabundus. 229. C. elytris striatis, posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 90. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 114.
Habitat in nova Hollandia.

stupidus. 230. C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 91. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 115.
Habitat in nova Hollandia.

mangiferae. 231. C. griseus thorace linea punctisque duobus dorsalibus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 92. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 116.
Habitat in mangiferae *nucleis.*

stultus. 232. C. griseus, elytris macula communi lunata cinerea, rostro atro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 117.
Habitat in Coromandel, *c. mangiferae minor.*

squalidus. 233. C. villoso-griseus, rostro testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 93. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 118.
Habitat Surinami, *mediae magnitudinis.*

pomorum. 46. C. femoribus anterioribus dentatis, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec.* 612.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 115. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 145.
Frisch inf. 1. *p.* 32. *t.* 8. Curculio in floribus arborum.
Habitat in pomonae *floribus.*

ovalis. 47. C. corpore ovato nigro albo maculato. *Fn. suec.* 613.
Habitat in Europa.

carbonarius. 48. C. corpore nigro oblongo, elytris striatis. *Fn. suec.* 614. *Scop. ent. carn.* 29.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 27. *n.* 47. *t.* 24. *f.* 21.
Habitat in Europa. Solander.

mucoreus. 49. C. femoribus quatuor anterioribus dentatis, elytris pollinc flavescentibus, supra apicem gibbosis. *Mus. Lud. Ulr.* 53.* *Gron. mus.* 589.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 92.
Habitat in America *australi et* India.

jamaicensis. 234. C. obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

bidens. 235. C. niger, femoribus posterioribus dentatis, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 90.
Habitat in nova Seelandia.

pusio. 50. C. femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris striatis nigris: linea repanda grisea. *Mus. Lud. Ulr.* 46.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 93.
Habitat in America *australi et* India, *elytrorum linea longitudinali.*

vaginalis. 51. C. elytris striatis: tuberculis sparsis, juxta apicem mucronatis, *Mus. Lud. Ulr.* 47.*
Habitat in America *et* Sibiria.
Pro rostro *fossula in thorace;* elytrorum *striae ex punctis cavis villosis.*

spinipes. 236. C. niger, thorace lineis duabus, elytris striis quatuor albis, tibiis anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 76. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 94.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis*, *magnus.*

Bombina. 237. C. ferrugineo-fuscus, elytris striatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 95.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scorpio. 238. C. ater, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 96.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scaber. 239 C. thorace carinato, elytris sulcatis tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf* 1. *p.* 174. *n.* 77. *mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 97.
Habitat in Cayenna.

trifasciatus. 240. C. thorace linea laterali, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 98.
Habitat in Cayenna, *testaceus c. abietis paulo major.*

cylindrirostris. 241. C. thorace scabro, elytris posterius bituberculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 78. *mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

stigma. 52. C. elytris macula magna ferruginea. *Mus. Lud. Ulr.* 48.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 79. *mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 100.
Habitat in America *australi et* India.

hebes. 242. C. femoribus subdentatis, thorace scabro, elytris sulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 80. *mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 101.
Habitat ad fluvium Senegal, *mediae magnitudinis.*

depressus. 53. C. thorace depresso, lateribus obtuse angulatis. *Mus. Lud. Ulr.* 49.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 114. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 144.
Seb. mus. 4. *t.* 95. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali*, *griseus: punctis nigris glabris prominulis.*

annulatus. 54. C. pallidus, thorace elytrisque strigis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 51.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 81. *mant. inf.* 1. *p.* 105. *n.* 102.

Habitat

Habitat in America *auſtrali et* India, *thoracis ſtriga una, elytrorum duabus.*

caliginoſus. 243. C. elytrorum ſtriis punctatis approximatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 103.
Habitat in Anglia, *rarior.*

dubius. 244. C. niger, thorace laevi, elytris ſtriatis ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 104.
Habitat - - - - *magnus.*

adſperſus. 245. C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 105.
Habitat in Cayenna, *magnitudine et ſtatura c. cynarae.*

brunneus. 246. C. brunneus, roſtro fuſco, elytris teſtaceis punctato ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 106.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

albiſtis. 57. C. elytris fuſcis: faſciis duabus linearibus interruptis albidis. *Fn. ſuec.* 615.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 107.
It. oel. 26. Curculio ſubfuſcus.
Pet. gazoph. 14. *t.* 8. *f.* 9. Curculio norwegicus.
Degeer inſ. 5. *p.* 205. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 11.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 1.
Habitat in pini ſylveſtris *cortice et reſina; an alter ſexus c. pini?*

reticulatus. 247. C. oblongus piceus, elytris reticulatis: faſciis obliquis pallidis, tibiis anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 108.
Habitat Tranquebariae.

germanus. 58. C. ater, thorace utrinque punctis duobus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 119.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 58. Curculio longiroſtris, femoribus ſubdentatis, corpore ovato nigro, punctis teſtaceis adſperſo.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 91. *n.* 44.
Sulz. hiſt. inſ. 39. *t.* 4. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 2.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26.
Habitat in Europa, *frequens in* Germania, *inter maximos europaeos.*

59. C.

nucum. 59. C. corpore griseo longitudine rostri. *Fn. suec.* 616. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 156. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 135. *Uddm. diss.* 24. Curculio ovatus griseus, roſtro filiformi longitudine corporis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 295. *n.* 42.
Degeer inf. 5. *p.* 205. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 14-16.
Roes. inf. 3. *t.* 67. *f.* 5. 6.
Scop. ent. carn. 105.
Poda inf. t. 1. *f.* 3.
Schaeff. el. t. 55. *f.* 1.
ic. t. 50. *f.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 22.
Habitat in coryli avellanae *nucibus frequens.*

proboscideus. 248. C. griseus, roſtro corpore duplo longiore. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 107. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 136.
Habitat in America *boreali, an varietas c. nucum?*

varians. 249. C. griseo nigroque varius, roſtro pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 108. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 137.
Habitat in Cayenna.

ceraſorum. 250. C. fuscus, scutello elytrorumque faſciis obſoletis cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 109. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 138.
Habitat in Anglia, *c. nucum triplo minor.*

amoenus. 251. C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 110. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 139.
Habitat in nova Hollandia.

bicornis. 252. C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 111. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 140.
Habitat in nova Seelandia, *ex fuſco et cinereo varius.*

tenuiroſtris. 253. C. niger, elytris albo ſubfaſciatis, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 112. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 141.
Habitat in Anglia, *ſtatura c. ceraſorum, at minor.*

ſcrophulariae. 61. C. coleoptris maculis duabus dorſalibus atris. *Fn. suec.* 603. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 95. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 120.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 296. *n.* 44.
Degeer inf. 5. *p.* 208. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 17-20.

Liſt. ſcar. angl. p. 395. *n.* 35.
Reaumur. inſ. 3. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in ſcrophulariis, *quarum pericarpia exedit larva, folliculos ovatos, operculatos, fuſcos ſubſtituens.*

verbaſci. 254. C. niger, thoracis lateribus flaveſcentibus, elytris punctis albis nigrisque alternis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 121.
Habitat Kilonii, *an varietas C. ſcrophulariae.*

gravis. 255. C. niger, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 96. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 122.
Habitat ad caput bonae ſpei.

druparum. 62. C. elytris teſtaceis, obſolete faſciatis. *Fn. ſuec.* 617. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 113. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 142.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 296. *n.* 43.
Degeer inſ. 5. *p.* 214. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 21.
Habitat in ceraſi padi *nucleis.*

fraxini. 256. C. fuſcus, femoribus ferrugineis, capite dorſoque nigris.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 109. *n.* 143.
Habitat in Sueciae *fraxino, magnitudine c. druparum.*

violaceus. 63. C. totus violaceus. *Fn. ſuec.* 579. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 134.
Degeer inſ. 5. *p.* 213. *n.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. 16. 13. *t.* 2. *f.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 271. *n.* 5.
Habitat in Europae pinetis, *frequens in turionibus.*

quinquepunctatus. 64. C. elytris ſutura maculisque duabus albis. *Fn. ſuec.* 618.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 178. *n.* 97. *mant inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 123.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 75. *n.* 40. *t.* 24. *f.* 18. *g.*
Habitat in Europa *boreali.*

guttula. 257. C. niger, thorace tuberculato, elytris ſtriatis: puncto poſteriore albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 124.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

didymus. 258. C. ſupra fuſcus, elytris ſtriatis: macula laterali tranſverſa alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 98. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 125.
Habitat in Germania, *parvus.*

259. C.

haemorrhoidalis. 259. C. thorace fuſco: lateribus cineraſcentibus, elytrorum ſutura apice ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 99. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 126.
Habitat in nova Hollandia.

trimaculatus. 260. C. coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; poſteriori communi lunata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 100. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 127.
Habitat in Alſatia *et* Suecia. Hermann *et* Pajkal.

Litura. 261. C. albo nigroque varius, roſtro vario. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 101. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 128.
Habitat in Europa.

villoſus. 262. C. villoſus griſeus, ſcutello faſciaque elytrorum poſteriore albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 129. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 41. *t.* 24. *f.* 19.
Habitat in Germania.

hiſpidus. 65. C. corpore ſulcato, adſperſo ſquamis erectis. *Fn. ſuec.* 619.*
Habitat in Europa.

pediculatus. 66. C. corpore rubro, elytris albido ſubfaſciatis. *Fn. ſuec.* 620.*
Habitat in Europa.

Tortrix. 67. C. corpore teſtaceo, pectore fuſco. *Fn. ſuec.* 622.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 116. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 146.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 300. *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 214. *n.* 16.
Habitat in populo tremula, *folia contorquens.*

tremulae. 263. C. nigricans, elytris ſtriatis griſeo irroratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 147.
Habitat in Sueciae *populo, ſtatura et magnitudine tortricis.*

taeniatus. 264. C. thorace nigro: margine anteriore et poſteriore rufis, elytris pallidis nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 148.
Habitat in Anglia, *tortrice minor.*

quadripuſtulatus. 265. C. niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 121. *mant. inſ.* 1. *p.* 109 *n.* 149.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura brenti diſparis.*

266. C.

elongatus. 266. C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 122. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 150.
Habitat in Jamaica.

byrrhinus. 267. C. thorace elytrisque nigris margine ferrugineis, pectore utrinque niveo. *Sparrm. nov. act. Stock.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ater, ovatus.*

ſtrigirostris. 268. C. thorace granulato, elytris punctato-ſtriatis, roſtro longitudinaliter utrinque ſulcato. *Sparrm. nov. act. Stock.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *nunc totus nigricans, nunc, praeter caput et thoracem, ſpadiceus.*

laniger. 269. C. elytris cicatriſato-reticulatis: poſterius maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus denticulatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſupra niger, ſubtus rubicundo-lanuginoſus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griſeis.*

tibialis. 270. C. niger cinereo-nebuloſus oblongus, thorace ſubgloboſo, elytris ſtriatis, roſtro inflexo canali pectoris immerſo, tibiis anterioribus intus barbatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glyphicus. 271. C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. *Schall. Abh. der hall. Geſ. Naturf. Fr.* 1. *p.* 282.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura c. nucum, ſed minor.*

capucinus. 272. C. elytris griſeo-nebuloſis, maculis poſterius ad ſuturam oblongis punctisque binis albidis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 283.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine fere nebuloſi, at magis ovatus.*

Forſteri. 273. C. manibus longiſſimis. *Forſt. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 32. *n.* 32.
Habitat in Anglia, *oblongus, magnitudine c. pomorum, piceus, pilis cinereis tomentoſus, antennis tarſisque ruſis, elytris cinereis nigro-punctatis.*

pollinarius. 274. C. elytris depreſſis planis abbreviatis, ventre, elytrorum margine et pedibus polline aſperſis. *Forſt. nov inſ. ſp.* 1. *p.* 33. *n.* 33.
Habitat in Angliae *plantis variis, praeſertim urtica dioica, ſupra planus fuſcus.*

cinnamomi. 275. C. cinnamomeus, roſtro anterius analiculato ad margi-nem denticulato: apice erecto mucronato bifurco, poſte-rius gibbo granulato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 46. *t.* 24. *f.* 20. h. i.
Habitat in India, 10 *lineas longus; elytris punctato-ſtria-tis: macula punctisque aurantiis; an brenti ſpecies?*

affinis. 276. C. niger, elytris caeruleis punctato ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 77. *n.* 48.
Habitat Berolini, *carbonarii ſtatura et magnitudine.*

glaber. 277. C. ater nitidus, ſubtus punctatus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 49.
Habitat Berolini, 2 *fere lineas longus.*

denigratus. 278. C. ater, thorace punctato, elytris punctato ſtriatis apice ſubtus rubicundis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 52.
Habitat in Marchia, *fine roſtro lineam longus, aterrimo affinis.*

cardui. 281. C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato, elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto ſcutelloque flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 79. *n.* 54. *t.* 24. *f.* 22. k.
Habitat Berolini *in carduis.*

ireos. 286. C. totus candidus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 57.
Habitat in Sibiriae *iride, c. ſcrophulariae triplo major.*

crucifer. 287. C. fuſcus, ſubtus ex flavo cinereus nitenti-tomentoſus, elytris ad ſuturam cruce notatis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 35.
Habitat in Sibiria, *c. ſcrophulariae magnitudine.*

albicans. 288. C. thorace tuberculis quinque, elytris ſex, ano albo. *Lepech. it.* 2. *p.* 206. *t.* 10. *f.* 6.
Habitat in Ruſſia.

urticae. 289. C. niger planiuſculus, thorace utrinque dentato, ely-tris ſtriatis poſterius bipunctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 983.
Habitat in urticis.

rufus. 290. C. subgloboſus rufus, elytrorum lineis elevatis albo nigroque teſſellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 89. *n.* 998.
Habitat in Dania, *c. ſcrophulariae affinis.*

tuberculoſus. 291. C. niger, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum ſeriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n.* 80.
Habitat in Carniolia.

carioſus. 292. C. oblongus, roſtro nitidulo, elytris ſtriatis, femoribus anterioribus craſſioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n.* 81.
Habitat in Carniolia.

ſyngeneſiae. 293. C. cervinus, breviſſime villoſus, roſtro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n.* 82.
Habitat in Carnioliae *ſyngeneſiis.*

fuſcus. 294. C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris macula rubeſcente notatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 300. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

Geerii. 295. C. ſubgloboſus griſeus, coleoptris macula magna fuſca dorſali. *Degeer inſ.* 5. *p.* 212. *n.* 4.
Habitat in fraxino.

ulmi. 296. C. oblongus ex rufo fuſcus, proboſcide nigra, elytris macula nigricante.
Degeer inſ. 5. *p.* 215. *n.* 8. *t.* 6. *f.* 26. 27.
Habitat in ulmo.

pulverulentus. 297. C. oblongus niger, elytris cinereo maculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 268. *n.* 3. *t.* 15. *f.* 24.
Habitat Surinami.

frigidus. 548. C. fuſcus, elytris ſtriatis ſubtuberculatis ferrugineo variis.
Fabr. mant. inſ. 2. *app. p.* 381.
Habitat in Amboina, *mediae magnitudinis.*

bohemus. 552. C. elytris griſeis punctatis, antennis pedibusque rufis.
Mayer Abh. der boehm. Geſ. 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *pomariis, pulicis magnitudine, celerrime currens.*

reticulatus. 573. C. oblongus niger, elytris profunde punctatis reticulatisque: rugis transverſe leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n* 423.
Habitat in Europa.

574. C.

subfasciatus. 574. C. ferrugineus, elytris fulvo obsolete fasciatis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 426.
Habitat in Europa.

tricolor. 575. C. testaceus, capite, thorace pedibusque rufis, elytris fasciis duabus dentatis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 427.
Habitat in Europa.

dentatus. 576. C. rufus, femoribus dente valido armatis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 431.
Habitat in Europa.

acutus. 577. C. rufus, elytris striatis, femoribus acute dentatis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 432.
Habitat in Europa, *an satis distincta species?*

cinerascens. 578. C. niger subtus cinerascens, elytris striatis, rostro longitudine corporis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 434.
Habitat in Europa.

muricatus. 579. C. subglobosus niger, elytris sulcatis pilosis cinereis, posterius muricatis, tibiis tarsisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 435.
Habitat in Europa.

cinereus. 580. C. subglobosus cinereus, antennis pedibusque rufescentibus. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 436.
Habitat in Europa.

bipunctatus. 581. C. subglobosus cinereus, thorace griseo: anterius tuberculis quatuor, elytris striatis: singulorum disco punctis duobus griseis. *Mus. Lesk. p.* 20. *n.* 439.
Habitat in Europa.

Daviesii. 601. C. albido griseus, elytris anterius angulatis: macula magna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 13. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Noveboraco, *c. nucum duplo fere major.*

zonatus. 602. C. niger, thorace lateribus elytrisque fasciis tribus distinctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 1787. 8. *n.* 3. 14.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis, subovatus.*

** *Brevirostres.*

† *femoribus dentatis.*

spectabilis. 298. C. corpore viridi nigroque variegato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 208. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 269.
Habitat in nova Hollandia.

pinguis. 299. C. gibbus nigricans, femoribus posterioribus muticis, thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 270.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

tridens. 300. C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 271.
Habitat in nova Seelandia, *magnus.*

fusco-maculatus. 301. C. ater, femoribus subdentatis, thorace elytrisque laevibus fusco maculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 272.
Habitat in Germania, *magnus, laevis.*

liguſtici. 68. C. abdomine subovato murino. *Fn. suec.* 621.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 197. *n.* 209. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 273. Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore obscuro.
Degeer inf. 5. *p.* 218. *n.* 10. Curculio apterus antennis fractis &c.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 12.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 33.
Habitat in liguſtico levistico.

nubilus. 302. C. griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 210. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 274.
Habitat Hamburgi.

nigrita. 303. C. niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 211. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 275.
Habitat in Italia, *statura et magnitudine sulcati.*

sulcatus. 304. C. ater, elytris striatis ferrugineo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 212. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 276. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 35.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 85. *n.* 86. *t.* 24. *f.* 35?
Habitat in Saxoniae *nemoribus.*

gemmatus. 305. C. ater, elytris punctis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 213. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 277. *Scop. ent. carn. n.* 90. *Schulze Naturf.* 6. *t.* 4.
Habitat in Europa.

picipes. 306. C. griſeus, elytris nebuloſis, femoribus poſterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 214. *mant. inſ.* 3. *p.* 122. *n.* 278.
Habitat in Kilonii *plantis.*
Elytra *punctis ſubocellaribus ſtriata.*

ovatus. 69. C. abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis. *Fn. ſuec.* 626.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 221. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 287. *Bonſd. curc. ſuec.* 2. *f.* 26.
Degeer inſ. 5. *p.* 219. *n.* 11. Curculio roſae.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 85. *n.* 90. *t.* 24. *f.* 36.
Habitat in Europae *pomona.*

attelaboides. 307. C. roſtro elytrisque unituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 222. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 288.
Habitat in Braſilia.

oblongus. 71. C. antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 625.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 220. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 286. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 294. *n.* 39. Curculio oblongus niger, elytris pedibusque teſtaceis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 168. *n.* 102. *t.* 45. *f.* 9. c. f.
Habitat in Europa.

pyri. 72. C. aeneo-fuſcus. *Fn. ſuec.* 623.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 217. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 281.
It. ſcan. 355. Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 282. Curculio ſquamoſo-viridis &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 246. *n.* 34.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 11.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 23.
Habitat in pyri *foliis larva, in hujus* prunique *corollis imago.*

mali. 308. C. ſubpubeſcens fuſcus, femoribus acute dentatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 499. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 282. *Lesk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 13.
Habitat Lipſiae, *c. pyri proxime affinis.* Leske.

arboreti. 309. C. cinereus, femoribus anterioribus dentatis, elytris punctato striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 283.
Habitat in Cayenna, *argentati magnitudine et statura.*

argentatus. 73. C. corpore viridi-argenteo. *Fn. suec.* 624.* *Scop. ent. carn.* 91. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 218. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 284. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 12.
Fn. suec. 459. Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 293. *n.* 38. Curculio squamosus viridi-auratus.
Degeer inf. 5. *p.* 219. *n.* 12. Curculio urticae.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 9.
Habitat in Europae *urtica, betula, corylo, quercu.*

viridanus. 310. C. viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 219. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 285.
Habitat Tranquebariae.

Morio. 311. C. ater nitens elytris glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 215. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 279. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 29.
Habitat in Germania, *et* Suecia *magnus.*

bisulcatus. 312. C. niger, coleoptrorum limbo cinereo, rostro bisulcato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 216. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 280.
Habitat in Italia, *statura sulcati.*

aeruginosus. 313. C. oblongus totus viridis, femoribus ferrugineis, antennis longioribus. *Bonsd. hist. curc.* 2. *p.* 23. *n.* 7. *f.* 8.
Habitat in Suecia, *statura magis oblonga et antennis longioribus a c. pyri distinctus.*

erythropus. 315. C. oblongo ovatus niger, antennis longioribus pedibusque rufis. *Bonsd. curc.* 2. *p.* 25. *n.* 10. *f.* 10.
Stroem act. Hafn. 2. *p.* 57. *n.* 28. 29. Curculio salicis et dubius.
Habitat in Scandinaviae *herbidis, frequentior; an a rufipede satis distinctus, cum femora non semper dentata.*

tessulatus. 316. C. ovatus niger, elytris striatis: striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. *Bonsd. curc.* 2. *p.* 38. *n.* 31. *f.* 32. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 967.
Habitat in Scandinavia, *punctatulo affinis.*

317. C.

floricola. 317. C. niger, elytris incanis, antennarum articulis mediis ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 86. *n.* 93. *Habitat* - - - 3 *lineas longus, c. pyri affinis.*

Fullo. 318. C. elytris nigris albo punctatis. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 116. *n.* 221. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 86. *n.* 91. *t.* 24. *f.* 37.
Habitat in Auſtriae *plantis variis, praeſertim arboribus, niger,* 3½ *lineas longus.*

anthracinus. 319. C. niger, elytris punctatim ſtriatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n.* 92.
Habitat in Carniolia.

lugubris. 320. C. fuſcus, elytris punctis ſcabris ſubſtriatis villoſulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n.* 93.
Habitat in Carniolia.

infidus. 321. C. obſolete cupreus, caeruleſcenti-villoſus. *Scop. ent. carn. n.* 94.
Habitat in Carniolia.

pruni. 322. C. niger ſubvilloſus, antennis, elytris pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 95.
Habitat in Carniolia.

caeleſtinus. 323. C. caeruleus, antennis pedibusque ſanguineis. *Scop. ent. carn. n.* 96.
Habitat in Germania.

carniolicus. 324. C. fuſcus, glauceſcenti-villoſus, elytris ſparſim punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 97.
Habitat in Carniolia.

Scopolii. 325. C. fuſcus villoſulus, antennis pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 98.
Habitat in Carniolia, *an diſtinctus ab ovato?*

Roeſelii. 326. C. thorace obſcure viridi: linea longitudinali alba, elytris fuſco-fulvis: lineis elevatis ſulcatis. *Roeſ. inſ.* 3. *p.* 391. *t.* 67. *f.* A. B. C. D.
Habitat in Germania, *roſtro craſſo.*

Mülleri. 327. C. niger, elytris ſubſtriatis, oculis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 963.
Habitat in Daniae *leviſtico.*

danicus. 322. C. ater, elytris subsuleatis pallide punctatis, oculis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 964. *Habitat in* Dania.

squamifer. 323. C. oblongus, elytris griseo nigroque striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 968. *Habitat in* Dania.

austriacus. 324. C. cinereus apterus, elytris lineis albidis nigro-punctatis. *Schranck inf. Austr. p.* 117. *n.* 222. *Habitat in* Austria.

religiosus. 325. C. ater nitens, elytris albo maculatis. *Schranck inf. Austr. p.* 118. *n.* 225. *Habitat in* monte Austriae Oettscher *ad* cellas Marianas, 4 *lineas longus, habitu germani.*

coronatus. 326. C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo: basi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 291. *n.* 34. *Habitat in* Gallia.

Tigris. 327. C. niger, maculis flavo-villosis, elytris subrugosis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 292. *n.* 35. *Habitat in* Gallia.

corrugatus. 328. C. fuscus apterus, elytris rugoso-striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 293. *n.* 37. *Habitat in* Gallia.

geographicus. 329. C. subglobosus ex nigro fuscus, squamosus, lineolis albis varius. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 294. *n.* 40. *Habitat in* Gallia.

fascialis. 330. C. fuscus, elytris striatis: macularum albarum fascia triplici transversa. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 295. *n.* 41. *Habitat in* Gallia.

albo-punctatus. 331. C. subglobosus squamosus ex cinereo fuscus, elytrorum maculis tribus et apice albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 299. *n.* 47. *Habitat in* Gallia.

sericeus. 332. C. obscure rufus cinereo-villosus, rostro thorace breviore. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 300. *n.* 52. *Habitat in* Gallia.

Virgo. 333. C. oblongus cinereo-villosus, rostro thoraci aequali. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 301. *n.* 53. *Habitat in* Gallia.

334. C.

ſtritos. 334. C. oblongus niger flaveſcente-punctatus, antennis longis fractis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 217. *n.* 9.
Habitat - - - 2 *lineas longus.*

granulo-ſus. 601. C. niger, thorace varioloſo, elytris punctis elevatis rugoſis: interſtitiorum punctis minoribus. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 490.
Habitat in Europa.

leproſus. 602. C. villoſus ferrugineus albido-maculatus, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 491.
Habitat in Europa.

ſulcatus. 603. C. fuſcus thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis: rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 492.
Habitat in Europa.

chryſoſti-ctos. 604. C. fuſcus glaber, thorace punctato, elytrorum ſulcis crenatis maculisque tribus auro conſperſis, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 493.
Habitat in Europa.

argenta-tus. 605. C. viridi-argenteus, antennis tibiisque rufis, femoribus fuſcis clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 500.
Habitat in Europa.

haemor-rhous. 606. C. fuſcus, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fuſco vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 501.
Habitat in Europa.

†† *femoribus muticis.*

polygoni. 26. C. thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuſcis futuraque nigro-punctata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 200.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 609. *n.* 26. *Fn. ſuec.* 597. Curculio longiroſtris teſtaceus, coleoptrorum ſutura nigra repanda.
Habitat in Europae *polygono, mediae magnitudinis.*

griſeus. 335. C. ſupra griſeo fuſcus, ſubtus cinereus, roſtro canaliculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 201.
Habitat in Anglia.

trigutta-tus. 336. C. nigricans, elytris griſeis: maculis duabus albis, poſteriori majori communi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 202.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 11.
Habitat in Anglia.

gemina-tus. 337. C. cinereus, thorace trilineato, elytris ſtriis numeroſis fuſcis per paria approximatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 203.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis, fere globoſus.*

diadema. 338. C. flaveſcenti-villoſus, roſtro apice retuſo atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 204.
Habitat in Cayenna, *ſtatura c. coryli, at paulo major.*

coryli. 339. C. cinereo fuſcoque varius, elytrorum ſutura dimidiata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 205.
Habitat in Angliae *corylo.*

Spengleri. 32. C. fuſcus, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 174. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 229. *Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat in America, *ſtatura c. pini.*

vittatus. 33. C. ater, elytris ſtriis albis rubriſque abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 173. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 228. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 610. *n.* 33. Curculio longiroſtris, elytris lineis albis luteisque.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. Scarabaeus Curculio.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

bivitta-tus. 340. C. niger, elytris punctato ſtriatis: vitta marginali dorſalique interrupta flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 230.
Habitat in inſula S. Thomae, *ſtatura c. Spengleri.*

lividus. 341. C. griſeus, thorace elytrisque cinereo atroque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 175. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 231. *Brown illuſtr.* 129. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

pulcher. 342. C. coleoptris atris: ſtriis ſex dorſalibus approximatis abbreviatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 176. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 232.
Brown illuſtr. 126. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in Jamaica, *ſtatura vittati.*

343. C.

hiſtrionicus. 343. C. griſeus, thoracе lineis lateralibus fulvis, elytris albis: maculis atris fulvisque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 177. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 233. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *p.* 44. *n.* 17. *t.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Rohrii. 344. C. elytris acumininatis griſeis: baſeos margine flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 178. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 234.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis*. v. Rohr.

impreſſus. 345. C. niger, thorace elytrisque punctis impreſſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 179. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 235.
Habitat in Jamaica, *ſtatura pulchri.*

cervinus. 70. C. griſeus, antennis baſi ruſeſcentibus. *Fn. ſuec.* 627. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 160. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 213. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 15.
Degeer inſ. 5. *p.* 220. *n.* 13. Curculio griſeo-aeneus.
Habitat in Europa, *femoribus interdum dentatis.*

ſtriatus. 346. C. fuſcus, elytris ſtriis cinereis nigro-punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214.
Habitat in Africa, *parvus.*

Lacerta. 347. C. griſeus, elytris ſtriatis, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 215.
Habitat in India, *ſtatura cervini, at triplo major.*

velox. 348. C. piloſus niger, elytris margine, puncto baſeos, faſcia interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 216.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

argyreus. 74. C. femoribus ſubmuticis, corpore toto viridi argenteo aureoque maculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 54.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 128. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 159.
Habitat in America *auſtrali et* India, *facie argentati, femoribus primoribus ſpina obſoleta armatis.*

imperialis. 349. C. elytris ſtriis elevatis atris ſulcisque punctatis viridiaureis alternis, baſi gibbis apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 129. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 160.
Drury inſ. 2. *t.* 33. *f.* 1.
Lindenberg Naturf. X. *p.* 86. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, maximus, inſectorum facile pulcerrimum.*

75. C.

regalis. 75. C. corpore viridi-fericeo: fasciis aureis repandis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 130. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 161.
Habitat in America *meridionali*, *magnitudine et statura germanici*, *femoribus fuscis*; *annulo aureo.*

marginatus. 350. C. fuscus, elytrorum sutura abdominisque marginibus aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 131. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 162.
Habitat in America.

19punctatus. 351. C. canescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris novendecim. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 132. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 163.
Habitat in Cayenna.

viridis. 76. C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 139. *mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 175. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 7.
Syst. nat XII. 2. *p.* 616. *n.* 76. Curculio breviroſtris, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore.
Degeer inf. 5. *p.* 256. *n.* 45. Curculio flavo-cinctus.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 108.
icon. t. 53. *f.* 6.
Habitat in Europae *pomona*, *magnitudine et statura c. pyri*, *antennis pedibusque nigris.*

gibber. 352. C. virescenti-albus, elytris basi unidentatis posterius gibbosis. *Pall. ic. inf. Ruff.* 1. *p.* 32. *t.* B. *f.* 14. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 176.
Habitat in Cayenna.

fulvus. 353. C. fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, roſtro emarginato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 113. *n.* 177.
Habitat in Saxonia, *parvus.*

palliatus. 354. C. fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Fabr. mant inf.* 1. *p.* 113. *n.* 178.
Habitat in Germania, *statura viridis*, *at paulo minor.*

aurifer. 355. C. corpore ferrugineo auro maculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 140. *mant. inf.* 1. *p.* 113. *n.* 179.
Drury inf. 1. *t.* 32. *f.* 1.
Habitat in America, *pedibus anterioribus elongatis.*

356. C.

cyanipes. 356. C. albus, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 180.
Habitat in Cayenna, *antennis fuſcis cyaneo nitidis.*

tamariſci. 357. C. viridi-nitens, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereoque variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 181.
Habitat in Africae *tamariſco, ſtatura ſplendiduli, at duplo fere major.*

ſplendidulus. 358. C. viridi-nitens, coleoptrorum diſco cinereo, cupreo nigroque faſciato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 141. *mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 182.
Habitat in Sibiria, *ſtatura argentati, at minor.*

curvipes. 359. C. argenteo ſquamoſus, tibiis poſterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 183.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

ſpecioſus. 77. C. corpore luteo viridi-nitente, elytris ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 55.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *ſpinis elytri utriusque* 5.

ruficornis. 78. C. corpore atro, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris. *Fn. ſuec.* 636.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 162. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 217. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 13.
Habitat in Europa.

albinus. 79. C. niger, fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Fn. ſuec.* 632. *Scop. ent. carn.* 66. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 180. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 236. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 255. *n.* 44. *t.* 8. *f.* 1. Curculio breviroſtris, antennis longis rubris &c.
Uddm. diſſ. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum ſex.
Habitat in Europa, *magis boreali, colore c. lapathi referens.*

latiroſtris. 360. C. roſtro latiſſimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 181. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 237. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 2. 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 17. Silpha oblonga.
Geoffr. inſ. par. 1. *t.* 5. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 6.
Habitat in Europa, *antennarum annulo rubro.*

361. C.

albirostris. 361. C. rostro latissimo plano elytrisque posterius albis nigro variis. *Schall. Abh. d. hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 287. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 238.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 80. *n.* 66. *t.* 24. *f.* 26. m.
Habitat in Germaniae *inferioris betula, latirostri duplo major.*

planirostris. 362. C. nigro aeneus, rostro latissimo plano pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 239.
Habitat Kilonii, *parvus.*

marginellus. 363. C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 182. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 240.
Habitat in Africa *aequinoctiali statura verrucosi, at minor.*

lineatus. 80. C. fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. *Fn. suec.* 630.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 155. *mant. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 206. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 16. 17.
Degeer inf. 5. *p.* 247. *n.* 35. Curculio brevirostris, antennis fractis &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 283. Curculio rostro thoracis longitudine &c.
Schaeff. ic. t. 103. *f.* 8.
Habitat in Europae *salice putrida, plantisque variis.*

lunatus. 364. C. coleoptris elevato-striatis: fascia semicirculari maculaque posteriore albis; lunula nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 156. *mant. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 207.
Habitat in Anglia.

fulvipes. 365. C. tomentoso-virescens, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 208.
Habitat Halae Saxonum, *statura parva lineati.*

ruficollis. 366. C. testaceus, capite elytrisque striatis cinereo-fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 209.
Habitat Halae Saxonum, *parvus.*

undatus. 367. C. fuscus, elytris apice pallidis: striga undata fusca. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 157. *mant. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 210.
Habitat in Germania, *parvus, statura lunulati.*

hispidulus. 368. C. fuscus, thorace cinereo lineato, elytris hispidis: punctis obscurioribus striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 211.
Habitat Kilonii *in plantis aquaticis.*

369. C.

fcabricu-lus. 369. C. corpore cinereo hiſpido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 212.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 21.
Mant. p. 531. Curculio breviroſtris femoribus muticis, cinereus, elytris hiſpidis.
Habitat in Sueciae *arenoſis.*

incanus. 81. C. oblongus fuſcus, thoracis dorſo plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 147. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 193. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 37. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 24. *f.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 616. *n.* 81. *Fn. ſuec.* 631.* Curculio breviroſtris cinereus oblongus, elytris obtuſiuſculis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 282. *n.* 10. Curculio cinereo ſquamoſus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 242. *n.* 28. Curculio griſeo apterus.
Liſt. ſcar. angl. p. 394. *n.* 30.
Habitat in Europae *pinetis.*

coſtatus. 370. C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 194.
Habitat in Gallia *auſtrali*, *magnitudine incani.*

interruptus. 371. C. obſcurus, coleoptrorum faſcia interrupta alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 148. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 195.
Habitat in nova Hollandia, *mediae magnitudinis.*

ſcutellaris. 372. C. ater, elytris crenato-ſtriatis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ment. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 196.
Habitat in terra van Diemen, *magnus.*

longimanus. 373. C. fuſcus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 149. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 197.
Habitat in Braſilia.

taucus. 374. C. nigricans, elytris griſeis cinereo punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 150. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 198. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 82. *n.* 64. *t.* 24. *f.* 25.
Habitat in Germania.

ſpiniſex. 375. C. cinereus fuſco irroratus, thorace acute ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 199.
Habitat - - - - *gibbus*, *mediae magnitudinis*

chloropus. 82. C. niger, antennis pedibusque rufis. *Fn. fuec.* 635.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 163. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 218. *Bonſd. curc. Succ.* 2. *f.* 19.
Habitat in Europae *plantis, parvus, valde oblongus.*

triſtis. 376. C. niger, elytris ſtriatis cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 164. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 219. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 28.
Habitat in Anglia, Suecia.

adſperſus. 377. C. ater, elytris poſterius albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 165. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 220.
Habitat in nova Hollandia.

punctatus. 378. C. fuſcus, elytris punctis holoſericeis elevatis margineque flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 166. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 221.
Habitat in Europa *boreali.*

obſcurus. 379. C. ovatus ferrugineo-fuſcus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 167. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 222.
Habitat in Europa *boreali.*

niger. 380. C. ovatus ſcaber niger, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 168. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 223.
Habitat in Germania.

varioloſus. 381. C. niger, thorace carinato varioloſo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 169. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 224.
Habitat in Saxoniae *campis.*

ſtictiſcus. 382. C. thorace elytrisque varioloſis nigris albo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 170. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 225.
Habitat ad caput bonae ſpei.

vulgus. 383. C. ater nitens, elytris punctato-ſtriatis, femoribus annulo cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 171. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 226.
Habitat in America *meridionali.*

ſuccinctus. 384. C. ater, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 172. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 227.
Habitat ad caput bonae ſpei.

rufipes. 83. C. cinereus oblongus, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 634.*
Habitat in Europa.

84. C.

nebulosus. 84. C. canus, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. suec.* 635.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 142. *mant. inf. p.* 118. *n.* 184. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 4.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 8.
Fn. suec. 1. *n.* 448. Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine.
Degeer inf. 5. *p.* 241. *n.* 27. Curculio carinatus.
Frisch inf. 11. *p.* 32. *t.* 23. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 3. *Knoch Beytr.* 1. *t.* 6. *f.* 8.
β) Curculio nebulosus capensis. *Sparrm. nov. act. Stokh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 18. *t.* 2.
Habitat in Europae *campis frequens*, β) *duplo major ad* caput bonae spei.

sulcirostris. 85. C. oblongus cinereus subnebulosus rostro trisulcato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 143. *mant. inf.* 1. *p.* 114. *n.* 185. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 19. *t.* 2. *Bonsdorf curc. Suec.* 2. *f.* 5.
Habitat in Europae *plantis*, *et ad* caput bonae spei *statura et magnitudine nebulosi.*

emarginatus. 385. C. oblongus fuscus, coleoptrorum dorso cinereo: lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 114. *n.* 186.
Habitat Halae Saxonum, *statura nebulosi*, *coleoptris apice emarginatis.*

perlatus. 386. C. niger, abdomine albo: punctis elevatis glabris atris, rostro sulcato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 114. *n.* 187.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine sulcirostris.*

glaucus. 387. C. rostro carinato thoraceque inaequali obscuris, elytris glaucis: puncto posterius elevato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 114. *n.* 188.
Habitat Kilonii, *magnitudine et statura albini.*

albidus. 388. C. oblongus fuscus elytris albidis; fascia media lituraque baseos apicisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 114. *n.* 189. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 83. *n.* 75. *t.* 24. *f.* 31. Curculio candidus.
Habitat in Germania, *nebuloso minor.*

lusitanicus. 389. C. oblongus supra fuscus, elytris macula baseos alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 144. *mant. inf.* 1. *p.* 115. *n.* 190.
Habitat in Lusitania, *statura et magnitudine incani.*

crenulatus. 390. C. cinereus, elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 145. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 191. *Habitat in* nova Hollandia.

punctatulus. 391. C. niger, elytris punctis nigris albisque alternis holoſericeis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 146. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 192. *Habitat in* inſula terrae novae, *magnitudine c. liguſtici.*

ater. 86. C. oblongus ater, antennis rufis. *Fn. ſuec.* 637.* *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 20. *Habitat in* Europa, *an mera varietas chloropodis?*

emeritus. 87. C. niger, thorace elytrisque ſpinoſis fronte excavata. *Muſ. Lud. Ulr.* 56.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 190. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 249. *Habitat in* America *auſtrali et* India, *aranei triſti facie.* Elytra *verrucis piloſis adſperſa.*

barbarus. 88. C. thorace ſubſpinoſo, elytris angulo duplici criſpato. *Fabr. ſp. inſ. p.* 194. *n.* 191. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 250. *Habitat in* Barbaria *et* Calabria, *minor in* Apulia, *duplo minor in* Gallia, *punctis excavatis adſperſus.*

algirus. 392. C. cinereus, thorace ſpinoſo ſulcato, elytris angulo duplici ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 251. *Habitat in* Africa *et* Calabria, *barbaro triplo minor.*

criſpatus. 393. C. thorace mutico ſcabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 192. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 252. *Habitat ad* caput bonae ſpei.

globoſus. 394. C. thorace ſpinoſo quinqueſulcato, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 193. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 253. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 33. *Drury inſ.* 1. *t.* 32. *f.* 4. *Habitat ad* caput bonae ſpei, *an vere diſtinctus ab obeſo?*

obeſus. 395. C. ater, thorace ſpinoſo inaequali, elytris rubris: punctis nigris confertis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 194. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 254. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 32. *t.* 2. *Habitat ad* caput bonae ſpei.

scalaris. 396. C. ater, thorace spinoso inaequali, elytris striis rufis denticulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 195. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 255.
Habitat ad caput bonae spei.

cultratus. 397. C. cinereus, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis posterius cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 196. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 256.
Habitat in nova Hollandia.

capensis. 89. C. ater, thorace elevato-punctato, elytris striato-crenatis. *Mus. Lud. Ulr.* 59. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 184. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 242. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 16. *t.* 2.
Habitat ad caput bonae spei.

Vitulus. 398. C. niger, fronte bidentata, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 185. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 243.
Habitat in Terra del Fuego.

inaequalis. 399. C. griseus, thorace inaequali anterius prominulo, elytris sulcatis, posterius bidentatis, rostro trisulcato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 186. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 244.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

rostratus. 400. C. fuscus, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris posterius spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 187. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 245.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

Spectrum. 401. C. thorace coleoptrisque globosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 188. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 246.
Habitat ad caput bonae spei, *parvus, singularis staturae.*

acuminatus. 402. C. cylindricus fuscus, elytris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 189. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 247.
Habitat in nova Seelandia.

capistratus. 403. C. fuscus, elytris acuminatis crenato-striatis, rostro sulcato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 248.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus.*

verrucosus. 90. C. aeneo-niger, elevato-punctatus, elytris posterius verrucosis. *Mus. Lud. Ulr.* 60.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 183. *mant. inf.* 1. *p.* 119. *n.* 241.
Drury inf. 1. 32. *f.* 5.
Habitat in Aethiopia.

cornutus. 91. C. cinereus, thorace elytrisque subspinosis, capite spinis fasciculato-pilosis. *Mus. Lud. Ulr.* 57. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 197. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 257. *Bonsd. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 24. *t.* 2. *Habitat in* nova Hollandia *et ad* caput bonae spei.

Tribulus. 404. C. cinereus, thorace scabro anterius impresso, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 198. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 258. *Habitat in* nova Hollandia, *rostro thoracem fere aequante, apice incrassato.*

retusus. 405. C. griseo-fuscus, elytris posterius retusis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 199. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 259. *Habitat ad* caput bonae spei, *statura cornuti.*

quadridens. 406. C. cinereus, thorace scabro, elytris spinosis: spinis quatuor; posterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 200. *mant. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 260. *Habitat in* nova Hollandia.

quadrispinosus. 407. C. albidus, elytris quadrispinosis, rostro fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 201. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 261. *Habitat ad* caput bonae spei.

Clavus. 408. C. albicans, thorace canaliculato, coleoptris spinosis: lineolis tribus baseos rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 202. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 262. *Habitat in* nova Hollandia.

nodulosus. 409. C. thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 203 *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 263. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 42. *n.* 12? Curculio nodulosus. *Habitat ad* caput bonae spei.

rubifer. 410. C. cinereus, thorace scabro, elytris spinis elevatis sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 204. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 264. *Habitat ad* caput bonae spei.

globifer. 411. C. thorace scabro, elytris spinosis posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 205. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 265. *Habitat ad* caput bonae spei.

412. C.

pilularius. 412. C. thorace utrinque ſpinoſo noduloſo, elytris tuberculato-ſtriatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 266.
Habitat ad caput bonae ſpei, *globifero proxime affinis.*

frontalis. 413. C. ater, fronte retuſa, thorace elytrisque tuberculato-ſeriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 14.
Habitat ad caput bonae ſpei, *praecedentibus affinis.*
Thorax *tuberculorum lineis* 4, *elytra conicorum utrinque tribus aſpera.*

16punctatus. 92. C. caeruleſcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris ſedecim. *Muſ. Lud. Ulr.* 58. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 133. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 164.
Habitat in Braſilia, *crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.*

decorus. 414. C. ſupra fuſcus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 134. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 165.
Habitat in America *meridionali.*

nitidulus. 415. C. viridi-ſquamoſus, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 135. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 166.
Habitat in Cayenna, *ſquamis cum aetate pereuntibus niger.*

candidus. 416. C. elytris ſpinoſis albis: macula laterali fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 136. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 167.
Habitat in Cayenna.

niveus. 417. C. niveus, thoracis dorſo roſtroque fuſcis, elytris ſpinoſis acuminatisque. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 168.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi.*

lacteus. 418. C. albus auro-nitidulus, elytris ſulcatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 137. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 169.
Habitat in Jamaica, *mediae magnitudinis, roſtri apice bifido.*

ſmaragdulus. 419. C. vireſcens, elytris punctatis: ſpina anteriore poſterioreque erecta valida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 170.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi, at paulo minor.*

8tuberculatus. 420. C. cinereo fuſcoque varius, coleoptris punctatis, poſterius gibbis: tuberculis octo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 171.
Habitat in Cayenna, *ſtatura candidi.*

Servus. 421. C. capite thoraceque obſcure ferrugineis, elytris fuſcis: punctis maculisque albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 172.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine octotuberculati.*

modeſtus. 422. C. cinereus, thorace elytrisque fuſco-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 138. *mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 173.
Habitat in nova Seelandia, *mediae magnitudinis.*

flaveſcens. 423. C. obſcurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 174.
Habitat in America *meridionali, viridi affinis, at paulo major.*

granulatus. 93. C. viridis ſtriatus punctis nigris elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 61.*
Habitat in America *auſtrali et* India, *magnitudine ſcarabaei ſtercorarii.*

abbreviatus. 94. C. ſubfuſcus, elytris griſeis: ſtriis atris glabris elevatis abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 62.* *Gron. zooph.* 597.*
Habitat in Martinica.

apterus. 95. C. thorace ſpinoſo: cruce impreſſa, elytris ferrugineo-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 206. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 267.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 619. *n.* 95. Curculio breviroſtris, pedibus muticis, corpore atro, thorace ſpinoſo, elytris coadunatis, abdomine punctato.
Degeer inſ. 5. *p.* 275. *t.* 16. *f.* 1. Curculio cruciatus.
Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 31. *t.* 2.
β) Curculio ornatus. *Drury inſ.* 2. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in India *et ad* caput bonae ſpei, *maximus.*

ocellatus. 424. C. thorace ſpinoſo anterius excavato, elytris cinereis: punctis atris ſubocellatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 207. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 268.
Habitat in Madagaſcar.

nivoſus. 425. C. thorace elytrisque ſeriatim tuberculatis niveo lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 41. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubtus albido et flaveſcente pruinoſus vel minutim ſquamoſus.*

nycthemerus. 426. C. albus, thorace elytrisque in parte ſumma atris, faſciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus,

bus, abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 41. *p.* 42. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Argus. 427. C. tomentoſus, capite thoracisque margine anteriore griſeo albioque punctatis, elytris ſtriis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Porculus. 428. C. cinereo-fuſcus piloſus, thorace lineis quinque, elytris poſterius maculis duabus albis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 20.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Tottus. 429. C. ex cinereo et fuſceſcente rufus, roſtro triſtriato, pedibus ſaepe rufeſcentibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei.

atratus. 430. C. glabriuſculus nigro-nitens, elytris ſtriatis: interſtitiorum punctis impreſſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 22.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cordiger. 431. C. thorace ſubdidymo cordato, utrinque aculeato, elytris ſtriatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 23.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Tauriculus. 432. C. niger, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato ſubcriſpato ſcabro, elytris lineis quatuor tuberculoſis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Juvencus. 433. C. fronte excavato-retuſa, thorace ſcabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum ſerie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 26.
Habitat ad caput bonae ſpei, *tauriculo affinis, at quadruplo minor.*

ephippiatus. 434. C. thorace tuberculis rugisque ſcabro, elytris utrinque ſerie ſesquitertia ſpinularum: ſutura ſpinulis conniventibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 27.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cuculatus. 435. C. fronte depressa scabra, thorace anterius porrecto rostroque bisulcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 48. *n.* 28. *Habitat ad* caput bonae spei, *griseus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.*

Uva. 436. C. ater, capite emarginato, thorace anterius foveolato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula baseos thoracis utrinque supra et subtus femorumque ferruginea. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 29. *Habitat ad* caput bonae spei.

biglobatus. 437. C. niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 30. *Habitat ad* caput bonae spei.

calvus. 438. C. ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco laeviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 34. *Habitat ad* caput bonae spei.

senilis. 439. C. fuscus griseo-irroratus, thorace teretiusculo, elytris striis elevatis laevibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 35. *Habitat ad* caput bonae spei.

Platina. 440. C. subtus lateribusque albo argenteo viridique aureo splendidus, supra pedibusque griseus, elytrorum fasciis longitudinalibus atris. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 36. *Habitat ad* caput bonae spei.

Gallina. 441. C. griseus, subtus canus, thorace utrinque sulcis quinque subaequatis obliquis, elytris leviter striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 37. *Habitat ad* caput bonae spei.

argynellus. 442. C. viridi-argenteus, oculis atris, rostro supra plano: linea longitudinali nigra impressa. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 39. *Habitat ad* caput bonae spei.

443. C.

nigellus. 443. C. nigricans, subtus ex griseo rufescens, antennis rectis, thorace elytrisque spinulosis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 52. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae spei, *statura albini, sed minor.*

Bonsdorfii. 444. C. oblongus albidissimus maculis quibusdam fasciaque nigris, rostro bisulcato fusco. *Bonsd. curc. Succ.* 2. *p.* 21. *n.* 5. *f.* 6.
Habitat in Sueciae, *potissimum salictis, statura sulcirostris, at duplo minor.*

tereticollis. 445. C. oblongo-ovatus, capite et thorace cylindricis angustis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 28. *n.* 14. *f.* 14. *Degeer inf.* 5. *p.* 246. *n.* 33.
Habitat in Sueciae *alnetis, non infrequens.*

lineellus. 446. C. oblongus cinereo fuscus, thorace striis tribus pallidioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 30. *n.* 17. *f.* 18.
Fn. suec. 1. *n.* 472. Curculio cinereus, fasciis longitudinalibus dilutioribus.
Habitat in Suecia, *pediculi magnitudine, lineato affinis.*

echinatus. 447. C. ferrugineus, abdomine globoso, elytris setis erectis dense echinatis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 21. *f.* 22.
Müll. zool. dan. prodr. p. 86. *n.* 947. Curculio scaber?
Habitat in Suecia, *subtus fuscus, ano rufo.*

Truncatulus. 448. C. ater, abdomine subgloboso, rostro brevissimo, antennis pedibusque rufis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 22. *f.* 23.
Habitat in Suecia.

capitatus. 449. C. fusco cinereus, sutura elytrorum basi nigra, rostro brevissimo lato, abdomine subgloboso. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 23. *f.* 24. *Degeer inf.* 5. *p.* 245. *n.* 32.
Habitat in Sueciae *pinetis, vulgatior, c. coryli proxime affinis.*

asperatus. 450. C. cinereus, abdomine ovato, elytris setis erectis brevissimis exasperatis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 34. *n.* 24. *f.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 288. *n.* 23.
Habitat Upsaliae *in arbustis, primo vere sub siccis foliis conspicuus.*

suecicus. 451. C. ovatus, posterius obtusissimus obscurus, thorace carinulato, antennis et pedibus fuscis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 37. *n.* 29. *f.* 30.
Habitat in Suecia.

murinus. 452. C. ovatus griseo-fuscus, elytris pallide maculatis, posterius setosis, rostro sulcato. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 37. *n.* 30. *f.* 31. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 943. *fn. Fridrichsd. n.* 116.
Habitat in Scandinaviae *plantis.*

clavipes. 453. C. oblongo ovatus gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis crassis. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *p.* 40. *n.* 35. *f.* 36.
Habitat in Hallandia Sueciae.

inderiensis. 454. C. apterus ovatus opalino-albus, thorace utrinque mucronato, elytris excavato punctatis. *Pall. inf. ross.* 1. *p.* 26. *t.* B. *f.* 5. *it.* 1. *app. p.* 464. *n.* 36.
Lepech. it. 1. *p.* 508. *t.* 16. *f.* 5.
Habitat circa lacum salsum Inderiensem *frequens, fabae minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.*

nomas. 455. C. albus, rostro crasso biporcato, thorace scaberrimo, elytris fusco oblique lituratis. *Pet. gaz. t.* 23. *f.* 4? *Pall. it.* 1. *app. p.* 463. *n.* 31. *inf. ross.* 1. *p.* 27. *t.* B. *f.* 6.
Habitat in aridissimis deserti caspici, *frequens circa fontes lacusque salsos, habitu nebulosi, sed major,* 10 *lineas longus.*

candidatus. 456. C. albo-nebulosus, rostro crasso: stria bifurca, thoracis dorso cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it.* 1. *app. p.* 463. *n.* 32. *inf. ross.* 1. *p.* 28. *t.* B. *f.* 7.
Habitat in aridis deserti caspici, *frequentissimus circa lacum* Inderiensem, *sulcirostri paulo major, subtus candidissimus.*

torridus. 457. C. apterus rufescente albus, supra lituris punctisque subverrucosis nigris, porco rostri crassi longitudinali. *Pall. inf. ross.* 1. *p.* 28. *t.* B. *f.* 8.
Habitat in salsis torridis deserti australis ad Volgam, *circa salsolarum et atriplicum radices, sulcirostris magnitudine, at crassior.*

Cenchrus. 458. C. dealbatus, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, rostro crasso uniporcato. *Pall. inf. ross.* 1. *p.* 29. *t.* B. *f.* 9.

Habitat

Habitat in torridis et ſqualidis deſerti Volgenſis *rarior, ſulciroſtri minor, magis teres.*

tetragrammus. 459. C. apterus cineraſcens, thorace fuſco: lineis quatuor lacteis, elytrorum lituris quatuor nigris, roſtro craſſo. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 29. *t.* B. *f.* 10.
Lepech. it. 2. *app. p.* 329. *t.* 11. *f.* 28.
Habitat in ſqualidis aridiſſimis deſerti Volgenſis *maxime auſtralis rarior, major, elegans.*

tribuloides. 460. C. thorace bicriſtato ſcabro, elytris ſpinis conicis axillaribus poſterioribusque roſtro craſſo. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 30. *t.* B. *f.* 11.
Habitat in Rio Janeiro Americae, *habitu inderienſis, europaeis omnibus major.*

nigrivittis. 461. C. cylindricus dealbatus, capite thoraceque ſubcarinatis: faſcia utrinque longitudinali fuſca. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 31. *t.* B. *f.* 12.
Habitat in aridis ſqualentibus deſerti caſpici, *frequens, octo lineas longus.*

Vibex. 462. C. cylindricus albiſſimus, thorace elytrisque ſtriga utrinque nigra longitudinali. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 32. *t.* B. *f.* 13.
Habitat in arenoſis ad Selengam, *frequens.*

feneſtratus. 463. C. apterus albus, roſtro craſſo, elytrorum maculis ſex rhombeis fuſcis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 33. *t.* H. *f.* B. 16.
Habitat in ſabuloſis ad Selengam, *nebuloſo minor.*

flaviceps. 464. C. apterus albatus, capite flaveſcente lateribus ruſo, roſtro craſſo, thorace elytrisque albo lineatis fuſco interruptis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 34. *t.* B. *f.* 17.
Lepech. it. 2. *app. p.* 327. *t.* 11. *f.* 27.
Habitat in arenoſis ad Selengam *et* Chonem, *rarior in* Tatariae *deſertis, magnitudine ſeminis atri.*

pictus. 465. C. albus, roſtro craſſo, thorace faſciis tribus longitudinalibus, elytrorum arcuata fuſcis. *Pall. it.* 1. *app. p.* 463. *n.* 33. *inſ. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 18.
Habitat rarior in aridiſſimis ſalſis deſerti caſpici, *circa lacum quoque* Inderienſem.

hololeucos. 466. C. ſubcylindricus totus albus immaculatus, roſtro craſſo, oculis atris. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 19.
Habitat in ſqualidis deſerti caſpici, *ſub atriplicibus et ſalſolis.*

467. C.

tenebrioides. 467. C. apterus aterrimus glaber, elytris laevigatis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 20.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26?
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 11.
Habitat rarior in deſerti caſpici *aridis, hami inter tenebriones apteros.*

albator. 468. C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, poſterius compreſſis pubeſcentibus: faſciis lateralibus niveis. *Pall. inſ. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 21.
Habitat in Braſilia, *major.*

noveboracenſis. 469. C. canus, elytris ſubfaſtigiatis: ſtriis quinque albidis nigro punctatis, ſcutello flavicante. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 35. *n.* 35.
Habitat in Noveboraco, 7 *lineas longus.*

melanogrammus. 470. C. corpore cano, ſutura elytrorum anterius nigra, nitida, roſtro breviſſimo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 36. *n.* 36.
Habitat in Anglia, *incano dimidio minor.*

plagiatus. 471. C. ſubgloboſus, elytris punctis longitudinalibus impreſſis ſtriisque e cinereo et fuſco alternis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 284.
Habitat in Marchia, *ſtatura C. coryli, at multoties major.*

cinereus. 472. C. oblongus cinereus, elytris albido nebuloſis: poſterius faſcia albida. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 285.
Habitat, rarus, Halae Saxonum, *lineati ſtatura.*

ſericeus. 473. C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus ſubdentatis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 286.
Habitat Halae Saxonum *in ſalice, aeſtate frequentiſſimus, argentato affinis, lineati ſtatura et magnitudine.*

tenebricoſus. 474. C. niger nitidus, oculis fuſcis, elytris connatis acuminatis excavato-punctatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 67. *t.* 24. *f.* 27.
Habitat Berolini, *rariſſimus,* 5 *lineas longus, tenebrioidi affinis.*

475. C.

Faber. 475. C. niger, roſtro lato, antennis fuſcis, elytris connatis: punctorum excavatorum ſeriebus octo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 68. *t.* 24. *f.* 28.
Habitat in Marchia.

major. 476. C. niger albido villoſus, thorace punctato rugoſo roſtrum aequante, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 69. *t.* 24. *f.* 29.
Habitat Berolini, *germanorum maximus.*

linzenſis. 477. C. apterus fuſcus, thoracis elytrorumque lateribus rufis. *Schranck enum. inſ. auſtr. p.* 123. *n.* 234.
Habitat Linzii.

ſplendidus. 479. C. viridis anguſtiſſimus, oculis fuſcis, antennis pedibusque fuſcescentibus, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 82. *n.* 72. *t.* 24. *f.* 30.
Habitat Berolini, 3 *lineas longus.*

trivialis. 480. C. cinereus, thorace lineis tribus exſoletis albis, elytris maculis fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 82. *n.* 73.
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longus, ſtatura c. polygoni.*

arenarius. 481. C. capite cano, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griſeis punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 22. *n.* 74.
Habitat Berolini, *ſtatura c. liguſtici, at dimidio minor.*

berolinenſis. 482. C. albicans, ſubtus varius, thorace rugoſo nigro ad latera variegato, elytris faſciis duabus undulatis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 83. *n.* 75. *t.* 24. *f.* 31.
Habitat Berolini, *frequens nebuloſo affinis, at multo minor.*

globatus. 483. C. capite thoraceque fuſcescentibus ſubaeneis, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine ſubgloboſo, elytris connatis punctato-ſtriatis: interſtitiis faſciis alternis cinereis et fuſcescentibus maculisque obſoletis albidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 83. *n.* 76. *t.* 24. *f.* 32.
Habitat Berolini *frequens, variae magnitudinis.*

Viverra. 484. C. ſordide cinereus, roſtro lato, thorace ſcabro, anterius turgido, per mediam longitudinem ſulcato, elytris ſtriatis:

striatis: interstitiis scabris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 83. *n.* 77.
Habitat in Pomerania, *vix sesquilineam longus, antennis fuscis.*

Herbstii. 485. C. cinereus, thorace subgloboso granulato, elytris rotundatis striatis: ocellis rubro-aureis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 84. *n.* 78.
Habitat Berolini, *rarior.*

pyricola. 486. C. angustus ater, subtus antennisque spadiceus, thorace granulato, elytris sulcatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 84. *n.* 79.
Habitat in Pomerania, *vix* 2 *lineas longus, rostro paulo longiore.*

granulatus. 487. C. ovatus griseus, supra granulatus: granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 84. *n.* 80. *t.* 24. *f.* 33.
Habitat in Marchia, 3 *lineas longus.*

piniperda. 488. C. spadiceus, thorace elongato punctato, elytris punctato-striatis, femoribus subdentatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 84. *n.* 81.
Habitat in Marchia, $1\frac{1}{2}$ *lineam longus, facie bostrichi piniperdae.*

suturalis. 489. C. elongatus cinereus fusco subvarius, subtus, lateribus suturaque albus, antennis oculisque nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 84. *n.* 82. *t.* 24. *f.* 34.
Habitat in Marchia, *angustus*, 3 *lineas longus.*

Eremita. 490. C. supra flavescente-pilosus, rostro tenui thoraceque subpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-striatis fuscis.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 85. *n.* 83.
Habitat in Marchia, 2 *lineas longus.*

bruchoides. 491. C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis et striatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 85. *n.* 84.
Habitat in Marchia, *brucho similis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, crassus rostro pendulo.*

singularis. 492. C. subbrevirostris cinereus, elytris striis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.

Habitat

Habitat in Luſitania, *mediae magnitudinis, femoribus clavatis.*

carinatus. 493. C. ſubbreviroſtris niger, thorace ſubcarinato, elytris angulatis tuberculatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.
Habitat in Luſitania, *barbaro ſimilis, at quadruplo minor.*

oedematoſus. 494. C. niger glaber politus, elytris ruſis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 40. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Cypri. 495. C. ſulcatus, linea dorſi longitudinali atra. *Haſſelq. it. p.* 449. *n.* 100.
Habitat in Cypro.

albidus. 496. C. apterus ſupra albicans, ſubtus dilute roſeus, thorace bicuſpidato, elytris ſulcatis: punctis canis. *Lepech. it.* 1. *p.* 313. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Ruſſia.

bipunctatus. 497. C. thorace ſcabro, elytris nebuloſis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 25.
Habitat in Sibiria.

guttatus. 498. C. niger, vellere rufeſcente nigro punctato: punctis in elytris tranſparentibus. *Lepech. it.* 2. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 30.
Habitat in Sibiria.

populneus. 499. C. ater, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn. n.* 74.
Habitat in Carniolia, *c. fagi proxime affinis, at femoribus aequalibus.*

piger. 500. C. femoribus anterioribus clavatis, roſtro ſtriis elevatis ſenis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn. n.* 65.
Habitat in Carniolia.

iners. 501. C. roſtro linea elevato unica, elytris ſtriis decem punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 68.
Habitat in Carniolia.

reſinoſus. 502. C. niger ſcaber, abdomine ſubtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn. n.* 67.
Habitat in Carniolia.

picatus. 503. C. piceus, abdomine nigro, ſubtus albido, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn. n.* 69.
Habitat in Carniolia.

erraticus. 504. C. rostro apice concavo, elytris subvillosis striatis: stria tertia tuberculata. *Scop. ent. carn. n.* 70.
Habitat in Carniolia.

C. album. 505. C. ex cupreo nigroque varius, elytris ad angulum baseos externum linea arcuata alba. *Scop. ent. carn. n.* 99.
Habitat in Carniolia.

sensitivus. 506. C. niger, femoribus fulvis apice nigris. *Scop. ent. carn. n.* 100.
Habitat in Carniolia.

nemoreus. 507. C. apterus niger opacus, capite glabro, rostro bifido, thorace elytrisque scabris acuminatis. *Scop. ent. carn. n.* 101.
Habitat in Carniolia.

Momus. 508. C. rostro supra bisulcato, abdomine posterius fulvo villoso, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn. n.* 102.
Habitat in Carniolia.

Zoilus. 509. C. rostro deflexo, elytris striatis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 103.
Habitat in Carniolia.

quercinus. 510. C. niger, scutello trilobo: lobo anteriore albo, elytris puncto albo. *Scop. ent. carn. n.* 106.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *quercu.*

carniolicus. 511. C. niger, thorace albido, elytris striis quinque elevatis nigris albo-punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 107.
Habitat in Carniolia.

villosulus. 512. C. rufus subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus obsoletis. *Scop. ent. carn. n.* 108.
Habitat in Carniolia.

praecox. 513. C. ferrugineus, elytris striatis subvillosis. *Scop. ent. carn. n.* 109.
Habitat in Carniolia, *sub finem Aprilis conspicuus.*

tricolor. 514. C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis: margine interiore albo, lineisque binis longitudinalibus flavis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 91. *n.* 45.
Habitat - - - -

515. C.

dentirostris. 515. C. ovatus niger, roſtro apice quadridentato. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 85. *n.* 941.
Habitat in Dania.

tardus. 516. C. nigricans, thorace elytrisque utrinque rufis: macula apicis atra. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 942.
Habitat in Dania.

nodoſus. 517. C. caneſcens, elytris nodulis minimis ſtriatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 948.
Olaff. it. isl. 1. *p.* 319. Silakkepr.
Habitat in Islandia.

longicornis. 518. C. nigricans, thorace hirto, elytris cinereis: maculis flavicantibus, pedibus antennisque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 949.
Habitat in Dania.

opacus. 519. C. totus griſeus laeviſſimus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 950.
Habitat in Dania.

bicolor. 520. C. griſeus, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 951.
Habitat in Dania.

maculoſus. 521. C. ovatus, obſcure flavicans, elytris luteo maculatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 952.
Habitat in Dania.

ſuturatus. 522. C. cervinus ovatus elytris lineis tribus elevatis: ſutura poſterius carinata. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 955.
Habitat in Dania.

terlineatus. 523. C. elongatus cinereus, thorace terlineato, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 956.
Habitat in Dania.

mollis. 524. C. griſeo-auratus, elytris mollibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 960.
Act. Nidr. 4. *p.* 12. *t.* 16. *f.* 6.
Habitat in Scandinavia.

undulatus. 525. C. griſeus nitens, faſciis elytrorum undulatis ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 961.
Act. Nidr. 4. *p.* 13.
Habitat in Scandinavia.

bispinus. 526. C. caeruleus, thorace utrinque spinoso, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1023. *Schaeff. ic. t.* 6. *f.* 4. *Habitat in* Europa.

inermis. 527. C. violaceus, thorace puncto utrinque impresso, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1025. *Schaeff. ic. t.* 56. *f.* 8. *Habitat in* Europa.

fuscatus. 528. C. nigro-fuscus, thorace utrinque fascia longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 280. *n.* 7. *Habitat in* Gallia.

fimbriatus. 529. C. niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis et punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 281. *n.* 9. *Habitat in* Gallia.

exaratus. 530. C. oblongus totus niger, thorace punctato, elytris sulcatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 282. *n.* 11. *Habitat in* Gallia.

squamosus. 531. C. squamis nitentibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 14. *Habitat in* Gallia.

Geoffroaei. 532. C. rufus subvillosus, capite nigricante. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 15. *Habitat in* Gallia.

graminеus. 533. C. caeruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 16. *Pet. gazoph. p.* 77. *n.* 6. *Habitat in* Europa.

doloro-sus. 534. C. oblongus niger, abdomine squamoso: lateribus albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 285. *n.* 17. *Habitat in* Gallia.

denticulatus. 535. C. ovatus ex nigro cinereus, thorace utrinque denticulato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 288. *n.* 24. *Habitat in* Gallia.

aculeatus. 536. C. subrotundus niger squamosus, elytris striatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 288. *n.* 25. *Habitat in* Gallia.

537. C.

subglobosus. 537. C. subglobosus ex cinereo ater, striatus, rostro thoracis longitudine. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 289. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

erythroleucos. 538. C. globosus rufus, elytris striatis: fascia transversa alba. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 289. *n.* 27.
Habitat in Gallia.

leucozonius. 539. C. globosus niger, elytris striatis: fascia transversa alba. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 289. *n.* 28.
Habitat in Gallia.

spinosus. 540. C. totus fuscus spinosus, elytris striis elevatis villoso-spinosis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 412. *n.* 97.
Habitat in Gallia.

armus. 541. C. niger, scutello albicante, elytrorum striis utrinque denticulatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 290. *n.* 31.
Habitat in Gallia.

marmoratus. 542. C. lividus, coleoptris fasciis plurimis obscuris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 291. *n.* 33.
Habitat in Gallia.

bohemicus. 543. C. corpore, capite antennisque nigris, thorace papilloso et elytris quatuor papillarum ordinibus insignitis cinereis incanis. *Richter Abh. Naturg. Boehm. p.* 34.
Habitat in districtu Bohemiae Reichenbergensi, *subglobosus, magnitudine dermestis pellionis.*

rotundatus. 544. C. apterus, corpore oblongo nitido nigro laevi. *Degeer inf.* 5. *p.* 243. *n.* 29. *t.* 7. *f.* 22.
Habitat in Europa, $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

multicolor. 545. C. corpore subglobosо ex rufo fusco: punctis ex flavo griseis, elytris carinatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 244. *n.* 30.
Habitat in alno, *mediae magnitudinis.*

ochropus. 546. C. corpore oblongo viridi nitido, antennis pedibusque flavis. *Degeer inf.* 5. *p.* 245. *n.* 31.
Habitat in Europa, *ultra* 2 *lineas longus.*

fasciculatus. 547. C. corpore ovato fusco: fasciculis pilosis griseis, antennis longis. *Degeer inf.* 5. *p.* 276. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 2.
Habitat Surinami.

fulvirostris. 549. C. nigro-aeneus rostro plano pedibusque flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in Scania *parvus.*

triangularis. 551. C. obscurus flavicans, thoracis basi triangulari, elytris striato-punctatis. *Petagn. inf. Calabr. p.* 14 *n.* 71.
Habitat Brancaleoni *in* Calabria, *in* carduorum *floribus frequens.*

formosus. 553. C. corpore virescente, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abh. boehm. Gef.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *floribus cardui, magnitudine c. pyri.*

carinatus. 582. C. griseus oblongus, rostro carinato: carina utrinque fuscata, thorace elytrisque punctatis: his polline griseo consperfis: punctorum ordinibus decem, pedibus anticis longioribus: femoribus tibiisque fusco annulatis. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 445.
Habitat extra Europam.

crassirostris. 583. C. griseus, rostro crasso supra rugoso, thorace nigro punctato, elytris obsolete rugosis: pilis erectis hispidis, abdomine fusco. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 449.
Habitat in Europa.

dealbatus. 584. C. oblongus varioloſus niger, polline albo consperſus, elytris fasciis obliquis duabus maculisque tribus albis, abdomine nigro punctato. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 450.
Habitat in Europa.

incinerarius. 585. C. niger, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis quatuor punctisque sparsis cinereis. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 456.
Habitat in Europa.

planirostris. 586. C. subglobosus griseus, rostro explanato, elytris striatis erecto-pilosis. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 459.
Habitat in Europa.

varius. 587. C. elytris griseo fulvoque variis punctato-striatis: punctis holosericeis fuscis. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 461.
Habitat in Europa.

nacvius. 588. C. nacvius, rostro crasso supra plano fusco, elytris rugosis: sutura elevata posterius carinata, femoribus fuscis, tibiis rufis griseo-squamosis. *Muf. Lesk. p.* 21. *n.* 463.
Habitat in Europa.

589. C.

coracinus. 589. C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoraceque punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 465.
Habitat in Europa.

latiroſtris. 590. C. elytris punctato-ſtriatis cinereo-piloſis, roſtro brevi lato ſtria dorſali exarato. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 466.
Habitat in Europa.

hirtus. 591. C. fuſcus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hiſpidis punctato-ſtriatis griſeis: horum marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 467.
Habitat in Europa.

rugatus. 592. C. griſeus, thoracis dorſo elytrorumque rugoſorum ſutura ferrugineo-fuſca, thoracis dorſo utrinque puncto. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 470.
Habitat in Europa.

infuſcatus. 593. C. roſtro thoraceque fuſcis: hujus lineis tribus griſeis, elytris tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 471.
Habitat in Europa.

obſoletus. 594. C. fuſco-griſeus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 472.
Habitat in Europa.

ſubrufus. 595. C. fulvo-griſeus, antennis tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 473.
Habitat in Europa.

clavipes. 596. C. oblongus fuſcus cinereo adſperſus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 475.
Habitat in Europa.

exoletus. 597. C. fuſcus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 478.
Habitat in Europa.

nubilus. 598. C. fuſcus griſeo-nebuloſus, roſtro lato plano, elytris ſtriatis apice obtuſis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 479.
Habitat in Europa, *magnitudine pediculi, ſtatura c. Albini.*

tenebricoſus. 599. C. niger ſubaeneus ovatus hirtus punctato-ſtriatus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 481.
Habitat in Europa.

lutoſus. 600. C. lutoſus ovatus, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 482.
Habitat in Europa.

RHINOMACER. *Antennae* setaceae, rostro insidentes. *Palpi* quatuor extrorsum crassiores.

curculioides. 1. Rh. villoso-griseus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 1.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 199. *n.* 1. Rhinomacer curculioides.
Habitat in Italia, *statura curculionis, subtus cinereus, pedibus nigris.*

attelaboides. 2. Rh. villoso-piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 2.
Habitat in Sueciae *pinetis, curculioide minor.*

caeruleus. 3. Rh. caerulescens subvillosus antennarum basi pedibusque flavis. *Petagn. inf. Calabr. p.* 14. *n.* 72. *f.* XXXIV.
Habitat ad littora Calabriae, Brancaleoni; *an forte Attelabi species?*

ATTELABUS. *Caput* posterius acuminatum, inclinatum. *Antennae* moniliformes, apicem versus crassiores.

* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A. niger, elytris rufis reticulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 619. *n.* 1. *Fn. suec.* 638. *Amoen. acad.* 5. *t.* 3. *f.* 171. Attelabus niger, elytris rubris.
It. oel. 153. Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.
Degeer inf. 5. *p.* 257. *n.* 46. *t.* 8. *f.* 3. Curculio excoriato-ruber.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 273. *n.* 11.
Pontopp. atl. Dan. p. 205. *n.* 1. *t.* 16.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 8.
Habitat in coryli *foliis, quae in cylindrum convolvit, et utrinque claudit.*

2. A.

avellanae. 2. A. niger, elytris, thorace pedibusque rubris.
Scop. ent. carn. 71. Curculio collaris.
Schaeff. ic. t. 56. *f.* 5. 6.
Habitat in Germaniae *corylis, a. coryli similis; an mera varietas?*

bicolor. 32. A. niger, thorace elytrisque rufescentibus, scutello femorum tibiarumque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 504.
Habitat in Europa.

denigratus. 33. A. niger, thorace elytrisque rubris, dorsi macula tibiis femorumque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 505.
Habitat in Europa.

erythropterus. 34. A. niger, elytris rubris laevissime striato-punctatis. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 506.
Habitat in Europa.

bipustulatus. 11. A. ater, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 2.
Habitat in America *septentrionali.*

gemmatus. 14. A. ferrugineus, tuberculis nigris sparsis. *Thunb. nov. inf. spec.* 3. *p.* 68. *f.* 80. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine et figura a. coryli.*

indicus. 15. A. ferrugineus, capite, elytrorum basi fasciaque cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 68. *f.* 81. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 5.
Habitat in India, *statura et magnitudine melanuri.*

curculionoides. 3. A. niger, thorace elytrisque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 72. Curculio nitens.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 273. *n.* 10.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 12.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 8.
Habitat in Europae *corylo, salice, a. coryli similis, sed minor.*

surinamensis. 4. A. elytris apice bidentatis.
Habitat Surinami, *pensylvanico similis, a. coryli minor, niger; elytris fuscis, pedibus ferrugineis, antennis albo nigroque annulatis.* Rolander.

pensylvanicus. 5. A. niger, elytris rubris: fascia media apicisque nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 3.
Habitat in America *boreali, statura surinamensis, sed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtusis basi flavescentibus, thorace oblongo glabro.*

melanuros. 6. A. niger, elytris testaceis apice nigris.
Habitat Upsaliae, *pensylvanico similis, sed major, antennarum abdominisque basi et elytris testaceis.*

angulatus. 16. A. ferrugineus, coleoptris angulatis: disco nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *statura A. coryli, antennis et pectore nigris.*

ruficollis. 17. A. rufus, capitis vertice nigro, elytris caeruleis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 8. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 87. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 1. a.
Habitat in Sibiria, *statura a. coryli, antennarum apice caeruleo.*

pubescens. 18. A. violaceus hirtus, rostro atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 9.
Habitat in Germania, *rostro longiori.*

betulae. 7. A. ater, pedibus saltatoriis. *Fn. suec.* 640.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 10.
Degeer inf. 5. *p.* 259. *n.* 47. Curculio excoriato-niger.
Habitat in betulae foliis, *quae rodendo pulcre crispa reddit, ocyssime saliens.*

** *maxilla unidentata.*

† *palpis posterioribus securiformibus*, Cleri.

mutillarius. 19. A. niger, elytris fascia triplici alba basi rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 1. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 87. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 2.
Schranck inf. austr. n. 34. Dermestes formicarioides.
Habitat Halae Saxonum.

dubius. 20. A. rufus, elytris nigris: fascia duplici alba basique rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 2.
Habitat in America *boreali.*

21. A.

ichneumonius. 21. A. capite thoraceque rufis, elytris nigris: fascia media rufa strigaque apicis alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 3.
Habitat in America *boreali.*

formicarius. 8. A. niger, thorace rufo, elytris fascia duplici alba basique rubris. *Fn. suec.* 641. *Scop. ent. carn.* 111. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 5.
Degeer inf. 5. *p.* 160. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 8. Clerus formicarius.
Schranck inf. austr. p. 21. *n.* 31. Dermestes formicarius.
Raj. inf. p. 103. *n.* 29.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Europa *et boreali* America, *ptinum pertinacem devastans, larva inter corticos putridos.*

sphageus. 22. A. niger, fronte elytrorumque fascia cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 4.
Habitat in America *boreali, statura et magnitudine formicarii.*

sexguttatus. 23. A. niger, fronte cinerascente, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

quadrimaculatus. 24. A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 288. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 7.
Habitat in Halae Saxonum *pinetis, parvus.*

unifasciatus. 25. A. niger, elytris fascia alba basi rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 8.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 13. Attelabus formicarius minor.
Habitat in Helvetiae *et* Africae *onopordo.*

octopunctatus. 26. A. cyaneus hirtus, elytris rufis: punctis quatuor nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 9.
Habitat in Hispaniae *umbellatis, statura formicarii.*

tricolor. 27. A. rufus, capite nigro, elytris basi caeruleis, medio rufis apice violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 10.
Habitat in Africa *aequinoctiali, formicario minor.*

bifasciatus. 28. A. viridi-aeneus pubescens, elytris cyaneis: fasciis duabus coccineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 11.
Habitat in Sibiria, *formicarii magnitudine.*

fipylus. 9. A. viridis, elytris faſcia duplici flava interrupta, thorace hirſuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 63.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 12.
Habitat in Africa, *ſtatura et magnitudine formicarii.*

Ammios. 29. A. viridis hirtus, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; poſterioribus lunatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 13.
Habitat in Africae *ammi majori, ſtatura et magnitudine apiarii.*

apiarius. 10. A. caeruleſcens, elytris rubris: faſciis tribus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 202. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 14.
Clerus elytris rubris: faſciis tribus caeruleſcentibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 304. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Clerus nigro-violaceus hirſutus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 157. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 3. Clerus caeruleo-violaceus.
Schranck inſ. auſtr. p. 21. *n.* 36. Dermeſtes apiarius.
Swammerd. bibl. nat. t. 26. *f.* 3.
Reaum. inſ. 6. *t.* 8. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 6. *et* 14.
Schaeff. el. t. 46.
ic. t. 48. *f.* 11.
Habitat in Europa, America, Sibiria, *larva frequens in alvearii, imago in floribus, formicario duplo major.*

cyaneus. 30. A. cyaneus, abdomine pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 15.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

crabroniformis. 31. A. niger hirtus, elytris rufis: faſciis tribus nigris; tertia terminali. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 16.
Habitat in Oriente, *apiario major.*

†† *palpis quatuor ſubfiliformibus*, Spondylides.

ceramboides. 12. A. ater, elytris rugoſis thorace latioribus. *Fn. ſuec.* 643.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Uddm. diſſ. 26. *t.* 1. *f.* 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 32. *n.* 2. Tenebrio varioloſus.
Habitat in boleto fomentario; *nonne potius tenebrio?*

bupreſtoides. 13. A. ater, elytris nervoſis, thorace ſubgloboſo. *Fn. ſuec.* 644.* *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.

Fn.

Fn. ſuec. 1. *n.* 554. Bupreſtis ater.
Degeer inſ. 5. *p.* 84. *n.* 21. *t.* 3. *f.* 21. Cerambyx maxillo-ſus niger &c.
Friſch inſ. 13. *p.* 23. *t.* 19. Scarabaeus arboreus, collo craſſo.
Habitat in Europae *ſilvis.*

NOTOXUS. *Antennae* filiformes. *Palpi* quatuor ſecuriformes. *Maxilla* unidentata.

porcatus. 1. N. niger, elytris porcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.
Habitat in terra van Diemen, *molli major.*

violaceus. 2. N. pubeſcens niger violaceo-nitidus, elytris laevibus: punctis tribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Habitat in nova Seelandia.

mollis. 3. N. pubeſcens, elytris nigris: faſciis tribus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 621. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 642. Attelabus griſeus pubeſcens, elytris faſciis tribus pallidis.
Uddm. diſſ. 28. *t.* 1. *f.* 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris faſcia triplici albicante.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 305. *n.* 3. Clerus fuſcus villoſus &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 159. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 6. Clerus fuſco-faſciatus.
Schranck inſ. auſtr. p. 22. *n.* 37. Dermeſtes mollis.
Habitat in Europae *floribus.*

monoceros. 4. N. thorace in cornu ſupra caput protenſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 4. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 88. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 651. *n.* 14. Meloë monoceros.
Fn. ſuec. 638. Attelabus monoceros.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 356. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 8. Notoxus.
Habitat in Europae *floribus.*

204. CERAMBYX. *Antennae* setaceae. *Palpi* quatuor. *Thorax* spinosus aut gibbus. *Elytra* linearia.

* *palpis quatuor aequalibus.*

1 *filiformibus.*

† *maxilla cylindrica integra*, Prioni.

†† *thorace spinis mobilibus.*

longimanus. 1. C. elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis. *Mus. Lud. Ulr.* 64.* *Gron. zooph.* 522.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 1.
Grew mus. 163. *t.* 13. Nocoonaca.
Degeer inf. 5. *p.* 102. *n.* 6.
Sloan. jam. 2. *p.* 209.
Merian. surin. t. 28.
Vinc. mus. t. 1. *f. inf. ved.*
Roes. inf. 2. *scar.* 2. *p.* 11. *t.* 1. *f.* a.
Aubent. miscell. t. 64. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, tibiis anterioribus in altero sexu longissimis.*

trochlearis. 2. C. elytris fusco canoque variis: punctis elevatis.
Habitat in India. Degeer.

†† *thorace marginato.*

fuliginosus. 84. C. ater, thorace crenato unidentato, elytris apice crenato-dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali, antennis pedibusque interdum rufis.*

rostratus. 85. C. thorace unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, sterno spinoso. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 3.
Habitat in Siam, *mediae magnitudinis, capite atro, antennis piceis, elytris nigris, pedibus rufis.*

cervicornis. 3. C. thorace utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus unispinosis, antennis brevibus. *Mus. Lud. Ulr.* 65.* *Gron. zooph.* 523.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 12.

Degeer

Degeer inf. 5. *p.* 94. *n.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 6.
Merian. furin. t. 48.
Roef. inf. 2. *fcar.* 2. *p.* 12. *t.* 1. *f.* B.
Brown jam. 429. *t.* 44. *f.* 8.
Aubent. miſcell. t. 90. *f.* 3.
Habitat larva in Americae *ligno* bombacis, *exemta edulis, incolis in* deliciis.

armillatus. 4. C. thorace utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus poſterioribus unidentatis. *Gron. zooph.* 525. *t.* 15. *f.* 6. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 15.
Habitat in India, *maximus.*

damicornis. 86. C. thorace denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 16.
Mant. 1. *p.* 532. Cerambyx thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus introrſum bidentatis, antennis mediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 97. *n.* 2.
Drury inf. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, cujus incolis larva in deliciis.*

imbricornis. 5. C. thorace bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato-imbricatis, brevioribus. *Gron. muſ.* 529.
Roef. inf. 2. *fcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Carolina, *ſtatura coriarii, an mera hujus varietas?*

Faber. 6. C. thorace utrinque unidentato rugoſo, elytris piceis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 646.* *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 6.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *p.* 2. *t.* 17.
Schaeff. ic. t. 72. *f.* 3.
t. 111. *f.* 1.
Habitat in Europae *ligno varior.*

coriarius. 7. C. thorace tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 647.* *Scop. ent. carn.* 161. *Gron. zooph.* 528. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 7.

Fn.

Fn. fuec. 480. Cerambyx niger, thorace planiuſculo, margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.
Gadd ſat. 79. Cerambyx cinereo nigricans, antennis et pedibus rufis.
Degeer inſ. 5. *p.* 59. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 5. Cerambyx Prionus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 198. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 9. Prionus.
Raj. inſ. p. 95. *n.* 1.
Friſch inſ 13. *t.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 26.
Roeſel inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Schaeff. el. t. 103.
ic. t. 67. *f.* 3.
Bergſtr. nomenel. 1. *t.* 13. *f.* 3. 4. 5. 6.
Voet coleoptr. 2. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat in Europae *betulis putridis, ova magna, oblonga, flaveſcentia pariens.*

giganteus. 87. C. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus. *Mant.* 1. *p.* 531. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 14.
Aubent miſc. t. 64. *f.* 2.
Drury inſ. 3. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, mandibulis bidentatis.*

melanopus. 8. C. thorace ſerrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 25. Prionus thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
Gron. zooph. 531.
Merian. ſurin. t. 24. *f.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, coriario duplo major.*

ſpinoſus. 88. C. thorace multidentato nigro, elytris unidentatis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 26.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

barbatus. 89. C. thorace integro, mandibulis ferrugineo-hirſutiſſimis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 27.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

Thomae. 9. C. thorace crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 15. *mant.*

mant. inf. 1. *p.* 129. *n.* 19. *Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 9.

Habitat in inſulis Americae, *meridionali oppoſitis*, 2 *pollices longus.*

bilineatus. 90. C. thorace crenato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 20.

Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.*

cinnamomeus. 10. C. thorace denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 66.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 24. Prionus thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.

Merian. ſurin. 24. *t.* 24.

Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 2.

Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 2.

Habitat in America *meridionali*, *elytris cinnamomeis.*

depſarius. 12. C. thorace ſubemarginato unidentato pubeſcente, corpore nigricante, antennis brevibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 7.

Habitat in Suecia, *coriario minor*, *et dimidio anguſtior.*

mucronatus. 91. C. thorace bidentato, elytris rufis mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 8.

Habitat in America *meridionali.*

curvus. 92. C. niger, thorace bidentato: dentibus arcuatis, elytris obtuſis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 9.

Habitat in terra van Diemen, *mediae magnitudinis.*

Luzonum. 93. C. thorace multiſpinoſo, mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 10.

Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 1.

Habitat in inſulis Luzonum.

ſerripes. 94. C. thorace multiſpinoſo, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus ſpinoſo-ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 11.

Habitat in Africa *aequinoctiali*, *c. luzonum proxime affinis.*

13. C.

atratus. 13. C. thorace utrinque bidentato, corpore atro, antennis mediocribus antrorsum aculeato-ferratis. *Gronov. zooph.* 524. *n.* 14. *f.* 9.
Habitat in Zeylon.

lineatus. 14. C. thorace serrulato dentato, elytris nigris: linea alba, antennis compressis brevioribus.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 204. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 4. Prionus thorace marginato crenato unidentato niger albo-vittatus, elytris apice crenato-dentatis.
Sloan. jam. 2. *p.* 209. *t.* 237. *f.* 34.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali, insulisque oppositis.*

nitidus. 95. C. thorace crenato unidentato, cyaneo-aeneus, elytris cupreis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 5.
Habitat in Brasilia, *coriario paulo minor.*

spinibarbis. 15. C. thorace suberenulato, capite sub maxillis spinoso scabro, antennis brevibus. *Mus. Lud. Ulr.* 67.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 208. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 21. Prionus thorace marginato crenato, capite sub mandibulis tridentatis.
Merian. surin. 24. *t.* 24.
Habitat in America *meridionali, niger.*

maxillosus. 96. C. thorace crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 22.
Drury inf. 1. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali, spinibarbi affinis.*

canaliculatus. 97. C. thorace crenato: canali dorsali villoso albo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 23.
Habitat in insulis, Americae *oppositis, coriario minor.*

bifasciatus. 16. C. thorace denticulato, corpore nigro, elytris rubris: fasciis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 17.
Gron. zooph. p. 532. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

cylindroides. 98. C. obscurus, thorace tridentato, pectore abdomineque ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 18.
Habitat in America *boreali, mediae magnitudinis.*

17. C.

planatus. 17. C. thorace ſcabro anterius dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 645.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 6. inſuſus flavipes.
Habitat in Europae *truncis decorticatis, pediculo duplo major, antennis mediocribus, vix hujus generis.*

†† *maxilla obtuſa unidentata*, Cerambyces.

barbicornis. 18. C. thorace ſpinoſo, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore teſtaceo nigro variegato. *Muſ. Lud. Ulr.* 68.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 34.
Habitat in Aſia.

Ammiralis. 19. C. thorace ſubſpinoſo, antennarum quarto articulo barbato, ſecundo ſpinoſo.
Habitat Surinami, *niger, elytrorum baſi, thoracisque lateribus rufis.*

Batus. 20. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 69.
Muſ. Petrop. 652. *n.* 154. Capricornus niger cornutus.
Habitat in America *auſtrali et* India.

araneiformis. 21. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris poroſis, antennis longis: articulo quinto barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 3.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 24.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali, griſeus, aedili duplo major.*

nodoſus. 99. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longiſſimis: articulo tertio apice nodoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 4.
Habitat in Marilendia.

cancriformis. 100. C. thorace multidentato: dorſo plano, elytris tibiisque anterioribus unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 5.
Drury inſ. 2. *t.* 35. *f.* 1. Cerambyx puſtulatus.
Habitat in America *meridionali.*

tuberculatus. 101. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, elytris punctatis ſpinoſisque, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 6.
Habitat in Jamaica, *ſtatura cancriformis.*

hebraeus. 102. C. thorace acute dentato: dorso bicarinato, elytris cinereis fusco striatis maculatisque. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 7.
Habitat in America *meridionali; cinereus.*

Scorpio. 103. C. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anterioribus apice dilatatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali, cinereus.*

Sentis. 23. C. thorace spinoso laevi, elytris fastigiatis biguttatis, antennis subtus aculeatis longioribus.
Habitat in India, *griseus, linea alba ab antennis per latera thoracis et abdominis ducta, antennis corpore sesquilongioribus.*

farinosus. 24. C. piceus, thorace spinoso, elytris punctis albis farinosis sparsis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 35.
Degeer inf. 5. *p.* 108. *n.* 9. *t.* 13. *f.* 17. Cerambyx niger &c.
Forster nov. inf. sp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinensis.
Merian. surin. t. 24. *f. inf.*
Drury inf. 2. *t.* 31. *f.* 4.
Habitat in argemones mexicanae *radice, larva albicans, capite caudaque nigris, imago lineolis duabus elytrorum mediis approximatis glabris.*

ferrugineus. 25. C. thorace spinoso rugoso, elytris fastigiatis subferrugineis, antennis longis. *Mus. Lud. Ulr.* 70.*
Habitat in India.

depressus. 26. C. depressus niger, cinereo variegatus, thorace multispinoso, elytris acuminatis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 32.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 626. *n.* 26? Cerambyx thorace quadrispinoso: dorso depresso, elytris fastigiatis nebulosis: anterius punctis elevatis sparsis, antennis longis.
Schreb. inf. 8. *f.* 10? Cerambyx lepturoides, thorace mucronato, elytris apice emarginatis, punctis elevatis scabris.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis, succinctis magnitudine.*

104. C.

Cerambycum *larvae cortices et ligna rodunt, perforant, penetrant, extrahuntur a picis.*

faſciatus. 104. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris faſcia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 33.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* F. *f.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 25. *f.* 5.
Habitat Tranquebariae.

glaucus. 28. C. glaucus, thorace quinqueſpinoſo, elytris muricatis: latere faſciaque nigris, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 111. *n.* 13. *t.* 14. *f.* 4. Cerambyx tuberculatus.
Habitat in America *meridionali, ſubtus fuſcus.* Rolander.

bidentatus. 105. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis ſcabris cinereo fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 10.
Habitat in America *meridionali.*

nebuloſus. 29. C. thorace ſpinoſo, elytris faſtigiatis: punctis faſciisque nigris, antennis longioribus. *Fn. ſuec.* 650. *It. gotl.* 173. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 36. *Scop. ent. carn. n.* 173.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 204. *n.* 7.
Voet coleoptr. 2. *t.* 4. *f.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 7.
Habitat in abietum *truncis, quas librum deſtruendo necat.*

faſciculatus. 106. C. thorace ſpinoſo, elytris integris: punctis tribus hiſpidis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 37.
Habitat in Germania, *medius quaſi inter nebuloſum et hiſpidum.*

hiſpidus. 30. C. thorace ſpinoſo, elytris anterius albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 37.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 215. *n.* 27. *Fn. ſuec.* 651. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris ſubpraemorſis punctisque tribus hiſpidis, antennis hirtis longioribus.
Fn. ſuec. 1. *n.* 484. *t.* 1. Cerambyx cinereus, elytris praemorſis nigris faſciaque alba, antennis ſesquilongioribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 17. Cerambyx faſciculatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 206. *n.* 9.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 4.

Schaeff. ic. t. 14. *f.* 9.
Frisch inf. 13. *p.* 22. *t.* 16.
Habitat in Europa.

pilosus. 107. C. thorace bispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 39.
Habitat Halae Saxonum, *statura bispidi, sed minor, griseus.*

rugicollis. 108. C. niger, thorace inermi rugosissimo, antennis mediocribus pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 40.
Habitat Tranquebariae.

longicornis. 109. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco griseoque vario, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 41.
Habitat in Coromandel, *mediae magnitudinis.*

marginalis. 110. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 42.
Habitat ad caput bonae spei.

brevicornis. 111. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis brevibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 43.
Habitat in Sierra Leon Africae.

desertus. 31. C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albofasciatis, antennis longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 71.*
Habitat in America.

succinctus. 32. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. *Mus. Lud. Ulr.* 72.* *Gron. zooph.* 535. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 27. *Degeer inf.* 5. *p.* 113. *n.* 14. *t.* 14. *f.* 5. Cerambyx fusco castaneus.
Marcgr. bras. 254. Quici.
Drury inf. 1. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in America, *praesertim* Brasilia.

strigosus. 112. C. ferrugineus, thorace bispinoso rugoso, elytris flavo striatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine succincti, antennarum corpore duplo longiorum femorumque apice nigro.*

rufipes. 113. C. thorace biſpinoſo rufo, elytris laevibus nigris, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 29.
Habitat in America *meridionali, ſtatura et magnitudine ſtigmatis.*

dimidiatus. 114. C. thorace biſpinoſo rugoſo, flavus nigro punctatus, elytris nigris baſi flavis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *ſuccincto paulo minor.*

bicolor. 115. C. ferrugineus, thorace biſpinoſo tuberculatoque, elytris ultra dimidium abdomineque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine rufipedis.*

virens. 33. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 12. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 627. *n.* 33. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis.
Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 39. 40.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 8.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis, antennis nunc longioribus, nunc brevioribus, femoribus nunc muticis, nunc dentatis.*

nitens. 116. C. viridi-nitens, thorace rotundato ſubſpinoſo, femoribus clavatis: clava anteriorum rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 13.
Habitat in Africa *aequinoctiali, virenti affinis.*

afer. 117. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. *Mant. p.* 532. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 14.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Africa.

feſtus. 118. C. thorace ſpinoſo viridi, elytris violaceis baſi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 15.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae.

vittatus. 119. C. viridis nitens, thorace ſpinoſo, elytrisque nigro lineatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 16.
Habitat in Braſilia.

velutinus. 120. C. thorace ſpinoſo niger: vitta atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 17.
Habitat in America *meridionali, virenti proxime affinis.*

ſuturatus. 121. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris ſutura vittaque media aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 18.
Habitat in America *meridionali, velutino proxime affinis.*

torridus. 122. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris viridibus apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 19.
Habitat in Sierra Leon Africae.

Gigas. 123. C. niger, thorace rugoſo acuteque ſpinoſo, elytris ferrugineis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 20.
Habitat in India, *maximus hujus tribus.*

moſchatus. 34. C. viridis nitens, thorace ſpinoſo, antennis cyaneis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 627. *n.* 34. *Fn. ſuec.* 652.* *Scop. ent. carn.* 165. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.
Fn. ſuec. 1. *n.* 478. Cerambyx viridi caeruleſcens, antennis corpus ſubaequantibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 2. Cerambyx odoratus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 203. *n.* 5. Cerambyx viridi-caeruleſcens.
Mouff. inſ. 149. *f. ult.* Cerambyx tertius.
Raj. inſ. p. 81. *n.* 17.
Liſter ſcar. p. 384. *n.* 11.
Friſch inſ. 13. *t.* 11.
Ammir. inſ. t. 33.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* e.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 7. *et t.* 55. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 13. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in Europae *ſalice, antennis pedibusque nunc cyaneis, nunc fuſcis, vivus odorem gratum et ſoporiferum ſpirans, ova pariens candida, ſapida.*

alpinus. 35. C. thorace ſpinoſo, coleoptris faſcia, maculisque quatuor atris, antennis longis. *Fn. ſuec.* 654. *Scop. ent. carn.* 166. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 23.

It.

It. ſcan. 260. Cerambyx ſubcaeruleſcens, faſcia maculisque 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 202. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 6.
Schaeffer. it. alp. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 3.
Mouff. inſ. 150. *f.* 2.
Rob. ic. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* d.
Schaeff. ic. t. 123. *f.* 1.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 5.
Habitat in Europae *montoſis.*

ſcalatus. 124. C. fuſcus: linea longitudinali alba, thorace ſpinoſo, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 24.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

cafer. 125. C. viridi-aeneus, thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.*

Morio. 126. C. ater, thorace biſpinoſo rugoſo, antennis longioribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 26.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ſuccinctli.*

aedilis. 37. C. thorace ſpinoſo: punctis quatuor luteis, elytris obtuſis nebuloſis, antennis longiſſimis. *Fn. ſuec.* 653.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 1.
It. oel. Cerambyx nebuloſus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 8. Capricornus ruſticus.
Degeer inſ. 5. *p.* 66. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Mouff. inſ. 151. *f.* 2.
Act. nidr. 4. *t.* 16. *f.* 8.
Friſch inſ. 13. *t.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. 3. 5. *t.* 1. *f.* 5. 6.* *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Europae *borealis arborum truncis, antennis pro ſexu diverſis.*

varius. 127. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 2.
Habitat in Auſtria, *aedili minor.*

Cerdo. 39. C. thorace ſpinoſo rugoſo niger, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 21. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 629. *n.* 39. *Scop. ent. carn.* 162. Cerambyx thorace ſpinoſo rugoſo nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 2.
Mouff. inſ. 149. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *t.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 8.
Berg ſtr. nomencl. 1. 8. 10. *t.* 1. *f.* 10. *et t.* 2. *f.* 3.
β) Cerambyx Heros. *Scop. ent. carn.* 163.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 200.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 5. 6.
Habitat in Europae *ligno*, β) *major.*

Heros. 128. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris apice ſubſpinoſis teſtaceis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 24. *f.* 3.
Habitat in Europae *quercu*, *cerdoni affinis.*

auricomus. 40. C. thorace quadriſpinoſo ater, elytris taeniis geminis aureis, pedibus poſterioribus latiſſimis compreſſis. *Gron. zooph.* 534. *t.* 16. *f.* 1.*
Habitat in America *meridionali*, *antennis corpore paulo longioribus.*

Juvencus. 53. C. thorace inermi rugoſo, elytris acuminatis nigris, lanuginoſo-caneſcentibus, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 44.
Habitat in America *meridionali ferrugineus*, *carchariae magnitudine.*

holoſericeus. 129. C. thorace inermi rugoſo, griſeus, elytris unidentatis holoſericeis fuſco cinereoque micantibus, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 45.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

longicollis. 130. C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 46.
Habitat in India, *mediae magnitudinis*, *capite fuſco.*

131. C.

Herbſtii. 131. C. niger, thorace rugoſo utrinque uniſpinoſo, elytris ſupra viridi-aureis: margine ad apicem faſciisque duabus rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 168. *n.* 11. *t.* 45. *f.* 10.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26?
Habitat in America.

platypus. 132. C. caeſius, ſubtus, antennis pedibusque caeruleus, elytris ex purpureo viridi-aureis: lineis duabus elevatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 169. *n.* 12. *t.* 45. *f.* 11.
Degeer inſ. 7. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in India, *ſtatura moſchati.*

luſitanus. 133. C. thorace ſpinoſo, corpore toto teſtaceo, elytris faſcia undulata pallida. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 5.
Habitat in Luſitania, *culicis magnitudine, antennis ferrugineis, an hujus tribus?*

balteus. 134. C. thorace ſpinoſo, corpore ferrugineo, abdomine ovato, elytris faſcia nigricante. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 6.
Habitat in Luſitania, *culicis magnitudine, antennis corpore vix longioribus, an ad hanc tribum ſpectat?*

ſmirnenſis. 135. C. thorace teretiuſculo ſubconvexo ad latera utrinque mucronato. *Haſſelq. it. pal. p.* 451.
Habitat in Syria; *an huic tribui adſcribendus?*

††† *maxilla bifida.*

† *cornea*, Lamiae.

Tribulus. 136. C. thorace quadriſpinoſo, ſcutello elytrisque ſpinoſis, antennis longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 1.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae.

fronticornis. 137. C. thorace ſpinoſo, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 2. Cerambyx bipunctatus.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fuſcus.*

pedicornis. 138. C. thorace elytrisque ſpinoſis, femoribus anterioribus cornutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

Hyſtrix. 139. C. thorace quinqueſpinoſo, elytris faſciculato-piloſis, antennis mediocribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Criſta. 140. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, elytris baſi tuberculo compreſſo tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 5.
Habitat in nova Seelandia.

ambulator. 141. C. thorace anterius utrinque biſpinoſo, corpore nebuloſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 6.
Habitat in inſulis Luzonum.

Rubus. 21. C. thorace ſpinoſo bimaculato, elytris bidentatis baſi ſcabris mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 59.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 625. *n.* 21. Cerambyx thorace ſpinoſo, antennis ſubtus hiſpidis longis, elytris bidentatis baſique mucronatis albo bimaculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 106. *n.* 7. *t.* 13. *f.* 16. Cerambyx albofaſciatus.
Habitat in India.

ſpinicornis. 142. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris griſeis truncatis, antennis compreſſis, articulis apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 60.
Habitat in Africa *aequinoctiali, rubo minor.*

brunnus. 143. C. brunneus, thorace triſpinoſo, elytris obtuſis: ſtriis duabus elevatis obſcuris, antennis compreſſis brevioribus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 37. *n.* 37.
Degeer inſ. 5. *p.* 99. *n.* 3. *t.* 13. *f.* 13. Cerambyx penſylvanicus.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *ſeptentrionali, moſchato major, an propria ſpecies huc ſpectans?*

ſcabrator. 144. C. ſubteſtaceus, thorace ſpinoſo, elytris punctis atris baſeos ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 61.
Habitat in India.

Spengleri. 145. C. cinereus, thorace ſpinoſo tuberculato, elytris ſcabris: maculis duabus lateralibus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 62.
Habitat in America *meridionali.*

146. C.

bidens. 146. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, elytris apice bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 63.
Habitat in nova Hollandia.

Cantor. 147. C. thorace mutico cinereo nigro-punctato, elytris pallide teſtaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 64.
Habitat in Sina, *mediae magnitudinis, niger, cinereo-villoſus.*

Solandri. 148. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis cinereo irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 65.
Habitat in nova Hollandia.

cornutus. 149. C. thorace obtuſe ſpinoſo, mandibulis baſi cornutis, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 66.
Habitat in America.

leproſus. 150. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi varioloſis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 67.
Habitat in America.

capenſis. 36. C. niger, thorace biſpinoſo, elytris faſciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 25.
Poda muſ. 32. *n.* 3.
Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 3.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26.
Habitat ad caput bonae ſpei.

hottentotus. 151. C. thorace ſpinoſo ruſo, elytris nigris: faſcia maculisque duabus marginalibus ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 26.
Brown ill. 118. *t.* 49. *f.* 1. Cerambyx punctatus.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26.

ferrugator. 152. C. obſcure ferrugineus, thorace ſpinoſo, elytris obſcure vireſcentibus: ſtriga interrupta ſanguinea, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 27.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

153. C.

humeralis. 153. C. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis anterius mucronatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 128.
Habitat - - - -

trifasciatus. 154. C. ater, thorace subspinoso, elytris fasciis tribus flavis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africae.

jamaicensis. 155. C. thorace spinoso posterius sinuato: elytris flavis: fasciis duabus maculaque rhombea cyanea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 30.
Habitat in Jamaica.

nobilis. 156. C. thorace spinoso atro: margine flavo, elytris atris: fasciis tribus flavis punctisque duobus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *statura bifasciati.*

aethiops. 157. C. ater thorace spinoso, elytris fasciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 32.
Habitat ad caput bonae spei.

variegator. 158. C. thorace spinoso cinereo elytrisque fusco variis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 33.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

Sutor. 38. C. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 17.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 628. *n.* 38. *Fn. suec.* 655.* *Scop. ent. carn.* 162. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis.
Fn. suec. 1. *n.* 482. Cerambyx ater, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus, thorace spinoso.
Gadd diss. 27. Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco aeneis.
Degeer inf. 5. *p.* 65. *n.* 4. Cerambyx atomarius.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Habitat in Europae *silvis.*

159. C.

Sartor. 159. C. niger, thorace ſpinoſo, ſcutello flavo, elytris immaculatis, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 18.
Habitat Dresdae, *an major varietas ſutoris?*

reticulator. 160. C. niger, thorace ſpinoſo nigro-lineato, elytrisque reticulatis fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 19.
Habitat in India, *ſutoris magnitudine.*

molator. 161. C. obſcure cinereus fuſco-maculatus, thorace ſpinoſo, elytris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

titillator. 162. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo fuſco glaucoque nebuloſis, antennis longiſſimis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 21.
Habitat in Carolina.

vittator. 163. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 22.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 38. *n.* 38. Cerambyx incanus.
Petiv. gazooph. t. 24. *f.* 6.
Habitat ad Sinus Campechienſis *littora.*

ocellator. 164. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris maculis quatuor flavis ſubocellaribus, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 123.
Degeer inſ. 7. *t.* 49. *f.* 1. Cerambyx ocellatus.
Voet coleopt. 2. *t.* 7. *f.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei.

Textor. 41. C. thorace ſpinoſo, elytris convexis atris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 629. *n.* 41. *Fn. ſuec.* 656.* *Scop. ent. carn.* 164. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis convexis atris punctatis, antennis mediocribus.
Uddm. diſſ. n. 29. Cerambyx ſordide niger, punctis elevatis ſparſis, antennis craſſis corporis longitudinem ſubaequantibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 3.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. 5. 8. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in Europae *truncis arborum.*

165. C.

vaginator. 165. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 8.
Habitat in India, *magnus.*

pulcher. 166. C. niger, anterius faſciis, poſterius punctis viridibus, thorace ſpinoſo, elytris baſi mucronatis. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 217. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 9.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 6.
Habitat in Africa.

regalis. 167. C. thorace ſpinoſo viridi faſciato, elytris viridi irroratis: maculis tribus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 10.
Brown illuſtr. t. 50. *f.* 1.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura pulchri.*

nigricornis. 168. C. griſeus, thorace mutico, elytris dorſo planis, antennis brevibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 11.
Habitat in Coromandel.

griſator. 169. C. griſeus, thorace mutico, elytris baſi tuberculis duobus apice ſpinoſis, antennis brevibus villoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſternutator. 170. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi poroſis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 13.
Habitat in inſula Barbados.

gutturator. 171. C. thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis albo irroratis: baſi punctis elevatis glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 14.
Habitat in Africa.

nubilus. 172. C. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fuſco ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 15.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

ariolator. 173. C. thorace ſpinoſo lineato, elytris fuſcis: linea ſemicirculari alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 16.
Habitat in India.

triſtis. 42. C. fuſcus, thorace ſpinoſo, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 37.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 95. *n.* 54.
Herbſt. apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 90. *n.* 6. *t.* 25. *f.* 7.
Habitat in ligno cupreſſi Europae *auſtralis, antennis interdum corpore duplo longioribus.*

funeſtus. 174. C. fuſcus, thorace ſpinoſo, elytris laevibus: maculis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 38.
Habitat frequens in Galliae *ſambuco, triſti proxime affinis, at duplo minor.*

punctator. 175. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 39.
Forſter nov. inſ. ſp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinenſis.
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 4. Cerambyx farinoſus.
Habitat in Sina.

criſpus. 175. C. thorace ſpinoſo, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae ſpei.

rotator. 176. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſubfaſciatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 41.
Habitat in India.

glycyrrhizae. 177. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris albo-lineatis binarinatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 42. *Pall. it.* 2. *p.* 723. *n.* 60.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 9. Cerambyx ovatus?
Habitat in Sibiria, *fuliginatore triplo major.*

cruciatus. 178. C. niger, thorace ſpinoſo, coleoptris cruce media alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 43. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 2. *t.* F. *f.* 5.
Lepechin it. 2. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8. Cerambyx crucifer.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, ſtatura fuliginatoris, at paulo major.*

43. C.

fuliginator. 43. C. niger, thorace subspinoso, elytris cinerascentibus, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 44.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 205. *n.* 8.
Degeer inf. 5. *p.* 70. *n.* 7.
Frisch inf. 13. *t.* 19.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 30.
Habitat in Europa *australi, aetate totus niger, lanugine derasa.*

cinerarius. 179. C. cinerascens, thorace spinoso, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 45.
Pall. ic. inf. roff. 2. *t.* F. *f.* 11.
Habitat in Russia *meridionali, statura fuliginatoris, cui proxime affinis.*

carinatus. 180. C. niger, thorace spinoso, elytris piceis: carina lateral elevata albida, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 46.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 91. *n.* 8. *t.* 25. *f.* 8.
Habitat in Sibiria, *statura et magnitudine fuliginatoris.*

coquus. 44. C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis atris anterius ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 47.
Habitat in America *boreali, thoracis spinis minutissimis.*

ruspator. 181. C. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuscis cinereo-variegatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 48.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

tornator. 182. C. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antinnis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 59.
Forst. nov. inf. sp. 1. *p.* 41. *n.* 41. Cerambyx tetrophthalmus.
Habitat in America *boreali.*

Bankfii. 183. C. griseus, thorace subspinoso, elytris ferrugineo irroratis: fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 50.
Habitat ad caput bonae spei.

saltator. 184. C. griseus, thorace inermi, elytris fasciis duabus maculatis abbreviatis strigaque posteriore punctata niveis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 51.
Habitat - - - - parvus.

185. C.

teſtator. 185. C. thorace ſpinoſo cornuque brevi recumbente, corpore teſtaceo, antennis brevibus apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 52.
Habitat in Africa *æquinoctiali, parvus, brevis, villoſus.*

Kachleri. 50. C. niger, thorace ſpinoſo elytrisque ſanguineis: maculæ nigra. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 96. *n.* 56. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 204. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 1.
β) Cerambyx ungarica. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 90. *n.* 4. *t.* 25. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 153. *f.* 4.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

pedeſtris. 51. C. ater, vitta integra alba, thorace ſpinoſo, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 53.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 631. *n.* 51. Cerambyx thorace ſpinoſo apterus niger, elytris tomentoſis atris: futura alba, antennis mediocribus.
Poda inſ. p. 34. *n.* 9. Cerambyx pedeſtris.
Scop. ent. carn. n. 168. Cerambyx arenarius.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 91. *n.* 9. *t.* 25. *f.* 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

Scopolii. 186. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris unicoloribus, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 54.
Scop. ent. carn. n. 169. Cerambyx aethiops.
Habitat in Germania *auſtrali, pedeſtri proxime affinis, at paulo minor, elytris nunc nigris, nunc teſtaceis.*

germanicus. 187. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris marginibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 55.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine pedeſtris.*

molitor. 188. C. fuſcus, vittis tribus integris albis, thorace ſubſpinoſo, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 56.
Habitat in India, *an varietas pedeſtris?*

tuberculator. 189. C. griſeus, thorace mutico, coleoptris baſi bituberculatis: maculis duabus communibus albis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 57.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

nutator. 190. C. villosus, thorace mutico lineato cinereo, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 58.
Habitat in Tahiti, *tuberculatoris magnitudine.*

curculionoides. 64. C. fuscus, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 34. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 634. *n.* 64. Cerambyx thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesqui-altero, antennis longis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 101. *n.* 75. Leptura curculionoides.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 210. *n.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 1. *et t.* 155. *f.* 5.
Habitat in Europa *magis australi.*

luscus. 191. C. niger ferrugineo irroratus, thorace spinoso rugoso, elytris basi macula ocellari atra, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 35.
Habitat in Siam, *tristi paulo major.*

notatus. 192. C. obscurus thorace spinoso, elytris punctis duobus approximatis atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *statura curculionoidis.*

fulvus. 193. C. apterus niger, thorace spinoso, elytris rubris, abdomine brevioribus. *Schrank inf. austr. p.* 139. *n.* 263. *Scop. ent. carn. n.* 170.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 25. *f.* 10.
Habitat in Austria.

ungaricus. 194. C. niger, capite thoraceque spinoso linea longitudinali, elytris futura lineisque tribus albis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 91. *n.* 12. *t.* 25. *f.* 11.
Habitat in Ungaria.

trifasciatus. 366. C. thorace spinoso, elytris convexis nigris: fasciis tribus coccineis interruptis; apicis angustiore, antennis corpore longioribus. *Mus. Lesk. p.* 24. *n.* 534.
Habitat extra Europam.

luteus. 367. C. oblongus, thorace quadrispinoso capite antennarum nigrarum basi pedibusque luteis; dorsi lineis tribus fuscis, elytris apice bispinosis flavescentibus: rugis duabus margineque fuscis. *Mus. Lesk. p.* 24. *n.* 535.
Habitat extra Europam.

Davieſii. 377. C. ater, thorace ſpinoſo, punctis maculisque plurimis fulvis, elytris ſubtriangularibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 15. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat in ſinu Hinduras Americae, *curculionoide paulo major.*

†† *membranacea*, Saperdae.

Carchariias. 52. C. thorace mutico cylindrico, corpore griſeo nigro punctato, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 660. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 73. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 19. Cerambyx punctatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 208. *n.* 1.
Pet. gaz. 5. *t.* 2. *f.* 1.
Goed. inſ. 2. *t.* 51.
Liſt. goed. f. 106.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 4. *et t.* 152. *f.* 4.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. 5. 7. *t.* 1. *f.* 7.
β) Cerambyx villoſus. *Lepech. it.* 2. *t.* 11. *f.* 18?
Habitat in Europae, *β*) Sibiriae *ſilvis.*

confluens. 368. C. niger, thorace cylindrico, antennis mediocribus, elytris punctis confluentibus. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 557.
Habitat in Europa.

fuſcicornis. 369. C. teſtaceus, thorace longo utrinque tuberculato, femoribus clavatis ferrugineis, antennis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 558.
Habitat in Europa.

ſurinamus. 54. C. thorace mutico ſubcylindrico, corpore ſubferrugineo, elytris litura una alterave fuſca, antennis mediocribus.
Habitat Surinami, *mediae magnitudinis, elytris ſpina acutiſſima terminatis.*

ſcalaris. 55. C. thorace mutico ſubcylindrico, coleoptris linea ſuturali dentata, punctisque flavis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 697.* *Scop. ent. carn. n.* 175. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 77. *n.* 14. Cerambyx flaviviridis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 102. *n.* 77. Leptura ſcalaris.
Friſch inſ. 12. *p.* 29. *t.* 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 5.
Hufn. inſ. t. 7.
Habitat in Europae *populo.*

candidus. 195. C. albus, thorace coleoptrisque fuscis: vittis duabus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 3.
Habitat - - - *statura et magnitudine scalaris.*

roridus. 196. C. ater, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Africae *plantis, oculati magnitudine.*

modestus. 197. C. niger, capite, thorace anoque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 5.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura et magnitudine oculati.*

cardui. 56. C. fuscus, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 23. *Herbst apud Fuesslii areh. inf.* 5. *p.* 94. *n.* 5. *t.* 26. *f.* 2. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 632. *n.* 56. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 101. *n.* 74. Cerambyx thorace mutico cylindrico, corpore fusco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.
Habitat in Europae *magis australis* carduis, *quos majo devastat, statura populnei.*

melanoceras. 198. C. cinereus, thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 24.
Habitat Lipsiae, *statura c. cardui, at paulo minor.*

futuralis. 199. C. virescens, thorace rotundato lineato, elytris acuminatis: futura alba. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 25.
Habitat in Africae *plantis, statura c. cardui.*

moestus. 200. C. thorace quadrispinoso, corpore fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia.

populneus. 57. C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 661. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 27. *Gadd fat.* 79. Cerambyx fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis. *Degeer inf.* 5. *p.* 78. *n.* 15. Cerambyx decempunctatus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 208. *n.* 3. Leptura nigra &c. *Schaeff. ic. t.* 48. *f.* 5.
β) Bergst. nomencl. 1. *t.* 2. *f.* 4?
Habitat in Europae *et* Americae *populetis, β) triplo minor.*

201. C.

tremulus. 201. C. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 234. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 28.
Schaeff. ic. t. 101. *f.* 1.
Habitat Halae Saxonum; *an varietas punctati?*

punctatus. 202. C. thorace mutico subcylindrico totus viridis: punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 7. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 29.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 10.
Habitat in Europa *magis australi, antennis pedibusque nigris.*

virescens. 203. C. thorace villoso cinereo, elytris subattenuatis viridibus.
Fabr. sp. inf. 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 30.
Habitat in Italia *et* Galliae *sambuco, statura punctati.*

macrocerus. 204. C. fuscus, thorace cylindrico, pedibus testaceis, antennis longissimis nigris: annulo albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 31.
Habitat in Africa *aequinoctiali, parvus.*

Volvulus. 205. C. supra niger, thorace cylindrico elytrisque margine cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 33.
Habitat in Cayenna, *statura cylindrici, at paulo minor.*

linearis. 58. C. niger, thorace mutico cylindrico, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 663.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 9.
Scop. ent. carn. n. 153. Leptura parallela.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 6.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in Europae *silvis.*

cylindricus. 59. C. cylindricus niger, pedibus anterioribus luteis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 10.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 633. *n.* 59. *Fn. suec.* 662. Cerambyx thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.
Degeer inf. 5. *p.* 75. *n.* 12. Cerambyx cinereus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 208. *n.* 2. Leptura tota caeruleonigra.
Scopol. ent. carn. n. 157. Leptura cylindrica.
Roes. inf. 2. *scar.* 2. *t.* 3.
Habitat in pyri prunique *ramis.*

melanocephalus. 206. C. thorace cylindrico pedibusque rufis, corpore nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 11.
Habitat in Africa, *ſtatura et magnitudine cylindrici.*

pilicornis. 207. C. violaceus, thorace rotundato, antennarum articulo primo ſecundoque clavato piloſis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 12.
Pall. inf. roſſ. 2. *t.* F. *f.* 14.
Rozier Journ. de phyſ. 1. *t.* 1. *f.* B?
Habitat in America *meridionali*, *cylindrico paulo major.*

erythrocephalus. 208. C. rufus, thorace rotundato villoſo, antennis, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Schranck inſ. auſtr. n. 270.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Habitat in Germania, *cylindrici ſtatura et magnitudine.*

ſibiricus. 209. C. cyaneus, thorace ſubſpinoſo, elytris faſciis duabus flavis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 14.
Habitat in Sibiria, *ſtatura clavicornis*, *at paulo minor.*

clavicornis. 210. C. viridis, thorace rotundato, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei.

longipes. 211. C. violaceus, thorace ſubgloboſo, antennis longioribus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei.

latipes. 212. C. niger, thorace ſubgloboſo, femoribus clavatis apice violaceis, tibiis poſterioribus compreſſis, antennis longioribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis.* Leske.

trilineatus. 213. C. griſeus, vittis tribus dentatis albis, antennis longis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 18.
Mant. p. 532. Cerambyx thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis, antennis longiſſimis.
Fabr.

Antennae *breves*, *quae corpore breviores*, *mediocres*, *quae longitudine corporis*, *longae*, *quae corpore longiores ſunt.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 226. *n.* 7. Stenocorus trilineatus.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in inſulis, Americae *oppoſitis.*

lateralis. 214. C. niger, thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19.
Habitat in America *boreali.*

lynceus. 215. C. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, elytris griſeis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20.
Habitat in nova Seelandia.

griſeus. 216. C. griſeus, ſcutello margine, elytris lineolis flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 21.
Habitat in nova Seelandia.

analis. 217. C. teſtaceus, elytrorum apicibus anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 22.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

oculatus. 60. C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris faſtigiatis linearibus nigris. *Fn. ſuec.* 664. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 6.
Uddm. diſſ. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris nigrocinereis punctis excavatis nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 74. *n.* 11. *t.* 3. *f.* 20.
Scop. ent. carn. n. 152. Leptura oculata.
Schaeff. ic. t. 128. *f.* 4.
Huffn. inſ. t. 13.
Habitat in Europae *ſilvis.*

hirtus. 218. C. ferrugineus griſeo-villoſus, ſcutello orbitaque oculorum fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 7.
Habitat in nova Seelandia.

unicolor. 219. C. teſtaceus, thorace rotundato punctato, antennis longis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 8.
Habitat in inſula Amſterdam oceani auſtralis, *hirto minor.*

cantharinus. 82. C. ferrugineus, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 33.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 82. Cerambyx thorace ſubmutico, corpore rufo, oculis femoribusque nigricantibus, elytris mollibus, antennis longioribus.
Fabr. ſp. inſ. 2. *app. p.* 500. Callidium thorace rotundato ſubſpinoſo rufum, antennis pedibusque nigricantibus.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

teutonicus. 220. C. niger, thorace cylindrico, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 34.
Habitat in Germania, *ſtatura cantharini.*

janthinus. 221. C. thorace cylindrico, corpore violaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 35.
Habitat in terra Pedamontana.

monſpelienſis. 222. C. niger, thorace cylindrico ſubſpinoſo, antennisque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 36.
Habitat Monſpelii, *praeuſto major.*

praceuſtus. 223. C. niger, elytris flavis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 37.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 641. *n.* 24. *Fn. ſuec.* 506. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 103. *n.* 80. Leptura (praeuſta) thorace ſubgloboſo fuſco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 209. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europae *ſilvis.*

Lineola. 224. C. niger, thoracis linea dorſali femoribusque apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 38.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 4.
Habitat in Italia, *parvus.*

minutus. 225. C. fuſcus, thorace cylindrico, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 39.
Habitat in Anglia, *parvus.*

caeruleſcens. 226. C. thorace mutico cylindrico, albo-caeruleus, thoracis lineis tribus ſcutelloque pallidioribus. *Schranck inſ. auſtr. p.* 144. *n.* 271.
Scop. ent. carn. n. 160. Leptura caeruleſcens.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Germania, Calabria, 5 *fere lineas longus.*

227. C.

ferreus. 227. C. plumbeo-niger immaculatus, thorace cylindrico inermi, scutello albido. *Schranck inf. austr. p.* 145. *n.* 272. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 11.
Habitat in Austria, $4\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

pustulatus. 228. C. niger, thorace inermi cylindrico: macula media fulva. *Schranck inf. austr. p.* 145. *n.* 273. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 10.
Habitat in Austriae *floribus.*

silphoides. 229. C. niger, thorace mutico cylindrico, elytris lineis subtribus elevatis, femoribus tibiisque anterioribus medio fulvis. *Schranck inf. austr. p.* 145. *n.* 274.
Habitat Viennae, *ad Maji finem conspicuus.*

lividus. 230. C. niger, thorace dilute ferrugineo: punctis nigris elevatis, elytris flavescentibus. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 95. *t.* 26. *f.* 7.
Habitat Berolini, *cantharino affinis.*

cyaneus. 231. C. caeruleus: punctis elevatis, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 95. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 6.
Habitat in Pomerania, 3 *circiter lineas longus.*

cinctico-nis. 232. C. thorace cylindrico: lineis sex longitudinalibus albis, elytris dentatis fuscis albo irroratis, antennis longis medio albo-annulatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 290. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat - - - *statura populnei, longicorni affinis.*

M nigrum. 233. C. thorace mutico cylindrico, elytris griseo-nebulosis: macula albida M nigro notata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 291.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 4?
Habitat, rarior, Halae Saxonum.

ictericus. 234. C. thorace mutico cylindrico: linea lutea, elytris fuscis, scutello pedibusque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 292.
Habitat, rarior, Halae Saxonum, *in floribus, cylindrico affinis.*

vulneratus. 235. C. thorace mutico cylindrico: tuberculo carinato luteo, elytris nigricantibus, pedibus luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 293.
Habitat in lapidicinis Giebichensteinensibus, *pustulato affinis.*

tripunctatus. 378. C. thorace flavo: punctis tribus nigris, elytris nigris medio longitudinaliter albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 17.
Habitat in Noveboraco, *cylindrici facie, at minor.*

11 *palpis capitatis*, Rhagia.

cursor. 45. C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis: futura lineaque nigris, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 658.* *Scop. ent. carn.* 167. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 4.
Fn. suec. 1. *n.* 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.
Degeer inf. 5. *p.* 127. *n.* 3. Leptura cursor.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europa *boreali.*

cinctus. 236. C. niger, thorace spinoso, elytris subferrugineis: fascia flava, femoribus posterioribus unidentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 5.
Habitat in Austria, *magnitudine et statura cursoris.*

noctis. 48. C. niger, thorace spinoso, antennarum basi ferruginea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali, cursori proxime affinis, an ejus varietas?*

anglicus. 237. C. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 7.
Fn. suec. 1. *n.* 486. Cerambyx cinereus, coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.
Degeer inf. 5. *p.* 124. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Leptura mordax.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 222. *n.* 1. Stenocorus glaber &c.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 118. *f.* 1.
ic. t. 8. *f.* 1. 3.
Habitat in Anglia, Gallia.

ornatus. 238. C. niger, thorace spinoso, elytris fascia lata flava. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 8.
Habitat in Pensilvania.

exilis. 239. C. thorace spinoso, elytris elevato-striatis cinereis nigro-undatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 9.

240. C.

indagator. 240. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſtriatis: atomis faſciisque duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 3.
Habitat in Germania.

inquiſitor. 49. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis teſtaceo ſubfaſciatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 659.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 485.* Cerambyx cinereus nigro-nebuloſus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace ſpinoſo.
Degeer inſ. 5. *p.* 126. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 1. Leptura inquiſitor.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 223. *n.* 2. Stenocorus niger &c.
Friſch inſ. 13. *t.* 14.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europae *truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique corneis fuſcis, dorſo canaliculato.*

mordax. 241. C. griſeus, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis, teſtaceo ſubfaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 1.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 2.
Habitat in Germania, *inquiſitori affinis, at paulo major.*

elegans. 242. C. ater, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris caſtaneis: baſi, ſutura maculaque communi nigris; faſciis duabus flavis. *Schrank inſ. auſtr. p.* 133. *n.* 253.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 170. *n.* 6. *t.* 45. *f.* 12. Rhagium elegans.
Habitat in Bavaria, *et* Calabria.

ſycophanta. 243. C. nigro ferrugineoque varius, thorace ſpinoſo, elytris faſciis tribus obſcurioribus lineisque duabus elevatis, antennis brevibus. *Schrank inſ. Auſtr. p.* 137. *n.* 260.
Habitat Vindobonae.

niger. 365. C. thorace ovato: margine poſteriori ſcutelloque flavo, elytris faſtigiatis, antennis brevibus. *Petagn. inſ. Calab. p.* 17. *n.* 83. *f.* XXXVI.
Habitat in Calabria, *totus niger, an hujus tribus?*

111 *palpis clavatis*, Callidia.

ruſticus. 67. C. thorace nudo, corpore luridо, antennis ſubulatis brevioribus. *Fn. ſuec.* 666.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 15.
Fn. ſuec. 492. Cerambyx fuſcus, punctis thoracinis impreſſis.

Degeer

Degeer inf. 5. *p.* 83. *n.* 20. Cerambyx griseo-fuscus &c.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 20.
Schaeff. elem. t. 13. *f.* 1. *et t.* 76. *f.* 1.
icon. t. 63. *f.* 6.
Habitat in Europae *silvis.*

agrestis. 244. C. niger, thorace nudo, elytris striatis fuscis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 16.
Habitat Halae Saxonum, *statura rustici, at duplo minor.*

dichrous. 370. C. niger, thorace rotundato, elytris striatis tibiis plantisque brunneis. *Mus. Lesk. p.* 26. *n.* 570.
Habitat in Europa.

laevigatus. 371. C. niger opacus, thorace elytrisque laevibus, antennis mediocribus, femoribus rubris compressis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 26. *n.* 573.
Habitat in Europa.

viridans. 372. C. thorace rotundato viridi: fovea utrinque impressa, elytris testaceo viridibus rugoso-reticulatis, antennis pedibusque fusco-testaceis. *Mus. Lesk. p.* 26. *n.* 574.
Habitat in Europa.

cyanochrysos. 373. C. violaceus pubescens, antennis apice fuscis, femorum piceorum basi tibiisque luteis. *Mus. Lesk. p.* 26. *n.* 578.
Habitat in Europa.

octonotatus. 374. C. capite nigro fulvo piloso furca glabra antrorsum notato, thorace rotundato maculis punctisque quatuor fulvis pilosis, elytris fuscis bifasciatis quadripunctatis, abdomine pedibusque fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 26. *n.* 580.
Habitat in Europa.

leucozonias. 375. C. niger, abdominis segmentorum trium priorum margine externo et pectore canis, elytris fasciis duabus linearibus deorsum arcuatis albis et apice cinereo. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 588.
Habitat in Europa.

luridus. 68. C. thorace subtuberculato nudo, niger, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 29. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 634. *n.* 68. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris luridis.
Habitat in Europae *borealis pinetis, bajulo simillimus, at triplo minor.*

245. C.

fuscus. 245. C. niger, thorace subtuberculato canaliculato nudo, elytris striatis obscure testaceis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 30.
Habitat Halae Saxonum, *statura et magnitudine luridi.*

lugubris. 246. C. thorace subtuberculato nudo, elytris substriatis, corpore lurido immaculato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 31.
Habitat Halae Saxonum, *rustico proxime affinis, at triplo minor.*

raucus. 247. C. thorace laevi obscure ferrugineo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 32.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura luridi.*

hafniensis. 248. C. thorace subvilloso nigro; lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 33.
Habitat Hafniae.

aulicus. 249. C. thorace laevi nitido, corpore nigro opaco, elytris laevibus, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 34.
Habitat Hafniae.

erythropus. 250. C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 35.
Habitat in Germania *boreali.*

femoratus. 69. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 9.
Degeer inf. 5. *p.* 93. *n.* 31.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 7.
Habitat in Germania, *statura violacei, at dimidio minor, angustior.*

occidentalis. 251. C. ater, thorace pubescente, elytris fasciis duabus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 10.
Habitat in America *occidentali, magnitudine et statura violacei; loco fasciae posterioris macula interdum marginalis.*

acuminatus. 252. C. thorace verrucoso nigricante, elytris acuminatis viridibus: sutura cyanea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae spei.

253. C.

rusticus. 253. C. niger, thorace verrucoso, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 12.
Habitat in Russiae *silvis.*

violaceus. 70. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis brevibus. *Fn. suec.* 667. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 8.
Degeer inf. 5. *p.* 88. *n.* 24. Cerambyx violaceus.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 97. *n.* 59. Stenocorus violaceus.
Gadd diss. 28. Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris caerulescentibus.
Trisch inf. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 1.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali, frequens.*

auratus. 71. C. thorace dente laterali depresso, viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus posterioribus caeruleis.
Habitat in America, *violaceo similis, pedibus purpureis, an hujus tribus?*

Stigma. 72. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus: stigmate albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 17.
Degeer inf. 5. *p.* 119. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 13. Cerambyx niger &c.
Habitat in America, *totus niger.*

equestris. 254. C. ater nitidus, thorace nudo, coleoptris fascia interrupta nuda. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *statura stigmatis, at minor.*

hirtus. 255. C. thorace hirto, elytris acuminatis pallide testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 19.
Habitat ad caput bonae spei, *magnus.*

tranquebaricus. 256. C. thorace subtus utrinque macula tomentosa ferruginea, antennis longioribus barbatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 20.
Habitat Tranquebariae.

compressus. 257. C. obscure niger, thorace laevi, antennis longis pedibusque testaceis: femoribus compressis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 21.
Habitat in Siam, *barbato minor.*

258. C.

Callidiis *omnibus thorax rotundatus, muticus.*

variegatus. 258. C. thoracis dorso glabro atro: lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 22.
Habitat in nova Seelandia.

australis. 259. C. thoracis lineis duabus, elytris quatuor albis; mediis coeuntibus abbreviatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 23.
Habitat in nova Seelandia.

sulcatus. 260. C. thorace tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in nova Seelandia.

striatus. 73. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus. *Fn. suec.* 668. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 36.
Degeer inf. 5. *p.* 90. *n.* 26. Cerambyx niger nitidus &c.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 13.
Habitat in Europae *silvis.*

lynceus. 261. C. thorace subspinoso villoso niger, elytris macula subdidyma fulva. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 37.
Habitat ad caput bonae spei.

salicis. 262. C. rufus, thorace tuberculato spinosoque, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 38.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 92. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 13. Stenocorus ruficollis.
Habitat in Lipsiae *salicibus: an hujus tribus?*

pusillus. 263. C. niger, antennis tibiisque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 39.
Habitat in Germania; *parvus.*

bimaculatus. 264. C. fuscus, thorace villoso, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 40.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

flavus. 265. C. corpore flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 41.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

74. C.

variabilis. 74. C. thorace glabro, corpore fusco-aeneo, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 13.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 635. *n.* 74. *Fn. suec.* 669. Cerambyx thorace mutico subrotundo inaequali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis.
Poda mus. p. 36. Cerambyx scaber.
Frisch inf. 12. *p.* 345. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Habitat in Europae *borealis pinetis.*

sericeus. 266. C. thorace holosericeo cinereo, elytris testaceis: punctis elevatis rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 14.
Habitat in Barbaria, *rustico major.*

testaceus. 75. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Syst. nat. XII. 2 *p.* 635. *n.* 75. *Fn. suec.* 670. Cerambyx thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo antennis mediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 93. *n.* 30. Cerambyx testaceus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 218. *n.* 18. Leptura testacea, thorace glabro.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 6.
Habitat in Europae *silvis.*

deustus. 267. C. testaceus, thorace subtuberculato, elytris apice violaceis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *app. p.* 500. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 27.
Habitat in Italia, *testaceo proxime affinis, an varietas?*

ligneus. 268. C. niger, thorace tuberculato villoso, elytris rubris: macula apiceque violaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 28.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

Portitor. 269. C. niger, thorace transversim oblongo: maculis duabus nitentibus, elytris ex nigro rubescentibus, antennis longis.
Schranck Schr. der berl. Ges. nat. Fr. 2. *p.* 312.
Frisch inf. 13. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat in Bavariae *pinetis, bajulo affinis, punctis excavatis inaequalis, mordax.*

270. C.

An hujus tribus Cerambyx flavo-fasciatus Schaefferi ic. t. 34. *f.* 12?

obscurus. 270. C. thorace subvilloso fusco elytris testaceo cinereoque variis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 1.

Habitat in terra van Diemen, *bajulo major.*

Bajulus. 76. C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fusco.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 236. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 76. *Fn. suec.* 672. *Mus. Lud. Ulr.* 76. Cerambyx thorace mutico subrotundo villoso, tuberculis duobus, antennis brevibus.
Degeer inf. 5. *p.* 86. *n.* 82. Cerambyx caudatus.
Scop. ent. carn. n. 156. Leptura Bajula.
Fn. suec. 1. *n.* 489. Cerambyx nigricans, thorace villoso cinereo, punctis duobus glabris.
Frisch inf. 13. *t.* 10.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 29.
Schaeff. el. t. 76. *f.* 4.
icon. t. 64. *f.* 4. 5.
β) *Fn. suec.* 1. *n.* 490. Cerambyx testaceus, thorace villoso-cinereo, lineolis duabus glabris.
γ) Cerambyx saxonicus duplo minor. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151.
Habitat in Europae *borealis arborum truncis, ligna, parietes, asseres e pino desumta perforans.*

fennicus. 77. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 77. *Fn. suec.* 674. Cerambyx thorace mutico subrotundo: tuberculis subferrugineo-obsoletis, elytris violaceis, antennis longiusculis.
Uddm. diss. 33. Cerambyx elytris nigro-caeruleis, apice abdominis ferrugineo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 219. *n.* 19. Leptura atra.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 8.
Habitat in Europae *pinetis.*

italicus. 271. C. thorace subcylindrico hirto rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus piceis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 4.
Habitat in Italia, *fennico minor.*

liciatus. 78. C. niger cinereo-nebulosus, antennis brevibus.
Habitat in Europa, *bajuli magnitudine.*
Elytra *strigis duabus undulatis cinerascentibus obsoletis.*

undatus. 79. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus undatis albis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 42.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 79. *Fn. suec.* 675.* Cerambyx thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 91. *n.* 28. Cerambyx nigro-fuscus.
Schaeff. ic. t. 68. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

colonus. 272. C. elytris lividis: fasciis tribus fuscis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 43.
Habitat in Carolina.

versicolor. 273. C. thorace rufo, elytris nigris basi rufis: fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 44.
Habitat in America *boreali.*

flexuosus. 274. C. thorace flavo-fasciato, elytris fasciis septem flavis: anterioribus antrorsum, posterioribus retrorsum arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 45.
Drury inf. 1. *t.* 41. *f.* 2. Cerambyx pictus.
Forst. nov. inf. cent. 1. *p.* 43. *n.* 43. Leptura Robiniae.
Pet. gaz. t. 27. *f.* 3?
β) Callidium (angulatum) thorace globoso nigro flavo fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 32.
Habitat in Americae *robinia.*

exiguus. 275. C. testaceus, elytris fascia abbreviata alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 46.
Habitat in nova Seelandia, *femoribus valde clavatis basi albis.*

lunatus. 276. C. thorace globoso nigro flavo-fasciato, elytris atris: fasciis quinque flavis: baseos maculari. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 500. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 47.
Habitat in insulis Americae *oppositis, major.*

floralis. 277. C. thorace globoso albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 48. *Pall. it.* 2. *p.* 724. *n.* 63.
Habitat in Italia, *statura exigui.*

278. C.

fulminans. 278. C. thorace globoſo maculato, elytris nigris: faſciis undato-angulatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 49.
Habitat - - -

arcuatus. 279. C. elytris faſciis quatuor flavis: prima interrupta; reliquis retrorſum arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 241. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 50.
Uddm. diſſ. 20. *Leche nov. ſp.* 30. Cerambyx niger, elytris faſciis quatuor flavis arcuatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 21. *Fn. ſuec.* 696. Leptura (arcuata) thorace globoſo nigro, elytris faſciis linearibus flavis, tribus retrorſum arcuatis, pedibus ferrugineis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 212. *n.* 10.
Friſch inſ. 12. *t.* 3. *ic.* 4. *f.* 1.
Raj. inſ. p. 83. *n.* 23.
Pet. gazoph. t. 63. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 6. *et t.* 107. *f.* 2. 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 14.
Habitat in Europae *hortis.*

arietis. 280. C. thorace nigro, elytris nigris: faſciis flavis, ſecunda antrorſum arcuata, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 242. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 155 *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 81. *n.* 18. Cerambyx quadrifaſciatus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 23. *Fn. ſuec.* 695. Leptura arietis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transverſis flavis, pedibus teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 214. *n.* 11. Leptura nigra &c.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 96. *n.* 57. Stenocorus arietis.
Raj. inſ. p. 82. *n.* 22.
Liſt. ſcar. p. 385. *n.* 14.
Pet. gazoph. t. 63. *f.* 6.
Friſch inſ. 12. *p.* 32. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 15.
β) Bergſtr. nomencl. 1. 9. 12. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in Europae *hortis.*

plebejus. 281. C. thorace globoſo immaculato, elytris nigris: faſciis linearibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 243. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 52.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 692. Leptura (ruſtica) thorace globoſo tomentoſo, elytris cinereis: faſciis linearibus albidis undatis.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 215. *n.* 12. Leptura nigra &c.
Raj. inf. p. 83. *n.* 25.
Petiv. gazoph. t. 63. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 7.
Habitat in Europae *hortis.*

maculosus. 282. C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: ſtrigis tribus arcuatis flavis, baſi ferrugineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 53.
Habitat in America.

americanus. 283. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis: ſtrigis quatuor flavis, femoribus clavatis compreſſis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 54.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 243. *n.* 39. Callidium acuminatum.
Habitat in America *boreali.*

detritus. 284. C. thorace flavo-faſciato, elytris nigris: faſciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 55.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 694. Leptura (detrita) thorace globoſo nigricante, elytris fuſcis: faſciis quatuor transverſis flavis, pedibus rufis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 216. Leptura nigra &c.
Schaeff. elem. t. 76. *f.* 2.
icon. t. 38. *f.* 9. *et t.* 64. *f.* 3.
Habitat in Europae *hortis.*

indus. 285. C. niger, elytris glaucis baſi nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 56.
Habitat in India, *mediae magnitudinis, pube glauceſcente nitidus.*

portugalus. 286. C. thorace globoſo ferrugineo, elytris nigris: faſciis tribus atris; primo annulari. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 244. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 57.
Habitat in Luſitania, *ſtatura c. verbaſci.*

verbaſci. 287. C. thorace nigro-maculato, elytris ſubvireſcentibus faſciis tribus nigris; prima lunari. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 244 *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 58.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 22. Leptura (verbaſci), thorace ſubovato nigro, elytris faſciis tribus nigris, prima ſemiannulata.

Sulz.

Sulz. hist. inf. t. 5. f. 12.
Herbst apud Fuesslí arch. inf. 5. t. 26. f. 19.
Habitat in Europae *magis australis verbasco.*

annularis. 288. C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis subvirescentibus: fasciis tribus nigris, prima annulari. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 59.
Habitat in Siam, *c. verbasci proxime affinis.*

aegyptiacus. 289. C. thorace ferruginco, elytris cinerascentibus: fasciis tribus fuscis; prima annulari. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 244. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 60.
Habitat in Oriente.

mysticus. 290. C. elytris fuscis: fasciis apiceque cinereis basi rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 244. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 61.
Degeer inf. 5. *p.* 82. *n.* 19. Cerambyx albo-fasciatus.
Scop. ent. carn. 177. Cerambyx quadricolor.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 18. *Fn. suec.* 693.* Leptura (mystica) thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 215. *n.* 17. Leptura nigra &c.
Raj. inf. p. 83. *n.* 26.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Europa.

gibbosus. 291. C. niger, elytris cinereo-fasciatis basi bituberculatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 62.
Habitat Kilonii, *statura et magnitudine mystici.*

picipes. 292. C. ater, thorace globoso, elytris striga obliqua alba. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 63.
Habitat - - - c. alni paulo major.

alni. 293. C. niger, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 64.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 19. Leptura alni.
Herbst apud Fuesslí arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 21.
Habitat in Europa, *mystico affinis, sed octies minor.*

sanguineus. 80. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 25.
Raj. inf. p. 97. *n.* 3. Cerambyx minor.

Degeer inf. 5. *p.* 92. *n.* 29.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 220. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 1.
Habitat in Europae *silvis*, Upsaliae *in parietibus.*

castaneus. 81. C. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. *Fn. suec.* 676.
Habitat in Europae *cortice abiegno.*
Thoracis *latera inferiora linea rubra longitudinali.*

ebulinus. 83. C. niger, thorace tuberculato, elytris violaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 5.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 83. Cerambyx thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-caeruleis, antennis mediocribus.
Habitat in Africae *plantis*, *statura italici.*

aeneus. 294. C. fuscus, thorace elytrisque viridi-aeneis, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 6.
Habitat in Africa, *statura italici.*

clavipes. 295. C. niger opacus, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 7.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 9.
Habitat in Germania.

pannonicus. 296. C. niger, thorace margine subaeneo, medio elevato, elytris viridi-caeruleis, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 96. *n.* 6. *t.* 26. *f.* 11.
Habitat in Ungaria, 8 *lineas longus.*

aeneus. 297. C. viridi-aeneus, subtus, antennis pedibusque fuscus. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 96. *n.* 7. *t.* 26. *f.* 12.
Habitat Berolini.

venustus. 298. C. thorace flavo: fascia nigra, elytris nigris: fasciis tribus latis ex viridi flavis, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 16.
Habitat in India.

indicus. 299. C. niger subtus flavus, frontis maculis, thoracis fasciis duabus, elytrorum quinque flavis, antennis pedibusque rubris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 17. *t.* 26. *f.* 17.
Habitat in India.

confusus. 300. C. niger pubescens, thoracis punctis obsoletis sex, elytrorum fasciis undatis albidis quatuor, antennis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 18. *t.* 26. *f.* 18.
Habitat Berolini *in* salicibus.

litteratus. 301. C. elytris nigris: fasciis apiceque cinereis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 99. *n.* 22. *t.* 26. *f.* 20.
Schranck inf. austr. n. 306? Leptura figurata.
Habitat in Germania.

hispidus. 302. C. thorace globoso ferrugineo, corpore testaceo, capite nigro, femoribus clavatis ustulatis, antennis hispidis mediocribus. *Forster nov. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 42.
Habitat in America *septentrionali, mystici magnitudine.*

viridis. 303. C. thorace tuberculato violaceo, elytris viridibus punctato-striatis, antennis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1067. *Fn. Fridrichsd. p.* 14. *n.* 134.
Habitat in Dania.

multicolor. 304. C. thorace nigro ovato villo ex griseo flavo pubescente, elytris ex griseo flavoque variis.
Drury inf. 1. *t.* 41. *f.* 6.
Habitat in Noveboraco.

pulverulentus. 306. C. thorace convexo nigro-fusco, elytris castaneis griseovillosis apice bidentatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 118. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 12.
Habitat in Pensylvania, *pollicem fere longus.*

nigricans. 307. C. niger depressus, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. *Degeer inf.* 5. *p.* 88. *n.* 23.
Hufn. inf. t. 16.
Habitat in conclavibus Sueciae, 7 *lineas longus.*

aurichalceus. 308. C. fusco-aeneus nitidus, thorace depresso, antennis pedibusque nigris. *Degeer inf.* 5. *p.* 89. *n.* 25.
Habitat - - - *dimidium pollicem longus.*

lucidus. 309. C. niger, elytris fusco-castaneis lucidis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98.
Habitat in Carniolia.

rufus. 310. C. niger thorace villoso, antennis rufis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 61.
Habitat in Carniolia.

carniolicus. 311. C. thorace subbituberculato, abdominisque apice rufis, elytris atro-violaceis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 98. *n.* 63. Stenocorus fenicus.
Habitat in Carniolia.

fuliginosus. 312. C. totus ater opacus, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 62.
Habitat in Carniolia.

calcaratus. 313. C. nigro-violaceus, femoribus rufis posterius dentatis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 98. *n.* 64.
Habitat in Carniolia.

caraboides. 314. C. rufus, elytris atro-violaceis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 65.
Habitat in Ungariae *et* Carnioliae *collibus, statura carabi minoris.*

ater. 315. C. niger, elytris truncatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100 *n.* 69.
Habitat in Carniolia.

braccatus. 316. C. niger, antennis pedibusque rufis: femoribus posterioribus crassis spina armatis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 70.
Habitat in Carniolia.

tenuis. 317. C. niger nitens, elytris attenuatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 71.
Habitat in Carnioliae *floribus umbellatarum.*

octopunctatus. 318. C. viridis, thorace tereti, elytris punctis octo nigris.
Schranck inf. austr. p. 142. *n.* 267. *Beytr. z. Naturg. p.* 65. §. 9.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 101. *n.* 73. Leptura octopunctata.
Habitat rarior in Austriae *tiliis.*

glaucopterus. 319. C. ferrugineus, thorace quadriverrucoso, oculis pectoreque nigris. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 294. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat rarior Halae Saxonum, *variabili affinis, at dimidio major.*

virescens. 320. C. corpore lineari viridi-aeneo, antennis longis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 295.
Habitat - - - - *magnitudine circiter variabilis, statura moschati.*

** *palpis*

** *palpis inaequalibus, anterioribus 2 filiformibus, posterioribus clavatis:* Stenocori Fabricii.

festivus. 11. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus; linea laterali lutea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 5.
Degeer inf. 5. *p.* 100. *n.* 4. *t.* 13. *f.* 14. Cerambyx spinosus.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 6. Cerambyx sulcatus.
Gron. zooph. 541. *t.* 16. *f.* 5.
Drury inf. 1. *t.* 37. *f.* 5.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. *t.* 25. *f.* 12.
Habitat in insulis, Americae *oppositis.*

marilandicus. 321. C. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 6.
Habitat in Marilandia.

insularis. 321. C. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 7.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis, ex testaceo et cinereo varius.*

bispinosus. 322. C. thorace inermi subtuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali, statura insularis, at minor.*

semipunctatus. 323. C. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

quadrimaculatus. 27. C. rufescens thorace scabro spinoso, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 12. *Gron. zooph.* 542*. *Sloan. jam.* 2. *t.* 237. *f.* 21.
Drury inf. 1. *t.* 37. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali, femoribus 4 posterioribus apice spinosis.*

geminatus. 324. C. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 13.

Habitat in Sierra Leon Africae, *congeneribus hujus tribus minor et brevior.*

africanus. 325. C. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis apice atris: fascia pallida. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali, antennis longitudine corporis, nigris.*

circumflexus. 326. C. ferrugineus, thorace mutico, elytris unidentatis testaceis: striga undata punctisque duobus fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 15.
Habitat in Cayennna, *mediae magnitudinis.*

annulatus. 327. C. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 16.
Habitat - - - -

decemmaculatus. 328. C. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 17.
Habitat in America.

brasilianus. 329. C. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatis testaceis: lineolis tribus glabris flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 16. *mant inf.* 1. *p.* 144. *n.* 18.
Habitat in Brasilia, *annulato minor.*

cayennensis. 330. C. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo, fusco flavoque variis: angulo bascos compresso. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *parvus, cinereus.*

Druryi. 331. C. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali.*

undulatus. 332. C. cinereus, thorace spinoso, elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 21.
Habitat - - - -

ruricola. 333. C. fuscus, thorace spinoso ferrugineo, elytris bidentatis pallidioribus antennis, longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 22.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

334. C.

gargani-cus. 334. C. thorace ſpinoſo, elytris bidentatis teſtaceis: macula pallida, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226 *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 4.
Habitat in Marilandia.

Lamed. 46. C. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris faſtigiatis lividis: taenia obſcura longitudinali ſinuata, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 649.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p* 143. *n* 3.
Geoffr. inſ par. 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger &c.
Habitat in Europa.

cyaneus. 335. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 2.
Forſter nov. inſ. 1. *p.* 40. *n.* 40. Cerambyx palliatus.
Fabr. ſyſt. entom. p. 182. *n.* 2. Calopus blandus.

meridia-nus. 47. C. thorace ſubſpinoſo, elytris faſtigiatis fuſcis anterius teſtaceis, pectore nitente. *Fn. ſuec.* 648. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 1.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 398. *n.* 7. Leptura meridiana.
Degeer inſ. 5. *p.* 305. Leptura fuſca cinerea.
Schaeff ic. t. 3. *f.* 13. *t.* 79. *f.* 7. *t.* 82. *f.* 4. *t.* 279. *f.* 3.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 1.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria, *mas teſtaceus, femina nigricans, larva ſubterranea, pedibus longiſſimis.*

quadrio-culatus. 336. C. thorace ſubſpinoſo: punctis ſeptem nigris, corpore teſtaceo, elytris apice dentatis: lineis longitudinalibus curvatis fuſcis, antennis longis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 289. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat - - - - magnitudine meridiani; an hujus tribus?

ramphy-geus. 61. C. thorace mutico ſubcylindrico bipunctato, corpore livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis.
Habitat in America, *feſtivi magnitudine; an hujus tribus?*

zona-rius. 63. C. thorace mutico cylindrico rugoſo, antennis longioribus, elytris obtuſis fuſcis: faſcia lineari albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 75.*
Marcgr. braſ. 254. Quici.
Habitat in America, *an ad hanc tribum?*

irrora-tus. 62. C. thorace mutico cylindrico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longioribus aculeatis.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 3.

Habitat

Habitat in Americae *meridionali oppositis insulis, inquisitoris magnitudine.*

glabratus. 337. C. thorace mutico cinereo: linea glabra fusca, elytris bidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 11.
Habitat in insula S. Crucis, Oceani americani.

suaveolens. 305. C. thorace spinoso caerulescenti aureo, corpore viridi, elytris cyaneis, antennis mediocribus pedibusque nigris, abdomine tibiisque ferrugineis, posterioribus longioribus compressis. *Mant. p.* 532.
Habitat in Jamaica *et* Carolina.

scabricornis. 338. C. ferrugineus thorace subcylindrico, antennis nitidis, intus denticulatis scabris. *Fuesslii Verz. schw. Inf. p.* 13. *n.* 241. *f.* 3. a. b.
Scop. ent. carn. n. 174.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Europa.

asper. 339. C. ater, asper, rigidus, thorace bispinoso, elytris in medio tuberculatis. *Sulz. hist. inf. p.* 44. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in Italia.

brevis. 340. C. nigricans, thorace spinoso, femoribus rotundatis brevibus, tarsis anterioribus lobatis perhirsutis. *Sulz. hist. inf. p.* 45. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Surinamo.

halodendri. 341. C. ater, punctis excavatis, thorace albido villoso, elytris margine maculaque baseos rubris. *Pallas it.* 2. *app. n.* 62.
Habitat in Sibiriae robinia halodendro, *C. Kaehleri affinis, an hujus tribus?*

badius. 342. C. badius, thorace elytrisque striatis. *Lepech. it.* 1. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in Sibiria, *an ex hac tribu?*

ruber. 343. C. elytris rubris: apicum macula oblonga nigra, thorace nigro: maculis duabus rubris. *Lepech. it.* 1. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in Sibiriae *glycyrrhiza echinata.*

fimbriatus. 344. C. ater, margine albo, thorace bispinoso. *Lepech. it.* 2. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in montis Ural *larice; an huc spectat?*

345. C.

taeniatus. 345. C. thorace spinoso, elytris nigricantibus: fasciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. *Lepech. it.* 2. *p.* 299. *t.* 11. *f.* 32.
Habitat in Sibiriae *petrarum fissuris.*

aculeatus. 346. C. nigricans antennis longissimis: spinis tribus introrsum armatis. *Rozier journ. de phys.* 1. *p.* 26. *t.* 1. *f* C.
Habitat in America.

arenarius. 347. C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. n.* 168.
Poda mus. graec. p. 34. Cerambyx pedestris.
Habitat in Carniolia.

timidus. 348. C. niger, elytris flavescentibus: maculis binis atris. *Scop. ent. carn. n.* 171. *ann. hist. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 67.
Habitat in Carniolia, *e longinquo hostem fugiens, et sub umbella se recipiens:*

adspersus. 349. C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 95. *n.* 55.
Habitat in Carniolia, *tristi affinis, sed minor.*

ovalis. 350. C. ovatus fuscus, elytris integris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 206. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

cruentatus. 351. C. griseus, thorace spinoso, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis, antennis longis aculeatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 107. *n.* 8.
Habitat in India, *rubo affinis, an hujus tribus?*

sinensis. 352. C. niger, thorace spinoso, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 109. *n.* 10.
Habitat in Sina, *tres lineas ultra pollicem longus.*

tigrinus. 353. C. ex fusco griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctisque fuscis sparsis, antennis longioribus. *Degeer inf.* 5. *p.* 114. *n.* 15. *t.* 14. *f.* 6.
Habitat in Pensylvania, 11 *lineas longus.*

pensylvanicus. 354. C. thorace subspinoso, elytris truncatis ex flavo griseis: fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 114. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in Pensylvania, *dimidium pollicem longus.*

355. C.

hirsutus. 355. C. fuscus, thorace spinoso, elytris hirsutis striato-punctatis, antennis mediocribus maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 115. *n.* 17. *t.* 14. *f.* 8.
Habitat in Surinamo, 4 *lineas longus.*

gibbus. 356. C. fuscus cinereo-maculatus, thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. *Degeer inf.* 5. *p.* 116. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, *hirsuto brevior, at latior et crassior.*

hirtipes. 357. C. fuscus, thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anterioribus hirsutis, antennis longioribus: media macula alba. *Degeer inf.* 5. *p.* 116. *n.* 19. *t.* 14. *f.* 10.
Habitat in India, 8½ *lineas longus.*

virideſcens. 358. C. ex flavo viridis, thorace mutico cylindrico: fasciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro cinereoque maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 76. *n.* 13.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

hieroglyphicus. 359. C. subtus canus, capite thoraceque lanuginosis: area nigra, elytris nigris glabris: futura utrinque ramosa punctisque quinque ex caeruleſcente albidis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 59.
Habitat in Sibiriae *borealis silvis.*

perforatus. 360. C. supra pulvere albidus, subtus lanugine flaveſcens, elytris punctis quinque dorsalibus mediis nigerrimis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 60.
Habitat cum hieroglyphico, cui proxime affinis.
Elytrorum *puncta quasi perforata.*

ferrugineus. 361. C. nigricans, elytris ferrugineis, antennis introrsum spinosis. *Rozier journ. de phys. p.* 27. *t.* 1. *f.* D.
Habitat in America.

carbonarius. 362. C. niger opacus, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. p.* 55. *n.* 178.
Habitat in Carniolia; *an propria species?*

lunulatus. 363. C. ex fusco obscure rufeſcens, thorace subcylindrico mutico, elytris rubeſcentibus: lunulis quatuor fuscis apice dentatis. *Drury inf.* 1. *t.* 37. *f.* 4.
Habitat in Jamaica.
Elytrorum *futura prope thoracem cor fuscum refert.*

364. C.

minimus. 364. C. minutissimus. *Seeligm. av.* 4. *t.* 108. *f.* 4.
Habitat - - - - *cutem penetrans.*

vittatus. 378. C. thorace spinoso pubescente, elytris subfastigiatis testaceis, futura vittaque fuscis. *Mus. Lesk. p.* 25. *n.* 540.
Habitat in Europa.

quadriguttatus. 379. C. pallide testaceus, thorace subspinoso, elytris bispinosis: maculis duabus flavis, femoribus clavatis muticis. *Svederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 16. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in Honduras Americae, *quadrimaculato duplo minor, subdepressus.*

CALOPUS.

Antennae filiformes.
Palpi quatuor; anteriores clavati, posteriores filiformes.
Thorax gibbus.
Elytra linearia.

ferraticornis. 1. C. fuscus, antennis compressis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 65. *Fn. suec.* 665. Cerambyx ferraticornis, thorace mutico subovali, corpore lurido fusco, antennis compressis antice ferratis mediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 79. *n.* 6.
Habitat in Europa, *boreali, statura oleri, elongatus, cylindricus.*

hispicornis. 2. C. subfuscus, antennarum articulis posterius spina minutissima armatis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 66. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore subfusco, elytris fastigiatis bidentatis, antennis mediocribus postice dentatis.
Habitat in America, *cerambyci rustico similis, at duplo major; an hujus generis?*

pygmaeus. 3. C. minutissimus fuscus, antennis ferratis pilosis.
Degeer inf. 5. *p.* 80. *n.* 17. *t.* 4. *f.* 5. Cerambyx pygmaeus.
Habitat in Suecia, *pulicis magnitudine.*

205.

Species 338-364 incerti adhuc loci.

205. LEPTURA. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra apicem verſus attenuata.
Thorax teretiuſculus.

* *labio integro*, Donaciae Fabricii.

aquatica. 1. L. aurata, femoribus poſterioribus clavatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 1. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 637. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 677.* *Scop. ent. carn.* 147. Leptura deaurata, antennis nigris, femoribus poſticis dentatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 140. *n.* 80. *t.* 4. *f.* 14. 15. Leptura aquatica ſpinoſa.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 229. *n.* 12.
Raj. inſ. p. 100. *n.* 1.
Friſch inſ. 12. *p.* 33. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in plantis aquaticis, nymphaeis, caricibus, phellandrio, *cujus radici intra globum brunneum adhaeret pupa.*
Femora *poſteriora varius mutica.*

ſimplex. 17. L. aurata, femoribus ſimplicibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 142. *n.* 19? Leptura aquatica mutica.
Habitat in Anglia *et* Germania.

faſciata. 18. L. deaurata, elytris faſcia longitudinali purpurea. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* *n.* 20. Leptura aquatica faſciata.
Habitat in Europae *aquis, femoribus poſterioribus nunc muticis nunc dentatis.*

holoſericea. 19. L. viridi-nitens, antennis pedibusque ex atro fuſcis, femoribus poſterioribus dentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 4.
Habitat in Marchiae *pratis humidis.*

paluſtris. 20. L. ex nigricante violacea, antennis pedibusque ſpadiceis, femoribus poſterioribus dentatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 100. *n.* 5.
Habitat in Pomeraniae *paludibus.*

21. L.

cinerea. 21. L. cinerea cupreo irrorata, pedibus posterioribus muticis.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. p. 100. n. 6.
Habitat in Pomerania.

violacea. 58. L. ex atro subaenea, elytris obscure violaceis, abdomine sanguineo. *Pall. it. 2. n 64.*
Habitat in Sibiria, *magnitudine aquaticae.*

bicolor. 84. L. aurea, thorace supra elytrisque viridibus, his striato-punctatis hinc inde impressis, femoribus clavatis: posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 589.*
Habitat in Europa.

crassipes. 85. L. viridi-aenea subtus cinereo-aenea, elytris striato-punctatis transverse lineolis subtriatis, ore antennis pedibusque rufis, femoribus crassis: posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 590.*
Habitat in Europa.

fusca. 86. L. fusca, elytris punctato-striatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus dente valido armatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 591.*
Habitat in Europa.

aenea. 87. L. rufo-aenea, subtus cinereo-aenea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 592.*
Habitat in Europa.

nitida. 88. L. nitida viridi-aurea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata purpureo-aenea, abdomine antennis pedibusque auratis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 593.*
Habitat in Europa.

vulgaris. 89. L. viridi-argentea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata communi viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 594.*
Habitat in Europa.

caerulea. 90. L. caerulea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, antennis aeneis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p. 27. n. 595.*
Habitat in Europa.

** *labio bifido*, Lepturae Fabricii.

† *thorace antrorsum oblongiusculo angustiore, elytris apice truncatis.*

unipunctata. 22. L. nigra, elytris rufis: puncto medio nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 1.
Habitat Dresdae, *statura bipunctatae.*

hastata. 23. L. atra, elytris rubris: apice suturaque media nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *Sulz. hist. inf. t.* 5. *f.* 11. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger &c.
Habitat in Europa *magis australi, melanurae affinis; mas minor, abdomine rufescente.*

carbonaria. 91. L. nigra, elytris testaceis apice fuscis. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 612.
Habitat in Europa, *an hujus familiae?*

nigella. 92. L. nigra, elytris testaceis, tibiis anticis rufis. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 614.
Habitat in Europa, *an hujus familiae?*

erythropus. 93. L. nigra, pedibus rubris, femorum basi tibiarum apice plantisque nigris. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 606.
Habitat in Europa.

quinquemaculata. 94. L. nigra, antennis nigro annulatis, pedibus elytrisque testaceis: his maculis quinque fuscisque tribus nigris. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 600.
Habitat in Europa.

fusca. 95. L. fusca aureo pubescens, antennarum basi testacea, femoribus tibiisque anticis testaceis: illis supra fasciis, quatuor posterioribus basi testaceis. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 617.
Habitat in Europa.

bipunctata. 24. L. nigra villosa, elytris lividis: sutura puncto medio apiceque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 3.
Habitat in Sibiria, *melanurae valde affinis, elytris apice rotundatis.*

melanura. 2. L. nigra, elytris rubescentibus lividisve: sutura apiceque nigris. *Fn. suec.* 678.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inf* 1. *p.* 158. *n.* 4.
Gadd diss. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete sordideque flavescentibus.

Degeer

Degeer inf. 5. *p.* 137. *n.* 14. Leptura variabilis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 226. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 1.
Raj. inf. p. 97. *n.* 6.
Petiv. gaz. t. 30. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 4.
β) Leptura minor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 158.
Habitat frequens in Europae *floribus*, *mas elytris apice nigris*, *femina unicoloribus*, *β) duplo minor.*

livida. 26. L. nigra, elytris teſtaceis immaculatis, pedibus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 246. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 5.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 23.
β) Leptura major. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158.
Habitat in Germaniae *floribus*, *β) duplo major.*

rubra. 3. L. nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. *Fn. ſuec.* 500. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 6.
Degeer inſ. 5. *p.* 132. *n.* 7.
Friſch inſ. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 6.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 30.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 2.
Habitat in Europae *floribus.*

emargina-ta. 27. L. atra, elytris purpureis apice emarginatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *rubra major*, *immaculata.*

villica. 28. L. ferruginea, antennis, elytris pectoreque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 8.
Habitat in Anglia.

ſanguino-lenta. 4. L. nigra, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 679.* *Scop. ent. carn.* 150. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 7.
Scop. ent. carn. p. 47. *n.* 151? Leptura dubia.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 9.

teſtacea. 5. L. nigra, elytris teſtaceis, tibiis rufis, thorace poſterius rotundato. *Fn. ſuec.* 680.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 246. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 135. *n.* 11.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali*; *an mas rubrae*, *cui ſaepe copula junctа?*

reveſtita. 6. L. teſtacea, elytris pectore antennisque atris.
Habitat in Germania, *ſtatura teſtaceae.* Schreber.

pubeſcens. 29. L. nigra cinereo-villoſa: coſta alarum baſi teſtacea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 11.
Habitat in Suecia, *teſtaceae affinis.*

virens. 7. L. ſericeo-viresſcens, antennis fuſco viridique variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 638. *n.* 7. *Fn. ſuec.* 682.* Leptura viridi-flava, antennis luteo viridique variis.
Degeer inſ. 5. *p.* 131. *n.* 6. Leptura flavo-viridis.
Habitat in Europa *boreali.*

atra. 30. L. corpore toto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 13.
Poda muſ. gr. p. 28. Leptura aethiops.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 228. *n.* 10. Stenocorus totus niger.
Habitat in Europa *magis auſtrali, pedibus interdum teſtaceis.*

humeralis. 31. L. nigra, humeris abdomineque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 14.
Habitat in Germania, *ſtatura quadriguttatae, at duplo fere major.*

ſuturalis. 32. L. cinerea, elytris teſtaceis: ſutura nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 15.
Habitat Halae Saxonum, *atra paulo major.*

ſcutellata. 33. L. nigra, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 16.
Habitat in Italia, *atra major.*

femorata. 34. L. nigricans, femoribus baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 17.
Scop. ent. carn. p. 47. *n.* 155? Leptura ruficrus.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine nigrae.*

ruficornis. 35. L. nigra, antennis pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 18.
Habitat in Italia, *femoribus interdum apice nigris.*

marginata. 36. L. nigra, elytrorum margine tibiisque poſterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 19.
Habitat in Norwegia, *ſtatura nigrae.*

8. L.

fericea. 8. L. viridi-caerulea, elytris ſubfaſtigiatis. *Fn. ſuec.* 683.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 32. *Schaeff. ic. t.* 84. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

quadri-maculata. 9. L. nigra, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 684. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 25. *Schaeff. elem. t.* 118. *f.* 2.
ic. t. 1. *f.* 7.
Habitat in Europae *plantis.*

interrogationis. 10. L. nigra, elytris lividis: faſcia longitudinali arcuata maculisque quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 685.
Uddm. diſſ. 35. *t.* 1. *f.* 2. Leptura nigra, elytris fuſco-flavis: maculis octo nigris.
Habitat in Europa.

ſexmaculata. 11. L. nigra, coleoptris teſtaceis: maculis ſex nigris margine connexis. *Fn. ſuec.* 686.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 26.
Degeer inſ. 5. *p.* 133. *n.* 9. Leptura teſtaceo maculata.
Raj. inſ. p. 81. *n.* 18.
Habitat in Europae *plantis.*

12maculata. 37. L. nigra, elytris flavis: maculis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 27.
Habitat in Sibiria, *ſtatura ſexmaculatae, at paulo major.*

quadri-faſciata. 12. L. nigra, elytris teſtaceis: faſciis quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 687.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 132. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 11. Leptura octomaculata.
Scop. ent. carn. n. 172. Cerambyx faſciatus.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 6.
Habitat in Europa, *attenuatae affinis, an femina?*

attenuata. 13. L. elytris attenuatis flavis: faſciis quatuor nigris, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 688.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 28.
Scop. ann. hiſt. nat 5. *p.* 99. *n.* 66. Priomus attenuatus.
Müll. zool. dan. prodr. p. 93. *n.* 1046? Leptura faſciata.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 6.
Habitat in Europa.
Femora *poſteriora apice nigra.*

dubia. 38. L. nigra subvillosa, elytris testaceis nigro-punctatis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 30.
Habitat in Sibiria, *attenuatae nimis affinis.*

sexguttata. 39. L. nigra, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 31.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 102. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 25.
Habitat in Germania.

nigra. 14. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine rufo. *Fn. suec.* 689.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 247. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 20. *Degeer inf.* 5. *p.* 144. *n.* 24.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 227. *n.* 9. Stenocorus niger nitidus, abdomine fusco-rubente.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 7.
Habitat in Europae *floribus.*

adusta. 40. L. aureo-pubescens, capite elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat Halae Saxonum, *nigra paulo minor, pedibus rubris.*

4guttata. 41. L. fusca, elytris nigris, punctis duobus baseos ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 22.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine et statura nigrae.*

rostrata. 42. L. obscure aenea, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 23.
Habitat in Africae *ammi majori, nigra minor.*

similis. 43. L. nigra, elytris spadiceis: apice fasciaque suturali nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 101. *n.* 2. *t.* 26. *f.* 22.
Habitat rurior Berolini, *melanurae perquam similis.*

armata. 44. L. thorace nigro spinoso, antennis pedibusque ferrugineis, elytris flavis: punctis duobus, macula cordata, fasciisque tribus nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 101. *n.* 11. *t.* 26. *f.* 24.
Habitat Berolini, *attenuatae affinis, antennarum articulis apice, capite, tarsis, et posterioribus femoribus tibiisque nigris, pedum posteriorum apice in altero sexu lobato.*

45. L.

Huic tribui adscribendae quoque videntur 4 *species a Schaeffero delineatae, affinis ic. t.* 101. *f.* 5. *figurata ic. t.* 151. *f.* 7. *clavata ic. t.* 103. *f.* 6. *et t.* 108. *f.* 1. *et aeneo-punctulata. ic. t.* 201. *f.* 6.

ceramby-ciformis. 45. L. nigra; elytris flavis: fasciis tribus nigris; prima ex punctis transversim positis. *Schrauck inf. austr. p.* 154. *n.* 290. *Scop. ent. carn. n.* 154. Leptura quadrimaculata. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 102. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 26. *Habitat in* Ungaria *et* Austria, $4\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

russica. 46. L. nigra albido-villosa, elytris flavescentibus: maculis quinque lineaque media nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 102. *n.* 17. *t.* 26. *f.* 27. *Habitat in* Russia.

laevis. 47. L. nigra, subtus villoso-fericea, antennis ex luteo fuscis, pedibus anterioribus ferrugineis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 103. *n.* 18. *Habitat in* Pomerania, *nigra dimidio minor.*

solstitialis. 48. L. nigra, antennis basi ferrugineis, pedibus elytrisque luteis: his margine nigris. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 103. *n.* 19. *Habitat* Berolini, *vix* 3 *lineas longa.*

splendida. 49. L. nigra flavo-villosa, elytris apice glabris, pedibus fulvis, antennis fuscis, basi ferrugineis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 103. *n.* 20. *Habitat in* Marchia, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, ad mecydalin accedens.*

quadrinotata. 50. L. nigra flavicanti-subtus albido-villosa, antennis basi fuscis, femoribus basi ferrugineis, elytris punctatis: maculis duabus aurantiis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 7. *p.* 171. *n.* 22. *t.* 45. *f.* 13. *Habitat* Berolini.

plumipes. 51. L. fusca punctata, femoribus subclavatis, pedibus postremis longissimis: tibiis apice floccosis. *Pall. spic. zool.* 9. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2. 2.* *Habitat - - - melanura minor, gracilima. Tarsi sparsa lanugine villosi; floccus in apice tibiarum postremarum e villis nigris sericeis in septem versus per longitudinem dispositis constat.*

rufipes. 52. L. nigra, pedibus rufis: femoribus basi nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 298. *Schaeff. ic. t.* 55. *f.* 7. *Habitat in* rhamni cathartici, corni sanguineae, crataegi oxyacanthae *floribus*, Majo *frequens.*

octomaculata. 53. L. nigra, elytris teſtaceis: maculis ſex apicibusque nigris.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 299.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 9.
Habitat in Saxonia.

Schalleri. 54. L. fuſca, elytrorum baſi maculis quatuor rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 299.
Schaeff. ic. t. 182. *f.* 4.
Habitat, rarior, in rhamni cathartici, pruni ſpinoſae *floribus.*

uſtulata. 55. L. nigra thorace elytrisque teſtaceis, apice nigris, pedibus teſtaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 298.
Habitat, rarior, in floribus Halenſibus, *Junio conſpicua, cerambycis praeuſti ſtatura et magnitudine.*

pumila. 56. L. fuſca, pedibus anterioribus teſtaceis: femoribus ſuperne nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 299.
Habitat Halae Saxonum, *in floribus, cerambycis praeuſti magnitudine.*

pariſina. 56. L. tota nigra, femorum antennarumque baſi rufeſcente.
Thunb. nov. act. Upſ. 4. *p.* 16. *n.* 28.
Habitat Lutetiis, *melanura duplo minor, oblonga, anguſta.*

bipuſtulata. 57. L. elytris nigris ſtriato-punctatis: maculis duabus teſtaceis.
Thunb. nov. act. Upſ. 4. *p.* 17. *n.* 29.
Habitat Upſaliae, *magnitudine melanurae; an priſinae tribus?*

Scopolii. 58. L. abdominis thoracisque margine poſteriore rubro, elytris teſtaceis pellucidis attenuatis: apice et margine infra medium nigro. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 72.
Habitat in Carniolia.

verna. 59. L. nigra, tibiis anterioribus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 94. *n.* 1055.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 9.
Habitat in Dania.

nigripes. 60. L. nigra, elytris obſcure flavo-teſtaceis, pedibus nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat - - - 7 lineas longa.

maculoſa. 61. L. nigra, elytris teſtaceo-lividis, antennis flavo-maculatis *Degeer inſ.* 5. *p.* 139. *n.* 16.
Habitat - - - 4 lineas longa.

96. L.

lunulata. 96. L. nigra, thorace posterius fascia angusta flava, elytris lunulis duabus ferrugineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 18.
Habitat ad caput bonae spei, *melanurae facie, at paulo major.*

bicolor. 97. L. pallide ferruginea, oculis, elytris, alis et ano supra nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 19.
Habitat in America *septentrionali, attenuatae simillima, at paulo minor.*

vittata. 98. L. pallide testacea, antennis fusco-annulatis, elytris nigris punctatis: vittis quatuor flavis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 20.
Habitat in America *septentrionali, facie et magnitudine sexmaculatae.*

†† *thorace subgloboso nec anterius attenuato, elytris apice obtusis nec truncatis.*

virginea. 15. L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomine rufo.
Fn. suec. 690. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 34.
Degeer inf. 5. *p.* 144. *n.* 23. Leptura violacea.
Gadd diss. 26. Leptura nigra, elytris caeruleseentibus, toto abdomine rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

collaris. 16. L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris.
Fn. suec. 691. *Scop. ent. carn.* 159. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 33.
Degeer inf. 5. *p.* 143. *n.* 22. Leptura ruficollis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 228. *n.* 11. Stenocorus niger, thorace rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 9.
Habitat in Europa.

decempunctata. 62. L. atra, thorace subgloboso, elytris decempunctatis. *Lepechin it.* 2. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in monte Ural.

varia. 63. L. villosa cana, thorace subgloboso, elytris nigris: punctis octo et fasciis interruptis quatuor albis. *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat in monte Ural.

viridis. 64. L. viridiuſcula, thorace ſubovato: lineolis duabus longitudinalibus obſcurioribus, dorſo nigro. *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 11.
Habitat in Sibiria.

linearis. 25. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 77.*
Habitat in India, *femoribus nunc clavatis, nunc linearibus.*

maſſilienſis. 65. L. nigra, thorace ſubgloboſo, elytris faſciis ſubtribus albis introrſum fractis. *Syſt. nat.* XII. *add. p.* 1067. *n.* 8.
Habitat in Luſitania, *et* Maſſilia, *facie cerambycis ruſtici, ſed triplo minor; an cerambyx?*

piloſa. 66. L. nigra cinereo-pubeſcens, thorace globoſo, elytris faſtigiatis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 44.
Habitat in Hiſpania *ad* calpen freti Gaditani, *magnitudine circiter cerambycis myſtici.*

nitens. 67. L. thorace globoſo et abdomine nigris flaveſcenti-tomentoſis nitentibus, elytris atris: faſciis quatuor latis tranſverſis flavis, pedibus ferrugineis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 45.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine melanurae.*

bilineata. 68. L. fuſco-nigricans, thorace lineis binis, elytris punctis ſparſis flaveſcentibus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 76.
Habitat in Carniolia, *habitu cerambycis cardui, nonne cerambyx?*

caerulea. 69. L. caerulea, tibiis anterioribus rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 78.
Habitat in Carniolia.

ſqualida. 70. L. nigra, elytris baſi et margine interiori teſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 79.
Habitat in Carniolia, *antennis brevibus.*

bipartita. 71. L. nigra, thorace ferrugineo: linea nigra longitudinali, elytris macula communi ferruginea. *Schranck. Beytr. z. Naturg. p.* 68. §. 15.
Habitat in Germania *ſuperiori.*

ferruginea. 72. L. nigra, elytris ferrugineis, extrorſum late nigris. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 68. §. 14. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in Germania.

73. L.

Lamda. 73. L. nigro, elytris fasciis tribus albis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 67. §. 13. *t.* 3. *f.* 13.
Habitat in Germania.

aurea. 74. L. viridi-aurea, thorace spinoso, elytris fasciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rufis. *Degeer inf.* 5. *p.* 145. *n.* 1.
Habitat - - - - $8\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Genii. 75. L. nigra, elytris fusco-testaceis apice nigris, pedibus flavis. *Deger inf.* 5. *p.* 139. *n.* 17.
Schaeff. icon. t. 39. *f.* 5.
Habitat in Europa, *tabaci colore*, $3\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

maculata. 76. L. nigra, maculis villoso-flavis, thorace globoso, antennis corpore dimidio brevioribus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 211. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

naevia. 77. L. nigra villoso-flava, elytris maculis duabus glabris nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Gallia

punctulata. 78. L. nigricans, capite thoraceque rubro nigro-punctato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 212. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

strigosa. 79. L. villoso flava, elytris lineis tribus transversis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 216. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

gallica. 80. L. caerulea, tibiis rufis, thorace subgloboso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 217. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

crassipes. 81. L. atra, femoribus crassis rufis. *Geoffr. inf. par.* 5. *p.* 219. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

bimaculata. 82. L. rufa, thorace cylindrico, elytris punctatis: macula et striga undulata albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1073.
Schaeff. ic. t. 158. *f.* 1.
Habitat in Europa.

villosa. 83. L. nigra villosa, thorace cylindrico: linea longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1072.
Habitat in Dania.*

206. NE-

Specierum 64-83 locus in hoc genere dubius.

206. NECYDALIS. *Antennae* setaceae vel filiformes.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra alis minora, breviora vel anguſtiora.
Cauda ſimplex.

* *antennis ſetaceis, elytris ala et abdomine brevioribus,* Lepturae Fabricii.

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 838.*
Degeer inſ. 5. *p.* 148. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Necydalis ichneumonea.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 35. Leptura abbreviata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 1. 2. Muſca Cerambyx major.
elem. t. 13. *f.* 2.
ic. t. 10. *f.* 10. 11.
Habitat in Europa.

variegata. 12. N. abdomine atro: faſciis fulvis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 36. Leptura variegata.
Habitat in nova Hollandia.

minor. 2. N. elytris teſtaceis: apice lineola alba, antennis longioribus. *Fn. ſuec.* 837.* *Scop. ent. carn.* 179.
It. oeland. 74. Necydalis elytris flavis lineola alba.
Degeer inſ. 5. *p.* 151. *n.* 2. Necydalis ceramboides.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 37. Leptura dimidiata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 6. 7. Muſca Cerambyx minor.
icon. t. 95. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 51.
Habitat in Europa, *inprimis boreali.*

umbellatarum. 3. N. elytris teſtaceis immaculatis, antennis longis.
Schreb. inſ. 4. Necydalis elytris apice nigris.
Scop. ent. carn. 180. Necydalis minima.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 28. Leptura umbellatarum.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 1.
Habitat in Germaniae *umbellatis.*

** *an-*

** *antennis filiformibus, elytris subulatis longitudine abdominis.*

viridissima. 13. N. thorace teretiusculo, corpore viridi. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 23. *Fn. suec.* 717. Cantharis viridissima.
Degeer inf. 5. *p.* 15. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 13. Cantharis viridi-aenea nitida.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 177. *n.* 14. Cicindela viridi-caerulea.
Habitat in Europae *hortis frequens.*

caerulescens. 14. N. thorace teretiusculo, corpore caeruleo subopaco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 2. *mant inf.* 1. *p* 170. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 22. Cantharis caerulea.
Degeer inf. 4. *p.* 76. *n.* 8. Telephorus villosus violaceo-caeruleus.
Habitat in Europa *boreali.*

sanguinicollis. 15. N. thorace teretiusculo rufo, corpore fusco. *Fabr. mant. inf.* 1. *p* 170. *n.* 3.
Habitat Halae Saxonum, *magnitudine et statura caerulescentis.*

ruficollis. 16. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 4.
Habitat in Italia, *statura et magnitudine caerulescentis.*

caerulea. 4. N. caerulea, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 264. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 11.
Forst. nov. inf. 1. *p.* 47. *n.* 47. Necydalis ceramboides.
Scop. ent. carn. 145. Cantharis nobilis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 342. *n.* 3. Cantharis viridi-caerulea.
Sulz. hist. inf. 48. *t.* 6. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis australi et* Oriente, *pedibus interdum simplicibus.*

tristis. 17. N. nigra, thorace teretiusculo femorumque basi rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 5.
Habitat in terra van Diemen, *statura atrae.*

atra. 5. N. nigra, femoribus omnibus clavatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 6.

Habitat

Habitat in Europa *auſtrali, femoribus in altero ſexu ſimplicibus.* Aſcanius.

humeralis. 18. N. elytris nigris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 7.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 48. *n.* 48. Necydalis (muralis) elytris ſubulatis fuſca, humeris flavis, pedibus ſimplicibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 342. *n.* 2. Cantharis nigra &c.
Habitat in Anglia.

uſtulata. 19. N. nigra, elytris baſi ſuturaque lata teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 8. *Schranck inſ. auſtr. n.* 319. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 8.
Habitat in Germaniae *plantis, ſtatura humeralis.*
Femina *major, thorace fulvo.*

melanura. 20. N. nigra, thorace elytrisque teſtaceis: his apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 9.
Habitat in Hiſpaniae *plantis, ſtatura et magnitudine ruficollis.*

rufa. 6. N. nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 10.
Geoff. inſ. par. 2. *p.* 220. *n.* 22. Leptura nigra &c.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 8.
Habitat in Europa.

glauceſcens. 7. N. elytris glaucis, corpore nigro, abdominis inciſuris albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 642. *n.* 7. Necydalis elytris glauco flaveſcentibus, femoribus clavatis.
Syſt. nat. X. *p.* 399. *n.* 17. Leptura necydalea.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 6.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

flaveſcens. 8. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis.
Scop. ent. carn. 145. Cantharis femorata.
Schaeff. ic. t. 85. *f.* 7.
Habitat in Europa; *an mera n. podagrariae varietas?*

podagrariae. 9. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis baſi teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 264. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 12.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 343. *n.* 4. Cantharis nigra &c.

Habitat

Habitat in aegopodio podagraria, *elytrorum apice nigro, antennarum basi, palpis, et pedibus quatuor anterioribus testaceis.* Schreber.

simplex. 10. N. elytris testaceis, pedibus simplicibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 264. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 14.
Scop. ent. carn. 144. Cantharis phthysica.
Habitat in Europa, *an forsan n. podagrariae varietas?*

brevicornis. 11. N. elytris minutissimis, capite thoraceque fuscis: linea longitudinali flava, antennis brevissimis crassiusculis.
Habitat in Guinea, *majoris magnitudine, elongata, elytris ex rufo fuscis, pedibus testaceis.*

striata. 21. N. virescens, elytris lineis quatuor elevatis. *Herbst apud Fuesslii arch.* 5. *p.* 109. *n.* 5.
Habitat Berolini.

melanocephala. 22. N. elytris testaceis, capite epigastrio alisque nigris, antennis fuscis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 300.
Habitat Halae Saxonum *in umbellatis.*

glauca. 23. N. nigra, thorace elytrisque cyaneis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 109. *n.* 6.
Habitat rarior Berolini, 5 *lineas longa.*

collaris. 24. N. atra, thorace bipunctato testaceo, pedibus simplicibus. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 46. *n.* 46.
Habitat in America *septentrionali, caeurleae magnitudine.*

exusta. 25. N. fusca, elytris subulatis testaceis margine exustis, pedibus simplicibus. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 664.
Habitat in Europa.

clavipes. 26. N. nigra, elytris subulatis testaceis margine exteriore fuscis, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 665.
Habitat in Europa.

207. LAMPYRIS. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor.
Elytra flexilia.
Thorax planus, semiorbiculatus, caput subtus occultans cingensque.
Abdominis latera plicato-papillosa.
Femina aptera plerisque, larvae phytiphagae similis.

* *palpis subclavatis.*

noctiluca. 1. L. oblonga fusca, clypeo cinereo. *Fn. suec.* 699. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 31. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 19. 20. Lampyris noctiluca communis.
Leche nov. sp. 23. *n.* 47. Cantharis mas coleopterus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 167. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat in Europae *borealis juniperetis graminosis, etiam in* Calabria.

coruscа. 2. L. obscure nigra, clypeo utrinque lunula rosea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 2. *Uddm. diss.* 47. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo utrinque intra marginem fulvo.
Habitat in America *boreali.*

splendidula. 3. L. oblonga fusca, clypeo apice hyalino. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 3. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo supra oculos fenestrato.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 166. *n.* 1. Lampyris femina aptera.
Scop. ent. carn. n. 118. Cassida noctiluca.
Poda inf. 39. Cantharis noctilcua.
Raj. inf. p. 78. *n.* 15.
Guen. de Montbeill. nov. act. Divion. 1782. *sem.* 2.
Column. ephr. 1. 38. *t.* 36.
Aldr. inf. 492.
Mouff. inf. p. 109. *f.* 1. *et* 2.

Jonst.

Jonst. inf. t. 14. *f.* 2.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 3. A. B.
Schaeff. elem. t. 74.
Habitat in Europae *sylvaticis, an a noctiluca satis distincta, tempestate inprimis pluvia lucem spargens, femina majorem, gravida maximam, in aëre vitali adhuc majorem.*

obscura. 19. L. nigra, clypeo utrinque macula rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 4.
Habitat in terra del Fuego.

Pyralis. 4. L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 5.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 4. *Mus. Lud. Ulr.* 78.* Lampyris oblongiuscula fusca, elytris margine rufescentibus, clypeo intra marginem purpurascente.
Degeer inf. 4. *p.* 52. *n.* 7. *t.* 17. *f.* 7. Lampyris oblonga.
Habitat in America *meridionali.*

cincta. 20. L. fusca, thorace elytrorum margine omni abdominisque apice fulvis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 6.
Habitat in Pulicander, *pyralidi proxime affinis.*

margina-ta. 5. L. oblonga nigra, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque posteriore flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 252. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 7.
Habitat in America *meridionali, magnitudine noctilucae.*

Hesperа. 6. L. ovata, elytris fuscis: macula marginali triangulari flava. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 252. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p* 161. *n.* 10.
Degeer inf. 4. *p.* 48. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 1. Lampyris surinamensis.
Habitat in America *meridionali.* Rolander.

ignita. 7. L. ovata, elytris fuscis: macula marginali ovata lutea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 252. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 11.
Degeer inf. 4. *p.* 49. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 2. Lampyris ovata.
Habitat in America *meridionali, fusca, subtus flava, alis nigris.* Rolander.

lucida. 8. L. oblonga, elytris fuscis: margine exteriore luteo, abdomine flavo. *Fabr. spt inf.* 1. *p.* 253. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 12.
Degeer inf. 4. *p.* 51. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 5.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 22.

Habitat in America *meridionali, noctilucae similis, sed pallidior, capite antennisque nigris.*

nitidula. 21. L. oblonga fusca, thorace flavescente: macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 13.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

phosphorea. 9. L. oblonga subtestacea, abdomine atro: posterius flavissimo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 14.
Degeer inf. 4. *p.* 51. *n.* 6. *t.* 17. *f.* 6. Lampyris oblonga &c.
Habitat in America *meridionali, antennis nigris.* Rolander.

japonica. 22. L. flava, segmento abdominis antepenultimo nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 79. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat in Japonia, *Majo et Junio copiosissima, vesperi lucem egregiam e vesiculis binis caudalibus aëre repletis spargens, oculis, antennis alisque nigris.*

compressa. 23. L. testacea, antennis pedibusque compressis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4 *p.* 80.
Habitat in India, *oblonga, linearis, glabra, abdomine caerulescente, capite, pectore, pedibus antennisque nigris.*

capensis. 24. L. livida, thorace flavescente, abdomine posterius flavissimo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae spei.

australis. 25. L. flavicans, capite elytrisque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

mauritanica. 10. L. elytris lividis, corpore flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 18.
Habitat in Africae *plantis, splendidula duplo, femina triplo major.*

depressa. 26. L. fusca, clypei elytrorumque margine dilatato plano. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 19.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 7. *p.* 171. *n.* 2. *t.* 46. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *magna.*

italica. 11. L. elytris fuscis, thorace transverso rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 16.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 645. *n.* 11. Lampyris elytris fuscis, clypeo antice transverso rufo medio nigro.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 53. *n.* 9. *t.* 17. *f.* 9. 10. Lampyris oblonga &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Italiae *et* Helvetiae *arboribus, congeneribus minor, fuſca, abdominis ſegmentis* 2 *ultimis flavis, pectore pedibusque luteis; femina nigra.*

chinenſis. 12. L. elytris teſtaceis apice nigris. *Osb. it.* 224.*
Habitat in Aſia.

minuta. 13. L. teſtacea, abdomine alisque nigricantibus.
Habitat in Europa, *vix pediculo major, ex ovali oblonga.*

pectinata. 27. L. atra, clypei lateribus baſi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 8.
Degeer inſ. 4. *p.* 57. *n.* 11. *t.* 17. *f.* 13. Lampyris atra &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 649. *n.* 17. Cantharis pectinata.
Habitat in America *meridionali.*

flabellicornis. 28. L. nigra, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baſeos abdomineque apice albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 9.
Habitat in Braſilia, *magna.*

piloſa. 29. L. oblonga nigra, thorace ſanguineo: lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 49. *n.* 49.
Habitat in America *ſeptentrionali, noctilucae fere magnitudine; an ex hac tribu?*

** *palpis ſubfiliformibus*, Pyrochroae Fabricii.

faſciata. 30. L. atra, thoracis margine flaveſcente, elytris faſcia lata alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 9.
Habitat in Cayenna, *ſtatura reticulatae.*

reticulata. 31. L. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis: faſcia apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8.
Habitat in America *boreali.*

bicolor. 16. L. ſanguinea, elytris poſterius violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 7.
Amoen. acad. 6. *p.* 395. *n.* 21. Cantharis bicolor.
Habitat in Africa, *antennis compreſſis.*

pusilla. 32. L. atra, antennarum apicibus elytrisque sanguineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 6.
Degeer inf. 4. *p.* 36. *n.* 3. Lampyris nigro-rubra.
Habitat in Norwegia, *sanguinea duplo major.*

nigripes. 33. L. sanguinea, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 5.
Habitat in Siam, *statura et magnitudine sanguineae.*

sanguinea. 17. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Fn. suec.* 704.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 4.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 168. *n.* 3. Lampyris, elytris rubris.
Degeer inf. 4. *p.* 452. *t.* 2. *f.* 1. Lampyris sanguinea.
Scop. ent. carn. 119. Cassida sanguinea.
Raj. inf. p. 101. *n.* 4.
Frisch inf. 12. *p.* 40. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 7. *f.* 1.
Habitat in Europae *lapidosis.*

pectinicornis. 34. L. atra, thorace elytrisque testaceis, antennis pectinatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 20. *Fn. suec.* 715. Cantharis pectinicornis.
Habitat in Germania, *coccinea major.*

rubens. 35. L. nigra, capite, thorace elytrisque rubris, antennis pectinatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 301. *Schranck inf. austr. p.* 174. *n.* 324. Pyrochroa Satrapa.
Habitat Halae Saxonum, *Majo et Junio conspicua, statura coccineae, at dimidio minor.*

flabellata. 36. L. coccinea, antennis elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 2.
Habitat in America, *statura et magnitudine coccineae, antennis serratis.*

coccinea. 18. L. nigra, thorace elytrisque sanguineis immaculatis. *Fn. suec.* 705.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 47. *n.* 4. Lampyris villosa.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 338. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 4. Pyrochroa.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 4.

Habitat

Habitat in Europae *sepibus, capite aliquando rufo, elytris interdum striatis.*

Aurora. 37. L. nigra, thorace rubro cancellato, elytris spadiceis: lineis quatuor elevatis; interstitiis seriatim punctatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 105. *n.* 4.
Habitat in Pomerania.

nitens. 38. L. oblonga, elytris fuscescentibus: macula marginali oblonga fusca, abdomine subtus rufo, posterius flavo: segmento unico nigro. *Degeer inf.* 4. *p.* 50. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
Habitat in Surinamo, $4\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

maculata. 39. L. ovata testacea, thorace fascia elytrisque macula nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 50. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 4.
Habitat - - - *sex lineas longa.*

pensylvanica. 40. L. oblonga, elytris pallide ex griseo testaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rufis. *Degeer inf.* 4. *p.* 52. *n.* 8. *t.* 17. *f.* 8.
Brown jam. p. 431. *t.* 44. *f.* 9. a. b. Pyralis minor subcinerea longa, alis et oculis nigricantibus?
Habitat in Pensylvania.

*** *palpis articulo ultimo crassiori truncato;* Lyci Fabricii.

latissima. 14. L. flava, elytris macula marginali posteriusque nigris, margine laterali maximo dilatato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 255. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *statura et magnitudine silphae cujusdam minoris, antrorsum angusta, retrorsum latissima, antennis serratis.*

palliata. 41. L. elytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 255. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 2.
Habitat ad caput bonae spei.

rostrata. 16. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis anterius posteriusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1, *p.* 255. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 646. *n.* 15. *Mus. Lud. Ulr.* 78. Lampyris elytris testaceis antice posticeque nigris.
Degeer inf. 7. *p.* 622. *n.* 19. *t.* 46. *f.* 11.
Habitat in Africae *plantis.*

proboscidea. 42. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, posterius nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 255. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *rostratae proxime affinis.*

serraticornis. 43. L. nigra, thorace elytrisque rufescentibus, elytris apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 256. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

atra. 44. L. atra, thorace orbiculato elytrisque rubris, dorsi macula impressa nigra. *Mus. Lesk. p.* 29. *n.* 626.
Habitat in Europa.

HORIA. *Antennae* moniliformes.
Palpi quatuor extrorsum crassiores.
Labium lineare, apice rotundatum.

testacea. 1. H. rufa, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 256. *n.* 1. Lymexylon testaceum.
Habitat Tranquebariae.
Mari *femora posteriora incrassata, subtus canaliculata dentata.*

dermestoides. 2. H. testacea, oculis, alis pectoreque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 25. *Fn. suec.* 702.* Cantharis testacea, oculis alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 256. *n.* 2. Lymexylon dermestoides.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 6. *p.* 145. *n.* 5. *t.* 30. *f.* 4. Lytta francofurtana.
Habitat in Europa *media.*

CUCUJUS. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor aequales: articulo ultimo truncato, crassiori.
Labium breve, bifidum: laciniis linearibus, distantibus.
Corpus depressum.

monilis. 1. C. supra niger, thorace quadrato mutico margine, elytris macula ferruginea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 9.
Habitat in Germania, *antennis moniliformibus ad boriam accedens, vix hujus generis.*

muticus. 2. C. thorace mutico nigro: puncto utrinque impresso, elytris striatis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 257. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 8.
Habitat in Germania, *niger.*

testaceus. 3. C. testaceus, thorace subquadrato mutico, femoribus compressis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 7.
Habitat sub betulae *cortice.*

dubius. 4. C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 257. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 5.
Habitat in America *boreali.*

clavipes. 5. C. ruber, thorace sulcato, femoribus clavatis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 257. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 4.
Habitat in America *boreali.*

caeruleus. 6. C. niger, thorace sulcato, elytris striatis caeruleis, abdomine rufo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 3.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 2. *p.* 6. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *depresso major.*

sulcatus. 7. C. niger, thorace sulcato, elytris crenato-striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Croatiae *ligno putrescente, elongatus, mediae magnitudinis.*

depressus. 8. C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus simplicibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 1.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 647. *n.* 1. Cantharis (ſanguinolenta) ſupra rubra, elytris bimarginatis.
Friſch inſ. 13. *t.* 24. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 2. *p.* 4. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-4.
Habitat in Germania *et* Ruſſia, *lampyridi ſanguineae affinis.*

quadratus. 9. C. niger, thorace quadrato poſterius dentato, medio tuberculato, margine externo rugoſo, anterius elevato, antennis fuſcis, pedibus ſimplicibus elytrisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 629. b.
Habitat in Europa.

rufus. 10. C. rufeſcens, mandibulis validis, antennis, palpis pedibusque nigris, capite gibboſo, elytris molliuſculis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 21.
Habitat in Sumatra.

maculatus. 11. C. ſordide flavus, thorace quadrangulo inaequali, mandibulis validis, pedibus, elytrorumque maculis ſubquadratis nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 22. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in Noveboraco, *congenerum maximus, ſubdepreſſus.*

208. CANTHARIS.

Antennae filiformes.
Thorax (plerisque) marginatus, capite brevior.
Elytra flexilia.
Abdominis latera plicato-papilloſa.

* *palpis quatuor ſecuriformibus.*

virideſcens. 1. C. thorace teſtaceo: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magna, capite nigro, pectore fuſco, abdomine teſtaceo.*

fuſca. 2. C. thorace rubro: macula nigra, elytris fuſcis. *Fn. ſuec.* 700.* *It. oel.* 38. *Scop. ent. carn.* 120. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 1.

Raj.

Cantharides *declaratae aliis victitant inſectis, ſola lymexyli tribus, tum larva, tum imago, ligno recenti.*

Raj. inſ. p. 84. *n.* 29. *et p.* 101. *n.* 2. Cantharis ſepiarius major, elytris nigricantibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 170. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 8. Cicindela elytris nigricantibus &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 60. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 12. Telephorus fuſcus.
Poda inſ. 40. *n.* 4.
Friſch inſ. 12. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 33.
Schaeff. elem. t. 123. *f.* 1. 2.
ic. t. 16. *f.* 10. *et t.* 26. *f.* 9-12.
Habitat frequens in Europae *ſepibus, rapaciſſima, in propriam ſpeciem ſaeviens.*

marginella. 73. C. teſtacea, abdomine nigro marginato capite poſterius pectore oculisque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 631.
Habitat in Europa.

media. 74. C. fuſca, thorace, capite, antennarum baſi, abdominis margine et apice pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 632.
Habitat in Europa.

haematoſtoma. 75. C. nigra, ore abdomineque rufo. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 633.
Habitat in Europa.

punctata. 76. C. livida, oculis truncoque fuſcis, abdominis ſegmentis utrinque puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 638.
Habitat in Europa.

dichroa. 77. C. nigra, fronte, thorace, abdomine pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 639.
Habitat in Europa.

multicolor. 78. C. capite nigro, fronte thoraceque luteis, elytris fuſcis, abdomine pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 640.
Habitat in Europa.

livens. 79. C. thoracis macula nigra poſterius triloba, utrinque punctis duobus impreſſis fuſcis, capite poſterius nigro, elytris fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 642.
Habitat extra Europam.

diſtincta. 80. C. nigra, maxillis thoracis abdominisque marginibus externis lividis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 643.
Habitat in Europa.

exuſta. 81. C. fuſca, capite thoraceque nigris, elytris teſtaceis apice exuſtis, antennis pedibusque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 644.
Habitat in Europa.

livida. 3. C. tota teſtacea. *Fn. ſuec.* 701.* *Scop. ent. carn.* 122. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 167. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 28. Cantharis ſepiarius major e rufo flavicans.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 171. *n.* 2. Cicindela thorace rubro immaculato &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 70. *n.* 2. Thelephorus flavus.
Habitat in Europa *et boreali* America.

rufa. 4. C. tota rufa, epigaſtrio alisque nigris. *Fn. ſuec.* 703.*
Habitat in Europa.

obſcura. 5. C. thoracis marginibus rubris, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 706. *Act. nidroſ.* 3. *p.* 396. *t.* 6. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258 *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 16. *f.* 8.
Habitat in Europa, *thoracis margine aliquando fuſceſcente, pedibus interdum rubris, fuſcae ſimilis, at duplo minor.*

limbata. 20. C. fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 5.
Habitat in Jamaica, *mediae magnitudinis.*

lateralis. 6. C. thorace rubro, corpore fuſco, elytris margine exterieri flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 707.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſmaragdula. 22. C. thorace flavo: macula viridi, elytris viridibus nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 6.
Habitat in Braſilia, *mediae magnitudinis.*

biguttata. 11. C. thorace medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis. *Fn. ſuec.* 712.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 11. Cicindela fuſca, elytris apice flavis, thorace fuſco.
Degeer inſ. 4. *p.* 77. *n.* 10. Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis.
Habitat in Europae *nemoribus, hortis.*

minima. 12. C. thorace rufo: macula nigra, corpore fuſco, elytris apice flavis. *Fn. ſuec.* 713.* *Scop. ent. carn.* 128. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 22. *Lesk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 14.

Fn.

Fn ſuec. 598.* Necydalis elytris apice puncto flavo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 10. *et. p.* 372. *t.* 7. *f.* 2. Necydalis elytris puncto flavo.
Habitat in Europae *hortis.*

cardiacae. 13. C. thorace ſubmarginato, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto ſanguineo. *Fn. ſuec.* 720.*
Habitat in Europae *leonuro cardiaca.*

albicans. 14. C. thorace orbiculato, margine luteo, corpore nigro, fronte flava.
Habitat in Germania, *ſtatura c. cardiacae, magnitudine pediculi, tibiis anterioribus anterius flavis.* Forskahl.

teſtacea. 15. C. thorace flavo: macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis. *Fn. ſuec.* 714.* *Scop. ent carn.* 123. *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 23.
Fn. ſuec. 593. Cantharis nigra, elytris lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 173. *n.* 6. b. Cicindela nigra, thoracis margine flavo &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 71. *n.* 4. Thelephorus niger, thorace rufeſcente &c.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europae *hortis.*

atra. 16. C. corpore toto atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

margina- ta. 23. C. nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 9.
Habitat in America.

bimacula- ta. 25. C. thorace ferrugineo: macula nigra, elytris teſtaceis: macula apicis nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 10.
Habitat in America *ſeptentrionali, nigra.*

pallipes. 28. C. atra, elytris pallidis apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 11.
Habitat in Germania, *ſtatura atrae.*

pallida. 29. C. atra, elytris pedibusque pallide teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 12.
Habitat Kilonii, *parva.*

30. C.

ruficollis. 30. C. atra, thorace abdomineque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 259. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 13.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 6.
Habitat in Anglia.

flavipes. 31. C. testacea, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 259. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 14.
Habitat in Sina, *magna.*

melanocephala. 32. C. testacea, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. *Fabr sp. inf.* 1. *p.* 260. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 15.
Habitat in Coromandel, *magna.*

bipunctata. 33. C. thorace punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 260. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 16.
Habitat Lipsiae.

angulata. 34. C. testacea, thorace angulato spinoso, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 17.
Habitat in oceani australis insula Amsterdam, *statura et magnitudine melanurae.*

nigra. 35. C. pubescens, corpore nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 20.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis pilosa.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. suec.* 439. Dermestes (niger) oblongus pilosus niger, elytris molliusculis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Habitat frequens in Europae *floribus.*

pulicaria. 36. C. thorace rufo: macula nigra, elytris atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 260. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 21.
Habitat in Germania, *atra.*

canescens. 37. C. thorace luteo, epigastrio elytrisque obscure cinereis.
Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 302.
Habitat gregaria Halae Saxonum, *in betulis, quercubus, Majo et Junio conspicua, fuscae affinis.*

coccinea. 38. C. thorace rubro: macula nigra, corpore nigro, elytris sanguineis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 303.
Habitat rarior Halae Saxonum, *bipustulatae affinis.*

39. C.

bicolor. 39. C. lutea, elytris dimidiato-caeruleis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 81.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaberrima, ſtatura et magnitudine melanurae.*

bilineata. 40. C. thorace flavo: macula punctisque quatuor fuſcis, elytris flavis: linea fuſca. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 81.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine teſtaceae.*

trilineata. 41. C. thorace flavo: maculis duabus nigris, elytris flavis: linea ſuturaque nigris. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 82.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine teſtaceae.*

Altica. 42. C. thorace rufo, elytris violaceis immaculatis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 82.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura pulicariae, glaberrima, violacea, pedibus rufeſcentibus.*

oculata. 43. C. thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris corporeque cyaneis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 83.
Habitat - - - bipuſtulata paulo minor, capite pedibusque flavis, elytris interdum violaceis.

collaris. 44. C. thorace ſanguineo: macula nigra, elytris cyaneis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 83.
Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nigra.

cuprea. 45. C. ſubtus cyanea, ſupra aenea. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 83.
Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nitida, piloſa.

argentea. 46. C. thorace plano elytrisque viridibus, abdomine ſericeo-argenteo. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 84.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et facie fuſcae, capite nigro, ano pedibusque luteis, tarſis fuſcis.*

janthina. 47. C. thorace flavo: macula punctisque quatuor fuſcis, elytris viridibus. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 84.
β) Cantharis antennis flavis: extremis tribus articulis fuſcis.
γ) Cantharis thoracis macula fuſca, poſterius bifida, punctum nigrum includente.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et facie fuſcae, pectore oculisque nigris, capite, antennis, abdomine pedibusque flavis.*

americana. 48. C. thorace flavo: macula nigra, elytris flavis: macula apicis trientali oblonga nigra. *Forſt. nov. inf. ſp.* 1. *p.* 50. *n.* 50.
Habitat in Noveboraco, *fuſcae magnitudine, nigra, antennis fuſcis.*

9. C.

rufipes. 49. C. capite thoraceque rubris immaculatis, pedibus fulvis: posterioribus apice nigris. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. p. 107. n. 2.*
Habitat Berolini, *fuscae affinis, sed minor.*

berolinensis. 50. C. nigra, antennis basi elytrisque flavescentibus: his apice nigris, pedibus ferrugineis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. p. 108. n. 10.*
Habitat Berolini, *lividae affinis, sed minor.*

fulva. 51. C. fulva, capite, elytris et antennis dimidiato nigris. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. p. 108. n. 11.*
Habitat Berolini, *fuscae similis, sed quadruplo minor.*

serrata. 18. C. flavescens, elytris striatis: fasciis tribus nigris, antennis serratis.
Habitat in America, *antennis nigris, longitudine corporis; an hujus generis?*

tropica. 19. C. thorace lateribus rubro, elytris nigris: fascia alba, antennis pectinatis. *Muf. Lud. Ulr. 80.* Gron. zooph. 515. t. 14. f. 7.*
Habitat in America *australi, an hujus generis?*

sonchi. 52. C. atra, elytris fimbria lineaque longitudinali intermedia albis. *Lepechin it. 1. p. 264.*
Habitat in Sibiriae *soncho; an hujus tribus?*

caspica. 53. C. viridis, elytris maculis duabus apicis flavis rhombeis. *Lepechin it. 1. t. 16. f. 11.*
Habitat ad mare caspium, *parva; an huc referenda?*

flaveola. 54. C. subtus flava, capite antennisque nigris, thorace ferrugineo: maculis duabus fuscis, elytris ex luteo fuscis apice flavis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 7. p. 171. n. 12.*
Habitat Berolini, *biguttatae affinis.*

violacea. 21. C. violacea, thorace teretiusculo, antennis pectinatis, femoribus anterioribus crassissimis dentatis.
Habitat in Guinea, *dermestis magnitudine, ano pedibusque ferrugineis.*

virescens. 24. C. thorace teretiusculo, corpore virescenti-fusco, femoribus posterioribus clavatis.
Habitat in Europa, *antennis nigris, elytris trilineatis.*

lepturoides. 55. C. lutea, thorae convexo, elytrorum apice corporeque nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 81.
Habitat ad caput bonae spei, *melanurae affinis, magnitudine lividae.*

nigripes. 56. C. lutea, thorace rotundato, abdomine, pedibus elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 260. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria, *melanurae proxime affinis, an satis a lepturoide distincta?*

melanura. 27. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris. *Fn. suec.* 719.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 260. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 19.
Raj. inf. p. 84. *n.* 27. Cantharis sepiarius, elytrorum apicibus nigris.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 173. *n.* 5. Cicindela rubra &c.
Schaeff. ic. t. 16. *f.* 14.
Habitat in Europae *hortis.*

Histrio. 82. C. nigra, thorace, antennarum basi, abdominis segmentorum basi posteriori pedibusque luteis, thoracis macula fusca. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 645.
Habitat in Europa.

picea. 83. C. picea, thorace posterius utrinque puncto rubro, antennarum basi pedibusque luteis, femoribus basi atris. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 646.
Habitat in Europa.

chalybea. 84. C. nigro-violacea pubescens. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 648.
Habitat in Europa.

tricolor. 85. C. nigra, elytris dimidio nigris, apicem versus albis, summo apice geniculisque luteis. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 649.
Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus: articulo ultimo setaceo,* Malachii.

aenea. 7. C. corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum undique rubris. *Fn. suec.* 708.* *Scop. ent. carn. n.* 126. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 261. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 73. *n.* 6. *t.* 2. *f.* 16. 17. Thelephorus aeneus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 174. *n.* 7. Cicindela viridi-aenea, elytris extrorsum rubris.

Raj.

Raj. inf. p. 77. *n.* 12.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 10. 11.
icon. t. 18. *f.* 12. 13.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 5.
Habitat in Europae *plantis, tentaculis duobus obtusis sanguineis basi connatis ad basin abdominis alitisque duobus ad apicem thoracis exserendis instructa, aliquando minor, elytris totis sanguineis.*

bipustulata. 8. C. aeneo-viridis, elytris apice rubris. *It. oel.* 127. *Fn. suec.* 709.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 262. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 2. *Scop. ent. carn. n.* 127.
Raj. inf. p. 101. *n.* 7. Cantharis vix $\frac{3}{4}$ unciae longa.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 175. *n.* 8. Cicindela aeneo-viridis, elytris apice rubris.
Degeer inf. 4. *p.* 75. *n.* 7. Thelephorus viridi-aeneus nitidus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 10. 11. *t.* 19. *f.* 14.
Habitat in Europa *frequens.*

haemorrhoidalis. 86. C. nigra, thorace elytrorumque apicibus rubris. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 660.
Habitat in Europa.

viridis. 57. C. aeneo-viridis, ore flavescente. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 3.
Habitat in Scania, *statura et magnitudine bipustulatae.*

sanguinolenta. 58. C. nigro-aenea, thoracis margine elytrisque sanguineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *statura aeneae, sed duplo minor.*

cyanea. 59. C. cyanea, thorace abdomineque rubris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 169. *n.* 5.
Habitat in Hispaniae *umbellatis, statura sanguinolentae.*

pediculatia. 9. C. atra, elytris apice rubris. *Fn. suec.* 710.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 262. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 6.
Habitat in Europae *hortis, pediculo paulo major.*

nemoralis. 60. C. nigra, thorace margine, elytrisque apice rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 262. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 7.
Habitat Kilonii *in nemoribus.*

10. C.

An ad primam tribum referendi Thelephori Schaefferi *bifasciatus ic. t.* 105. *f.* 9. a. 9. b. *et bipunctatus ic. t.* 41. *f.* 15. 16.

fasciata. 10. C. thorace subrotundo virescente, elytris nigris: fasciis duabus rubris. *Fn. suec.* 711.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 262. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 8.
Raj. inf. p. 102. *n.* 22. Cantharis valde exigua.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 177. *n.* 12. Cicindela elytris nigris: fasciis duabus rubris.
Degeer inf. 4. *p.* 76. *n.* 9.
Schaeff. ic. t. 189. *f.* 3.
Habitat in Europae *muscis.*

equestris. 61. C. viridi-aenea, elytris rubris: fascia viridi-aenea. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 500. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 9.
Habitat in Italia, *statura et magnitudine fasciatae.*

ochropus. 62. C. nigra, antennarum basi tibiisque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 10.
Habitat Halae Saxonum, *parva nitida.*

chrysomeloides. 63. C. thorace rubro immarginato, elytris cyaneis laevibus, antennis pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 17. *n.* 30.
Habitat Lutetiis, *magnitudine pediculi majoris, tacta sub pectore caput et corpus contrahens et libera celerrime fugiens.*

caeruleocephala. 64. C. thorace rubro, immarginato, elytris fuscis, capite anterius rubro, posterius ex caeruleo nigro. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 18. *n.* 31.
Habitat circa Holmiam, *magnitudine testaceae, laterali similis, sed angustior et minor.*

suecica. 65. C. thorace flavo immarginato: punctis duobus nigris, elytris flavescentibus apice nigris. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 18. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *melanurae affinis, lividae magnitudine, statura lepturae; an cum* 63 *et* 64 *hujus tribus?*

Herbstii. 66. C. elytris rubris; macula nigricante. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 108. *n.* 4.
Habitat Berolini, *fasciatae magnitudine.*

erythromelas. 67. C. nigra, thoracis margine elytrisque rubris, segmentis abdominis tribus margine fulvis. *Herbst apud Fuesslii arch.* 5. *p.* 108. *n.* 5.
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longa.*

*** *palpis anterioribus porrectis: articulo penultimo appendice magna ovata fissa aucto, ultimo arcuato acuto,* Lymexyla.

abbreviata. 68. C. nigra, thoracis linea dorsali, elytris brevissimis fornicatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *speciebus hujus tribus major, elongata.*

proboscidea. 69. C. nigra, elytris testaceis apice nigris, palpis hamato-irregularibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 256. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Germaniae *lignis.*

barbata. 70. C. fusca, antennis tibiisque piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 3.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 322. *t.* 1. *f.* 7. Mordella (barbata) fusca, palpis ensiformibus trilobis: lobis lateralibus latissimis.
Schaeff. ic. t. 279. *f.* 7. a. b.
Habitat in Germaniae *lignis, proboscideae affinis, tomento aureo fugaci nitens.*

navalis. 26. C. thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Fn. suec.* 718.* *It. wgoth.* 153. *t.* 2.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 256. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 4.
Frisch inf. 13. *p.* 24. *t.* 20.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 1.
Habitat in ligno querno, *quod destruit.*

saxonica. 71. C. nigro, elytris basi, abdomine apice pedibusque flavis.
Fabr. mant. 1. *p.* 165. *n.* 5.
Habitat in Saxoniae *ligno, statura et magnitudine navalis.*

morio. 72. C. nigra, pedibus anterioribus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 6.
Habitat in Saxoniae *lignis, saxonica duplo major.*

SERROPALPUS. *Antennae* ſetaceae.
Palpi quatuor inaequales; anteriores longiores profunde ſerrati: articulis quatuor; ultimo maximo, truncato, compreſſo apice patelliformi; poſteriores ſubclavati.
Thorax marginatus, anterius caput excipiens: angulo utrinque prominente.
Caput deflexum.
Pedes foſſorii.

ſtriatus. 1. S. corpore fuſco, elytris ſtriatis. *Hellenius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 273. *t.* 8. *f.* 3-5.
Habitat in inſulae Runſalae *aedificiis ligneis vetuſtis, autumno veſpere ad parietes conſpicuus, elatere aterrimo vix major.*

laevigatus. 2. S. corpore atro, elytris laevibus. *Hellenius act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 280.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 656. *n.* 37. *Fn. ſuec.* 742.* Elater (bupreſtoides) thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 175. *n.* 55. Elater (bupreſtoides) cylindricus niger immaculatus, capite retracto.
Habitat in Europa.

209. ELATER. *Antennae* filiformes.
Palpi quatuor ſecuriformes.
Corpus dorſo impoſitum exſiliens mucrone pectoris e foramine abdominis reſiliente.

flabellicornis. 1. El. fuſcus, antennarum faſciculo flabelliformi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 651. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 47. *f.* 1.

Habitat in India, *inter maximos hujus generis, antennis brevibus, a tertio inde articulo ingenti ex* 8 *lamellis conflato flabello ornatis.*

fasciculatus. 37. El. thorace murino, elytris pallidis fusco-undatis, antennarum fasciculo flabellicorni. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 2.
Habitat in America, *aeneo paulo major, murinus, antennis nigris.*

speciosus. 2. El. albus, lineis punctis maculisque nigris.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 3. Elater albus nigro-maculatus.
Habitat in India, *noctiluco major.* Brünniche.

luridus. 39. El. cinereo-tomentosus, elytris substriatis, plantis fuscis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 4.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

oculatus. 3. El. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore nigricante. *Mus. Lud. Ulr.* 81.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 5. Elater thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo-maculato.
Degeer inf. 4. *p.* 159. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 28. Elater niger, thorace maculis binis ovatis villosis aterrimis.
Petiv. gaz. t. 10. *f.* 4. Scarabaeus elasticus major, capite bimaculato.
Act. angl. 246. *p.* 396. *n.* 13. *et* 271. *p.* 842. *n.* 32.
Habitat in America *meridionali.*

fuscus. 40. El. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immaculato.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 6.
Habitat in America.

caecus. 41. El. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris strigis duabus arcuatis punctoque posteriore ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 7.
Habitat in Africa.

noctilucus. 4. El. thoracis lateribus macula flava glabra. *Mus. Lud. Ulr.* 82.* *Gron. zooph.* 474.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 8.
Degeer inf. 4. *p.* 160. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 1. Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida.
Brown jam. 432. *t.* 44. *f.* 10. Elater major fuscus phosphoricus.

Sloan.

Sloan. jam. 2. *p.* 206. *t.* 237. *f.* 1. Scarabaeus medius fuscus &c.
Mouff. inf. 112. Cocujus.
Habitat in America *meridionali, thoracis ocellis lampyridum et fulgorarum more, noctu, ut fertur, pro arbitrio lucem tantam spargens, ut lecturo sufficiat; abdomen diffractum intus lucet.*

phosphoreus. 5. El. fuscus, thorace posterius maculis duabus flavis glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 266. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 9. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 110. *n.* 1. *t.* 27. *f.* 2. *Degeer inf.* 4. *p.* 161. *n.* 3. *t.* 18. *f.* 2. Elater fusco-castaneus.
Habitat in America *meridionali, noctiluco affinis, at duplo minor, quamvis europaeis speciebus multo major; thoracis maculis noctu pariter lucentibus.*

ignitus. 42. El. fuscus, thorace nigro: margine flavo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *phosphoreo minor.*

fuscipes. 43. El. ater, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 266. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 11.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 110. *n.* 3. *t.* 27. *f.* 4.
β) Elater elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 684.
Habitat in India, *β*) *in* Europa.

rubiginosus. 44. El. nigricans griseo maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 12.
Habitat in Sierra Leon Africae, *magnus.*

porcatus. 6. El. viridi-aeneus, elytris sulcatis: sulcis villoso-albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 266. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 15.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 652. *n.* 6. Elater fuscus elytris nigris porcatis: sulcis elevatis glabris.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 7.
Drury inf. 3. *t.* 47. *f.* 6.
Habitat in America *meridionali, europaeis speciebus major, pectoris futura atra nitida.*

ligneus. 7. El. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 395. *n.* 24. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 266. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 13.
Gron. zooph. 477? Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris postice acuminatis.
Habitat in America *meridionali.*

sulcatus. 45. El. villoso-albidus, elytris striis tribus elevatis glabris atris.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 266. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali.*

virens. 46. El. villoso-viridis, antennis serratis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in insulis Americae *oppositis, statura porcati.*

striatus. 8. El. niger opacus, elytris striatis: striis subpubescentibus, ano villoso.
Gron. zooph. 475. Elater virescens, elytris atris sulcis albis striatis, ano barbato.
Habitat Surinami, *magnitudine fere oculati.*

bipustulatus. 9. El. niger nitidus, elytris puncto baseos nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 59.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 136. *n.* 15. Elater niger, elytrorum basi maculis rubris.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 8.
Habitat in Germaniae *graminosis, mediae magnitudinis.*

brunneus. 10. El. thorace rufo medio nigro, elytris corporeque ferrugineis. *Fn. suec.* 721. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 271. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 38.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 112. *n.* 17. *t.* 27. *f.* 6.
Habitat in Europae *hortis.*

syriacus. 11. El. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro.
Mus. Lud. Ulr. 83.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 269. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 26.
Habitat in Oriente. Hasselquist.

cruciatus. 12. El. thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis: cruce margineque nigris. *Fn. suec.* 722.* *Gadd sat.* 27. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 268. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 133. *n.* 6.
Degeer inf. 4. *p.* 149. *n.* 9.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 10.
Habitat in Europae *graminosis.*

linearis. 13. El. thorace rufo medio fusco, elytris testaceis linearibus.
Fn. suec. 723.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 269. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 29.
Fn. suec. 1. *n.* 582. Elater thorace rubro, elytris griseis.
Uddm. diss. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuscis striatis.

Degeer

Degeer inſ. 4. *p.* 154. *n.* 17.
Pontopp. atl. dan. t. 16.
Habitat in Europa *boreali.*

ruficollis. 14. El. niger, thorace poſterius rubro nitido. *Fn. ſuec.* 724. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 37. *Fn. ſuec.* 576. Elater niger, thorace rubro.
Scop. ent. carn. 290. Elater gramineus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 153. *n.* 16.
Raj. inſ. p. 92. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europae *graminoſis.*

lineatus. 15. El. niger, elytris obſcure lividis fuſco ſublineatis.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis, antennis ſubferrugineis.*

meſomelas. 16. El. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Fn. ſuec.* 725.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 35.
Habitat in Europa *boreali, lineato paulo major, larva hexapus filiformis duriuſcula, caudae ſcuto corneo lateribus dentato, ſubtus tuberculo conico pediformi tubuloſo, in ligno putreſcente.*

thoracicus. 47. El. niger, thorace toto rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 36.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 5. Elater niger, thorace rufo.
Habitat prope Hemly Anglorum, *ruficolli affinis.*

aterrimus. 17. El. thorace atro nitido, elytris ſtriatis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 653. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 726.* *Uddm. diſſ.* 45. Elater ater, thorace opaco punctato, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 13. Elater totus niger nitidus.
Habitat in Europa *boreali.*

caſtaneus. 18. El. thorace teſtaceo pubeſcente, elytris flavis apice nigris, corpore atro. *Fn. ſuec.* 727.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 27.
Degeer inſ. 4. *p.* 153. *n.* 15. Elater flavo-pectinicornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 132. *n.* 4.
Raj. inſ. p. 192. *n.* 6.

Liſt. loqu. 387.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 9. *et t.* 31. *f.* 4.
Habitat in Europae *campis.*

virescens. 48. El. thorace viridi: ſulco medio, elytris flavis muronatis: apice macula virescenti-nigra oblonga. *Schranck Schr. der berl. Naturf. Fr.* 2. *p.* 317.
Scop. ent. carn. n. 286. *Schranck inſ. auſtr. n.* 237. Elater caſtaneus.
Poda muſ. p. 41. *n.* 1. Elater pectinicornis.
Habitat in Auſtria *et* Carniolia, *viridi-aeneus.*

livens. 19. El. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris teſtaceis. *Fn. ſuec.* 728.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 28.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

ferrugineus. 20. El. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine poſteriore nigris. *Fn. ſuec.* 729.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 14.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 130. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 4. Elater thorace elytrisque rubris.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 1.
Habitat in Europa.

haematodes. 48. El. niger, thorace pubeſcente fulvo, elytris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 39.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 9. Elater ſanguineus.
β) Elater thorace nigro. *Schaeff. ic. t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Germania *et* Calabria.

ſanguineus. 21. El. ater, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 731. *Scop. ent. carn.* 287. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 40.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 131. *n.* 2. *Degeer inſ.* 4. *p.* 151. *n.* 13. Elater niger, elytris rubris.
Schaeff. el. t. 60. *f.* 2.
ic. t. 31. *f.* 7.
Berg ſtr. nomencl. t. 10. *f.* 10.
Habitat in Europae *graminoſis, elytrorum ſummo apice nigro.*

balteatus. 22. El. niger, elytris anterius dimidiato rufis. *Fn. ſuec.* 732. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 41. *Degeer inſ.* 4. *p.* 152. *n.* 14.

Rij.

Raj. inſ. p. 78. *n.* 23.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 2.
Habitat in Europae *arvis.*

elongatus. 49. El. ater, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 42.
Habitat in Auſtria, *balteato proxime affinis.*

melanocephalus. 50. El. ſanguineus, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n* 43. *Thunberg nov. inſ. ſp.* 3.
Habitat in Coromandel *et ad* caput bonae ſpei, *balteato paulo minor, ceterum ejusdem ſtaturae.*

marginatus. 23. El. thorace ſubfuſco, elytris teſtaceis: margine undique nigro. *Fn. ſuec.* 733.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 34.
Act. nidroſ. 3. *p.* 16. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſputator. 24. El. thorace fuſco nitido, elytris teſtaceis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 734.* *Scop. ent. carn.* 285. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 44.
Degeer inſ. 4. *p.* 151. *n.* 11. Elater fuſcus flavipes.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 11.
Habitat in Europa *boreali.*

piloſus. 51. El. fuſcus cinereo-ſubvilloſus, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 45. *Lesk. it.* 1. *p.* 11. *n.* 1. *t.* A. *f.* 1.
Habitat in Luſatiae *montibus, parvus.*

pallipes. 52. El. fuſcus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 46.
Habitat Tranquebariae *parvus.*

ſuecicus. 53. El. niger, elytris lineatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 47.
Habitat in Sueciae *graminoſis.*

minutus. 34. El. thorace atro nitido, elytris nigris. *Fn. ſuec.* 744.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 48.
Habitat in Europa *plantis, parvus, niger, immaculatus.*

limbatus. 54. El. thorace atro nitido, elytris teſtaceis limbo nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 49. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 64.
Habitat Kilonii *et ad* caput bonae ſpei.

advena. 55. El. ater, elytris ſtriatis pedibusqu e obſcure cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 50.
Habitat prope Biſertam Hiſpaniae, *parvus.*

marginellus. 56. El. thorace nigro: margine ferrugineo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 372. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 51.
Habitat in Germania, *limbato ſimillimus, at paulo major.*

obſcurus. 25. El. piceus thorace elytrisque obſcure nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 30.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 655. *n.* 25. *Fn. ſuec.* 735. Elater thorace fuſco obſcuro, elytris obſcure teſtaceis.
Habitat frequens in Europae *borealis plantis.*

flavipes. 57. El. thorace obſcure nigro, elytris ſtriatis fuſcis, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 31.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

filiformis. 58. El. ex cinereo fuſcus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 32.
Habitat in Italia, *filiformis, obſcuro duplo minor.*

triſtis. 26. El. thorace atro nitido, elytris baſi margineque exteriori lividis. *Fn. ſuec.* 736.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 1.
Habitat in Europae *ligno putreſcente.*

faſciatus. 27. El. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: faſcia alba undulata. *Fn. ſuec.* 737.* *Scop. ent. carn.* 281. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 21.
Habitat in Europae *hortis.*

murinus. 28. El. thorace obſcure cinereo, elytris cinereo nebuloſis, plantis rufis. *Fn. ſuec.* 738.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 19.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 10. Elater niger, elytris villoſo-murinis.
Degeer inſ. 4. *p.* 150. *n.* 10. Elater rufipes.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 6.
Habitat in Europa.

teſſellatus. 29. El. thorace obſcure aeneo, elytris aeneis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fn. ſuec.* 739.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 20.
Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 135. *n.* 9. Elater niger villoso-undatus.
Degeer inf. 4. *p.* 148. *n.* 7. Elater rufo-unguiculatus.
Scop. ent. carn. 282. Elater thoracicus.
Gadd Sat. 80. Elater niger, pilis minimis flavo-aeneis junctim intermixtis.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 7.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 111. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat in Europae *hortis, scutello pallido.*

germanus. 30. El. thorace elytrisque atro-caeruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. suec.* 730.*
Scop. ent. carn. 279. *Schranck inf. austr. p.* 183. *n.* 340? Elater nitens.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 8. Elater latus.
Habitat in Europa, *an mera aenei varietas?*

aeneus. 31. El. thorace elytrisque aeneis, antennis nigris simplicibus.
Fn. suec. 740.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 267. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 22.
Fn. suec. 578. Elater viridi-aeneus, pedibus fulvis.
Degeer inf. 4. *p.* 149. *n.* 8. Elater aeneus rufipes.
Act. Nidros. 3. *t.* 4. *f.* 6.
β) Elater fuscus latior. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 681.
Habitat in Europae *nemoribus.*

pectinicornis. 32. El. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis.
Fn. suec. 741. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 268. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 23. *Scop. ent. carn.* 278.
Fn. suec. 575. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 133. *n.* 7. Elater fusco-aeneus.
Degeer inf. 4. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 3. Elater aeneo-pectinicornis.
Raj. inf. p. 92. *n.* 7.
List. angl. p. 387. *n.* 19.
Poda inf. t. 1. *f.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 36.
Schaeff. el. t. 11. *f.* 1. *et t.* 60. *f.* 3. *ic. t.* 2. *f.* 4.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 11.
Habitat in Europae *nemoribus.*

cupreus. 59. El. cupreus, elytris dimidiato flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 268. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 24.
Schaeff. ic. 1. *t.* 38. *f.* 2.

Habitat

Habitat in Anglia, *antennis nigris pectinatis, rarius simplicibus.*

niger. 33. El. thorace laevi, elytris pedibus corporeque nigris. *Fn. suec.* 743.*
Fn. suec. 577. Elater totus nigro-fuscus.
Lift. mut. t. 17. *f.* 14.
Raj. inf. p. 92. *n.* 1. 2. 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 134. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 174. *f.* 4.
β) Elater nigricans. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 5. *p.* 114. *n.* 33.
Habitat in Europa, β) *dimidio minor.*

nitidulus. 60. El. ater, elytris striatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 52.
Habitat in Cayenna, *pulchello triplo minor.*

pulchellus. 35. El. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Fn. suec.* 745.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 53.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 112. *n.* 22. *t.* 27. *f.* 7. a.
Habitat in Europa *boreali.*

sexguttatus. 61. El. laevis ater, elytris punctis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 65. *f.* 75. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 54.
Habitat ad caput bonae spei, *minimus, nitidus.*

tetrastichon. 36. El. niger luteo-maculatus, elytris maculis confluentibus; abdomine quadrifariam punctato.
Habitat in Africa, *mediae magnitudinis.*

dermestoides. 38. El. subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 175. *n.* 56.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 656. *n.* 38. *n.* 38. Elater subpubescens subfuscus, antennis subclavatis.
Habitat in Suecia, *dermestis facie, parvus.*

notatus. 62. El. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, apice nigris: maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 57.
Habitat in Coromandel, *parvus, statura pulchelli.*

festivus. 63. El. thorace ferrugineo, elytris atris: fasciis duabus flavis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 273. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 58.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 64. *f.* 74.
Habitat in Africa, *magnitudine balteati.*

64 El.

deuſtus. 64. El. teſtaceus, linea thoracis elytrorumque poſterius ramoſa nigra. *Thunb. nov. inſ. ſpec* 3. *p.* 64.
Habitat in Zeylona, *melanocephalo duplo minor, tenuiſſime pubeſcens.*

clavicornis. 65. El. viridis, antennis clavatis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 65.
Habitat in India, *pecticorni major, glaberrimus, nitens, an hujus generis?*

uſtulatus. 66. El. niger, elytris teſtaceis poſterius fuſcoſcentibus, antennis pedibusque caſtaneis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 303.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 8.
Habitat - - - - *magnitudine caſtanei, facie balteati.*

giganteus. 67. El. depreſſus, elytris viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 304. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in America *bupreſtis facie.*

indicus. 68. El. niger, thorace convexo punctato: margine fulvo, medio ſinuato, elytris atris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 110. *n.* 2. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat in America, *phoſphoreo minor, et anguſtior.*

carbonarius. 69. El. ater atro-farinoſus: punctis minutiſſimis albis interjectis, antennis ſerratis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 184. *n.* 343.
Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 1. Elater punctatus.
Habitat in Germania.

undulatus. 70. El. niger flavo-undulatus pubeſcenti-nitens. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 7.
Habitat in Germania.

caeruleus. 71. El. chalybeus, antennis nigris ſimplicibus, pedibus ex atro fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 10.
Habitat Berolini, *aeneo proxime affinis.*

ſanguinolentus. 72. El. ater, elytris ſanguineis: margine interiori macula magna ovata atra communi. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 16. *t.* 3. *f.* 15. *inſ. auſtr. p.* 184. *n.* 341. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 112. *n.* 24. *t.* 27. *f.* 9.
Habitat in Germania, *an mera ſanguinei varietas?*

73. El.

purpureus. 73. El. niger, thorace atro: vellere raro purpureo, elytris purpureis: lineis duabus elevatis. *Schranck inf. auſtr. p.* 187. *n.* 350.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 113. *n.* 25. *t.* 27. *f.* 10.
Habitat in Auſtria, *ſanguineo affinis, at magis depreſſus.*

quercinus. 74. El. fuſcus, capite thoraceque granulatis: villis flavis undulatis, elytris faſcia flavo-villoſa. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 113. *n.* 26. *t.* 27. *f.* 11.
Habitat in Ungaria *et* Germania, *in quercu.*

erythropus. 75. El. niger, elytris flavicanti-villoſis, punctato-ſtriatis, pedibus antennarumque articulis margine ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 113. *n.* 28. *t.* 27. *f.* 12.
Habitat Berolini.

hirtus. 76. El. nitenti-niger pubeſcens, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 30.
Habitat Berolini, *magnitudine erythropodis, at paulo latior.*

vulgaris. 77. El. niger, elytris fuſcis punctato-ſtriatis: ſutura nigra, pedibus pallidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114 *n.* 32.
Habitat Berolini.

griſeus. 78. El. obſcure griſeus, thorace convexo, elytris punctato-ſtriatis, ſubtus nigris, antennis pedibusque fuſcis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 34.
Habitat Berolini.

cinereus. 79. El. niger pubeſcenti-canus, thorace convexo, tarſis ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 35.
Habitat Berolini, *magnitudine et ſtatura griſei.*

equiſeti. 80. El. niger, thorace convexo, elytris ſtriatis, pedibus flavescentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 36.
Habitat Berolini, 3 *lineas longus, ſtatura cinerei.*

pulverulentus. 81. El. niger vireſcenti-aureo irroratus, elytris ſtriatis, tibiis intus criſpo-piloſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 7. *p.* 172. *n.* 38. *t.* 48. *f.* 1.
Habitat in America, *inter maximos hujus generis.*

ſocialis. 82. El. fuſcus, antennis elytrorumque marginibus ferrugineis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 9.
Habitat in Luſitania, *magnitudine pectinicornis.*

ſerraticornis. 83. El. fuſcus, abdomine ſupra pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 280.
Habitat in Carniolia.

montanus. 84. El. villoſulus niger nitens, antennis baſi tibiisque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 283.
Fueſſli Verz. Schw. Inſ. p. 17. *n.* 334.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *montibus.*

degener. 85. El. niger aureo punctatus variegatus, thorace poſterius dentato. *Scop. ent. carn. n.* 292.
Habitat in Carniolia.

ſubfuſcus. 86. El. niger, elytris fuſcis, abdomine rubro. *Müll. zool. dan. prodr p.* 59. *n.* 538.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 169.
Habitat in Dania.

ſeelandicus. 87. El. ex purpureo aeneus griſeo-villoſus, elytris ſtriato-punctatis nebuloſis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 550.
Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 170.
Habitat in Seelandia Daniae.

ſexmaculatus. 88. El. niger griſeo-villoſus, thoracis margine elytrisque teſtaceis: maculis ſex ſubfuſcis glabris. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 17. *n.* 171. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 544.
Habitat in Dania.

obtuſus. 89. El. corpore obtuſo ſubtus nigro, thorace nigro, elytris fuſcis griſeo-villoſis, antennis ruſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 147. *n.* 5. *t.* 5. *f.* 19.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 172. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 540. Elater badius.
Habitat in Europa *boreali.*

pullus. 90. El. niger nitidus pubeſcens, elytris punctatis, pedibus brunneis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 59. *n.* 537.
Habitat in Dania.

chryſomelinus. 91. El. niger, thorace rubro ſulcato, elytris tarſisque flavis. *Müll. zool. dan. prodr p.* 60. *n.* 539.
Habitat in Dania.

lugubris. 92. El. ſupra ater, opacus, ſubtus niger. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 545.
Habitat in Dania.

93. El.

Müllerti. 93. El. rufus pubescens, pedibus luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 551.
Habitat in Dania.

tuberculatus. 94. El. niger opacus, thorace bituberculato, elytris laevissime striatis, punctis ferrugineis. *Pontopp. hist. nat. Dan. p.* 208. *n.* 13. *t.* 16.
Habitat in Dania, *magnitudine pectinicornis.*

gracilis. 95. El. testaceus, capite thoraceque linea longitudinali, macula laterali atra, elytris laevissimis, margine atro. *Gron. mus.* 1. *p.* 153. *n.* 478.
Habitat in America.

guineensis. 96. El. viridi-aeneus, thorace subpubescente, antennis nigris, elytris striatis. *Gron. mus.* 2. *p.* 153. *n.* 476.
Habitat in Guinea.

fimbriatus. 97. El. niger, thoracis margine rubro, elytris ad suturam lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis. *Lepechin it.* 1. *p.* 311. *t.* 16. *f.* 12.
Habitat in deserto Sibiriae Uralensi.

auratus. 98. El. viridi-aureus, pedibus nigris. *Drury inf.* 2. *p.* 65. *t.* 35. *f.* 3.
Habitat in Sina.

histrio. 99. El. niger, elytris flavis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 131. *n.* 3. Elater nigro-flavus.
Habitat in Gallia.

vittatus. 100. El. niger, elytris fuscis: fascia longitudinali fulva.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 135. *n.* 11. Elater bicolor.
Raj. inf. p. 78. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

fuscatus. 101. El. niger, elytris fuscis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 136. *n.* 12. Elater bicolor.
Habitat in Gallia.

discolor. 102. El. niger pedibus rufis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 136. *n.* 14. Elater rufipes.
Habitat in Gallia.

melanophthalmos. 103. El. rufus, oculis nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 144. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 18.
Habitat in Suecia, *pollicem longus.*

104. El.

major. 104. El. nigro-fuscus nitidus, pedibus fusco-castaneis, abdomine supra rubente. *Degeer inf.* 4. *p.* 146. *n.* 3.
Habitat in Europa, *magnus.*

minor. 105. El. elongatus capite thoraceque nigris, elytris antennis pedibusque fuscis. *Degeer inf.* 4. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Europa, *inter minores.*

inaequalis. 106. El. niger: maculis villosis griseis, elytris scabris, thorace cavitatibus impressis. *Degeer inf.* 4. *p.* 148. *n.* 6.
Habitat in Europae *arboribus*, *magnus.*

undatus. 107. El. griseo-marinus villosus, elytris fasciis tribus undulatis transversis nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 155. *n.* 18. *t.* 5. *f.* 26.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

maculosus. 108. El. capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris fulcescentibus. *Degeer inf.* 4. *p.* 158. *n.* 19.
Habitat in Europa, *minor.*

nitidus. 109. El. nigro-viridi-aeneus nitidus, pedibus nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat in Europa, *pusillus.*

piceus. 110. El. totus ater nitidus, elytris laevissimis. *Degeer inf.* 4. *p.* 162. *n.* 4. *t.* 18. *f.* 3.
Habitat in Pensylvania, *pollicem longus.*

lividus. 111. El. pallide fusco-rufescens antennis rufis, pedibus flavo-testaceis. *Degeer inf.* 4. *p.* 162. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 4.
Habitat in Pensylvania, *dimidium pollicem longus.*

ochropus. 112. El. nigro-fuscus, pedibus antennisque flavo-testaceis. *Degeer inf.* 4. *p.* 163. *n.* 6. *t.* 18. *f.* 5.
Habitat Surinami, 4½ *lineas longus.*

maculatus. 113. El. obscure testaceus, thorace anterius nigro, elytris maculis binis irregularibus nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 163. *n.* 7. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat Surinami, 3 *modo lineas longus.*

segetis. 114. El. niger, antennis tarsisque fuscis, elytris lineis longitudinalibus nigris fucisque. *Bjerkand act. Holm.* 1779. 4. *n.* 4. *p.* 254. *t.* 10. *f.* 1. 3.
Habitat in Sueciae *segetis radicibus*, *agros larva devastante*, *praesertim siccos*, *tardam subeunte metamorphosin.*

dubius. 115. El. viridi-aeneus, thorace pedibusque nigris. *Mayer Abh. bochm. Gef. 4. p. 183.*
Habitat in Bohemiae *pratis, grani oryzae magnitudine, an propria ſpecies?*

punctatus. 116. El. elongatus fuſcus, thorace punctato, elytris crenato-ſtriatis, ore pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 671.*
Habitat in Europa.

dichrous. 117. El. niger, thorace linea longitudinali, elytris baſi ſulcatis apicem verſus complanatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 673.*
Habitat in Europa.

pubeſcens. 118. El. piceus pubeſcens, elytris ſtriatis, plantis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 674.*
Habitat in Europa.

villoſus. 119. El. fuſcus cinereo-villoſus, elytris laeviſſime ſtriatis, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 682.*
Habitat in Europa.

crenatus. 120. El. niger, elytris crenato-ſtriatis punctatisque, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p. 31. n. 683.*
Habitat in Europa.

ambiguus. 121. El. niger, elytris rufo-teſtaceis ſtriatis, plantis teſtaceis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 688.*
Habitat - - - - -

lineolatus. 122. El. niger, thoracis linea longitudinali, elytris crenato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 689.*
Habitat in Europa.

longicornis. 123. El. niger, elytris obſolete ſtriatis, antennis longis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 690.*
Habitat in Europa.

concolor. 124. El. fuſcus, thorace punctato, elytris leviſſime ſtriatis, antennis pedibusque rufo-fuſcis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 691.*
Habitat in Europa.

variabilis. 125. El. fuſcus flavo-villoſus, pedibus rufis, elytris leviſſime ſtriatis: maculis fuſcis incerta directione lucis inconſpicuis. *Muſ. Lesk. p. 32. n. 693.*
Habitat in Europa.

126. El.

rubiginosus. 126. El. ferrugineus, thorace fuſco punctato, elytris crenato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 694.
Habitat in Europa.

villoſus. 127. El. fuſco-ferrugineus griſeo-villoſus, thorace pectoreque fuſcis, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 695.
Habitat in Europa.

tricolor. 128. El. ferrugineus, capite thoraceque fuſco, hujus marginibus externis, elytris punctato-ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 696.
Habitat in Europa.

haemopterus. 129. El. niger, elytris ſanguineis: ſuturae macula communi oblonga picea. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 697.
Habitat in Europa.

craſſipes. 130. El. niger, elytris leviſſime ſtriatis, femoribus craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 699.
Habitat in Europa.

acupunctatus. 131. El. teſtaceus, thoracis dorſo fuſceſcente, elytris ſtriatis: ſtriis punctis diſtinctis impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 701.

gibbus. 132. El. fuſcus griſeo-villoſus, elytris leviſſime ſtriatis thoraceque gibbis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 698.
Habitat in Europa.

pubes. 133. El. ater pubeſcens, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 702. 703.
Habitat in Europa.

cineraſcens. 134. El. teſtaceus cinereo-villoſus, thorace fuſceſcente, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 704.
Habitat in Europa.

bicolor. 135. El. fuſco-ferrugineus, capite thoraceque fuſcis, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 705.
Habitat in Europa.

quadriſulcus. 136. El. niger, elytris obſolete ſtriatis, baſi ſulcis quatuor impreſſis, antennis longis tibiis plantisque anticis fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 706.
Habitat in Europa.

ſtrigoſus. 137. El. teſtaceo-fuſcus, elytris ſtriatis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 708.
β) Elater elytris fuſceſcentibus verſus apicem, elytris totis teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 707.
Habitat in Europa.

ſuturalis. 138. El. fuſcus, thoracis margine ferrugineo, elytris teſtaceis: ſutura fuſca. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 711.
Habitat in Europa.

dentatus. 139. El. thorace atro: macula utrinque dentibusque rubris, elytris teſtaceis: marginibus externis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 713.
Habitat in Europa.

capucinus. 140. El. niger, elytris pedibus anticis tibiisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 718.
β) Elater elytris apice fuſceſcentibus, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 714.
Habitat in Europa.

gibboſus. 141. El. taſtaceus, thorace gibboſo obſcuro, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 720.
Habitat in Europa.

foricinus. 142. El. murinus, thorace gibbo, elytris teſtaceis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 721.
Habitat in Europa.

rufipes. 143. El. niger, elytris ſtriatis, tibiis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 723.
β) Elater elytris tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 722.
Habitat in Europa.

fumereus. 144. El. teſtaceus, elytris ſtriatis, capite fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 724.
Habitat in Europa.

chalybeus. 145. El. nigro-aeneus nitidus, femorum anticorum baſi tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 725.
Habitat in Europa.

obſcurus. 146. El. ferrugineus, capite thoraceque fuſcis, hoc poſterius, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 726.
Habitat in Europa.

147. El.

fuligino-sus. 147. El. piceus subpubescens, antennis, pedibus elytrisque testaceis: his margine fuscis. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 728. *Habitat in* Europa.

pusillus. 148. El. brunneus, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris leviſſime striatis pubescentibus. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 730. *Habitat in* Europa, *statura dermestoidis, magnitudine pediculi.*

Limbellus. 149. El. thorace sordide flavo: disco fusco, elytris striatis nigro-fuscis: margine omni flavescente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 23. *Habitat ad* caput bonae spei, *inter minores.*

210. CICINDELA.

Antennae setaceae.
Palpi sex filiformes: posteriores piloſi.
Mandibula prominens, multidentata.
Oculi prominuli.
Thorax rotundato-marginatus.

* *labio tridentato.*

longicollis. 15. C. cyanea, thorace elongato cylindrico, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 1. *Habitat in* Siam, *magna, elongata.*

grossa. 16. C. nigra, elytris acuminatis: maculis tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 2. *Habitat in* Coromandel, *maxima.*

cyanea. 17. C. cyanea nitida, ore testaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 3. *Habitat in* India, *subtus nitidior, antennis fuscis.*

bicolor. 18. C. viridis nitida, elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 283. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 4. *Habitat in* Italia, *magnitudine et statura campestris.*

campestris. 1. C. viridis, elytris punctis quinque albis. *Fn. suec.* 746.* *Scop. ent. carn.* 181. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 283. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 5.
Degeer inf. 4. *p.* 113. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Cicindela viridis nitida.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 153. *n.* 27. Buprestis inauratus supra viridis &c.
Mouff. inf. 145. *f. infim.* Cantharis quarta.
Jonst. inf. t. 15. Cantharis Mouffeti minor quarta.
List. loq. 386. *mut. t.* 17. *f.* 12. Scarabaeus viridis &c.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 37.
Schaeff. ic. t. 34. *f.* 8 9. *et t.* 228. *f.* 3.
Bergstr. nomencl. 1. *p.* 15. *n.* 8–11. *t.* 2. *f.* 8–11.
Habitat in Europae *campis arenosis.*

hybrida. 2. C. subpurpurascens, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Fn. suec.* 747.* *Scop. ent. carn.* 183. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 283. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 6.
Degeer inf. 4. *p.* 115. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 8. Cicindela maculata.
Schaeff. elem. t. 43.
icon. t. 35. *f.* 10.
Bergstr. nomencl. 1. *p.* 26. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in Europae *fabulosis.*

capensis. 3. C. subaenea, elytris albis: linea fusca triramosa. *Mus. Lud. Ulr.* 84.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 14.
Degeer inf. 7. *t.* 47. *f.* 3.
Voet. coleopt. t. 40. *f.* 5.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 11.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 14?
Habitat ad caput bonae spei, *et in* Calabria.

germanica. 4. C. cuprea, elytris viridibus puncto lunulaque apicum albis. *Scop. ent. carn.* 182. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 15.
Schreb. inf. 10. *n.* 5. Cicindela obscurior viridis, elytris punctis quatuor lineolaque albis.
Geoffr.

Cicindelae *in locis petrosis, aridis, praesertim arenosis, habitant, insectorum aliorum, larvarum quoque, etiam hirsutarum tigrides: larva mollis, alba, longa, hexapus, in foraminibus cylindricis sub terra latet, famelia prodiens insectis praetereuntibus inhians, mandibula forcipata arripiens, et in foveam trahens, in qua etiam declaratur.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 155. *n.* 29. Buprestis inauratus supra fusco-viridis, coleoptris punctis sex albis.
Poda inf. 42. *n.* 3.
Gron. zooph. 167.
Habitat in Germaniae *arenosis*, *campestri simillima*, *sed triplo minor*, *colore viridi*, *nigro et caeruleo varians.*

tuberculata. 19. C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco viridique variis: margine tridentato albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 16.
Habitat in nova Seelandia.

unipunctata. 20. C. subpurpurascens, labio elytrisque puncto albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 17.
Habitat in America.

sexpunctata. 21. C. viridi-aenea, elytrorum disco obscuriore: punctis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 18.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 7. *t.* 46. *f.* 1.
Habitat ad littus Malabaricum.

quadrilineata. 22. C. viridi-aenea, elytris obscuris: margine lineaque media albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 19.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 15.
Habitat in India, *magnitudine sexpunctatae.*

biramosa. 23. C. obscure aenea, elytrorum margine biramoso albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 20.
Thunb. nov. inf. sp. 1. *p.* 26. *f.* 40. Cicindela (tridentata) purpurascenti-aenea, elytris linea marginali tridentata.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *p.* 115. *n.* 7. *t.* 27. *f.* 16.
Habitat in India.

sexguttata. 24. C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 286. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 21.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 17.
Habitat in Virginia, *labio superiori flavo.*

Catena. 25. C. viridi-aenea, elytris albidis: punctis sex viridibus concatenatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 22.
Thunb. nov. inf. sp. 2. *t.* 1. *f.* 41-43. Cicindela viridi-aenea, elytris linea flava triramosa.
Habitat in India.

margina-ta. 26. C. viridis, elytris margine fascia undata punctisque duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 23.
Habitat in Virginia.

octogutta-ta. 27. C. obscura, elytris punctis quatuor disci lunulisque duabus marginalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 24.
Habitat in America, *parva.*

trifascia-ta. 28. C. obscura, elytris strigis tribus albis: secunda flexuosa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 25.
Habitat in America, *parva*, *subtus aenea nitida.*

virginata. 5. C. nitida, ore antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 27.
Habitat in Virginia, *carolinae similis*, *violacea.*

carolina. 6. C. viridis nitida, elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 23. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 26.
Gron. zooph. 576.*
Degeer inf. 4. *p.* 120. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 24.
Habitat in Carolina.

cayen-nensis. 29. C. supra fusca, subtus cyanea, ano tibiisque posterioribus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *magnitudine carolinae.*

aequino-ctialis. 7. C. flava, elytris fasciis duabus nigris latis. *Amoen. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 6. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 29.
Habitat in Surinamo.

sylvatica. 8. C. nigra, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Fn. suec.* 748.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 7.
Fn. suec. 1. *n.* 549. Cicindela atra, coleoptris maculis sex fasciaque albis.
Degeer inf. 4. *p.* 114. *t.* 4. *f.* 7. Cicindela supra nigra, subtus viridis nitida &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 155. *n.* 28. Buprestis inauratus supra fusco-viridis &c.
Petiv. gazoph. t. 50. *f.* 5.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 13.
Habitat in Europae *pinetis.*

30. C.

littoralis. 30. C. obſcure aenea, elytris nigricantibus: punctis ſex albidis; baſeos lunato medio transverſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 8.
Habitat ad Barbariae *littora*, *ſtatura ſylvaticae.*

triſtis. 31. C. nigra, elytris macula media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 9.
Habitat - - -

interrupta. 32. C. elytris fuſcis: puncto baſeos faſciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 10.
Habitat in Sierra Leon Africae.

lunulata. 33. C. nigra, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis: anteriore transverſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura hybridae.*

lurida. 34. C. obſcura, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis: intermedia flexuoſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 284. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae ſpei.

flexuoſa. 35. C. obſcura elytris punctis quatuor lunulisque tribus albis: intermedia flexuoſa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 13.
Habitat ad Hiſpaniae *littora*, *luridae proxime affinis.*

maura. 9. C. nigra, elytris punctis ſex albis: tertio et quarto parallelo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 30.
Habitat in Oriente, *ſtatura campeſtris*, *fronte alba.*

japonica. 36. C. violacea, elytris baſi, apice faſciaque cupreis: punctis duobus faſciaque luteis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 25. *f.* 39.
Habitat in Japonia, *magnitudine ſylvaticae*, *ſubtus e cyaneo et violaceo nitens.*

ſexnotata. 37. C. capite viresſcente, thorace rubro, elytris teſtaceis: maculis ſex nigris. *Lepech. it.* 2. *p.* 203. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Sibiriae *fluviorum arena.*

auſtriaca. 38. C. viridis, pectore abdominisque baſi ſubtus rubro-aeneis, elytris margine aureo tenuiſſimo: punctis aliquot albis. *Schrauck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 17.
Habitat in Auſtria.

litterata. 39. C. metallica albo-villosa, elytris cupreis: punctis caeruleis striisque argenteis litteras aequantibus. *Sulz. hist. inf. p.* 55. *t.* 6. *f.* 12.
Fuesslı Verz. schw. Inf. p. 17. *n.* 338. Cicindela arenaria.
Habitat in Helvetiae *arena.*

danica. 40. C. nigra supra fusco-aenea, elytris striis lateralibus remotis: dorso speculifero. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 80. *n.* 865. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 18. *n.* 178. Cicindela orichalcica, dorso speculifero.
Habitat in Dania.

punctata. 41. C. nigra, supra subaenea, elytris striatis: punctis impressis quatuor, pedibus flavo-fuscis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 80. *n.* 867.
Müll. Fn. Fridrichsd. p. 18. *n.* 179.
Habitat in Dania.

chinensis. 42. C. subtus caeruleo-violacea nitida, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. *Degeer inf.* 4. *p.* 119. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 23.
Habitat in Sina.

caerulea. 43. C. caerulea nitens, ore albo. *Pall. it.* 2. *app. n.* 65.
Habitat in desertis arenosis australibus ad Irtim Sibiriae *positis, fugacissima.*

gracilis. 44. C. nigro-aenea, elytris punctis duobus marginalibus albis: disco posterius rubente. *Pall. it.* 2. *app. n.* 66.
Habitat in Sibiriae *arena ad* Sohulbam *sita, congeneribus gracilior, pedibus longissimis tenuissimis.*

ferruginea. 49. C. ferruginea, pedibus, elytris, capite thoraceque testaceis, hoc utroque posterius, elytrorum fascia undata suturaque viridibus. *Mus. Lesk. p.* 34. *n.* 762.
Habitat in Europae *aquis, coccinellae statura, capite posterius bilobo, labio albo, maxillis nigris, thorace anterius exciso, scutello nullo, elytro utroque striis punctatis* 15, *basi maculis* 3 *margine antico contiguis.*

** *labio rotundato acuminato integro,* Elaphri Fabricii.

atrata. 45. C. tota atra opaca. *Pall. it.* 1. *app. n.* 42.
Habitat in Sibiriae *lacu* Inderiensi, *magnitudine et forma germanicae; an ex hac tribu?*

46. C.

lateola. 46. C. elytris ex fusco viridi-aureis: margine laterali undique late lacteo. *Pall. it.* 2. *app. n.* 41.
Habitat in lacu Sibiriae Inderiensi; *an huic tribui accensenda?*

riparia. 10. C. viridi-aenea, elytris punctis latis excavatis. *Fn. suec.* 741.* *It. oel.* 38. 121. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 117. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 9. Cicindela viridi-aenea maculis rotundis excavatis griseo-viridibus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 156. *n.* 30. Buprestis viridi-aeneus &c.
List. loqu. 385. Scarabaeus parvus inauratus.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 86. *f.* 4.
Habitat in Europae *humentibus, colore saepius varians.*

flavipes. 11. C. obscure aenea, elytris subnebulosis, pedibus luteis. *Fn. suec.* 750.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 2.
Degeer inf. 4. *p.* 119. *n.* 6. Cicindela flavipes.
Habitat in Europae *borealis ripis, elytris punctatis.*

rupestris. 12. C. nigra, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugineis. *Fabr. sp. inf. p.* 287. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 3.
Habitat in Sueciae *rupibus, frequentius sub lichenibus, pediculi majoris magnitudine.*

quadri-maculata. 13. C. nigra, elytris fuscis: maculis duabus pallidis, tibiis rufis. *Fn. suec.* 751.*
Habitat in Europa.

aquatica. 14. C. aenea nitida, capite striato. *Fn. suec.* 752.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 288. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 4.
Schreb. inf. 6. Cicindela pusilla.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 157. *n.* 31. Buprestis fusco-aeneus.
List. mut. t. 31. *f.* 13.
Habitat ad Europae *aquas, frequens.*

semipunctata. 47. C. aenea nitida, elytris punctatis, dorso glaberrimo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 288. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 5.
Degeer inf. 4. *p.* 118. *n.* 5. Cicindela striata.
Habitat Halae Saxonum *et* Berolini.

biguttata. 48. C. aenea, elytris nitidis apice flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 288. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat ad Norwegiae *aquas.*

211. BUPRESTIS.

Antennae filiformes, ferratae, longitudine thoracis.
Palpi quatuor filiformes: articulo ultimo obtuso truncato.
Caput dimidium intra thoracem retractum.

unidentata. 31. B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 1.
Habitat - - -

bicolor. 32. B. elytris acuminatis viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali.*

gigantea. 1. B. elytris bidentatis rugosis, thorace laevi, corpore inaurato. *Mus. Lud. Ulr.* 85.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 3.
Degeer inf. 4. *p.* 134. *n.* 1. Buprestis gigantea.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 108. *n.* 84. Mordella gigantea.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. *t.* 236. *f.* 1. 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris sulcatis.
Grew mus. 165. *t.* 13. Cerambyx Indiae orientalis maximus.
Petiv. gaz. t. 147. *t.* 16. 17.
Merian. surin. t. 50. *f. infim.*
Seb. mus. 3. *t.* 84. *f.* 12.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 38.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 1.
Habitat in America *et* Asia.

vittata. 33. B. elytris bidentatis punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-aenea: vitta lata aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 274. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 14.
Habitat in India.

fastuosa. 34. B. elytris truncatis bidentatis punctato-striatis viridibus, dorso aureo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 274. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 5.
Habitat in America *septentrionali.*

35. B.

Larvae *buprestis in ligno nidulantur.*

punctatiſſima. 35. B. elytris bidentatis cupreis: punctis violaceis numeroſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 6.
Habitat in Sierra Leon Africae.

berolinenſis. 36. B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 7.
Herbſt Beſchr. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 5. *et apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 5.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine obſcurae.*

coruſca. 37. B. aenea nitidiſſima, elytris bidentatis apice abdomineque aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 8.
Habitat in Jamaica, *vittata minor, antennis cyaneis.*

decora. 38. B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta caeruleſcente marginibusque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 9.
Habitat in America.

lurida. 39. B. obſcura, elytris bidentatis, ano tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 10.
Habitat in America.

obſcura. 40. B. obſcure aenea: punctis elevatis obſcurioribus, elytris bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 11.
Habitat in America *boreali, parva, ſubtus nitida, cuprea.*

punctata. 41. B. aenea, capite abdomineque teſtaceo-maculatis, elytris ſubbidentatis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 12.
Habitat in Barbaria, *mediae magnitudinis.*

faſciata. 42. B. elytris bidentatis viridi-aeneis apice cyaneis: faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 13.
Habitat in America *boreali, magnitudine punctatae, viridi-aenea, antennis nigris.*

rauca. 43. B. obſcure aenea immaculata, elytris bidentatis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 14.
Habitat in Barbaria, *parva.*

ſtriata. 44. B. elytris truncatis ſubbidentatis cupreis: lineis elevatis quatuor. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 15.
Habitat in Penſylvania.

45. B.

rutilans. 45. B. elytris tridentatis viridibus nigro-maculatis: margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 16.
Jacquin miſcell. auſtr. 2. *t.* 23. *f.* 2. Bupreſtis faſtuoſa.
Habitat in Auſtria.

octogut-tata. 2. B. elytris faſtigiatis muticis: maculis quatuor albis, corpore caeruleo. *Fn. ſuec.* 753. *it. ſcan.* 23. *Uddm. diſſ.* 42. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 48. Bupreſtis elytris integris: maculis quatuor albis, corpore caeruleo.
Degeer inſ. 4. *p.* 132. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 20. Bupreſtis albo-punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 126. *n.* 2. Cucujus viridi-aeneus: punctis quatuor impreſſis.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 1. *et. t.* 204. *f.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 7. a. b.
β) Bupreſtis ſexpunctata? *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat in Europae *nemoribus*, *β*) *in arena fluviorum* Sibiriae.

ignita. 3. B. elytris ſerratis, thorace impreſſo, corpore inaurato, tibiis teretibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 86.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 274. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 17. Bupreſtis elytris dentatis, thorace impreſſo, corpore inaurato.
Grew muſ. 166. *t.* 13. Beetle.
Kaempf. jap. 1. *p.* 132. *t.* 10. *f.* 7.
Pet. gaz. t. 20. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 14.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali*, India *et* Sina.

lineata. 46. B. elytris truncatis ſubtridentatis nigro-aeneis: vittis duabus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 18.
Habitat in America *meridionali.*

ocellata. 47. B. viridi-nitens, elytris tridentatis: maculis duabus aureis ocellarique flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 15.
Habitat in America *auſtrali et* India.

aeroſa. 48. B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 20.
Habitat in Coromandel, *minor.*

49. B.

maculata. 49. B. elytris tridentatis cyaneis flavo-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 275. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 21.
Habitat in Sibiria, *mediae magnitudinis, subtus aenea, capite cyaneo.*

maculosa. 50. B. elytris truncatis striatis dentatis nigris: maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 22.
Deger inf. 4. *p.* 137. *n.* 6. *et Herbst apud Fuesslı arch. inf.* 5. *p.* 118. *n.* 8. *t.* 28. *f.* 8. Buprestis flavo-punctata.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis; capite et abdomine aeneo-nigro; pedibus et thorace nigris, hujus margine flavo.*

stricta. 4. B. elytris serratis sulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro. *Mus. Lud. Ulr.* 87.*
Habitat in America *australi, et* India.

sternicornis. 5. B. elytris serrato-tridentatis, thorace punctato, sterno porrecto, corpore inaurato. *Mus. Lud. Ulr.* 88.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 275. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 23. Buprestis elytris serrato-tridentatis viridibus: punctis cinereis impressis, sterno porrecto conico.
Grew mus. 167. *t.* 13. Carabus orientalis crassus.
Mouff. inf. 160. *f. inf.*
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 7. *t.* 46. *f.* 2.
Habitat in India *et* America.

Chrysis. 51. B. elytris serrato-tridentatis castaneis, sterno conico porrecto. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 275. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 24.
Degeer inf. 4. *p.* 136. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 25. Buprestis viridi aurata. &c.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 2.
Schroet. Abh. t. 2. *f.* 3. Bupestris splendida.
Habitat in India, Sina, *an satis distincta a sternicorni?*

violacea. 52. B. elytris, truncato-quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 25.
Habitat in Sierra Leon Africae, *immaculata.*

aegyptiaca. 53. B. elytris serratis sulcatis, corpore depresso obscuro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 26.
Habitat in Aegypto.

mariana. 6. B. elytris serratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace sulcato. *Mus. Lud. Ulr.* 89.* *Fn. suec.*

Suec. 754.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 27.
Fn. suec. 557. Buprestis aeneo-nitida supra cinerea, coleoptris apice attenuatis.
Degeer inf. 4. *p.* 128. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 18. Buprestis nitida supra fusco-aenea, subtus rubro-cuprea &c.
Pet. gaz. t. 2. *f.* 2. Cantharis marianus.
Schaeff. ic. t. 49. *f.* 1.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat in Europa, *et boreali* America.

farinosa. 54. B. elytris serratis viridibus: sulco abbreviato suturali impresso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

fulminans. 55. B. aeneo nitidissima, elytris serratis apice aureis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 29.
Habitat in India *magna.*

cyanipes. 56. B. elytris serratis striatis viridi-aeneis, thorace plano caeruleo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 30.
Habitat in America *meridionali, marianae magnitudine.*

modesta. 57. B. elytris serratis corpore obscurioribus: maculis tribus impressis aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 31.
Habitat in Brasilia, *farinosae magnitudine.*

blanda. 58. B. elytris attenuatis serratis sulcatis viridi-aeneis: sulcis cupreis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 32.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

aurata. 59. B. aurea, elytris serratis, thorace aeneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 33.
Habitat in America, *magna.*

tripunctata. 60. B. elytris serratis striatis cupreis punctis tribus impressis aureis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 39.
Habitat in America *meridionali, statura blandae.*

elegans. 61. B. aenea nitida, elytris serratis, thoracis lineis duabus elytrorumque unica aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 277. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae spei.

chryſoſtigma. 7. B. elytris ſerratis longitudinaliter ſulcatis: maculis duabus aureis impreſſis, thorace punctato. *Fn. ſuec.* 755.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 39.
Fn. ſuec. 1. *n.* 556. Bupreſtis fuſco-aenea, elytris maculis aeneis impreſſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 129. *n.* 3. Bupreſtis fuſca.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 1. Cucujus aureus.
Sulz hiſt. inſ. t. 6. *f.* 39.
Schaeff. elem. t. 31. *f.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 6.
Habitat in Europa.

dorſata. 62. B. obſcure aenea, elytris ſerratis, abdominis dorſo aureo, ano bidentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali*, *chryſoſtigmate minor.*

impreſſa. 63. B. elytris ſerratis laevibus aeneis: punctis tribus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 40.
Habitat in America *auſtrali et* India, *modeſtae affinis*, *at duplo minor.*

ornata. 64. B. elytris ſerratis obſcuris albo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 41.
Habitat in Penſylvania.

taeniata. 65. B. cinereo-villoſa, elytris ſerratis nigris: faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 42.
Habitat in Europa *magis auſtrali*, *parva*, *antennis nigris.*

cayennenſis. 66. B. viridi-aenea, elytris ſerratis atris: faſciis tribus lineolaque apicis viridibus, capite thoraceque fuſco maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parva*, *antennis nigris.*

cylindrica. 67. B. elytris ſerratis ſtriatis, thorace villoſo, corpore cylindrico nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 44.
Habitat in Oriente.

ſcabra. 68. B. elytris integris, fronte ſulcata, corpore ſcabro aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 45.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Trochilus. 69. B. aurea nitidiſſima, dorſo elytris integris pedibusque viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 46.
Habitat in Auſtria.

decaſtigma. 70. B. elytris integris elevato-ſtriatis fuſcis: punctis quinque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 47.
Habitat in Auſtria, *ſtatura chryſoſtigmatis.*

ruſtica. 8. B. elytris ſtriatis faſtigiatis, thorace punctato. *Fn. ſuec.* 756.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 555. Bupreſtis viridi aenea immaculata.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 279. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 57. Bupreſtis elytris emarginatis ſtriatis obſcure aeneis.
Degeer inſ. 4. *p.* 130. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 10. Bupreſtis violacea.
Scop. ent. carn. n. 188. Mordella ruſtica.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 126. *n.* 3. Cucujus viridi-auratus oblongus.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *p.* 174. *n.* 28.
Habitat in Europae *nemoribus.*

canaliculata. 71. B. obſcura, elytris integris, abdomine ſubtus canaliculato: ano quadridentato. *Fabr. mant. inſ.* 1 *p.* 181. *n.* 58.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnitudine ruſticae.*

acuminata. 72. B. elytris integris attenuato-acuminatis obſcuris, corpore cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 59.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura ruſticae.*

plebeja. 73. B. elytris emarginatis cupreis fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 280. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 182 *n.* 60.
Habitat in India.

tranquebarica. 74. B. nigra obſcura, elytris integerrimis, thorace macula baſeos utrinque impreſſa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 61.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura ruſticae.*

lugubris. 75. B. elytris integris obſcuris nigro-ſcabris, corpore ſubtus cupreo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 62.
Pall. ic. inſ. roſſ. 2. *t.* D. *f.* 11. Bupreſtis oxyptera.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 14.
Habitat in Auſtria *et* Ungaria.
Feminae *aculus brevis ferratus ani.*

carioſa. 76. B. atra, elytris integris: atomis albis, thorace varioloſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 63. *Pall. it.* 3. *app. p.* 708. *n.* 52. *ic. inſ. roſſ.* 2. *t.* D. *f.* 6.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, ſtatura B. tenebrionis, at duplo major.*

77. B.

undata. 77. B. viridi-aenea, elytris integris apice obſcuris: ſtrigis undatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 64.
Habitat in Germania, *B. rubi major.*

auſtriaca. 9. B. elytris ſtriatis aeneis bidentatis, capite thoraceque viridibus, abdomine violaceo.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 279. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 53. Bupreſtis elytris integris ſulcatis aeneis, capite thoraceque viridibus.
Scop. ent. carn. n. 187. Mordella gigantea.
Habitat Idriae, *magnitudine ruſticae.*

ſibirica. 78. B. elytris integerrimis atris: vittis duabus cinereo-tomentoſis impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 54.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 11.
Habitat in Sibiria, *mediae magnitudinis, latiuſcula, ſcabra, ſubtus cinereo-villoſa.*

ſplendens. 79. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 55.
Habitat in Sina.

fuſca. 80. B. ſubtus aenea, elytris integris obſcure fuſcis, abdomine punctis lateralibus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 279. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 56.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fuſca, magnitudine et ſtatura ſplendentis.*

aurulenta. 10. B. elytris faſtigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace ſubpunctato.
Habitat in Carolina, *oblonga, anguſta.*

Tenebrionis. 11. B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace varioloſo dilatato. *Fn. ſuec.* 761.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 65.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 16.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 15.
Habitat in Europa, Africa.

faſciularis. 12. B. elytris integerrimis ſtriatis: punctis faſciculato-villoſis, corpore inaurato hirſuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 90.* *Gron. zooph.* 493.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 49.

Seb. muſ. 2. *p.* 22. *t.* 20, *f.* 5. Scarabaeus amboinenſis.
Pet. gaz. 4. *t.* 13. *f.* 5. Scarabaeus viridis aureus, pupillis pilis albis obtuſis undique hirtus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 4.
Degeer inſ. p. 7. *t.* 47. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 9.
Habitat ad caput bonae ſpei, *rarius nigra, faſciculis pilorum nunc flavis, nunc fulvis.*

variolaris. 81. B. elytris integris obſcuris: punctis impreſſis numeroſis, thorace carinato. *Pall. it.* 1. *p.* 464. *n.* 37. *ic. inſ. roſſ.* 2. *t.* D. *f.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 50.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 10.
Habitat in Ruſſiae *onopordo et echinopode, ſcabra, nigra, ſubtus hirta, magnitudine et ſtatura faſcicularis.*

Onoporsdi. 82. B. elytris integris cupreis: ſulcis punctisque numeroſis albo-villoſis, thorace ſcabro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 51.
Habitat in Hiſpaniae *onopordo, aenea, nitida, albo-villoſa, faſciculari paulo minor.*

hirta. 13. B. hirta, elytris integerrimis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lud. Ulr.* 91.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 278. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 52.
Habitat in Africa, *colore varians.*

rubi. 14. B. cylindrica nigra, elytris faſciis cinereis undulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 66.
Habitat in Europae *magis auſtralis rubo, cichoreo.*

deaurata. 83. B. ſupra obſcure viridis, elytrorum margine aureo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 67.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis, cuprea, antennis nigris.*

nitidula. 15. B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depreſſo, corpore viridi nitido. *Fn. ſuec.* 757.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 57.
Schaeff. ic. t. 50. *f.* 7.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 20.
Habitat in Europa *boreali.*

84. B.

laeta. 84. B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 282. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 88.
Habitat Halae Saxonum, *an varietas nitidulae?*

ſalicis. 85. B. viridis nitens, elytris integerrimis aureis baſi viridibus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 282. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 89.
Schrauck inſ. auſtr. p. 195. *n.* 365. Bupreſtis elegantulus.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 12.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. *t.* 46. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germaniae *ſalice.*

cyanea. 86. B. elytris integerrimis rugoſis, corpore cyaneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 91.
Habitat Halae Saxonum *et* Berolini.

diſcoidea. 87. B. aenea villoſa, elytris integris: diſco teſtacco. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 90.
Habitat in Barbariae *umbellatis, parva.*

bimaculata. 16. B. elytris integerrimis ſtriatis: macula rubra, corpore fuſco-viridi. *Muſ. Lud. Ulr.* 92.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 68.
Sulz. hiſt. inſ. p. 17. *t.* 6. *f.* 15.
Habitat in India.

quadrimaculata. 88. B. viridis, thorace poſterius, elytrisque integris maculis duabus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 69.
Habitat in India.

novemmaculata. 17. B. elytris integerrimis: maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 282. *n.* 62. Bupreſtis elytris integerrimis nigris, maculis tribus flavis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 16. *f.* 17?
Habitat in Barbaria, Calabria, *nigra, oblonga, mediae magnitudinis.*

triſtis. 18. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdominis punctis decem nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 93.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 70.
Habitat in America *auſtrali et* India.

aenea. 19. B. elytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus apice ſtriatis. *Fn. ſuec.* 758.*
Habitat in Europa.

cuprea. 20. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus ſcabris, ſcutello tuberculari, corpore cupreo laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 94.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 71.
Habitat in America.

nobilis. 21. B. elytris integerrimis: ſtrigis duabus undatis inauratis, corpore fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 72.
Habitat in America *auſtrali et* India.

barbarica. 89. B. ſupra aenea, ſubtus cuprea, elytris integerrimis ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 73.
Habitat in Barbaria, *parva.*

umbellatarum. 90. B. elytris integerrimis laevibus, corpore obſcure cupreo immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 74.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura et magnitudine quadripunctatae.*

quadripunctata. 22. B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis quatuor impreſſis, corpore obſcuro. *Fn. ſuec.* 759. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 75.
Degeer inſ. 4. *p.* 134. *n.* 8. Bupreſtis ſubviridi-nigra, thorace punctis quatuor impreſſis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 17.
Habitat in Europae *floribus, frequens in caltha paluſtri.*

cruciata. 91. B. coleoptris integerrimis aureis: punctis duobus cruceque poſteriore nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 281. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 76.
Habitat in nova Hollandia.

manca. 23. B. aurata, thoracis lineis duabus, elytrisque fuſcis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 10.
Fabr. ſyſt. ent. p. 222. *n.* 37. Bupreſtis biſtriata.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 281. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 77. Bupreſtis elytris integris obſcuris, thorace aureo: ſtriis duabus nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 127. *n.* 4. Cucujus aeneus &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 18.
Habitat in Gallia *et* Germania.

pygmaea. 92. B. elytris integris cyaneis, capite thoraceque aeneis nitidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 78.
Habitat in Barbariae *umbellatis, ſtatura et magnitudine minutae.*

minuta. 24. B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtrilobo laevi, corpore ovato nigro. *Fn. suec.* 760.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 79. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 128. *n.* 6. Cucujus fusco-cupreus triangularis &c.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 19.
Habitat in Europa.

meditabunda. 93. B. elytris integerrimis fusco-nitidis, capite thoraceque cupreis, corpore aeneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 80.
Habitat in America *boreali, statura viridis, at paulo major.*

viridis. 25. B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore viridi elongato. *Fn. suec.* 762.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 81.
Degeer inf. 4. *p.* 133. *n.* 6. *t.* 5. *f.* 1. Buprestis viridis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 127. *n.* 5. Cucujus viridi-cupreus oblongus.
Scop. ent. carn. 190. Mordella ferraticornis.
Schaeff. ic. t. 76. *f.* 9.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 21.
Habitat in Europae *betula alba, foliorum margines exedens, corpore obscuriori et cupreo varians.*

biguttata. 94. B. elytris integerrimis linearibus viridibus: puncto albo, abdomine cyaneo: punctis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 82.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 22.
Habitat in Angliae *plantis.*

atra. 26. B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore atro elongato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 282. *n.* 56. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 83.
Habitat in Germania, *viridi proxime affinis.* Schreber.

elata. 95. B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo nitido. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 84.
Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 99. *n.* 12? Buprestis elongata.
Habitat Berolini *et* Halae Saxonum, *statura atrae, at minor.*

ruficollis. 96. B. nigra, elytris integerrimis linearibus, thorace cupreo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 85.
Habitat in America, *parva, statura elatae.*

festiva. 27. B. elytris integerrimis: maculis sex caeruleis, corpore elongato viridissimo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 282. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 86.
Habitat in Africa, *viridis magnitudine.*

linearis. 28. B. lineari oblonga murino-aenea, thorace posteriore trilobo.
Habitat in America. Rolander.

granularis. 29. B. aeneo-nebulosa, antennis clavatis. *Fn. suec.* 763.*
Habitat in Europa, *an hujus generis?*

depressa. 30. B. elytris subserratis aenco-ferrugineis nervoso-punctatis, thorace depresso. *Mant.* 2. *p.* 533.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 277. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 37. Buprestis (porcata) elytris serratis porcatis, thorace angulato, corpore fusco nitido.
Habitat in Oriente.

calcarata. 97. B. elytris bidentatis substriatis, tibiis intermediis dentatis, corpore cupreo. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 310.
Herbst Schrif. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 91. *n.* 2. Buprestis aeruginosa.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 7.
elem. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Germania, *statura et magnitudine ruslicae, rarior; elytrorum striis quatuor, thoracis unica media ex atro caerulea.*

fuliginosa. 98. B. elytris integerrimis sublinearibus glabris pilosis, thorace deflexo, corpore fuliginoso. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 51. *n.* 51.
Habitat in Anglia, *lecta in floribus crataegi oxyacanthae, magnitudine cantharidis testaceae, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

haemorrhoidalis. 99. B. aeneo-nitens, elytris subtridentatis novemsulcatis, abdominis annulo ultimo maculis duabus fulvis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 97. *et apud Fuesslı arch. inf.* 5. *t.* 28. *f.* 12.
Habitat Berolini *in sepibus, octoguttatae affinis.*

quercus. 100. B. viridi-nitens, thorace orbiculato: puncto impresso, elytris truncatis costatis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 90. *n.* 1. *et apud Fuesslı arch. inf.* 5. *t.* 28. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 6?

Habitat

Habitat in Germaniae *ligno querno, pollicem fere longa, pedibus caeruleis, antennis nigricantibus.*

hirſuta. 101. B. atra, villoſa, elytris faſciculis ſparſis villoſis flavis, marginalibus rubris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 7. t. 46. f. 4.*
Habitat in America, *faſciculari affinis.*

11maculata. 102. B. cylindrica nigra nitens, frontis macula, thoracis quatuor, elytrorum tribus flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. t. 28. f. 23.*
Habitat in Ungaria.

ſexmaculata. 103. B. cylindrica nigra nitens, capite thoraceque immaculatis, elytrorum maculis tribus flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 121. n. 24.*
Habitat in Ungaria, *an vere diſtincta ab* 11*maculata?*

varicornis. 104. B. nigricans villoſa, thorace utrinque lobato, elytris acutis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 59. n. 530.*
Habitat in Dania.

acuta. 105. B. nigra, elytris punctatis pone acuminatis, thorace laevi. *Degeer inſ. 4. p. 133. n. 7.*
Habitat in Europa, 4 *modo lineas longa.*

naevia. 106. B. atra, thorace albo nigroque vario. *Lepechin it. 1. p. 232. t. 17. f. 7.*
Habitat in Ruſſiae *regno, ruſticae affinis.*

picta. 107. B. aenea nitens, elytris violaceo-nigris: maculis ſymmetricis flaveſcentibus. *Pall. it. 2. app. n. 46.*
Habitat in regionibus Uralenſibus *magis auſtralibus, octoguttatae fere magnitudine.*

inaurata. 108. B. viridi aurea nitidiſſima, elytris obtuſis integerrimis decemſtriatis aeneis. *Pall. it. 2. app. n. 45.*
Habitat rarior in regionibus auſtralibus, fluviis Ural *et* Volgae *finitimis, ignitae magnitudine, ſed latior.*

tatarica. 109. B. nigra, ſubtus aenea, elytris laevibus aureis: vitta marginali lineaque margini parallela impreſſis tomentoſis. *Pall. it. 1. app. n. 10.*
Habitat in Tataria, *marianae magnitudine, at brevior, craſſior, et congeneribus magis obtuſa.*

virginica. 110. B. thorace lato fusco: punctis cupreis, elytris serratis atris: maculis cupreis futuraque metallica. *Drury inf.* 1. *p.* 66. *t.* 30. *f.* 3.
Habitat in Virginia.

nana. 111. B. nigra nitida, elytris caeruleo violaceis nitidissimis. *Degeer inf.* 4. *p.* 137. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 27.
Habitat in Surinamo, *pulice vix major.*

margina-ta. 112. B. elytris integerrimis nigris: margine flavo. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 18. *n.* 182.
Habitat in Dania; *an distincta species?*

nigra. 113. B. thorace elytrisque nigris, abdomine subtus albo-tomentoso. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 18. *n.* 183.
Habitat in Dania.

rosacea. 114. B. thorace pone marginato, elytris marginatis apice rotundatis, abdomine supra aeneo fusco.
Scop. ent. carn. n. 190. Mordella rosacea.
Habitat in Carnioliae *floribus.*

ungarica. 115. B. viridissima, subtus fronte et thoracis lateribus rubro-aureis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 104. *n.* 85. Mordella hungarica.
Habitat in Ungaria, *rustica paulo minor, elytris apice rotundatis.*

nebulosa. 116. B. supra nigra, subtus albicans, elytris integerrimis striis tenuissimis punctatisque albidis nebulosis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 104. *n.* 86. Mordella nebulosa.
Habitat in Ungaria, *pedibus nigris.*

bruttia. 117. B. nigra albido punctata, thorace varioloso dilatato albidiore: maculis quinque nitidis nigris.
Petagn. inf. Calabr. p. 22. *n.* 108. *f.* XX.
Habitat in Calabriae lentisco

Stephanelli. 118. B. viridi-aurea nitens, thorace lineis duabus fuscis, elytris integris. *Petagn. inf. Calabr. p.* 23 *n.* 110.
Habitat in Calabriae *monte* tre pizzi, *minor.*

rugosa. 119. B. aenea punctata, thorace scabro: sulco obliquo utrinque impresso, elytris striatis fuscis apice truncatis: rugis impressis interruptis. *Mus. Lesk. p.* 34. *n.* 739.
Habitat - - - -

coccinea. 120. B. fuſco-aenea punctata, thorace ſulcato, elytris integris coccineis: rugis quatuor nigris, internis ad futuram ramoſis. *Muſ. Lesk. p.* 34. *n.* 744.
Habitat extra Europam, *thoracis ſulcis ſtriis villoſis griſeis repletis, elytris ſpatio rugis interjecto punctis concatenatis duplici ſerie ſtriatis.*

HYDROPHILUS. *Antennae* clavatae: clava perfoliata.
Palpi quatuor filiformes.
Pedes poſteriores villoſi, natatorii, ſubmutici.

piceus. 1. H. niger, ſterno canaliculato poſterius ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 371. *n.* 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. Hydrophilus ruficornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 182. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 1. Hydrophilus niger, elytris ſulcatis, antennis fuſcis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 764.* *Scop. ent. carn.* 293. Dytiſcus antennis perfoliatis, corpore laevi, ſterno carinato poſtice ſpinoſo.
Herbſt Beſch. der naturf. Berl. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 2. Dytiſcus haſtatus.
Lyonn. Leſſ. t. 1. *f.* 15–17.
Friſch inſ. 2. *t.* 6.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 8.
Schaeff. el. t. 71.
ic. t. 33. *f.* 1. 2.
Bergſtr. nomencl. 1. 2. 6. *f.* 3. *et t.* 8. *f.* 1. *et t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Europa, *nido eminenter mucronato natante.*

olivaceus. 6. H. olivaceus, ſterno canaliculato poſterius ſpinoſo, coleoptris emarginatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *piceo paulo minor.*

caraboides. 2. H. niger nitidus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 289. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 3.
Degeer inſ. 4. p. 516. *n.* 2. Hydrophilus nigricornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 183. *n.* 2. Hydrophilus niger, elytrorum punctis per ſtrias digeſtis, antennis nigris.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 765.* Dytiſcus antennis perfoliatis, corpore glabro, ſtriis aliquot recurvis.
Raj. inſ. p. 95. *n.* 7. Hydrocantharus niger ſubrotundus.
Friſch inſ. 13. *p.* 24. *t.* 21.
Roeſ. inſ. 2. *aquat.* I. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 41.
Schaeff. ic. t. 53. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. I. *t.* 5. *f.* 8. 9. *et* (*larv. pupp.*) *t.* 7. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa.

lateralis. 7. H. niger nitidus, thoracis elytrorumque marginibus flavis.
Fabr. ſp. inſ. I. *p.* 289. *n.* 4. *mant. inſ.* I. *p.* 188. *n.* 4.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

ſcarabacoides. 3. H. niger, elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 289. *n.* 5. *mant. inſ.* I. *p.* 188. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 3. Dytiſcus ovalis convexus ater laeviſſimus, antennis filiformibus triarticulatis.
Syſt. nat. X. *n.* 56. Scarabaeus (aquaticus) muticus piceus, elytris ſtriatis, antennis flaveſcentibus filiformibus.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 85. Scarabaeus piceus.
Habitat in Europa, *palpis, non antennis, filiformibus.*

picipes. 8. H. niger, pedibus piceis, elytris laevibus. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat in Germania, *utrum hujus, an inſequentis mox generis?*

orbicularis. 9. H. ſubrotundus corpore glabro atro. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 290. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 188. *n.* 7.
Habitat in Germania.

collaris. 10. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 290. *n.* 7. *mant. inſ. p.* 188. *n.* 8.
Habitat in America.

fuſcipes. 4. H. thorace atro: margine griſeo, elytris fuſcis: margine punctoque poſteriore albidis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 290. *n.* 10. *mant.* I. *p.* 189. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 766. Dytiſcus antennis perfoliatis, elytris ſtriatis margine lividis, pedibus fuſcis.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 184. *n.* 4. Hydrophilus.
Habitat Upſaliae, *elytrorum punctis interdum obſoletis.*

5. H.

luridus. 5. H. elytris ſtriatis, corpore cinereo-fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 378. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 1. 2. Hydrophilus fuſcus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 665. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 767.* Dytiſcus antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fuſcescentibus, thorace lateribus flavicante.
Habitat in Europa.

minutus. 11. H. ovatus niger elytris pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 9. *mant inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 10.
Forſt. nov. inſ. ſp. 53. *n.* 53. Dytiſcus dermeſtoides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 85. *n.* 27? Scarabaeus totus rufoniger, maculis nigrioribus.
Habitat in Europa, *veſperi ſonorus, thorace interdum griſeo.*

griſeus. 12. H. ſupra cinereus, ſubtus fuſcus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 11.
Habitat in Saxonia, *ſtatura et magnitudine minuti.*

tricolor. 13. H. niger, elytris piceis margine nigris et apice ochroleucis, pedibus ſpadiceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 122. *n.* 6. *t.* 28. *f.* A. b.
Habitat Berolini, *lineam longus.*

cordiger. 14. H. niger, thoracisque margine elytrisque ferrugineis: his macula communi cordata nigra. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 122. *n.* 7. *t.* 28. *f.* A. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam longus, pedibus piceis.*

rufus. 15. H. rufus, elytris laeviſſimis obſcurioribus: margine exteriore albido anterius bidentato. *Scop. ent. carn. n.* 298.
Habitat in Carniolia.

obſcurus. 16. H. lividus, abdomine nigro, elytris nitidis confertim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 657.
Habitat in Dania, *an vere diſtinctus a lurido?*

puſillus. 17. H. niger, elytris laeviſſimis, antennis tarſisque fuſcis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 658.
Habitat in Dania.

Pilula. 18. H. ater, ſupra nitidus confertim punctatus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 659.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 184. *n.* 3. Hydrophilus punctatus.
Habitat in Europa.

19. H.

niger. 19. H. niger nitidus, elytris punctis diſtantibus leviſſime ſtriatis, antennis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 769.
Habitat in Europa, *ſtatura caraboidis, at quadruplo minor.*

ater. 20. H. ater glaber, antennis tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 774.
Habitat in Europa.

212. DYTISCUS. *Antennae* ſetaceae. *Palpi* ſex filiformes. *Pedes* poſteriores villoſi, natatorii, ſubmutici.

latiſſimus. 6. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis: linea flava. *Fn. ſuec.* 768.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 1.
Müll. zool. dan. prodr. p. 69. *n.* 663. Dytiſcus ampliſſimus.
Degeer inſ. 4. *p.* 390. *n.* 1. Dytiſcus nigro-fuſcus.
Friſch inſ. 2. *t.* 7. *f.* 1. 2. Scarabaeus aquaticus magnus niger, margine luteo.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 19.
Schaeff. ic. t. 217. *f.* 1. 2.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 1. 2. *et t.* 9. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali, in propriam ſpeciem ſaeviens, mas glaber, femina ſulcata.*

coſtalis. 1. D. niger, capitis faſcia, thoracis margine elytrorumque ſtria coſtali ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 291. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 2.
Habitat in Surinamo. Femina *obſcurior.*

margina- lis. 7. D. niger, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. *Fn. ſuec.* 769. *Scop. ent. carn.* 294. *Geoffr. inſ.*

Hydrophili *et* Dytiſci *in aquis et humidis habitant, egregie natant, dorſo impoſiti circumgyrando exſiliunt, in umbra quieſcunt, noctu volitant, diutius in ſicco ſervati difficilius ſubmergi poſſunt; maribus pedum anteriorum plantae hemiſphaericae, feminis elytra ſaepius ſulcata, priores dermeſtidi, poſteriores carabis affines; ceterum ſexus diſcerni, ſpecies determinari difficulter poſſunt: larvae ſubaquaticae voraciſſimi aquatilium crocodili, piſces ipſos occidunt innumeros, uti Baruthi* 1762. *teſte Schrebero nene Samml.* 1763. 3. *p.* 680. *de ſemiſtriato, alias de latiſſimo compertum eſt.*

inſ. par. 1. *p.* 186. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 291. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 3.

Degeer inſ. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 2. Dytiſcus nigro fuſcus nitidus.

Mouff. inſ. 164. Hydrocantharis.

Raj. inſ. p. 93. *n.* 1. Hydrocantharis noſtras.

Aldr. inſ. 707.

Liſt. mut. t. 5. *f.* 2.

Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 9. 11.

Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 42.

Schaeff. ic. t. 8. *f.* 8.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 1. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1. 2. *et* (*larv. pupp.*) *t.* 7. *f.* 4. 5. *β*) 1. *t.* 7. *f.* 1.

Habitat in Europa.

ſemiſtriatus. 8. D. fuſcus, elytris ſulcis dimidiatis decem villoſis. *Fn. ſuec.* 772.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 187. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 2.

Fn. ſuec. 1. *n.* 568. Dytiſcus ſupra fuſcus, ſubtus ater.

Raj. inſ. p. 94. *n.* 2. Hydrocantharis elytris ſtriatis ſive canaliculatis.

Friſch inſ. 2. *t.* 7. *f.* 4.

Bradl. nat. t. 26. *f.* 2.

Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 10.

Degeer inſ. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 1.

Schaeff. ic. t. 8. *f.* 7.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 2. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

Fn. ſuec. 1. *n.* 567. Dytiſcus elytris ſtriis 20 dimidiatis.

Habitat in Europa, *enſe recurvo, acuto, recondito inſtructus, ova oblonga, magna, alba pariens, marginalis, ut videtur, femina.*

punctulatus. 2. D. niger, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori albis, elytris ſtriis tribus punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 4.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 185. *n.* 1. Dytiſcus margine coleoptrorum thoracisque flavo.

Degeer inſ. 4. *p.* 396. *n.* 3. Dytiſcus lateraliter marginatus.

Müll. zool. dan. prodr. p. 70. *n.* 664. Dytiſcus virens.

Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 2.

Friſch inſ. 13. *t.* 1. *f.* 7.

Schaeff. elem. t. 7.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 31. *n.* 45. *t.* 6. *f.* 4. 5. *t.* 8. *f.* 4. *et t.* 9. *f.* 2.

β) *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.

Habitat

Habitat in Germaniae *rivulis ſilvaticis.*
Femina *elytrorum ſulcis decem dimidiatis.*

limbatus. 3. D. niger, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 5.
Habitat in Sina, *et* India, *abdomine atro: punctis utrinque* 3 *ferrugineis.*

ruficollis. 4. D. niger, fronte thoraceque fulvis, elytris ſtriga baſeos margineque exteriori teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 6.
Habitat in Siam, *ſulcati magnitudine.*

ſtriatus. 9. D. fuſcus, elytris transverſim ſubtiliſſime ſtriatis. *Fn. ſuec.* 770.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 399. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 16. Dytiſcus transverſe ſtriatus.
Habitat in Europa.

fuſcus. 10. D. fuſcus, elytris transverſe ſubſtriatis.
Habitat in Europa; *an ſpecie diſtinctus a ſtriato?*

Lanio. 5. D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 10.
Habitat in Madera.

cicurius. 24. D. ater laevis, ore verticis puncto thoracisque margine rufis, elytris flavo-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine ſtriati.*

vittatus. 25. D. ater laevis, elytris vitta marginali flava: macula baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 12.
Habitat in India.

cinereus. 11. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Fn. ſuec.* 771. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 188. *n.* 4 *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 13.
Degeer inſ. 4. *p.* 397. *n.* 14. Dytiſcus faſciatus.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 1.
Petiv. gaz. t. 70. *f.* 3.
Act. Nidroſ. 425. *t.* 70. *f.* 3.
Huffn. inſ. 2. *t.* 12.

Roeſ.

Roes. inf. 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 7.
Habitat in Europa *frequentissimus.*

griseus. 26. D. cinereus, elytris fascia dentata nigra. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 293. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 14.
Habitat in India, *cinereo paulo major.*

sticticus. 12. D. pallens, elytris griseis: puncto oblongo laterali impresso nigro. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 15.
Habitat in Africa.

decempunctatus. 27. D. ater glaber, elytris punctis albis quinque. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

sulcatus. 13. D. elytris sulcis decem longitudinalibus villosis. *Fn. suec.* 773.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 189. *n.* 5. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 292. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 7.
Raj. inf. p. 94. *n.* 3. *et* 10. Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano.
Bradl. mut. t. 26. *f.* 2. A.
Frisch inf. 13. *p.* 13. *t.* 7.
Roes. inf. 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 3.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 5. f. 3–5. *et t.* 7. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa *et* America, *maris elytris glabris.*

fasciatus. 28. D. elytris flavis: fasciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 293. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 8.
Habitat in India.

erythrocephalus. 14. D. ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis. *Fn. suec.* 774.* *Degeer inf.* 4. *p.* 404. *n.* 12. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 31.
Habitat in Europa.

planus. 29. D. ovato-oblongus planus niger, tibiis solis rufis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 32.
Habitat in Dania, *statura erythrocephali.*

varius. 30. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque striatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 33.
Habitat in Patagonia.

notatus. 31. D. fuſcus, thorace flavo: punctis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 34. *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 5. *f.* 10.
Habitat in Germania, *ſtatura paluſtris, thorace interdum rufo, aut punctis faſciave abbreviata nigris vario.*

depreſſus. 32. D. thorace ferrugineo: punctis duobus baſeos nigris, elytris fuſcis ferrugineo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 35.
Habitat in Suecia.

dorſalis. 33. D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baſeos diſtincto margineque inaequali ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 36.
Habitat Kilonii, *ſexpuſtulato affinis, at major.*

ſexpuſtulatus. 34. D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baſeos majore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 37.
Habitat in Sueciae *aquis ſtagnantibus.*

maculatus. 15. D. niger, thorace nigro: faſcia pallida elytris albo nigroque variis. *Fn. ſuec.* 777.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 38. *Uddm. diſſ.* 43.
Habitat in Europa.

ferrugineus. 16. D. ferrugineus totus.
Habitat in Europa, *cimicis magnitudine.* Aſcanius.

bipuſtulatus. 17. D. ater laevis, capite poſterius punctis duobus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 17.
Degeer inſ. 4. *p.* 401. *n.* 8? Dytiſcus ater.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 189. *n.* 6? Dytiſcus totus niger laevis.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali.*

cinctus. 35. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris: margine omni albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 18.
Habitat in America.

bipunctatus. 36. D. ater, thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuſcoque variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 19.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

37. D.

feneſtratus. 37. D. ſubtus ferrugineus, ſupra niger, elytris punctis duobus feneſtratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 20.
Habitat Hamburgi, *ſtatura bipuſtulati.*

Hübneri. 38. D. laevis ater, ore thoracisque margine ferrugineis, elytris linea marginali flava. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 21.
Habitat in Germania, *magnitudine et ſtatura tranſverſalis.*

ſtagnalis. 39. D. laevis niger, thorace anterius ferrugineo, elytris fuſcis flavo-lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 22.
Habitat in Germania, *ſtatura et magnitudine tranſverſalis.*

transverſalis. 40. D. ater, thorace anterius ferrugineo, elytrorum margine ſtrigaque baſeos abbreviata flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 23.
Müll. zool. dan. prodr. p. 71. *n.* 668. Dytiſcus niger, thorace utrinque faſciaque antica, elytris margine lineaque tranſverſa baſeos flava.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in Europa.

Hermanni. 41. D. gibbus capite thorace elytrorumque baſi ferrugineis, elytris truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 24.
Fabr. ſyſt. ent. p. 232. *n.* 14. Dytiſcus gibbus, elytris faſcia undata baſeos ferruginea.
β) *Herbſt Beſch. der berl. naturf.* Fr. 4. *t.* 7. *f.* 3. Dytiſcus tardus.
γ) *Schranck enum. inſ. auſtr. n.* 379. Dytiſcus undulatus.
Habitat in Alſatiae *aquis ſtagnantibus.*

abbreviatus. 42. D. niger, elytris ſtriga abbreviata baſeos punctisque duobus flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 25.
Habitat Kilonii, *ſtatura tranſverſalis, at duplo minor.*

gibbus. 43. D. gibbus ferrugineus, elytris nigris apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 26.
Habitat Kilonii *in aquis ſtagnantibus.*

haemorrhoidalis. 44. D. niger, thorace elytrorumque baſi apiceque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 27.
Habitat Kilonii, *magnitudine uliginoſi.*

ovatus. 18. D. ovatus fuſcus, capite thoraceque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 2282. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 39.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 191. *n.* 10. Dytiſcus ovatus fuſcus, capite thoraceque rubicundis.
Degeer inſ. 4. *p.* 402. *n.* 9. *t.* 14. *f.* 17–19. Dytiſcus ſphaericus.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, conſueto interdum duplo major, margine elytrorum albo-maculato.*

picipes. 45. D. niger, thorace anterius ferrugineo, elytris flavo-lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 40.
Habitat in Germania, *parvus.*

lituratus. 46. D. niger, elytris baſi lituraque apicis pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 41.
Habitat in Italia, *parvus.*

chryſomelinus. 47. D. ſupra cinereus ſubtus niger. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 42.
Habitat in Germania, *parvus.*

ſignatus. 48. D. niger, capite thoraceque rufis: ſignaturis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 43.
Habitat in Patagonia.

halenſis. 49. D. ater, thorace rufo: baſeos medio nigro: puncto rufo, elytris cinereis nigro ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 44.
Habitat in Germania, *parvus, planus.*

paluſtris. 19. D. niger laeviſſimus, elytris lituris duabus lateralibus albidis. *Fn. ſuec.* 775.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 38.
Habitat in Europa, *thorace ferrugineo.*

uliginoſus. 20. D. ater nitidus, antennis pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Fn. ſuec.* 776.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 28.
Habitat in Europa.

irroratus. 50. D. teſtaceus nigro irroratus, capite pectoreque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 295. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 29.
Habitat in America.

bimaculatus. 21. D. teſtaceus, elytris macula nigricante.
Habitat in Gallia, *magnitudine ſeminis oryzae, elytris ſubſtriatis.* Gouan.

22. D.

granularis. 22. D. niger, elytris lineis duabus flaveſcentibus, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 45.
Scop. ent. carn. n. 297. Dytiſcus minimus.
Habitat in Europae *borealis aquis ſtagnantibus, pulicis magnitudine.*

confluens. 51. D. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis: lineis quatuor diſci nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 46.
Habitat Kilonii, *parvus.*

obliquus. 52. D. ferrugineus, elytris maculis quinque obliquis fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 47.
Habitat Kilonii, *ſtatura granularis.*

impreſſus. 53. D. oblongus flaveſcens, elytris cinereis: punctis impreſſis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 48.
Schall. Abh. der hall. naturf. Fr. 1. *p.* 312. Dytiſcus impreſſo-punctatus.
Habitat in Europa.

lineatus. 54. D. ferrugineus, coleoptris fuſcis: lineis flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 49.
Berg ſtr. nomencl. 1. *p.* 32. *n.* 8. 9. *t.* 6. *f.* 8. 9.
Habitat in Aſiatiae *aquis ſtagnantibus.*

inaequalis. 55. D. ferrugineus, elytris nigris: lateribus inaequaliter ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 50.
Habitat in Sueciae *aquis ſtagnantibus.*

minutus. 23. D. elytris fuſcis baſi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato. *Fn. ſuec.* 778.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 297. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 51. Dytiſcus flaveſcens, elytris fuſcis, margine flavo maculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 404. *n.* 18. *t.* 16. *f.* 9. Dytiſcus ruficollis.
Habitat in Europa.

craſſicornis. 56. D. fuſcus, capite thoraceque flavis, antennis medio incraſſatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 52.
Müll. zool. dan. prodr. n. 779. Dytiſcus craſſicornis.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 193. *n.* 15.
Degeer inſ. 4. *p.* 402. *n.* 10. Dytiſcus clavicornis.
Habitat in Europa *magis boreali, parvus.*

pictus. 57. D. ferrugineus, thorace ferrugineo, elytris pallidis, ſutura maculaque laterali nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 53.
Habitat in Germania, *minutus.*

puſillus. 58. D. ater, thorace elytrisque margine albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 54.
Habitat in Italia, *vix pediculi magnitudine.*

ovalis. 59. D. elytris fuſcis pallido-lineatis, thorace ferrugineo, abdomine atro. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 19. *n.* 33.
Habitat Upſaliae, *magnitudine nitidulae aquaticae, ovato major.*

intricatus. 60. D. flavicans, ſupra nigro-virens intricatus, elytris excavato-ſtriatis: margine apice thoraceque flavis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 311.
Müll. Naturf. 7. *p.* 99. Dytiſcus ſemiſulcatus.
Habitat Halae Saxonum *in ſtagnis, ſtatura et magnitudine punctulati.*

verſicolor. 61. D. fulvus, elytris maculis oblongis nigris. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 313.
Habitat Halae Saxonum *in ſtagnis, ovatus, magnitudine chryſomelae nemorum.*

Schalleri. 62. D. niger, capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: margine extimo rufo. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 313.
Habitat Halae Saxonum.

laminatus. 63. D. fulvus, elytris ſtratis nigro-punctatis, laminis duabus ad baſin abdominis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 314.
Habitat rarior Halae Saxonum, *magnitudine chryſomelae nemorum.*

aciculatus. 64. D. thoracis elytrorumque margine maculisque tribus abdominis flavis, elytris ſtriis excavatis decuſſantibus abruptis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. *p.* 123. *n.* 4.
Habitat in India, *limbato affinis.*

fuſculus. 65. D. ater, elytris fuſcis laevibus, pedibus obſcure teſtaceis. *Schrank inſ. auſtr. p.* 203. *n.* 382.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 190.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

66. D.

oculatus. 66. D. capite cinereo: margine poſteriori maculisque duabus trigonis frontis nigris, elytris piceis: margine omni flavo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 125. n. 13.*
Habitat Berolini, *in paludibus, 5 fere lineas longus.*

ornatus. 67. D. niger, ſubtus piceus, ore, maculis elytrorum, et duabus inter oculos rotundis, thorace et antennis ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 125. n. 15. t. 28. f. B.*
Habitat Berolini, *4 lineas longus.*

unilineatus. 68. D. niger, elytrorum margine fiſſo lineaque dimidia flavescentibus. *Schranck inſ. auſtr. p. 204. n. 384.*
Habitat in Germania.

diſpar. 69. D. niger, laevis, ore flavo, elytris variegatis thoraceque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 126. n. 18.*
Habitat Berolini, $1\frac{1}{2}-3$ *lineas longus.*

ſordidus. 70. D. niger, antennis ferrugineis apice nigris, pedibus piceis, elytris atris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 126. n. 19.*
Habitat Berolini, *2 lineas longus.*

inſularius. 71. D. ſubtus ſpadiceus, capite thoraceque luteis, elytris nigris punctatis cancellatis: margine fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 127. n. 20.*
Habitat in Pomerania, *vix 2 lineas longus.*

aquaticus. 72. D. ſpadiceus, oculis, elytris thorace et ventre nigris, thoracis faſcia media et margine ſpadiceis, elytrorum margine obſolete ferrugineo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 127. n. 21.*
Habitat Berolini, *ultra 2 lineas longus.*

parvulus. 73. D. ſubtus piceus, capite thoraceque fulvis, elytris nigris: margine ſtriisque duabus dimidiatis flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 127. n. 22.*
Habitat Berolini, *vix* $1\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

piceolus. 74. D. ſubtus niger, capite thoraceque ſpadiceis, elytris piceis: margine obſolete fulvo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 127. n. 23.*
Habitat Berolini, $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

ſimplex. 75. D. niger, capite, thoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 5. p. 127. n. 24.*
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine undulati.*

capricornis. 76. D. luteſcens, ventre oculisque nigris, antennarum articulis mediis multo latioribus, elytris fuſcis punctato-excavatis. *Fueſſli apud Herbſt arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 25. *t.* 28. *f.* C. *et* b. c.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

variolosus. 77. D. flaveſcens, ſubtus ex fuſco luteus oculis nigris, elytris ex viridi luteſcentibus, variegatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 26.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine capricornis.*

orbicularis. 78. D. niger, laevis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace elytrisque ex luteo fuſcis pellucidis: maculis obſoletis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 27.
Habitat Berolini, *vix lineam longus.*

pedicularius. 79. D. laevis, ſubtus thorace elytrisque fuſcis, capite nigro, pedibus piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 5. *p.* 128. *n.* 28.
Habitat Berolini, $\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

marginellus. 80. D. niger, thoracis margine flavo, elytris flaveſcentibus ſeriatim punctatis: maculis obſoletis nigricantibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 29.
Habitat Berolini, $1-1\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

ſeminulum. 81. D. niger laevis, elytris pellucidis ſpadiceis: apice rubro, pedibus ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 30.
Habitat Berolini, *vix ultra lineam longus.*

oblongus. 82. D. obſolete niger, capite, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 31.
Habitat Berolini, *fuſculo affinis*, 2 *lineas longus.*

Zeylanicus. 83. D. niger, thorace elytrorumque margine flavo, ſterno mutilo. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 552.
Habitat in Zeylon.

Gronovii. 84. D. niger laevis, antennis ferrugineis, capite poſterius maculis binis rubris. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 555.
Habitat - - - *an diverſus a bipuſtulato?*

Scopolii. 85. D. niger, thoracis margine lineaque media transverſa rufis, elytris teſtaceis ſubpellucidis: poſterius faſcia abrupta punctisque plurimis atris. *Scop. ent. carn. n.* 295.
Habitat in Carniolia.

86. D.

glaber. 86. D. fuſcus, elytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 55. *n.* 55.
Habitat in Angliae *aquis ſtagnantibus, ſtriato affinis.*

nebulo-ſus. 87. D. lividus nigro-nebuloſus, antennis pedibusque ferrugineis ventre atro: margine ferrugineo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 56. *n.* 56.
Habitat in Angliae *aquis ſtagnantibus, magnitudine uliginoſi.*

exſoletus. 88. D. lividus, antennis, capite, thorace, abdomine pedibusque pallidis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 57. *n.* 57.
Habitat in Angliae *aqua ſtagnante inter lemnum, cimicis fere magnitudine.*

danicus. 89. D. niger, margine thoracis extimo elytrorumque flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 669.
Habitat in Dania.

Mülleri. 90. D. elytris acuminatis glabris apice bipunctatis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 20. *n.* 194. *zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 670.
Habitat in Dania.

lacuſtris. 91. D. flavicans, thoracis margine flavo, elytris ſparſim punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 671.
Habitat in Dania.

piceus. 92. D. niger, corpore ſubtus et thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 673.
Habitat in Dania.

foetidus. 93. D. ferrugineus, ſupra niger, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 674.
Habitat in Dania.

Comma. 94. D. flavicans, ſupra nigro-aeneus, elytrorum margine exteriore lineolaque luteſcente. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 676.
Habitat in Dania.

quadri-punctatus. 95. D. ferrugineus, elytris nigris: faſcia, macula punctisque quatuor albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 677.
Habitat in Dania.

biocella-tus. 96. D. rufus, elytris aeneis: maculis albis longitudinaliter diſpoſitis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 768.
Habitat in Dania.

erythromelas. 97. D. niger, antennis tarsisque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 770.
Habitat in Dania.

roridus. 98. D. flavus, thorace macula media, elytris nigro irroratis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 771.
Habitat in Dania.

rubripes. 99. D. nigro-aeneus nitidus, antennis, pedibus, elytrorum apice punctisque duobus ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 772.
Habitat in Dania.

quadricolor. 100. D. ovatus rufus, thoracis medio nigro, elytris fuscis: margine inferiore punctoque baleos flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 780.
Habitat in Dania.

cimicoides. 101. D. virens, elytris virescentibus: margine inferiore maculisque albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 781.
Habitat in Dania.

velox. 102. D. ovatus rufus, elytris striis octo fuscis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 783.
Habitat in Dania.

nanus. 103. D. niger, thorace anterius flavo, elytris sulco abrupto, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr.* 73. *n.* 784.
Habitat in Dania.

rufifrons. 104. D. niger, thorace utrinque, elytris basi lateribusque flavis, capite pedibusque rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 785.
Habitat in Dania.

tricolor. 105. D. rufus, elytris luteis: disco macula communi nigra sinuata. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 73. *n.* 786.
Habitat in Dania.

exilis. 106. D. ovatus niger, antennis basi pedibusque ferrugineis, elytris laevibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 788.
Habitat in Dania.

quadripustulatus. 107. D. niger, elytris maculis quatuor flavis, pedibus rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 789.
Habitat in Dania.

flavicans. 108. D. ater, ſupra flavicans, thorace poſterius, elytris ſtriis maculisque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 790. *Habitat in* Dania.

naevius. 109. D. fulvus, maculis ſparſis nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 189. *n.* 7. *Habitat in* Gallia.

fimbriatus. 110. D. fuſcus, elytris anterius et exterius flavis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 190. *n.* 8. *Habitat in* Gallia.

rufipes. 111. D. ovatus ater, pedibus antennaramque baſi ferrugineis, elytris punctatis ſubpubeſcentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 782. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 568. 2. *p.* 216. *n.* 772. b. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 190. *n.* 9? *Habitat in* Europa.

gibbus. 112. D. flavicans, capite thoraceque virente, elytris obſcure laevibus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 778. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 191. *n.* 11. *Habitat in* Europa.

quadrimaculatus. 113. D. niger, thorace flavo, elytris laevibus: maculis limboque luteis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 192. *n.* 13. *Habitat in* Gallia.

uniſtriatus. 114. D. niger, elytris maculis et limbo luteis: ſtria unica. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 192. *n.* 14. *Habitat in* Gallia.

bilineatus. 115. D. elytris fuſcis, corpore ſubtus fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra. *Degeer inſ.* 4. *p.* 400. *n.* 6. *Habitat in* Europa, 7 *lineas longus.*

ſeminiger. 116. D. corpore ſubtus toto nigro, thorace elytrisque obſcure fuſcis: margine rufo. *Degeer inſ.* 4. *p.* 401. *n.* 7. *Habitat in* Europa, 7 *lineas longus.*

nubilus. 117. D. niger, ſupra maculis ſtriisque griſeis, pedibus rufo fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 403. *n.* 11. *Habitat in* Europa, *minutus.*

hyalinus. 118. D. vireſcens, elytris hyalinis: maculis lateralibus albidis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 406. *n.* 14. *t.* 15. *f.* 21-23. *Habitat in* Europa, $2\frac{1}{2}$ *lineas longus, velociſſime natans.*

119. D.

virescens. 119. D. teſtaceus ſupra virescens, thoracis elytrorumque marginibus externis flavis, his longitudinaliter ſtriatis, pedibus poſterioribus craſſioribus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 778. *Habitat in* Europa.

teſtaceus. 120. D. teſtaceus, thoracis margine anteriori et poſteriori fuſcis, medio, elytrorum linea ſuturali atomisque marginalibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 783. *Habitat in* Europa.

niger. 121. D. niger, thoracis margine antico externis latiore, elytrorum marginibus lividis longitudinaliter ferrugineo punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 784. *Habitat in* Europa.

carbonarius. 122. D. oblongo-ovatus niger, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 788. *Habitat in* Europa.

bilobus. 123. D. oblongo-ovatus niger, ore, verticis macula biloba, thorace, elytrorum linea ſuturali baſi marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 789. *Habitat in* Europa, *thoracis diſco macula transverſa nigra picto.*

ferrugineus. 124. D. ferrugineus, capite thoracisque margine poſteriori nigris, illo anterius, maculis inter oculos duabus, thorace elytrorum linea ſuturali marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 790. *Habitat in* Europa.

flavus. 125. D. flavus, ore, punctis inter oculos duobus, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 791. *Habitat in* Europa.

tricolor. 126. D. ferrugineus, capite thorace elytrisque teſtaceo-fuſcis, maculis inter oculos duabus ferrugineis, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 792. *Habitat in* Europa.

denigratus. 127. D. niger, ore, punctis inter oculos duobus et abdomine luteis: ſegmentis utrinque macula nigra, elytris fuſcis: atomis marginibusque externis lividis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 793. *Habitat in* Europa.

128. D.

unipunctatus. 128. D. ater, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto teſtaceo. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 795.
Habitat in Europa.

biguttatus. 129. D. niger, pedibus, abdominis apice, antennis, ore, punctis inter oculos duobus, thorace elytrisque teſtaceis, his fuſco maculatis, thoracis medio guttis duabus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 796.
Habitat in Europa.

octomaculatus. 130. D. lividus, thorace viridi-livido, elytris fuſco-lividis: ſingulis maculis quatuor connatis ſtriisque brevibus pone medium lividis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 802.
Habitat in Europa.

lividus. 131. D. lividus, capite anguſto, thorace anterius anguſtiore, elytris punctis fuſcis in ſtrias ſeriatis. *Muſ. Lesk. p.* 37, *n.* 805.
Habitat in Europa.

quadrilineatus. 132. D. niger, elytris profunde punctatis fuſceſcentibus: lineis quatuor marginibusque externis flaveſcentibus ramoſis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 809.
Habitat in Europa.

denticulatus. 133. D. piceus, ore antennisque ferrugineis, elytris glabris: baſeos faſcia bidentata, maculis tribus, et margine externo, thorace anterius pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 37. *n.* 810.
Habitat in Europa.

213. CARABUS. *Antennae* filiformes.
Palpi ſex: articulo ultimo obtuſo, truncato.
Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus.
Elytra marginata.

* *majores.*

maxillosus. 44. C. apterus ater, mandibulis exſertis longitudine capitis, thorace poſterius producto bilobo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 298. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n,* 1.

Thunb.

Thunb. nov. inf. ſp. 4. *p.* 69. Carabus apterus ater, thorace poſtice producto bilobo unicolore.
Voet coleoptr. t. 39. *f.* 47. 48.
Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 8. *t.* 47. *f.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *congenerum maximus.*

thoracicus. 45. C. apterus ater, thorace poſterius producto bilobo: lateribus elytrorumque marginibus albo-villoſis. *Thunb. nov. inf. ſp.* 4. *p.* 69. *f.* 82. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 2. *Herbſt apud Fueſſli arch. inf.* 8. *t.* 47. *f.* 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *maxilloſo proxime affinis.*

coriaceus. 1. C. apterus ater opacus, elytris connatis: punctis intricatis ſubrugoſis. *Scop. ent. carn.* 265. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 141. *n.* 1. Bupreſtis ater, elytris rugoſis.
Sulz. hiſt. inf. 1. *t.* 6. *f.* 44.
Poda inf. 45.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Degeer inf. 4. *p.* 9. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 36. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 43.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 7.
Habitat in Germaniae *ſilvis, inter maximos europaeos.*

variolo-ſus. 46. C. apterus ater, elytris punctis variolosis impreſſis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 4.
Habitat in Tranſylvania, *magnus.*

granulatus. 2. C. apterus nigricans, elytris aeneis ſtriatis: interjectis punctis elevatis longitudinalibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 301. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 668. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 780. Carabus apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis.
Fn. ſuec. 511. Carabus ater &c.
Degeer inf. 4. *p.* 82. *n.* 2. Carabus ſubapterus &c.
Geoffr. inf. par. 1, *p.* 143. *n.* 3. Bupreſtis niger &c.
Sulz. hiſt. inf. t. 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 31.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 4. 5.
β) Carabus niger, elytris ſubvireſcentibus convexe punctatis ſtriatisque. *Fn. ſuec.* 512.

γ) Ca-

γ) Carabus purpurascenti-niger, elytris convexe punctatis striatisque. *Fn. suec.* 513.
Hufn. inf. 2. *t.* 3.
Habitat in Europae arvis.

hortensis. 3. C. apterus niger, elytris laevibus, punctis aeneis excavatis triplici serie, margine cyaneo, *Fn. suec.* 783. *Stroem. act. Nidros.* 3. *p.* 401. *t.* 6. *f.* 7. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 300. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 16.
Degeer inf. 4. *p.* 90. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 1. Carabus striatus.
Raj. inf. p. 96. *n.* 2. *List. mut. t.* 8. *f.* 4. Cerambyx purpurea punctata.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 33.
Berg str. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 4. 5.
Habitat in Europae *hortis et silvis, elytrorum punctis interdum concoloribus.*

taedatus. 47. C. apterus niger, elytris sublaevibus fuscis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 17.
Habitat in America *boreali, statura et magnitudine hortensis.*

arvensis. 48. C. apterus nigro-cupreus, elytris striatis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 18.
Habitat in Germania, *statura taedati, at paulo minor.*

calidus. 49. C. apterus niger, elytris crenato-striatis punctisque aureis excavatis triplici serie. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 300. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 19.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

retusus. 50. C. apterus, elytris striatis virescentibus: punctis aeneis excavatis triplici serie, basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 300. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 20.
Habitat ad Patagoniae *littora.*

Maderae. 51. C. apterus ater, elytris basi retusis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 301. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 21.
Habitat in insula Madera.

convexus. 52. C. apterus convexus ater laevis, thorace posterius emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 301. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 22.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Habitat in Germaniae *silvis.*

leucophthalmos. 4. C. elytris laevibus: ſtriis obſoletis octo. *Fn. ſuec.* 784.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 304. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 41.
Carabus elatus ater, elytris ſtriatis, thorace canaliculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 96. *n.* 13. Carabus niger ſtriatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 146. *n.* 7. Bupreſtis ater, elytro ſingulo ſtriis 8 laevibus, pedibus nigris.
Liſt. ſcar. angl. p. 390. *n.* 23. Scarabaeus ex toto niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 9. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 13.
β) Carabus niger. *Schall. Abh. der. hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 315.
Habitat in Europae *quiſquiliis frequens, magnitudine varius, thorace, quam in congeneribus, minore.*

attelaboides. 53. C. apterus ater, thorace anguſtiori, capite poſterius attenuato, elytris ſulcatis truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 42.
Habitat in Coromandel, *magnitudine leucophthalmi.*

trilineatus. 54. C. apterus ater thorace poſterius anguſtato: marginibus albis, elytris albidis: ſutura lineaque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 43. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 71. *f.* 85. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *t.* 47. *f.* 6.
Habitat in Coromandel, *et ad* caput bonae ſpei, *prioribus minor.*

cicindeloides. 289. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato, elytris ovatis planis ferrugineis villoſis: margine albo. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *trilineato affinis, at paulo major, cicindelae facie.*

clathratus. 5. C. apterus nigricans, elytris aeneis porcatis interjectis punctis excavatis longitudinalibus. *Fn. ſuec.* 782.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 302. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 26.
Carabus apterus nigricans, elytris aeneis ſtriatis interjectis punctis excavatis cupreis.
Habitat in Europa.

porcatus. 55. C. apterus ater, elytris ſtriatis apice granulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 302. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 27.
Habitat in nova Hollandia.

reflexus. 56. C. apterus ater, thoracis margine rotundato reflexo, elytris ſulcatis: maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 302. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 28.
Habitat in Coromandel.

57. C.

angulatus. 57. C. apterus hirtus ater, thorace canaliculato, coleoptris fulcatis: fasciis duabus flavis interruptis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 302. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 29.
Habitat in Coromandel, *reflexo affinis.*

nitens. 6. C. apterus, elytris porcatis: striis passim interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. *Fn. suec.* 185.* *It. oel.* 96. *Scop. ent. carn.* 262.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 302. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 30. Carabus apterus, elytris porcatis scabris viridibus: margine aureo.
Degeer inf. 4. *p.* 91. *n.* 6. Carabus aureus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 41.
Habitat in Europae *silvis.*

auratus. 7. C. apterus, elytris porcatis: striis sulcisque laevibus inauratis. *Fn. suec.* 780.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 301. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 23. Carabus apterus, elytris auratis sulcatis, antennis pedibusque rufis.
Degeer inf. 4. *p.* 104. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 20. Carabus sulcatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 142. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Buprestis viridis &c.
Raj. inf. p. 96. *n.* 6. Cerambyx dorso in longas regulas divisо, omnium pulcherrimus.
Schaeff. ic. t. 202. *f.* 4.
Voet coleopt. 1. *t.* 36. *f.* 21.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 8. 9.
Habitat in Europae *locis suffocatis, silvis.*

futuralis. 58. C. apterus, elytris striatis viridibus: futura aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 301. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 24.
Habitat in Terra del fuego.

violaceus. 8. C. alatus, elytris laeviusculis nigris: margine aureo, thorace subviolaceo. *Fn. suec.* 787.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 299. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 5. Carabus alatus niger, thorace elytrorumque marginibus violaceis.
Degeer inf. 4. *p.* 89. *n.* 3. Carabus apterus aeneo-niger nitidus.
Raj. inf. p. 96. *n.* 1. Scarabaeus major e purpura nigricans.
List. scar. angl. p. 389. *n.* 22. Scarabaeus maximus e viola nigricans.

Frisch inf. 13. *t.* 23. Scarabaeus terrestris nigricans.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 1. *et t.* 88. *f.* 1.
Bergstr. nomencl. 1. *p.* 16. *n.* 14. *t.* 2. *f.* 14. *et t.* 10. *f.* 6.
Habitat in Europae *silvis passim.*

purpurascens. 59. C. apterus ater, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 6.
Habitat in Germania, *magnus, violaceo affinis.*

cyaneus. 60. C. apterus niger violaceo-nitens, elytris punctis intricatis rugosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 299. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 7.
Fn. suec. 780. Carabus (intricatus) violaceo-niger, elytris intricatis elevato-striatis punctatisque.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 144. *n.* 4. Buprestis nigro-violaceus, elytris dense striatis.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 30.
Habitat in Europa *boreali, rarior.*

hispanus. 61. C. apterus niger, thorace cyaneo, elytris rugosis aureis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 195. *n.* 8.
Habitat in Hispania, *statura cyanei.*

cephalotes. 9. C. apterus, elytris atris laevibus, thorace exserto oblongo. *Fn. suec.* 788.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 304. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 39. Carabus apterus ater laevissimus, thorace orbiculato convexo.
Frisch inf. 13. *p.* 25. *t.* 22. Scarabaeus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 17. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali.*

laevigatus. 62. C. alatus depressus ater, thoracis angulis posterius rotundatis, thorace elytrisque laevissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 304. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 40.
Habitat in Coromandel, *majusculus, congeneribus magis planus.*

10. C.

Carabi *larvae saepe intra ligna putrida, muscas, terram &c. degunt, imagines vero insectorum, inprimis larvarum leones sunt, cursu festinantes.*

decem-guttatus. 10. C. apterus ater, thorace anguſtato, coleoptris novemſulcatis: punctis decem albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 96.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 299. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 9. *Forſk. Fn. arab. p.* 77. *n.* 4? Carabus ſerrator. *Habitat in* Africa, *maximus.*

ſexguttatus. 63. C. apterus thorace poſterius angulato, elytris laevibus atris: punctis duobus griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 10. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70. *f.* 84. Carabus apterus ater, thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoſo-albis. *Habitat in* Surate.

ſexmaculatus. 64. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato: margine albo, elytris ſubſtriatis: maculis tribus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 11. *Habitat in* Barbaria, *ſexguttato fere duplo major.*

quadriguttatus. 65. C. apterus, thorace poſterius attenuato, elytris ſulcatis: maculis duabus griſeis remotis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 12. *Habitat ad* caput bonae ſpei.

tabidus. 66. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato, elytris rugoſo-ſulcatss. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 13. *Habitat ad* caput bonae ſpei.

variegatus. 67. C. apterus ater, elytris planis laevibus: margine ſinuato punctisque diſci albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 14. *Forſk. ic. anim. t.* 24. *f.* A. Cicindela. *Habitat in* Oriente, *mediae magnitudinis.*

gemmatus. 68. C. apterus niger, elytris ſtriatis: punctis aeneis bilobis excavatis triplici ſerie. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 15. *Habitat* Hamburgi, *ſtatura hortenſis.*

inquiſitor. 11. C. alatus, elytris ſtriatis viridi-aeneis: punctis triplici ordine. *Fn. ſuec.* 789.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 303. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 31. *Roland. act. Stokh.* 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 3. Carabus alatus viridi-aeneus, concave punctatus ſtriatusque, pedibus antennisque nigris.

Degeer inſ. 4. *p.* 94. *n.* 9. Carabus alatus, elytris ſtriatis margine aeneis &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 145. *n.* 6. Bupreſtis elytris latis, ſingulo ſtriis ſedecim.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 39.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 3.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis, elytris rarius totis nigris.*

ſcrutator. 69. C. alatus, elytris ſtriatis viridibus: punctis triplici ſerie, thorace cyaneo: margine reflexo aurato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 303. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 32.
Habitat in Virginia.

reticulatus. 70. C. alatus niger, elytris reticulatis viridi-aeneis, thoracis margine vireſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 33.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine inquiſitoris.*

ſycophanta. 12. C. aureo-nitens, thorace caerulco, elytris aureo-viridibus ſtriatis, thorace ſubatro. *Muſ. Lud. Ulr.* 95.* *Fn. ſuec.* 790.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 303. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 34.
Carabus alatus violaceo-nitens, elytris ſtriatis aureis.
Degeer inſ. 4. *p.* 105. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 19.
Poda inſ. 46.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 144. *n.* 5.
Reaum. inſ. 2. *t.* 37. *f.* 18.
Rob. jun. t. 20. *f.* 2.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 1.
Schaeff. elem. t. 2. *f.* 1.
icon. t. 66. *f.* 6.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 1. 2.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 32.
β) Carabus punctato-ſulcatus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 357. *n.* 12. *t.* 7. *f.* 14.
Habitat in Europa, *maximus europaeorum.*
Larva *nigra, noctu larvas phalaenarum devaſtat.*

indagator. 71. C. apterus ater, thoracis margine rotundato, elytris laeviſſimis, punctis aeneis triplici ſerie. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 35.
Habitat in Barbaria, *ſycophantae propior, quam horteuſi.*

roſtratus. 72. C. apterus, elytris laevibus nigris, thorace anguſtiore, capite anguſtiſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 304. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 36.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 577. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 123. Tenebrio roſtratus.
Habitat

Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria *elytris deflexis ad tenebriones accedens.*

elevatus. 73. C. apterus, thoracis margine rotundato deflexo, elytris violaceis, corpore atro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 37.
Habitat in America *meridionali, magnitudine et statura rostrati.*

unicolor. 74. C. apterus, thoracis margine rotundato reflexo, corpore atro, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, elevato proxime affinis.*

fimbriatus. 75. C. apterus ater, thorace simplici: lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentosis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 70. *f.* 83. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 8. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae spei, *laevis, magnitudine thoracici.*

alacer. 76. C. apterus ater immaculatus, thorace posterius rotundato sulcato. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 70.
Habitat ad caput bonae spei, *fimbriato proxime affinis.*

spinosus. 77. C. apterus ater, elytris octo-sulcatis punctato-rugosis, posterius spinosis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 70.
Voet coleoptr. 1. *t.* 38. *f.* 44. 45.
Habitat ad caput bonae spei, *leucophthalmi magnitudine, glaber.*

lunulatus. 78. C. apterus ater, thorace lunato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 72. *f.* 86.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, magnitudine violacei, at latior et magis depressus.*

difformis. 79. C. apterus ater, thorace transverso posterius truncato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 72.
Habitat in interioribus regionibus pone caput bonae spei *sitis, statura et magnitudine hortensis.*

dorsalis. 80. C. ater, antennis elytrisque rubris: margine nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 73.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, magnitudine fere leucophthalmi.*

obtusus. 81. C. thorace elytrisque fuscis, capite antennis pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 74.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine fere cephalotis, crepitanti similis.*

adſperſus. 82. C. apterus, ſupra viridi-aeneus obſcurus, ſubtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine ſulcisque elevatis.
Degeer inſ. 4. *p. n.* 1. *t.* 3. *f.* 12. Carabus aeneo-punctatus
Voet coleoptr. 1. *t.* 37. *f.* 35.
Habitat in Europae *ſilvis, ſub ceſpite; elytris interdum nigris.*

Herbſtii. 83. C. elytris tranſverſim undulatis: punctorum aureorum ordine triplici. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 131. *n.* 15.
Habitat in Germania, *inquiſitori ſimillimus, ſed major, pollicem longus, nunc vireſcens, nunc niger.*

pomeranus. 84. C. cupreus ſubtus niger, elytris decuſſatim ſtriatis: punctorum elevatorum ſerie triplici. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 132. *n.* 16.
Habitat in Pomerania, *granulato affinis,* 9 *fere lineas longus.*

cylindricus. 85. C. ater cylindricus, thorace anguſtato, medio ſulcato, elytris novemſulcatis: margine exteriori punctato. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 132. *n.* 17. *t.* 29. *f.* 3.
Habitat - - - - ultra 9 *lineas longus.*

problematicus. 86. C. apterus niger caeruleo-nitens, elytris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 177. *n.* 67. *t.* 47. *f.* 5.
Habitat in Auſtria, *cyaneo intricatoque affinis, at brevior et latior.*

nemoralis. 87. C. niger, elytris aeneis: lineolis intricatis ſubrugoſis punctisque excavatis triplici ſerie. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 75. *n.* 809. *Fn. Fridrichsd. p.* 21. *n.* 211.
Habitat in Dania; *an vere diſtincta ſpecies?*

rubicundus. 88. C. apterus, ſubtus niger, thorace violaceo, elytris rubicundis: ſutura atque marginibus albis. *Lepech. it.* 2. *p.* 195. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in Ruſſiae *fiſſuris montium.*

catenulatus. 89. C. elytris porcatis: punctorum triplici ſerie tribus ſtriis elevatis ſcabriuſculis decuſſata. *Scop. ent. carn. n.* 264.
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

atomarius. 228. C. apterus ater glaber, elytris ſublaevibus: punctis minutiſſimis ſparſis confluentibus, marginibusque ſubviolaceis. *Muſ. Leſk. p.* 37. n. 818.
Habitat in Europa.

miliarius. 229. C. apterus ater, elytris marginibus externis violaceo-aeneis punctisque elevatis sparsis. *Muf. Lesk. p.* 37. *n.* 819. *Habitat in* Europa.

rugosus. 230. C. apterus ater, elytris rugosis: rugis alternis confuse fractis. *Muf. Lesk. p.* 37. *n.* 820. *Habitat in* Europa.

aerugino-sus. 231. C. apterus ater, elytris confertim striatis: punctorum impressorum viridium serie triplici. *Muf. Lesk. p.* 37. *n.* 823.

cyprius. 232. C. apterus niger, capite, thorace elytrisque cupreis: his rugis quatuor singulis triplici punctorum elevatorum serie discretis. *Muf. Lesk. p.* 38. *n.* 824. *Habitat in* Europa.

** *minores.*

afer. 90. C. niger, antennis pedibusque rufescentibus, elytris laevibus. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 73. *Habitat ad* caput bonae spei *sub lapidibus montium, magnitudine vulgaris, subtus piceus, oblongus.*

capensis. 91. C. ferrugineus, thorace elytrorumque sutura linea longitudinali nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 75. *f.* 88. *Habitat ad* caput bonae spei, *statura marginati, sed paulo minor, glaber, abdomine nunc nigro, nunc ferrugineo.*

fasciatus. 92. C. ferrugineus fascia elytrorum nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 75. *f.* 89. *Habitat ad* caput bonae spei, *quadrimaculato affinis.*

striatulus. 93. C. niger, thoracis basi utrinque puncto impresso, elytris striatis medio glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 44. *Habitat ad* Patagoniae *littora.*

caligino-sus. 94. C. ater, thorace quadrato laevi, antennis piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 45. *Habitat in* America, *capitis punctis duobus impressis.*

arenarius. 95. C. pallidus, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 46. *Habitat in* Cambriae *arena mobili.*

fabuloſus. 96. C. pallidus, capite coleoptrorumque macula dorſali nigris.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 199. *n.* 47.
Habitat in Saxoniae *fabuletis, arenario affinis.*

ruficornis. 97. C. ater, elytris ſulcatis laevibus, antennis pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 48.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 146. *n.* 8. Bupreſtis niger &c.
Liſt. ſcarab. angl. p. 390. *n.* 24. Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 78. *n.* 843. Carabus curſor.
Habitat in Europae *ſilvis, frequens.*

bicolor. 98. C. ſupra niger, ſubtus ferrugineus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 49.
Habitat in America *boreali.*

flavicornis. 99. C. niger, thoracis margine antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 50.
Habitat Halae Saxonum, *mediae magnitudinis.*

bupreſtoides. 13. C. niger, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piceis.
Habitat in Europa *auſtrali, mediae magnitudinis.*

faſtigiatus. 14. C. ferrugineus, abdomine elytrisque faſtigiatis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 97.*
Habitat ad caput bonae ſpei. Tulbagh.

lividus. 15. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. *Fn. ſuec.* 791.*
Habitat in Europa.

marginatus. 16. C. niger, elytris margine tibiisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 804. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 84.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 41. Bupreſtis viridis, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europa, *aliquando viridis.*

cinctus. 100. C. fuſcus, capite thoraceque viridi-aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 85.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *marginato major.*

pallipes. 101. C. ater, thoracis rotundati coleoptrorumque limbo et pedibus pallidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 86.
Habitat in America, *marginato minor.*

limbatus. 102. C. ſupra ferrugineus, thorace macula, elytris faſciis undatis viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 87.
Herbſt Beſch. der berl. naturf. Geſ. 4. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Germania *ſub lapidibus.*

nitidulus. 103. C. niger, elytrorum margine aeneo nitido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 88.
Habitat in Camtſchatca, *ſtatura et magnitudine cuprei.*

complanatus. 17. C. pallidus, elytris faſciis duabus undulatis nigricantibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 57.
Carabus thorace orbiculato, rufus, elytris faſciis duabus nigris.
Habitat in inſula S. Dominici.

pilicornis. 104. C. thorace rotundato, elytris ſtriatis punctisque impreſſis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 65. *Lesk. it. p.* 18. *t.* A. *f.* 7.
Habitat in Anglia, *nunc niger, nunc aeneus.*

ſpinibarbis. 105. C. cyaneus, thorace orbiculato, ore antennis tibiisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 64.
Habitat in Anglia.

ſexpuſtulatus. 106. C. rufus, elytris nigris: punctis ſex rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 63.
Habitat in America *meridionali.*

bimaculatus. 107. C. niger, faſcia communi flava interrupta, antennis pedibusque teſtaceis. *Mant. p.* 532.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 307. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 62.
Carabus niger, capite elytrisque truncatis puncto baſeos faſciaque media ferrugineis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 34. *f.* 10. 11.
Habitat in India, *thorace mox flavo, mox nigro, mox maculato.*

crepitans. 18. C. thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris.
Fn. ſuec. 272. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 61.

Degeer inſ. 4. *p.* 103. *n.* 22. *t.* 3. *f.* 18. Carabus alatus ferrugineus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 151. *n.* 19. Bupreſtis capite, thorace pedibusque rubris &c.
Rol. act. Stockh. 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 2. Cicindela capite, thorace pedibusque ruſis &c.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 13.
Voet coleoptr. 1. *t.* 36. *f.* 26.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat in Europae *nemoribus, perſequentes carabos majores crepitu ventris pellens.*

fumans. 108. C. ferrugineus, elytris nigro-cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 60.
Habitat in America, *crepitanti affinis, at triplo major.*

lateralis. 109. C. niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 59.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine americani.*

americanus. 19. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 58.
Degeer inſ. 4. *p.* 107. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 21.
Habitat in America, *crepitanti ſimilis, ſed quadruplo major.*

ſpinipes. 20. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus ſpinoſis. *Fn. ſuec.* 793. *Scop. ent. carn.* 267.
Habitat in Europa, *ſuper tritici ſpicas frequens.*

cyanocephalus. 21. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. ſuec.* 794.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 310. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 90.
Fn. ſuec. 525. Carabus capite elytrisque caeruleis, thorace rubro.
Degeer inſ. 4. *p.* 100. *n.* 17. *t.* 3. *f.* 17. Carabus alatus, capite elytrisque viridi-caeruleis &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 149. *n.* 40. Bupreſtis capite elytrisque caeruleis, thorace rubro.
Raj. inſ. p. 89. *n.* 1. Cantharis elytris et capite caeruleis, ſcopulis croceis.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 14.
Habitat in Europae *ſilvis.*

ruficollis. 110. C. thorace obcordato ferrugineo, elytris truncatis ſtriatis viridibus, capite plano atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

111. C.

amethystinus. 111. C. cyaneus, capite thoraceque aeneis nitidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 92.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine cyanocephali.*

flexuoſus. 112. C. niger, elytris ferrugineis: macula media ſinuata punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 311. *n.* 66. *mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 93.
Habitat in India.

melanocephalus. 22. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Fn. ſuec.* 795.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 526. Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 310. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 89. Carabus niger, thorace pedibusque ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 15.
β) *Fn. ſuec.* 524. Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.
Degeer inſ. 4. *p.* 93. *n.* 8. Carabus apterus niger nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 42. Bupreſtis nigro &c.
Habitat in Europae *locis ſuffocatis.*

vaporariorum. 23. C. thorace fuſco, pedibus antennis elytrisque anterius et apice ferrugineis. *Fn. ſuec.* 796.* *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 312. *n.* 76. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 110.
Fn. ſuec. 1. *n.* 529. Carabus ater, elytris antice griſeis.
Müll. prodr. zool. dan. p. 78. *n.* 850. Carabus nigricans, antennis, thorace, pedibus elytrisque antice ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Europa, *frequens, meridiano quadruplo major.*

latus. 24. C. niger, elytris ſtriatis crenatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 521.* *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 308. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 73.
Degeer inſ. 4. *p.* 101. *n.* 18. Carabus alatus niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 7.
Habitat in Europa *frequens.*

abdominalis. 113. C. niger, antennis, abdominis diſco pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 74.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine lati.*

Lineola. 114. C. thorace ſubaequali ferrugineus, elytris lineola nigra. *Fabr. ſp. inf.* 1, *p.* 309. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 75.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

25. C.

ferrugineus. 25. C. ferrugineus, thorace glaberrimo. *Fn. suec.* 798.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 309. *n.* 56. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 76.
Carabus ferrugineus elytris striatis obscurioribus.
Degeer inf. 4. *p.* 101. *n.* 19. Carabus alatus flavo-griseus nitidus &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 162. *n.* 43. Bupreſtis ferrugineo-lividus &c.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 6. c.
Habitat in Europae *arvis.*

pallens. 115. C. pallidus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 77.
Habitat Dresdae, *an ſatis diſtinctus a ferrugineo?*

dorſiger. 116. C. ferrugineus abdomine coleoptrorumque lunula lata nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 78.
Habitat in Barbaria, *ſtatura pallentis.*

germanus. 26. C. cyaneus, capite, pedibus elytrisque teſtaceis, elytris apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 102.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 13.
Habitat in Germania, *interdum niger.*

vulgaris. 27. C. nigro-aeneus, antennis pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 799.* *Scop. ent. carn.* 268. *Fabr. ſp. inſ.* 1, *p.* 308. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 70.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 14. Carabus alatus ſupra viridi-aeneus nitidus &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 158. Bupreſtis fuſco-aeneus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Habitat in Europae *ſilvis frequens.*

azureus. 117. C. cyaneus, antennis pedibusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 508. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 71.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Lipſiae *collibus arenoſis.*

erythrocephalus. 118. C. niger, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 72.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis.*

caeruleſcens. 28. C. nigro-caeruleus, antennis baſi rubris. *Fn. ſuec.* 800.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 308. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 66.
Carabus nigro-caeruleſcens, elytris ſtriatis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 76. *n.* 817. Carabus virens.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 3. 4.
Habitat in Europae *hortis, viis.*

119. C.

lepidus. 119. C. viridi-aeneus, thorace quadrato posterius utrinque bistriato, elytris striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 67. *Lesk. it.* 1. *p.* 17. *n.* 8. *t.* A. *f.* 6.
Habitat in Lusatiae *arenosis*, *magnitudine et statura caerulescentis.*

cupreus. 29. C. cupreus, antennis basi rubris. *Fn. suec.* 801.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 308. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 68.
Degeer inf. 4. *p.* 97. *n.* 13. *t.* 3. *f.* 15. Carabus alatus supra viridi-aeneus &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 161. *n.* 40. Buprestis totus viridi cupreus, antennis nigris.
Habitat in Europae *silvis.*

Carnifex. 120. C. alatus viridi aeneus, antennis pedibusque rufis, thorace angustato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 308. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 69.
Habitat in Terra del fuego.

piceus. 30. C. niger, pedibus antennisque piceis. *Fn. suec.* 802.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 306. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 51. Carabus thorace obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris striatis.
Gron. zooph. 501. Carabus apterus niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali.*

holosericeus. 121. C. holosericeo-niger, capite aeneo nitido. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *statura picei.*

femoralis. 122. C. capite thoraceque aeneis, elytris striatis obscurioribus, femoribus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 53.
Habitat in Sierra Leon Africae.

madidus. 123. C. niger, thorace posterius utrinque impresso, femoribus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 54.
Habitat in Anglia.

binotatus. 124. C. ater, capite punctis duobus frontalibus rubris, antennis basi flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 55.
Habitat Kilonii, *statura et magnitudine ruficornis.*

125. C.

interruptus. 125. C. ater, thorace posterius rotundato abdomineque remotis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 56. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 6. *t.* 29. *f.* 4. a. *Habitat in* Oriente, *an forte tenebrio?*

velox. 31. C. nigricans, pedibus tibiisque pallidis. *Fn. suec.* 803.* *It. gotl.* 207. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 312. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 103. Carabus nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis. *Habitat in* Europae *arena volatili, agilissimus.*

rufescens. 126. C. ferrugineus, thorace rotundato, vertice anoque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 312. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 104 *Habitat in* Anglia.

viridanus. 127. C. viridi-aeneus, elytris ferrugineis: macula communi nigro-aenea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 105. *Habitat in* Germaniae *quisquiliis, statura c. vaporariorum, thorace interdum nigro.*

bipustulatus. 128. C. thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis duabus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 312. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 106. *Habitat in* Anglia.

aequinoctialis. 129. C. flavus, thorace cordato, elytris fuscis: maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 312. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 107. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 6. *t.* 29. *f.* 8. d. *Habitat in* Africa *aequinoctiali, parvus.*

lunatus. 130. C. niger, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris flavis: maculis tribus nigris. *Fabr. syst. ent. p.* 247. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 108. *Habitat in* - - -

prasinus. 131. C. niger, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris macula magna communi posteriore nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 204. *n.* 109. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 74. *f.* 87. Carabus thorace capiteque cyaneis, elytris rubris: postice macula communi fusca. *Habitat* Hafniae *et ad* caput bonae spei, *statura c. vaporariorum, at paulo major.*

32. C.

multipunctatus. 32. C. subaeneus; elytris punctis vagis plurimis impressis. *Fn. suec.* 805.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 309. *n.* 58. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 79.
Habitat in Europae *fabulosis.*

hafniensis. 132. C. niger, elytris striatis: punctis dorsalibus plurimis impressis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 80.
Habitat Hafniae, *mediae magnitudinis.*

aeneus. 133. C. ferrugineus, thorace elytrisque aeneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 309. *n.* 59. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 81.
Habitat in Lipsiae *hortis.*

nigricornis. 134. C. niger, thorace cupreo elytris striatis viridibus, pedibus piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 82.
Habitat in Dania, *statura sexpunctati, at paulo major.*

bipunctatus. 33. C. subaeneus, elytris punctis duobus impressis. *Fn. suec.* 806.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 313. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 121. Carabus aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis.
Habitat in Europae *quisquiliis.*

angustatus. 135. C. thorace cylindrico cyaneo, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 122.
Habitat in Germania, *parvus, an hujus generis?*

quadripustulatus. 34. C. capite ferrugineo, thorace atro, elytris maculis duabus flavis. *Fn. suec.* 811.*
Habitat in Europa.

sexpunctatus. 35. C. subaeneus, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Fn. suec.* 807.*
Fn. suec. 1. *n.* 519. Carabus nitens, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 309. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 83. Carabus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.
Degeer inf. 4. *p.* 99. *n.* 16. Carabus alatus, capite thoraceque viridi-aureis &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 149. *n.* 14. Buprestis nitens, capite thoraceque viridibus &c.
Goed. inf. 2. *p.* 126. *t.* 31.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 4.
Voet coleoptr. 1. *t.* 33. *f.* 4.
Habitat in Europa *et boreali* America.

meridianus. 36. C. niger, elytris anterius pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 111.
Habitat in Europa, *parvus.*

Comma. 136. C. niger, thorace fuſco, elytris griſeis: macula lineari nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 112.
Habitat in America.

teſtaceus. 37. C. pallide teſtaceus, elytris glabris. *Fn. ſuec.* 812.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 313. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 119.
Carabus capite thoraceque ferrugineis, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 153. *n.* 25. Buprestis teſtaceus, capite nigro.
Habitat in Europa.

abbreviatus. 137. C. thorace rotundato rufo, elytris abbreviatis teſtaceis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 313. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 20.
Habitat in Norwegiae *rupibus.*

uſtulatus. 38. C. thorace nigro, elytris obſcuris pallido-bifaſciatis. *Fn. ſuec.* 810. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 115.
Fn. ſuec. 528. Carabus niger, coleoptris pone faſcia ferruginea; lateribus macula ferruginea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 151. *n.* 20.
Voet coleoptr. 1. *t.* 34. *f.* 7.
Habitat in Europae *quibuſdam, maculis interdum magnis obſoletis rubro-pallidis varius.*

kilonienſis. 138. C. thorace rotundato nigro, coleoptris pallidis: macula magna dorſali nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 116.
Habitat Kilonii, *parvus.*

Crux major. 39. C. thorace capiteque nigro-rubeſcente, coleoptris ferrugineis: cruce nigra. *Fn. ſuec.* 808.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 311. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 94.
Carabus thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis rubris, cruce nigra.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 150. *n.* 18.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 13.
Habitat in Europae *ſilvis.*

vittatus. 139. C. thorace marginato rufo, elytris atris: vitta alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

140. C.

turcicus. 140. C. thorace orbiculato rufo, elytris nigris: lunula baſeos pallida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 96.
Habitat - - - *ſtatura et magnitudine vittati.*

haemorrhoidalis. 141. C. thorace ſuborbiculato, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 97.
Habitat Dresdae, *rufus.*

picipes. 142. C. ater nitidus, thorace rotundato, elytris fuſcis, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 98.
Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, agilis.*

agilis. 143. C. rufus, thorace rotundato, elytris abdomineque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 99.
Habitat Upſaliae, *ſtatura vittati.*

Crux minor. 40. C. thorace luteo glabro, elytris poſterius nigris: maculis duabus flavis. *Fn. ſuec.* 809.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 311. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 100.
Carabus thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, macula rufa.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 8. *et t.* 41. *f.* 13.
Habitat in Europa, *praeſertim* Anglia.

Andreae. 144. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: faſcia media nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 101.
Habitat in Italia, *ſtatura c. crucis minoris.*

quadrimaculatus. 41. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtuſiſſimis fuſcis: maculis duabus albis. *Fn. ſuec.* 813.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 113.
Fn. ſuec. 1. *n.* 532. Carabus niger, thorace ferrugineo, elytrorum maculis 4 lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 152. *n.* 24. Buprestis niger, thorace plano ferrugineo &c.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europae *quisquiliis.*

quadriguttatus. 145. C. thorace rotundato atro, elytris nigris: punctis quatuor albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 114.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 9. c.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. C. flavus, capite nigro, elytris obtusissimis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 313. *n.* 82. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 117.
Carabus thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis, capite atro.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 6. *t.* 29. *f.* 10. ♀?
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 146. C. capite rotundato aeneo, elytris nigris: macula apicis pallida. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 313. *n.* 83. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 118. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 76.
Habitat in Norwegia, *sub arborum corticibus, in* Suecia, *et ad* caput bonae spei, *pediculo duplo major.*

truncatellus. 43. C. niger, supra aeneus, elytris apice subtruncatis. *Fn. suec.* 814.*
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 206. *n.* 123. Carabus thorace rotundato, supra obscure aeneus, subtus ater.
Habitat in Europae *quisquiliis, parvus.*

Thunbergii. 147. C. elytris testaceis: macula communi violacea, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 20. *n.* 34.
Habitat Upsaliae, *caerulescentis magnitudine, c. vaporariorum affinis.*

upsaliensis. 148. C. elytris viridibus striatis, thorace plano aeneo punctato. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 20. *n.* 35.
Habitat Upsaliae, *vulgaris magnitudine, cupreo affinis, at thorace punctato distinctus.*

fericeus. 149. C. ater, capite thorace et elytris viridi-nitentibus, antennis pedibusque rufis. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 58. *n.* 58.
Habitat in America *septentrionali, spinipede paulo major.*

lineatus. 150. C. thorace ferrugineo; pedibus elytrisque griseis: suturae linea communi alteraque media nigra, tarsis nigris. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 59. *n.* 59.
Habitat in America *septentrionali, magnitudine crucis minoris.*

marchicus. 151. C. subtus niger, capite thoraceque caesiis, palpis antennisque fuscis basi ferrugineis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 6. *p.* 137. *n.* 38.
Habitat Berolini, *germano affinis.*

Schranckii. 152. C. viridi-aeneus, abdomine nigro, pedibus antennisque pallide rufis. *Schranck inf. austr. p.* 213. *n.* 401.
Habitat in Germania, 5 *lineas longus.*

153. C.

indicus. 153. C. niger, antennis apice griſeis, thorace linea impreſſa, elytris ſeptemſulcatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 40. *t.* 29. *f.* 11.
Habitat in India, 9 *lineas longus.*

ſplendidus. 154. C. fuſcus, capite thoraceque viridi-aeneis, pedibus pallidis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 41.
Habitat in India, *cincto proxime affinis, an ſatis diſtinctus?*

marginellus. 155. C. piceus, pedibus ſpinuloſis, antennis thoracisque margine flaveſcentibus, elytris octoſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 42.
Habitat in India, *anguſtus*, 7½ *lineas longus.*

Friſchii. 156. C. niger, thoracis ſulco unico medio, elytrorum octo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 43.
Habitat Berolini, 8-9 *lineas longus, oculis albis.*

varius. 157. C. ſupra nigro-aeneus ſubtus niger, corpore ovato brevi, thorace convexo, elytris laevibus, antennis baſi ruſis. *Degeer inſ.* 4 *p.* *n.* 15.
Habitat in Europa, 3 *circiter lineas longus.*

Herbſtii. 158. C. niger, antennis thoracisque glaberrimi margine anteriori ferrugineis, pedibus piceis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 138. *n.* 45.
Habitat Berolini.

Mülleri. 159. C. aeneo-niger, elytris punctato-ſtriatis: punctis tribus impreſſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 46.
Müll. zool. dan. prodr. n. 842. Carabus ſexpunctatus.
Habitat in Europa, 3 *lineas longus.*

obſcurus. 160. C. niger, ſubtus badius, elytris fuſcis: ſtriis 8 punctatis, antennis pedibusque luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 47. *t.* 29. *f.* 12. g.
Müll. zool. dan. prodr. n. 819.
Habitat in Europa.

Pelidnus. 161. C. niger, thorace orbiculato, elytris ſordide luteis octoſtriatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 48.
Habitat Berolini.

hungaricus. 162. C. ex fuſco ruſus, elytris ſtriatis, thorace rotundato. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 103. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 139. *n.* 49.
Habitat in Hungaria *et* Germania, *vix ultra* 2 *lineas longus.*

aterrimus. 163. C. totus ater nitidus, thorace rotundato, elytris obsolete striatis: punctis quatuor ad suturam excavatis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 140. n. 50. t. 29. f. 13.*
Habitat Berolini, *statura multipunctati, at major, sex lineas longus.*

terricola. 164. C. niger, subtus fuscus, elytris caeruleis: striis novem punctatis; extima crenata. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 140. n. 51. t. 29. f. 14.*
Habitat Berolini, 7-8 *lineas longus.*

platys. 165. C. totus niger, thorace submarginato, elytris glabris obsolete striatis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 140. n. 52.*
Habitat Berolini, *lato proxime affinis, at latior.*

Aethiops. 166. C. totus niger nitidus. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 141. n. 53.*
Habitat Berolini, *vulgari affinis, an propria species?* 5-6 *lineas longus.*

Virgo. 167. C. niger, antennis pedibusque fuscis, thorace posterius sinuato, elytris obsolete striatis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 141. n. 54.*
Habitat Berolini, *vulgari similis*, 3 *lineas longus.*

glaber. 168. C. niger nitidus, elytris fuscis striatis, ore palpis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 141. n. 55.*
Habitat Berolini, *vulgari affinis, sed angustior.*

globosus. 169. C. niger, thorace hemisphaerico, elytris punctato-striatis, ore palpisque ferrugineis, antennis basi fulvis submoniliformibus. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 142. n. 58. t. 29. f. 17. k.*
Habitat Berolini, *vix sesquilineam longus, an hujus generis?*

chalcos. 170. C. aeneus subtus niger, antennis basi ferrugineis, thorace punctato, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 142. n. 59.*
Habitat Berolini, $2\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

micros. 171. C. badius, elytris punctato-striatis, oculis nigris. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 142. n. 60.*
Habitat Berolini 2 *lineas longus.*

172. C.

lampros. 172. C. nitens glaberrimus aeneo-niger, subtus niger, elytris punctato-striatis, antennis griseis, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 143. n. 61.*
Habitat Berolini, *ad ripas humidas, chalco affinis, at minor, 1½ lineas longus.*

pyropus. 173. C. ater nitens, thoracis margine elevato, antennis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 143. n. 62.*
Habitat Berolini, *statura lati, 4 lineas longus.*

mixtus. 174. C. luteus, capite nigro, elytris posterius nigro irroratis. *Herbst apud Fuesslı arch. inf. 6. p. 143. n. 63.*
Habitat Berolini, *2 lineas longus.*

Geerii. 175. C. supra niger, subtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque fulvis. *Degeer inf. 4. p. 102. n. 20.*
Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 840? Carabus bimaculatus.
Habitat in Europa.

didymus. 176. C. ex nigro caeruleus, elytris flavis: macula didyma fusca. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 849.*
Habitat in Dania.

minimus. 177. C. thorace subnigro, elytris striatis pedibus antennisque fuscis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p. 21. n. 212. zool. dan. prodr. p. 77. n. 833.*
Habitat in Dania, *herbariis quoque infestus, vix pediculi magnitudine.*

flavus. 178. C. flavus, elytris striatis, capite, thorace maculaque apicis elytrorum viridi. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 846.*
Habitat in Dania.

fenestratus. 179. C. niger, elytris fuscis: maculis obliquis flavis fenestratis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 812.*
Habitat in Dania.

inflexus. 180. C. niger, tibiis tarsisque piceis, elytris punctorum impressorum serie flexuosa. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 814.*
Habitat in Dania.

fulvipes. 181. C. niger, elytris aeneis, pedibus antennisque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 816.*
Habitat in Dania.

nigricans. 182. C. ater, elytris, antennis, palpis pedibusque piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 819.*
Habitat in Dania.

celer. 183. C. piceus, capite thorace elytrisque ſtriatis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 76. n. 823. act. nidroſ. 4. p. 32.*
Habitat in Scandinavia.

caeruleus. 184. C. niger, elytris cyaneis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 827.*
Habitat in Dania.

ſimilis. 185. C. niger, thorace poſterius utrinque excavato, elytrorum ſtriis ſubpunctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 828.*
Habitat in Dania.

aeſtivus. 186. C. flavus, capite ferrugineo, thorace elytrisque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p. 77. n. 832.*
Habitat in Dania.

flexilis. 187. C. flavicans, capite nigro, elytris lividis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 837. act. nidroſ. 4. p. 30.*
Habitat in Scandinavia.

laevis. 188. C. aeneus, capite thoraceque viridi, elytris cupreis, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 841.*
Habitat in Dania.

vernalis. 189. C. niger, antennis palpis pedibusque flavis, elytris ſtriato-punctatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 847.*

pullus. 190. C. niger, elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 848.*
Habitat in Dania.

ater. 191. C. ater, elytris ſtriatis, unguibus ſubferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 78. n. 851.*
Habitat in Dania.

diſcolor. 192. C. ater, ſubtus rufus, elytris mollibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 79. n. 857. act. nidroſ. 4. p. 31.*
Habitat in Europa *boreali.*

aurichalceus. 193. C. flaveſcens ſupra aeneus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 79. n. 859.*
Habitat in Dania.

194. C.

fulvicornis. 194. C. niger glaber, elytris ſtriatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 826.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 147. *n.* 9. Bupreſtis niger.
Degeer inſ. 4. *p.* 95. *n.* 10. Carabus niger ruficornis.
Habitat in Europa.

leproſus. 195. C. caeruleus, antennis baſi pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: maculis binis albis.
Pontopp. Naturg. Dinnem. p. 211. *t.* 16. Carabus quadriguttatus.
Habitat in Dania.

Inderienſis. 196. C. obſcure viridis, ſubtus ater, pedibus teſtaceis, elytris ſtriatis: margine laterali ex griſeo lutescente. *Pall. it.* 1. *app. n.* 39.
Habitat circa lacum Sibiriae Inderienſem, *paulo major.*

pictus. 197. C. depreſſus teſtaceus, elytris ſtriatis pedibusque griſeis.
Pallas it. 1. *app. n.* 40.
Habitat in Sibiriae *campis aridiſſimis ſub cadaveribus torrefactis.*

elegans. 198. C. thorace lineari elytra aequante, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n.* 269.
Habitat in Carniolia.

metallicus. 199. C. ſupra aeneus nitens, thorace lateribus connivente, antennis baſi fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 270.
Habitat in Carniolia.

cordatus. 200. C. thorace inverſe cordato. *Scop. ent. carn. n.* 271.
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

junceus. 201. C. corpore ſublineari, thorace pone anguſtiori. *Scop. ent. carn. n.* 272.
Habitat in Carniolia *et* Helvetia.

Scopolii. 202. C. aeneo-viridis, elytris teſtaceis: margine toto faſciaque fuſcis. *Scop. ent. carn. n.* 275.
Habitat in Carniolia.

ſalicinus. 203. C. niger punctatus, elytris fuſcis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n.* 276.
Habitat in Carnioliae *ſalice cuprea.*

arenoſus. 204. C. aeneo-fuſcus, thorace ſubrotundo pone dentato, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n.* 277.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *arena.*

lucidus. 205. C. niger nitens, elytris pedibusque teſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat. 5. p.* 108. *n.* 104.
Habitat in Hungaria, *parvus.*

octoſtriatus. 206. C. viridis punctatus, elytris octoſtriatis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 147. *n.* 11. Bupreſtis &c.
Habitat in Gallia.

nitidus. 207. C. viridi-nitens, elytris octoſtriatis: punctis tribus impreſſis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

viridis. 208. C. viridis, elytris octoſtriatis, anterius et margine fulvis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

aeruginеus. 209. C. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo: punctis duodecim. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 149. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

nobilis. 210. C. niger, thorace atro, elytris rubris: cruce nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 150. *n.* 17.
Habitat in Gallia.

ſtrigoſus. 211. C. niger, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 152. *n.* 22.
Habitat in Gallia, *an vere diverſus a quadrimaculato?*

nigricollis. 212. C. totus niger, elytris ſtriatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 152. *n.* 23.
Habitat in Gallia, *an varietas quadriguttati?*

octomaculatus. 213. C. niger, elytris ſtriatis: maculis octo lividis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in Gallia.

minutulus. 214. C. totus niger laevis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

variegatus. 215. C. cupreo viridique variegatus: punctis quatuor impreſſis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 157. *n.* 32.
Habitat in Gallia.

tenebrioides. 216. C. ater, thorace lato, elytrorum ſtriis punctatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 159. *n.* 34.
Habitat in Gallia.

217. C.

laticollis. 217. C. totus viridis, thorace lato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 159. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

lugubris. 218. C. ater opacus, palpis antennisque fulvis, tibiis tarsisque ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 820. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 160. *n.* 37. Bupreſtis lugubris.
Habitat in Europa.

pubeſcens. 219. C. niger tomentoſus, elytris ſtriatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 825. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 160. *n.* 38. Bupreſtis nigro-ſericeus.
Habitat in Europa.

fuſcipes. 220. C. ater laevis, pedibus antennarumque baſi ferrugineis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 161. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

fuſcus. 221. C. fuſcus, elytris ſtriatis, corpore ſubtus rufeſcente, pedibus antennisque ferrugineis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 96. *n.* 11. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 830? Carabus fulvus. *Schaeff. ic. t.* 18. *f.* 7.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

verſicolor. 222. C. aeneus, corpore ovato brevi ſupra nigro-aeneo, ſubtus nigro, thorace convexo, elytris laevibus, antennis baſi rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 98. *n.* 15.
Müll. zool. dan. prodr. p. 77. *n.* 824. Carabus varius.
Habitat in Europa, *parvus.*

ſubſtriatus. 223. C. niger nitidus, elytris ſubſtriatis: punctis quatuor impreſſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 102. *n.* 21.
Habitat in Europa, *inter minimos hujus generis.*

penſylvanicus. 224. C. rufo-fuſcus, capite obſcuro, elytris ſtriatis, corpore ſubtus, antennis pedibusque teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 108. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 22.
Habitat in Penſylvania, 7 *lineas longus.*

halenſis. 225. C. niger, elytris ſtriatis verſus thoracem ferrugineis, antennis pedibusque teſtaceis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 317.
Habitat rarior Halae Saxonum *in locis humidis ſub lapidibus, ruficornis magnitudine, ſed magis oblongus.*

Schalleri. 226. C. ater laevis, elytris ſtriis ſubtiliſſimis punctatis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 318.
Habitat Halae Saxonum, *in viis inter agros, cuprei ſtatura et magnitudine.*

triſtis. 227. C. niger, elytris ſtriatis thoraceque ſcabris opacis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 318.
Habitat rarior Halae Saxonum, *in viis campeſtribus, cuprei ſtatura et magnitudine.*

quinque-lineatus. 233. C. ater, thorace lateribus rotundato poſterius truncato: linea dorſali et utrinque lineola baſeos duplici impreſſa, elytris rugoſis, rugarum quinque interiorum apice cum ſexta confluente. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 836.
Habitat in Europa.

tricolor. 234. C. nigro-ferrugineus, capite, antennarum baſi thoraceque nigris, antennis cinereis glabris, elytris depreſſis ſtriatis apice truncatis thoracisque marginibus externis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 837.
Habitat in Europa.

confluens. 235. C. ater, thorace lateribus rotundato, elytris ſtriatis: rugis prima et octava, ſecunda et ſeptima apice unitis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 843.
Habitat in Europa.

holoſericeus. 236. C. ater, capite thoraceque nigris, elytris fuſcis holoſericeis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 844.
Habitat in Europa.

trichrous. 237. C. niger, antennis pedibusque ferrugineis, elytris leviſſime ſtriatis, capite thoraceque aeneis: hujus linea dorſali et poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 845.
β) Carabus antennis baſi rubris. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 861.
γ) Carabus ater. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 880.
δ) Carabus niger. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 888.
Habitat in Europa.

pullus. 238. C. nigro-ferrugineus, elytris ſtriatis, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 846.
Habitat in Europa.

239. C.

quadratus. 239. C. thorace ſubquadrato: linea dorſali et poſterius utrinque lineola impreſſa, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 848. *et* 860.
Habitat in Europa.

plicatus. 240. C. ater, thorace ſuborbiculato poſterius utrinque plicato, elytris rugoſis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 849.
Habitat in Europa.

picatus. 241. C. piceus, elytris atris ſtriatis, thoracis linea dorſali et poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis: interna altiore. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 850.
Habitat in Europa.

emarginatus. 242. C. ater, thorace ſubquadrato, poſterius truncato, elytris ſtriatis apice emarginatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 851.
Habitat in Europa.

chalybeus. 243. C. niger, capite thoraceque aeneis, elytris aeneo-nigris ſtriatis: marginibus externis vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 852.
Habitat in Europa.

erythroceras. 244. C. niger, thorace ſubquadrato ad latera rotundato, elytris ſtriatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 853.
Habitat in Europa.

concolor. 245. C. niger, thorace ſubquadrato, elytris atris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 854.
β) Carabus niger, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 866.
Habitat in Europa.

erythropus. 246. C. niger, thorace poſterius quadrato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 859.
β) Carabus elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 875.
Habitat in Europa.

crenatus. 247. C. niger, elytris ſtriatis punctato-crenatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 862.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 248. C. ſupra niger, ſubtus ferrugineus, thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 865.
Habitat in Europa.

249. C.

rubricornis. 249. C. niger, antennis rubris, thorace posterius truncato: linea dorsali impressa. *Muf. Lesk. p.* 29. *n.* 868.
Habitat in Europa.

punctulatus. 250. C. niger, elytris punctulorum minimorum ordine notatis. *Muf. Lesk. p.* 39. *n.* 869.
β) Carabus elytrorum punctis sex impressis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 881.
Habitat in Europa.

bispinosus. 251. C. niger, thorace posterius truncato, tibiis anticis crassis bispinosis. *Muf. Lesk. p.* 39. *n.* 870.
Habitat in Europa.

erythromelas. 252. C. niger, antennis tibiisque ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 39. *n.* 871.
β) Carabus thorace posterius truncato, elytris striatis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 873.
Habitat in Europa.

glaber. 253. C. niger glaber, thorace posterius truncato utrinque impresso, elytris striatis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 872.
Habitat in Europa.

viridans. 254. C. nigro virescens, antennis pedibusque rufis, elytris striatis: rugis planis levissime punctatis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 874.
Habitat in Europa.

multicolor. 255. C. niger, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-caerulescentibus lutescente-villosis, ore antennarum basi pedibusque rufis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 876.
Habitat in Europa.

obfuscatus. 256. C. fuscus, thorace posterius truncato, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 877.
Habitat in Europa.

moestus. 257. C. niger, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 879.
Habitat in Europa.

discolor. 258. C. niger, thorace posterius truncato: linea dorsali punctisque utrinque impressis, elytris striatis margine virescentibus, antennis ferrugineis basi rufis. *Muf. Lesk. p.* 40. *n.* 882. 883.
Habitat in Europa.

259. C.

exciſus. 259. C. ferrugineus glaber, thorace anterius truncato, poſterius exciſo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 884.
Habitat in Europa.

limbatus. 260. C. niger, thorace marginato poſterius plicato, elytris ſtriatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 885.
Habitat in Europa.

truncatus. 261. C. niger, thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis, pedibus fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 886.
Habitat in Europa.

chloromelas. 262. C. niger, ſupra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 887.
Habitat in Europa.

ſinuatus. 263. C. niger, elytris ſtriatis apice ſinuatis, antennis baſi rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 889.
Habitat in Europa.

pallidicornis. 264. C. niger, elytris ſtriatis, thorace poſterius truncato: marginibus externis, antennis pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 892.
Habitat in Europa.

aurichalceus. 265. C. nigro-aeneus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 894.
Habitat in Europa.

rotundatus. 266. C. niger, ſupra aeneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 897.
Habitat in Europa.

lituratus. 267. C. piceus, capite, pedibus ſtriatisque elytris teſtaceis: macula ad apicem communi magna thoraceque violaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 899.
Habitat in Europa.

truncatus. 268. C. ater thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis tibiarum baſi plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 901.
β) Carabus piceus, tibiis totis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 903.
γ) *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 910.
Habitat in Europa, *antennis rufis, femoribus fuſcis.*

269. C.

ferrugi-nosus. 269. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 904.
β) Carabus capite nigro. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 918.
Habitat in Europa.

denigra-tus. 270. C. niger, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus compreſſis ſupra nigris. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 905.
Habitat in Europa.

cylindri-cus. 271. C. teſtaceus cylindricus, capite nigro, thorace orbiculato rufo. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 909.
Habitat in Europa.

geniculatus. 272. C. niger, thorace ſuborbiculato, elytris pedibusque teſtaceis: geniculis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 911.
Habitat in Europa.

quadrigut-tatus. 273. C. niger, thorace orbiculato, elytris fuſco-caeruleis: guttis quatuor pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 916.
Habitat in Europa.

ſexpunctatus. 274. C. nigro-aeneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis: punctis ad ſuturam impreſſis aeneis trium parium. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 917.
Habitat in Europa.

porphyropus. 275. C. piceus, thorace truncato, elytris ſtriatis, antennis tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 920.
Habitat in Europa.

fuſcicornis. 276. C. niger ſupra aeneus, thorace rotundato punctato, elytris crenato-ſtriatis, antennis fuſcis, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 921.
Habitat in Europa.

atratus. 277. C. niger, thorace orbiculato, elytris pallidis nigro-variis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 924.
Habitat in Europa.

triſpinoſus. 278. C. niger, capite thoraceque orbiculato aeneis, elytris ferrugineo-aeneis ſtriato-punctatis, pedibus rufis: femoribus craſſis, tibiis triſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 925.
Habitat in Europa.

279. C.

moeſtus. 279. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, capite fuſco, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 926.
Habitat in Europa.

lepidus. 280. C. ſupra aeneo-viridis, ſubtus caeruleſcens, thorace ſubquadrato poſtice ſtriis quatuor impreſſis, tibiis anticis apice dilatatis. *Lesk. it. p.* 17. *t.* A. *f.* 6.
Habitat in Luſatiae *monte* Keulenberg, 6 *lineas longus, vulgari affinis.*

214. TENEBRIO.

Antennae moniliformes: articulo ultimo ſubrotundo. *Thorax* plano-convexus, marginatus. *Caput* exſertum. *Elytra* rigidiuſcula.

* *palpis ſex filiformibus: tibiis anterioribus foſſoriis, palmato-dentatis.* Scaritae Fabricii *et* Pallaſii.

complanatus. 13. T. ater, thorace ſubquadrato, elytris laeviſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

marginatus. 14. T. ater, thorace ſubquadrato, elytris ſulcatis: margine cyaneo. *Fabr. mant. inſ.* 1, *p.* 206. *n.* 2.
Habitat in Cayenna, *an varietas depreſſi?*

giganteus. 15. T. ater, mandibulis ſulcatis, elytris laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſubterraneo proxime affinis, at triplo major.*

ſubterraneus. 16. T. ater, capite anterius ſulcato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 4.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *p.* 133. *n.* 18. *t.* 29. *f.* 4. a. Carabus interruptus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.

cyaneus. 17. T. cyaneus glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

7. T.

Foſſor. 7. T. piceus. *Fn. ſuec.* 817. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 314. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 350. *n.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. Attelabus Foſſor.
Habitat in Europae *collibus arenoſis, quos perforat.*

Curſor. 8. T. fuſcus, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis. *Fn. ſuec.* 818.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 314. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 7. Scarites teſtaceus, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 74. *n.* 798. Tenebrio fuſcus.
Habitat in Europae *collibus arenoſis, pediculi longitudine.*

arabs. 10. T. niger, thorace ſerrato, antennis pedibusque teſtaceis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 314. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 8.
Habitat in Oriente.

minutus. 12. T. niger, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 315. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 9. Scarites piceus, antennis clavatis.
Habitat in Sueciae, *duplo major in* Saxoniae *ſabuletis; an hujus generis?*

collaris. 19. T. niger, elytris punctato-ſtriatis et capite fuſcis, antennis pedibusque piceis: anterioribus ſpinoſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 56. *t.* 29. *f.* 15.
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longus.*

bucephalus. 20. T. totus fuſcus punctatus, oculis nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 57. *t.* 29. *f.* 16. i.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

** *palpis inaequalibus filiformibus*, Scaurus Fabricii.

atratus. 21. T. totus ater glaber. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 1 *mant. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 1.
Habitat in Aegypto, *elytris connatis, pedibus anterioribus bidentatis.*

*** *palpis quatuor, anterioribus ſubclavatis, poſterioribus filiformibus*, Tenebriones Fabricii, Mylarides Pallaſii.

laminatus. 22. T niger, thorace ſubquadrato laevi, elytris ſulcatis, tibiis anterioribus incurvis apice lamina ferruginea acutis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 211. *n.* 1.
Habitat in India, *maximus ſui generis.*

1. T.

Gigas. 1. T. ater, elytris ſtriatis, thorace laevi. *Amoen. ac. 6. p. 396. n. 26.*
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. p. 37. t. C. f. 1. Mylaris gigantea.
Habitat Surinami, *lucani cervi magnitudine, antennis ſubclavatis.*

punctatus. 23. T. niger, thorace quadrato: marginibus ſubdenticulatis, elytris ſtriato-punctatis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 211. n. 2.*
Habitat in India, *magnus, palpis ſecuriformibus.*

ſerratus. 24. T. ater glaber, elytris ſtriatis, tibiis poſterioribus ſerratis.
Fabr. ſp. inſ. 1. p. 322. n. 1. mant. inſ. 1. p. 211. n. 3.
Habitat in Sierra Leon Africae.

Molitor. 2. T. totus niger, femoribus anterioribus craſſioribus. *Fn. ſuec. 875. Scop. ent. carn. 259.*
Fn. ſuec. 547. Mordella antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoſo.
Fabr. ſp. inſ. 1. p. 322. n. 2. mant. inſ. 1. p. 211. n. 4. Tenebrio oblongus piceus, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. p. 349. n. 6. Tenebrio atra oblonga &c.
Degeer inſ. 5. p. 34. n. 3. t. 2. f. 4. Tenebrio elatus nigro fuſcus &c.
Raj. inſ. 4. (larva) Vermis farinarius.
Friſch inſ. 3. p. 1. t. 1.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. f. 52.
Schaeff. ic t. 66. f. 1.
Habitat in farina piſtorum, molendinis, pane ſicco, ſaccharato.
Larva *pallida, glabra, ſegmentis 13, mollis, luſciniis gratiſſimus cibus.*

luridus. 26. T. niger, pedibus fuſcis. *Fabr. mant. 1. p. 211. n. 5.*
Fabr. ſp. inſ. 1. p. 325. n. 9. Helops luridus.
Habitat in Braſilia.

chalybeus. 3. T. violaceus, pedibus antennisque piceis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 323. n. 4. mant. inſ. 1. p. 211. n. 7.*
Degeer inſ. 5. p. 53. n. 4. t. 13. f. 11. Tenebrio aeneus.
Habitat in Guinea.

mauritanicus. 4. T. niger, ſubtus piceus, thoracis marginibus anterius poſteriusque dente angulatis.
Habitat Algiriae, *chalybeo ſimilis, at quintuplo minor, pedibus antennisque piceis.* Brander.

variegatus. 27. T. oblongus, fuſco cinereoque varius. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 323. *n.* 5. *mant. iuſ.* I. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *fuſcus*, *pilis griſeis varius.*

abbreviatus. 28. T. ovatus ater, elytris ſtriatis capite tuberculato. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 323. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 211. *n.* 9.
Habitat in India.

capenſis. 30. T. ovatus niger, elytris ſtriatis, tibiis anterioribus dentato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, *an forſan primae tribus?*

cornutus. 31. T. thoracis bicornis marginibus crenatis angulisque prominulis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 324. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 11.
Habitat Smirnae.

ſanguinipes. 32. T. ater, antennis pedibusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 12.
Habitat in nova Hollandia.

bupreſtoides. 33. T. ater, thorace ovali marginato, elytris connatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 13.
Pall. it. 2. *p.* 719. *n.* 44.
Habitat ad caput bonae ſpei, *caraboidi proxime affinis*, *at major.*

dermeſtoides. 34. T. ater, thorace ovali marginato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 14.
Habitat Halae Saxonum, *bupreſtoidi affinis.*

culinaris. 5. T. ferrugineus, elytris ſtriatis, clypeo emarginato. *Fn. ſuec.* 816. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 212. *n.* 15.
Fn. ſuec. 546. Mordella ferrugineo rufa, thorace antice depreſſo.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 2.
Habitat in Hiſpaniae *arena mobili*, *in* Sueciae *quiſquiliis*, *et frumentorum acervis.*

barbarus. 6. T. ater glaberrimus, thorace orbiculato, capitis clypeo anterius margine elevato.
Habitat

Tenebriones et Pimeliae *in locis ſuffocatis, umbroſis, quisquiliis potiſſimum in terra ipſa, larvae ibidem, in ligno, farina, aliisque cibariis degunt.*

Habitat in Mauritania, *nitidus, carabi mediocris magnitudine, elytris connatis.* Brander.

erraticus. 9. T. niger, antennis thorace ſubòrbiculato elytrisque ferrugineis, his apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 819.*
Habitat in Europa.

pallens. 10. T. pallide teſtaceus, thorace tranſverſo. *Fn. ſuec.* 820.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *parvus.*

ferrugineus. 35. T. ferrugineus, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 17.
Habitat in Africa *aequinoctiali, pallente minor et magis depreſſus.*

villoſus. 36. T. fuſcus cinereo-villoſus, elytris laevibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 18.
Habitat in Europae *quiſquiliis, parvus.*

caraboides. 25. T. niger, thorace ovali marginato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 25. *Fn ſuec.* 825. Tenebrio apterus, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.
Fn. ſuec. 595. Tenebrio ater, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 13. Carabus coadunatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 64. *n.* 5. Platycerus fuſcus, elytris ſtriatis.
Habitat in Europae *quiſquiliis.*

brunnipes. 37. T. ater glaber nitidus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 20.
Habitat Dresdae, *parvus.*

laevigatus. 29. T. oblongus ater, elytris laeviuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio apterus niger laevis, elytris laevibus, thorace lunato ſubtus caeruleus.
Habitat in Africa *aequinoctiali, molitore paulo minor.*

gibboſus. 38. T. ſubovatus totus aeneus, elytris gibboſo-convexis: ſtriis tenuiſſimis crenulatis. *Pall. ic. inſ. Roſſ* 1. *p.* 38. *t.* C. *f.* 2.
Habitat in Braſilia, *pimeliae mortiſagae magnitudine.*

spinimanus. 39. T. thorace marginato laevi, elytris laevissimis posterius obtusis, tibiis primoribus spina robustissima arcuata productis. *Pall. ic. inf. Ross.* 1. *p.* 55. *t.* C. *f.* 23.
Habitat in Russia *australi, circa* Borysthenem, *pimeliae mortisagae magnitudine, sed crassior et magis convexus, aterrimus, nitidus, glaberrimus, durus.*

uncinus. 40. T. apterus niger, thorace marginato subaequali, elytris striato-punctatis angulatisque, femoribus anterioribus clavatis maximis biuncinatis. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 60. *n.* 60.
Habitat in Hispania, *pimeliae mortisagae magnitudine, sed gracilior, elytris brevioribus.*

piceus. 41. T. depressus niger, subtus piceus, elytris striatis. *Schaller Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. *p.* 319.
Habitat Halae Saxonum *sub corticibus et in ligno saligno putrescente; an a mauritanico vere diversus?*

cylindricus. 42. T. aterrimus, thorace punctis elevatis, antennis fuscis, tarsis subtus flavo-pilosis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 6. *p.* 144. *n.* 3.
Habitat Berolini, *molitori proxime affinis.*

montanus. 43. T. totus ater, elytris opacis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 102.
Habitat in Hungariae *inferioris montanis.*

tristis. 44. T. niger subopacus, punctis excavatis variolosus. *Scop. ent. carn. n.* 256.
Habitat in Carniolia.

pomonae. 45. T. supra piceus, infra niger, elytris striis elevatis quinis. *Scop. ent. carn. n.* 257.
Habitat in Carnioliae *arboribus pomiferis, larvis binis ternisve reticulo laxo tectis in folio convoluto latentibus.*

capreae. 46. T. niger, thorace punctis impressis elytrisque testaceis. *Scop. ent. carn. n.* 258.
Habitat in Carnioliae *et* Helvetiae *salice caprea.*

flavus. 47. T. flavus, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 260.
Habitat in Carnioliae *umbelliferis.*

aestivus. 48. T. niger, palpis pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 795.
Habitat in Dania.

49. T.

striatus. 49. T. niger, abdomine subtus dense striato. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 796.
Habitat in Dania.

festinans. 50. T. totus niger glaber, thorace ferrugineo.
Habitat - - - cicindelae affinis, pediculi magnitudine, femoribus clavatis.

globosus. 51. T. ater, thorace globoso: lineis duabus scabris elevatis. *Lepech. it.* 2. *p.* 209. *t.* 11. *f.* 34.
Habitat in Sibiria.

incurvatus. 52. T. totus piceus, elytris striatis medio transversaliter impressis. *Lepech. it.* 2. *p.* 210. *t.* 11. *f.* 25.
Habitat in Sibiria.

ovatus. 53. T. ovatus nigro-fuscus, elytris striis octo laevibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 348. *n.* 4.
Habitat in Gallia.

rotundatus. 54. T. niger totus laevis, coleoptris pone rotundatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 351. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

subvillosus. 55. T. totus ferrugineus subvillosus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 351. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

glaber. 56. T. totus ferrugineus laevis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 351. *n.* 10.
Habitat in Gallia. *)

lignarius. 57. T. thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque ferrugineis. *Degeer inf.* 5. *p.* 38. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 15–18.
Habitat in Europa, *larva sub cortice pinuum in terra jacentium, quarum librum corrodunt; imago* 5 *lineas longa; mas minor.*

tardarius. 58. T. oblongus flavo-fulvus, oculis nigris, elytris striis punctatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 45. *n.* 7 *t.* 2. *f.* 25. 26.
Habitat in Belgis, *larva in vesica fusilla; imago pulicis magnitudine.*

*) *Species* 43-55 *enumeratae utrum ad tenebriones, an ad pimelias referendae, autoptis definiendum relinquo.*

curvipes. 59. T. ovatus piceus, elytris punctato-striatis, femoribus arcuatis: posterioribus subtus ciliatis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 937. *Habitat in* Europa.

bicolor. 60. T. ovatus, elytris striatis, supra niger, subtus antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 938. *Habitat in* Europa.

ater. 61. T. ater, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 939. *Habitat in* Europa.

lunatus. 62. T. niger depressus, thorace lunato, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 941. *Habitat in* Europa.

hispidus. 63. T. niger hispidus, elytris striatis: basi macula utrinque rufa, antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 942. *Habitat in* Europa.

glaber. 64. T. ferrugineus, capite thoraceque glabris elytrisque atris: his striatis, ore ferrugineo, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p.* 42. n. 943. *Habitat in* Europa.

PIMELIA. *Antennae* filiformes. *Palpi* quatuor. *Thorax* plano-convexus, marginatus. *Caput* exsertum. *Elytra* rigidiuscula. *Alae* (*plurimis*) nullae.

* *antennis apice moniliformibus.*

⊢ *palpis clavatis*, Blaps Fabricii.

Gages. 1. P. nigra, thorace rotundato, elytris mucronatis laevissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 321. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 1. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 676. *n.* 14. Tenebrio Gages. *Sulz. hist. inf. p.* 64. *t.* 7. *f.* 9. *Habitat in* Europa *magis australi, simillima mortisagae, at duplo major.*

sulcata. 2. P. coleoptris mucronatis sulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 321. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 2.

Forsk.

Forſk. Fn. arab. p. 79. *n.* 10. Tenebrio (polychreſtus) apterus, elytris mucronatis, ſingulis ſtriis novem elevatis.
Habitat in Aegypti *hortis frequens.*
Commendantur contra aurium dolores ſcorpionumque morſum, et coctae a feminis turcis ſaginandi cauſſa comeduntur.

mortiſaga. 3. P. atra, coleoptris mucronatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 15. Tenebrio (mortiſagus) apterus, thorace aequali, coleoptris laevibus mucronatis.
Fn. ſuec. 594. 822.* *Scop. ent. carn.* 252. Tenebrio ater coleoptris acuminatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 346. Tenebrio atra aptera &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 31. *n.* 1. Tenebrio acuminatus.
Mouff. inſ. 139. Blatta foetida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 12.
Liſt. ſcar. angl. p. 388. *n.* 21.
Jonſt. inſ. t. 16.
Aldr. inſ. 499.
Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 7.
Friſch inſ. 13. *t.* 25.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 1.
icon. t. 6. *f.* 13. *et t.* 37. *f.* 6.
Habitat in Europae *umbroſis ſuffocatis.*

excavata. 4. P. thorace poſterius angulato, elytris excavato-punctatis acutiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 4.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 14.
Act. angl. 271. 861. 13.
Habitat in Coromandel.

ſtriata. 5. P. ater, thorace poſterius angulato, elytris obtuſis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *ſtatura excavatae.*

crenata. 6. P. griſeo-fuſcus, thorace poſterius angulato, elytris crenato-ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Coromandel, *ſtatura ſtriatae, at duplo minor.*

ſpecioſa. 7. P. ſubovata aenea alata, elytris politiſſimis ſtriatis cupreo viridique lineatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 39. *t.* C. *f.* 3. Mylaris ſpecioſa.
Habitat in Braſilia, *attelabi ceramboidis magnitudine.*

chryſomeloides. 8. P. ovata ſcaberrima, thoracе longitudinaliter rugoſo, elytrorum porcis tribus verrucoſis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 52. *Habitat in* Mauritania, *glandis magnitudine, an forſan ad alteram tribum ableganda.*

coſtata. 9. P. ſubgloboſa glabriuſcula opaca, elytris ſingulis coſtis tribus crenulatis: extima carinata.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 52. *t.* C. *f.* 18. Tenebrio coſtatus.
Habitat, rarior, in torridis deſerti caſpici inter fluvios Volgam *et* Ural *intermedii; an forte inſequentis tribus?*

toruloſa. 10. P. ovato ſubgloboſa, elytris tuberculatis undique convexis enerviis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 51. *n.* 17. *t.* C. *f.* 17. Tenebrio toruloſus.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine variabilis.*

agricola. 11. P. rufeſcens, thoracе capiteque nigris. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 101.
Habitat in agro Laibacenſi, *tenebrionis moſitoris magnitudine.*

fabuloſa. 12. P. atra, colcoptris rugoſis pone acuminatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 347. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Gallia *et* Helvetia.

octoſtriatus. 13. P. nigra, elytrorum ſtriis octo punctatis per paria diſpoſitis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 348. *n.* 3.
Habitat in Gallia. *)

⊢ ⊢ *palpis filiformibus.*

ſtriata. 14. P. atra glabra, elytris ſtriis quatuor ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 1.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 45. *t.* C. *f.* 11. a. b.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mortiſaga major, nitida.*

unicolor. 15. P. glabra nigra, elytris immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 46. *t.* C. *f.* 12. Tenebrio gibbus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 9. Tenebrio gigas.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtriatae affinis, at paulo minor.*

16. P.

*) *Species* 11-13 *an hujus generis ordinisve ſint, haud certa conſtat.*

gibba. 16. P. atra, thorace globoſo, elytris linea abbreviata elevata carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 3.
Habitat in India.

hiſpida. 17. P. atra, corpore muricato hiſpido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Forſk. Fn. arab. p. 79. *n.* 8. Tenebrio hiſpidus.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 42. *t.* 6. *f.* 1. Tenebrio ſetoſus.
Habitat rarior in Africa, *mortiſagae magnitudine, ſed brevior et craſſior.*

longipes. 18. P. atra, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 5.
Habitat in Aegypto.

cephalotes. 19. P. thoracis margine anteriori et poſteriori ciliato, elytris ſcaberrimis: nervis quatuor lateralibus carinatis ſubſerratis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 16? Tenebrio (groſſus) apterus niger glaber, coleoptris nervoſis: nervis lateralibus ſcabris, thorace emarginato.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 49. *t.* C. *f.* 15. Tenebrio cephalotes.
Habitat in deſertis *aridiſſimis ſalſis auſtralibus* Uralenſibus, *muricata brevior, et ut plurimum minor.*

muricata. 20. P. nigra, coleoptris obtuſis: ſtriis muricatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 12. *Muſ. Lud. Ulr.* 100.* *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 48. *t.* C. *f.* 14. Tenebrio muricatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 352? Tenebrio atra aptera rotundata, elytris ſulcis tribus elevatis.
Pet. gaz. 11. *t.* 92. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali*, Aegypto, *in deſerto arenoſo* Naryn, *inter fluvios* Volga *et* Ural, *nemorum poſteriorum attritu ad elytra ſtridens, mortiſaga major.*

tuberculata. 21. P. nigra, thorace ſcabro, elytris tuberculato-muricatis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 7.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtatura muricatae, at duplo minor.*

bipunctata. 22. P. atra, thorace globoſo: punctis duobus impreſſis, elytris rugoſis: ſtriis elevatis tribus laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 316. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 8.
Habitat in Italia, *ſtatura muricatae.*

scabra. 23. P. atra, elytris scabris lineisque elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae spei, *et in* Barbariae *ruderatis.*

angulata. 24. P. elytris spinosis: linea laterali elevata serrata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 10.
Forsk. Fn. arab. p. 80. *n.* 13. Tenebrio spinosus.
Pall. ic. inf. Roff. 1. *p.* 55. *t.* H. *f.* C. 22. Tenebrio asperrimus.
Habitat Alexandriae *in* Aegypto.

echinata. 25. P. thoracis lateribus spinosis, elytris lineis elevatis tribus echinatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 11.
Habitat ad caput bonae spei, *statura angulatae.*

dentipes. 26. P. thorace scabro, elytris pilosis muricatis, femoribus anterioribus unispinosis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 12.
Habitat ad caput bonae spei, *statura echinatae, at paulo minor.*

dentata. 27. P. nigra, thorace glabro, elytris fuscis: lineis elevatis tribus serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae spei, *pedibus inermibus elongatis.*

porcata. 28. P. thorace laevi nitido, elytris lineis elevatis tribus: interjectis punctis elevatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 14.
Habitat ad caput bonae spei, *echinata minor.*

maculata. 29. P. thorace nigro, elytris cinereis fusco-maculatis: lineis tribus elevatis; secunda subundata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae spei.

serrata. 30. P. thorace varioloso, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elongatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 16.
Habitat ad caput bonae spei, *parva, atra.*

minuta. 31. P. thorace laevi obscuro, elytris cinereis hispidis: lineis tribus elevatis laevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae spei, *pedibus cinereis.*

32. P.

rugoſa. 32. P. thorace ſcabro, elytris rugoſis anterius anguſtioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 18. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 678. *n.* 27? Tenebrio apterus niger, elytris rugoſis, abdomine pedibusque caeruleſcentibus, thorace lunato.
Habitat in Aegypto.

gibboſa. 33. P. nigra laevis, thorace orbiculato convexo anterius truncato.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 18. *Fn. ſuec.* 824.* Tenebrio gibbus.
Habitat in Europa *et* Africa.

linearis. 34. P. nigra laevis, pedibus ferrugineis, antennis breviſſimis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 23. Tenebrio linearis.
Habitat in Suecia, *magnitudine culicis; an haec et gibboſa huic generi tribuique adſcribendae, judicent autoptae.*

pubeſcens. 35. P. ovata lanuginoſa opaca, elytris ſingulis coſtis quatuor denticulatis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 53. *t.* C. *f.* 19. Tenebrio pubeſcens.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 22. Tenebrio (angulatus) apterus, thorace teretiuſculo, elytris ſtriis quatuor elevatis: tertia crenata.
Voet coleoptr. 1. *t.* 39. *f.* 52?
Habitat in Aegypto *et torridis deſerti* caſpici *inter fluvios* Volgam *et* Ural *intermedii, rarior, ſupra aterrimus, coſtato magis oblongus.*

ſpinoſa. 36. P. thorace marginato anterius et poſterius ſpinoſo, elytris ſtriis elevatis laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 24. *Muſ. Lud. Ulr.* 101.* Tenebrio ſpinoſus.
Habitat in Europa *auſtrali*, Oriente.

acuminata. 37. P. thorace marginato: marginibus anterius et poſterius ſpinoſis, elytris laevibus carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 20.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſpinoſae proxime affinis, tota atra.*

reflexa. 38. P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata laevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 21.

Forſk.

Forsk. Fn. arab. p. 79. *n.* 9. Tenebrio vulgaris.
Pall. ic. inf. Rosſ. 1. *p.* 41. *t.* C. *f.* 6. Tenebrio pterygodes.
Habitat in Oriente, *frequens in* Aegypto, *auritae affinis, at minor.*

aurita. 39. P. thorace marginato anterius dilatato, elytris utrinque bicarinatis laeviſſimis muticis.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 5. a. b. Tenebrio auritus.
Habitat ad lacum Sibiriae Inderienſem, *tota atra, mortiſaga major et magis oblonga.*

faſciata. 40. P. atra, thorace ſuborbiculato, elytris faſciis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 22.
Habitat in India.

collaris. 41. P. nigra, elytris laevibus uniangulatis, thorace anguſtiore, capite depreſſiuſculo carinato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 23.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 21. Tenebrio (collaris) apterus niger, elytris laeviuſculis uniangulatis, thorace anguſtiore, capite depreſſiuſculo carinato.
Habitat in Europa *auſtrali, e geniculis oleum flaveſcens exſudans.*

carinata. 42. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus laevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 24.
Forſk. Fn. arab. p. 878. *n.* 6. Tenebrio aegypticus.
Habitat in Gallia, Calabria, Aegypto.

lineata. 43. P. thorace rotundato ſcabro, elytris ſtriis tribus punctato-ſcabris poſterius lineolis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 26.
Habitat in Sibiria, *parva.*

ciliata. 44. P. nigra depreſſa, thorace elytrisque reflexo-marginatis ciliatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 25.
Habitat ad caput bonae ſpei.

glabra. 45. P. atra, thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 27.
Forſk. Fn. arab. p. 78. *n.* 7. Tenebrio laevis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 30? Tenebrio (latipes) apterus niger laevis, elytris laevibus thorace ſublunato, ſubtus ater. *Pall.*

Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 10? Tenthredo hypolithus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 351. *n.* 8? Tenebrio nigra tota laevis, coleoptris pone rotundatis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 32. *f.* 5.
Habitat in Africa, Calabria, *et frequens in arenoſis aridis ſub ſaxis latens ad* Volgam.

anguſtata. 46. P. glabra, thorace poſterius anguſtato, elytris acuminatis.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 320. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 28.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 9. Tenebrio longicornis?
Habitat in deſerto auſtrali circa Volgam, *ſub lapidibus et in ſtercore vaccino ſicco vere frequens, et in* Aegypto, *carabi mediocris magnitudine.*

orbiculata. 47. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 320. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 29.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 43. *t.* C. *f.* 8. Tenebrio Nomas.
Barrel. ic. plant. t. 945.
Habitat in Oriente, *in univerſo deſerto* tatarico, *et campis aridis* Sibiriae *auſtralis tota aeſtate frequens, duriſſima.*

didyma. 48. P. thorace late marginato, poſterius bicorni, elytris angulatis ſupra biconvexis.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 42. Tenebrio didymus.
Habitat in Mauritania, *mortiſagae fere magnitudine, tota atra, glabra.*

caſpica. 49. P. ex ovato depreſſiuſcula, thorace anterius poſteriusque excavato, elytris utrinque carinatis: faſciis ſcaberrimis laevigatisque alternis.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 47. *t.* C. *f.* 13. Tenebrio caſpicus.
Habitat in ripis elatioribus maris caſpii, *praeſertim orientem verſus ſitis, mortiſaga duplo craſſior.*

ſubgloboſa. 50. P. ſubgloboſa, elytris toruloſo-laevigatis: nervis ſubquaternis; extimis carinatis crenulatis.
Pall. ic. inf. Roſſ. 1. *p.* 50. *t.* C. *f.* 16. a. b. Tenebrio ſubgloboſus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 28. Tenebrio (variabilis) apterus niger laevis, elytris elevato-punctatis angulatisque.
Habitat in Gallia *auſtrali, circa* Volgam, *et in* limoſis *torridis deſerti* tatarici *magis auſtralis, lente incedens, interdiu fere immota, gordiis frequenter infeſtata, varicata brevior, et magis globoſa; an vere diſtincta a rugoſa?*

51. P.

silphoides. 51. P. thoracis lateribus posterius acuminatis, anterius excisis, elytris striis tribus elevatis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 26. Tenebrio silphoides.
Syst. nat. X. *p.* 360. *n.* 9. Silpha maura.
Habitat in Mauritania.

tibialis. 52. P. nigra laevis, tibiis anterioribus compressis unidentatis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 31. Tenebrio tibialis.
Habitat in Africa, Hispania, *vix chrysomela major, tota opaca.* Brander.

femoralis. 53. P. nigra laevis, femoribus crassiusculis, subtus canaliculatis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 32. Tenebrio femoralis.
Habitat in Germania, *chrysomela minor.*

striatula. 54. P. nigra, coleoptris ovato-oblongis striatis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 33. Tenebrio striatulus.
Habitat in Hispania.

laticollis. 55. P. ovalis depressa aterrima laevissima, thorace marginato latissimo anterius excavato, posterius truncato, elytris subtilissime striatis.
Pall. ic. inf. Rossi. I. *p.* 56. *t.* H. *f.* C. 21. Tenebrio laticollis.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine glabrae, sed multo magis depressa.* *)

vittata. 85. P. gibba atra, elytris connatis glabris: sutura et utrinque striis tribus coccineis, pedibus inermibus nigris. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 932.
Habitat extra Europam.

** *antennis totis filiformibus.*

† *palpis quatuor filiformibus*, Sepidia Fabricii.

tricuspidata. 56. P. thorace tricuspidato, corpore griseo. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 315. *n.* 1. *mant. inf.* I. *p.* 207. *n.* 1.
Forsk. Fn. arab. p. 80. *n.* 12? Tenebrio alexandrinus.
Habitat in Aegypto.

cristata. 57. P. thorace tricuspidato cristato, corpore variegato. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 315. *n.* 2. *mant. inf.* I. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inf. Rossi. I. *t.* C. *f.* 26.
Habitat in Aegypto.

58. P.

*) *De his posterioribus speciebus, potissimum 52-55, incertum, cui tribui accensendae.*

reticulata. 58. P. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine tricuſpidatae.*

corrugata. 59. P. atra, thorace laevi nitido, elytris rugoſis: linea elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reticulatae proxime affinis.*

vittata. 60. P. thorace ſubangulato elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae ſpei, *reticulata duplo minor.*

†† *palpis anterioribus ſecuriformibus, poſterioribus clavatis,* Helopes Fabricii.

caerulea. 61. P. caeruleſcens, thorace ſuborbiculato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 1. *mant inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 1.
Muſ. Lud. Ulr. 98.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 19. Tenebrio apterus caeruleſcens, thorace ſuborbiculato, coleoptris obtuſis.
Liſt. angl. app. 4. *f.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 6.
Habitat in Europa, *magis auſtrali.*

lanipes. 62. P. aurea, elytris ſtriatis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 2.
Mant. 1. *p.* 533. Tenebrio alatus aeneus, elytris ſubbifido mucronatis, plantis ſubtus hirſutis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 349. *n.* 5. Tenebrio nigro-cuprea &c.
Scop. ent. carn. 255. Tenebrio aeneus.
Habitat in Germaniae *quiſquiliis.*

aeruginoſa. 63. P. viridi-aenea, antennis, elytris pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 3.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine lanipedis.*

ſerrata. 64. P. nigra, digitis ferrugineis, palpis porrectis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 675. *n.* 11 ? Tenebrio (depreſſus) alatus niger, elytris caeruleſcentibus, antennis tibiisque ſanguineis, thorace depreſſo.

Schall.

Schall. Abh. der hall. Ges. naturf. Fr. 1. *p.* 324. Tenebrio rufibarbis.
Sulz. act. Dresd. 1. Serratula.
Habitat in Anglia *et* Germania.

barbata. 65. P. nigra, palpis porrectis pedibusque flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 5.
Habitat Halae Saxonum, *statura ferratae, at duplo minor.*

canaliculata. 66. P. niger thorace canaliculato utrinque impresso, elytris striatis, palpis porrectis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 6.
Schall. Abh. der hall. Ges. naturf. Fr. 1. *p.* 326. Tenebrio dubius.
Habitat Halae Saxonum, *statura ferratae, alata.*

laevis. 67. P. nigra thorace canaliculato, posterius attenuato, elytris laevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 7.
Habitat Halae Saxonum, *statura canaliculatae.*

equestris. 68. P. atra, elytris fascia abbreviata aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 325. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 8.
Habitat in Brasilia.

maura. 69. P. atra, thorace utrinque rotundato laevi, elytris excavato-punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 325. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 9.
Habitat in India, *magna.*

morio. 70. P. atra, thorace quadrato laevi, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 325. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 10.
Habitat in America *boreali.*

nigrita. 71. P. atra, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-sulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 325. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 11.
Fabr. syst. ent. p. 256. *n.* 4. Tenebrio atratus.
Habitat in America *meridionali.*

rufipes. 72. P. nigra, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 325. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 12.
Habitat in nova Hollandia.

granulata. 73. P. depressa, elytris granulato-subspinosis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 214. *n.* 13.
Habitat ad caput bonae spei, *tribulibus minor et latior.*

74. P.

longipes. 74. P. nigra, elytris ſtriatis, pedibus elongatis: pedibus ſecundi paris barbatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 14.
Habitat in Africa *aequinoctiali, tibiis raro omnibus laevibus.*

atra. 75. P. atra, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 15.
Degeer inſ. 5. *n.* 4. Pyrochroa (nigra) nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuſcis.
Habitat Lipſiae.

anglica. 76. P. nigra, thorace anterius rotundato, elytris punctato-ſtriatis, antennis apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 16.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 318. *n.* 17. Pimelia Morio.
Habitat rarior in Anglia.

indica. 77. P. atra, elytris ſulcato-punctatis, femoribus anterioribus acute dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 17.
Habitat in Coromandel, *ſtatura atrae, ſed paulo minor.*

quiſquilia. 78. P. nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 214 *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 13. *Fn. ſuec.* 821.* Tenebrio niger, ore pedibusque ferrugineis.
Habitat in Europae *quiſquiliis, ſubtus tota ferruginea.*

ruficollis. 79. P. ferruginea, elytris ſtriatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 19.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura quiſquiliae.*

laevis. 80. P. corpore atro laevi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 20.
Habitat in Europae *quiſquiliis.*

cyanea. 81. P. caerulea, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 21.
Habitat Hafniae, *tota caerulea immaculata.*

violacea. 82. P. cylindracea ſplendidiſſima caeruleo violaceoque varians, abdomine poſterius rubro, elytris punctato-ſtriatis.
Pall. ic. inſ. roſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 4. Mylaris violacea.
Habitat in Braſilia, *tenebrione molitore longior et gracilior.**)

83. P.

*) *de hac et duabus ſequentibus dubium adhuc, an ad hanc tribum ſpectent.*

leucographa. 83. P. ovata, thorace ſcaberrimo difformi, elytris carinatis ſcabris: faſciis longitudinalibus albatis laevibus.
Pall. it. 2. *app. p.* 719. *n.* 43. Tenebrio leucogrammus.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 54. *t.* C. *f.* 20. Tenebrio leucographus.
Habitat frequens ad fluvium Irtin, *rarior ad fluvios* Ural, Volga, Selenga Ruſſiae *orientalis.*

buparia. 84. P. alata atra glabra, thorace lunato, maxillis validis dentatis ſongitudine capitis.
Forſter. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 61. *n.* 61. Tenebrio buparius.
Habitat in Hiſpania *ad fretum* Gaditanum, *magnitudine et ſtatura lucani interrupti, habitu tenebrionis foſſoris.*

MANTICORA.

Antennae filiformes: articulis cylindricis.
Palpi quatuor filiformes.
Thorax anterius rotundatus, poſterius apice emarginatus.
Caput porrectum. *Mandibula* exſerta, porrecta.
Elytra connata. *Alae* nullae.

maxilloſa. 1. M. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 320. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 1. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 38. Cicindela (gigantea) nigra, elytris coſta longitudinali ſerrata acuta, thorace bilobo.
Degeer inſ. 7. *p.* 623. *n.* 10. *t.* 46. *f.* 14. Carabus (tuberculatus) apterus niger, elytris ſcabris: tuberculis conicis hirſutis, tibiis obſcure ferrugineis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *vulgaris carabi majoris magnitudine, celerrime currens et mordens.*

ERODIUS.

Antennae moniliformes.
Palpi quatuor filiformes.
Maxilla cornea, bifida, truncata.
Labium corneum, emarginatum.

teſtudinarius. 1. Er. gibbus ater, elytris connatis ſcabris: lateribus pulverulento-albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus, ſubtus planus.*

2. Er.

gibbus. 2. Er. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 2.
Forſk. Fn. arab. p. 80. *n.* 11? Tenebrio (cothurnatus) apterus niger, thorace laevi utrinque antice unidentato, elytris tuberculatis, ſtriis duabus elatis.
Habitat in Africae *arena mobili*, *in* Aegypto *frequens.*

planus. 3. Er. ater, elytris linea elevata unica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Habitat in Aegypto.

minutus. 4. Er. ater, elytris laeviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 4.
Habitat in Oriente.

LYTTA. *Antennae* filiformes.

Palpi quatuor inaequales: poſteriores clavati.

Thorax ſubrotundus: *Caput* inflexum, gibbum.

Elytra mollia, flexilia.

veſicatoria. 1. L. viridis, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 328. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 827. *Scop. ent. carn.* 185. Meloë (veſicatorius) alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris.
It. ſcan. 186. Cantharis officinarum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 341. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 5. Cantharis viridi aurata, antennis nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 12. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 9. Cantharis veſicatoria.
Raj. inſ. 1. 341. Cantharis vulgaris officinarum.
Mouff. inſ. 144.
Jonſt. inſ. p. 76. *t.* 7.
Aldrov. inſ. 276.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 55.
Schaeff. elem. t. 33.
icon. t. 47. *f.* 1.
Habitat in Liguſtro, Fraxino, Sambuco, Syringa, Perſiae populo tremula, Tatariae lonicera tatarica, Calabriae *quoque aſperula*, *officinalis pro veſicatoriis.*

nitidula. 2. L. viridi-aenea, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 328. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 2.
Habitat in Anglia.

collaris. 3. L. atra, vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Habitat in Ruſſia *meridionali, magna; mas duplo minor.*

ſyriaca. 4. L. viridi-caerulea, thorace ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 4. *Muſ. Lud. Ulr.* 102. *Gron. zooph.* 620. Meloë alatus viridi-caeruleus, thorace luteo.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 30. *f.* 1.
Habitat in Sibiria, India, Oriente, *et frequens in auſtrali* Europa.

feſtiva. 5. L. viridi-aenea nitida, elytris teſtaceis maculis viridi-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 5.
Pall. it. 2. *app. p.* 721. *n.* 54. Meloë feſtiva.
Habitat in Sibiria.

marginata. 6. L. atra, elytrorum marginibus cinerascentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 6.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 62. *n.* 62. Meloë (cinereus) alatus cinereus, antennis elytrisque atris margine cinereis.
Habitat ad caput bonae ſpei.

atrata. 7. L. corpore atro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 8.
Habitat in Barbaria.

erythrocephala. 8. L. atra, capite teſtaceo, thorace elytrisque cinereo lineatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 9.
Pall. it. 1. *app. n.* 46.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 103. *n.* 81.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 6. *t.* 30, *f.* 2.
Habitat in Europa *auſtrali, et* Ruſſia, *atratae affinis.*

vittata. 9. L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 7.
Habitat in America.

10. L.

Lyttae Meloaeque, *larvae et imagines, foliis veſcuntur.*

dubia. 10. L. atra, capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.* 9. *mant. inſ* 1. *p.* 216. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 12. Meloë algiricus.
Habitat in Sibiria, *erythrocephalae proxime affinis.*

afra. 11. L. nigra, thorace rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 10. Meloë alatus niger, thorace rufo.
Habitat in Africa, *atratae affinis.*

indica. 12. L. nigra, thorace convexo, elytris laeviſſimis fuſceſcenti-luteis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 4. *t.* 30. *f.* 3.
Habitat in America, *veſicatoriae affinis.*

ruficollis. 13. L. caerulea, thorace orbiculato rubro, elytris punctatis pubeſcentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 6. *t.* 48. *f.* 4.
Habitat in India, *ſyriacae affinis, ſed multo latior.*

quadrimaculata. 14. L. nigra glabra, pectore pubeſcente, elytris ex griſeo luteis: maculis duabus ſubquadratis nigris. *Pall. it.* 2. *app. n.* 48.
Habitat in Sibiria, *ſtatura et magnitudine feneſtratae, et inſtar ejus oleum ſuaveolens ex pedibus exſudans.*

feneſtrata. 15. L. glabra pallide teſtacea, thorace depreſſo, elytris griſeis apice nigris: maculis duabus quadratis hyalinis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 47.
Habitat ad Volgam *inter flores, ſtatura veſicatoriae, mediae magnitudinis.*

clematidis. 16. L. ex chalybeo atra nitida, elytris dilute teſtaceis immaculatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 51.
Habitat in regionibus a fluvio Irtis *verſus orientem ſitis in clematide, veſicatoriae affinis.*

uralenſis. 17. L. nigra opaca glaberrima. *Pall. it.* 2. *app. n.* 56.
Habitat ad montes Uralenſes, *muſcae domeſticae magnitudine, proſcarabaeo affinis, elytris tamen longioribus, et capite latiore.*

ſibirica. 18. L. atra opaca glaberrima, elytris margine albis, capite rubro, oculis ore antennisque nigris. *Pall. it.* 2. *app. n.* 50.
Habitat gregaria in Sibiriae *lotis et aſtragalis; maris antennarum articulis mediis compreſſis et dente munitis.*

lutea. 19. L. atra lanuginosa, elytris ventricosis subcompressis luteis: punctis sex nigris. *Pall. it. app. n.* 54.
Habitat ad fluvium Irtis, *major ad fluvium* Ural, *Syriacae fere magnitudine.*

ocellata. 20. L. nigra lanuginosa, pedibus testaceis, capite thorace elytrisque flavescentibus, elytris ocellis sex medio nigris. *Pall. it. app. n.* 53.
Habitat prope mare caspium, *statura meloës trifasciatae, et duplo major, instar luteae oleum ex pedibus exsudans.*

pectinata. 21. L. antennis pectinatis, corpore atro, fronte rubra. *Lepechin it.* 2. *p.* 200. *t.* 11. *f.* 26.
Habitat in Sibiria.

cinnabarina. 22. L. nigra, thorace supra, elytris et capite utrinque rubris. *Scop. ent. carn. n.* 186.
Habitat in Carniolia.

rufa. 26. L. nigra, capite rufo. *Scop. ann. hist. nat. p.* 103. *n.* 82.
Habitat in Carnioliae *calidioris collibus.*

subvillosa. 27. L. flavescens subvillosa, elytris attenuatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 343. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

bicolor. 28. L. testacea, elytris apice nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 344. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

formicaria. 29. L. fusca, elytris anterius thoraceque elongato rubris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 344. *n.* 8.
Habitat in Gallia. *)

pensylvanica. 30. L. tota nigra opaca. *Degeer inf.* 5. *p.* 16. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Pensylvania, $4\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

pubescens. 31. L. nigra, capite thoraceque pubescentibus, elytris flavis: macula posterius utrinque ferruginea. *Mus. Lesk. p.* 43. *n.* 949.
Habitat - - -

ferruginea. 32. L. ferruginea, capite thoraceque rufis, elytris fuscis basi testaceis. *Mus. Lesk. p.* 43. *n.* 949. b.
Habitat in Europa.

215. ME-

*) *Species* 17, 19-29 *utrum huic generi adscribendae, an sequenti, dubium.*

215. MELOË. *Antennae* moniliformes. *Thorax* subrotundus. *Elytra* mollia, flexilia. *Caput* inflexum, gibbum.

* *alis nullis, elytris abbreviatis.*

Proscarabaeus. 1. M. corpore violaceo. *Fn. suec.* 826. *Scop. ent. carn.* 184. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 327. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 1. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 377. *n.* 1. Meloë. *Degeer inf.* 5. *p.* 31. *t.* 1. *f.* 1. Canthatis proscarabaeus. *Lister scarab. angl. p.* 392. *n.* 27. Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens. *Mouff. inf.* 162. *f. med.* Proscarabaeus. *Jonst. inf. p.* 74. *t.* 1. Proscarabaei femina. *Clut. hemerob. p.* 81. *n.* 73. Vermis majalis. *Goed. inf.* 2. *t.* 42. *Frisch inf.* 6. *t.* 6. *f.* 5. *Hufn. inf.* 2. *t.* 9. *Sulz. hist. inf. t.* 7. *f.* 10. *et* 54. *Schaeff. elem. t.* 82. *icon. t.* 3. *f.* 5. *Berg str. nomencl.* 1. *p.* 17. *n.* 15. *t.* 2. *f.* 15. *Habitat, vere potissimum in* Europae *campis apricis arenosis, ranunculos, veratrum* e. c. *comedens, ova suaveolentia pariens, tacta oleum limpidissimum flavicans, e geniculis praesertim pedum exsudans valde diareticum, cum melle vel oleo mixta in rabie canina commendata.*

majalis. 2. M. segmentis dorsalibus abdominis rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 327. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 2. *Frisch inf.* 6. *t.* 6. *f.* 4. Proscarabaeus alter. *Pontopp. atl. dan.* 1. *t.* 29. *Schaeff. ic. t.* 3. *f.* 6. *Habitat in* Europa *australi, proscarabaeo valde affinis.*

marginata. 3. M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 328. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 3. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 71. *n.* 19. Meloë (hungarus) apterus ater laevis, thoracis basi elytrorumque margine interiori ferrugineis. *Habitat in* Italia *et* Hungaria, *proscarabaeo duplo minor.*

** *alatae, elytris alas tegentibus.*

† *maxilla bifida*, Mylabrides Fabricii.

fasciata. 4. M. nigra, elytris fascia media flava. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 330. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 1.
Habitat in India.

cichorei. 5. M. nigra, elytris flavis: fasciis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 330. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 2.
Syst. nat XII. 2. *p.* 680. *n.* 5. *Mus. Lud Ulr.* 103.* Meloë alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis.
Degeer inf. 5. *p.* 17. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 2. Cantharis cichorei.
Hasselq. it. p. 410. *n.* 101. Chrysomela cichorei.
Imper. hist. nat. 78. Cantharis fasciata.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 11.
Habitat in totius Orientis, *etiam* Sibiriae *et* Calabriae *cichoreis, proscarabaei magnitudine, in* Sina *officinalis, antennis interdum apice flavis.*

decempunctatus. 6. M. atra, elytris testaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 331. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 5.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 6. Meloë (quadripunctata) alatus niger, elytris flavis: maculis quinque nigris, antennis clavatis.
Habitat in Italia, *m. cichorei similis, at triplo minor, antennarum articulo ultimo clavato.*

capensis. 7. M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis flavis. *Mus. Lud. Ulr.* 104.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 330. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 4.
Degeer inf. 7. *t.* 48. *f.* 14.
Habitat ad caput bonae spei, *m. cichorei duplo minor.*

chrysomeloides. 8. M. viridi-caerulescens, subtus nigro-violacea. *Amoen. ac.* 6. *p.* 396. *n.* 25.
Habitat Surinami, *an hujus generis?*

quadripunctata. 9. M. atra, elytris testaceis: punctis duobus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 6.
Habitat in Russia, *decempunctatae affinis.*

trimaculata. 10. M. nigra, coleoptris flavis: fascia punctoque communi fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 331. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 7.
Habitat in Oriente.

11. M.

algirica. 11. M. nigra, elytris teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 3.
Fabr. ſyſt. ent. app. 828. Mylabris immaculata.
Degeer inſ. 7. *n.* 53. *t.* 40. *f.* 17. Cantharis fulva.
Habitat in India.

teſtacea. 14. M. teſtacea, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 8.
Habitat in Sibiria, *congeneribus paulo minor.*

americana. 15. M. nigra, thorace ſemicirculari, elytris faſciis tribus flavis: prima arcuata, reliquis confluentibus. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 30. *f.* 5. a.
Habitat in America, *antennarum apice clavato, ochraceo.*

indica. 16. M. nigra, elytris flaveſcentibus poſterius fulvis: puncto, baſeos litura triloba, faſcia media dentata apiciſque margine ſemilunari nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 5. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in India, *congeneribus latior.*

elongata. 17. M. nigra nitida, elytris flavis, caeruleo variis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 6. *t.* 30. *f.* 7. b.
Habitat - - - ſatis anguſta.

undulata. 18. M. nigra, elytrorum vittis duabus anguſtis undulatis dentatis ſpadiceo-marginatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 8. *t.* 48. *f.* 3.
Habitat in India.

aurea. 19. M. viridi-aurea, elytris fulvis. *Degeer inſ.* 7. *n.* 54. *t.* 48. *f.* 18.
Habitat - - - 4 lineas longa; an vere diſtincta ſpecies.

arcuata. 20. M. nigra hirſuta, elytris anterius macula arcuata faſciisque binis undatis flavis.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 2. *t.* E. *f.* 3. b? Meloë phalerata.
Degeer inſ. 7. *n.* 52. *t.* 48. *f.* 15. Cantharis undato-bifaſciata.
Habitat - - - tres lineas longa, antennis nigris apice clavatis.

bifaſciata. 21. M. nigra hirſuta, elytris anterius macula rotunda, et ad angulum exteriorem altera faſciisque binis transverſis flavis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 7. *t.* 48. *f.* 2.
Degeer inſ. 7. *n.* 50. *t.* 48. *f.* 13. Cantharis bifaſciata.
β) Pall. ic. inſ. Roſſ. 2. *t.* E. *f.* 3. a. Meloë plagiata.

Habitat in India, *magna, antennis flavis, elytrorum basi picea, a* $9\frac{1}{2}$ *lineis ad* 3 *lineas ultra pollicem longa; in β) ad elytrorum angulum exteriorem macula nulla.*

trifasciata. 22. M. ex virescente chalybea sericea cana, elytris griseo-pallidis: fascia communi alteraque ex virescente atra. *Pall. it.* 2. *app. n.* 52.
Habitat in vicinia maris caspii, *magnitudine meloës Schaefferi, statura m. cichorei, antennis apice clavatis.*

atrata. 23. M. aterrima nitens, elytris fascia flava versus apicem undulata. *Pall. it.* 2. *app. n.* 55.
Habitat in confiniis maris caspii, *frequens in gypsophilis et veronicis florescentibus, antennis apice clavatis, oleum ex pedibus exsudans.*

necydalea. 24. M. nigra, elytris ruberrimis, abdomine paulisper brevioribus, apice dilatantibus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 49.
Habitat in Russici *imperii provinciis orientalibus, oleum pariter suaveolens exsudans.*

chloroptera. 25. M. nigra subvillosa, elytris flavis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 344. *n.* 6.
Habitat in Gallia, *extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*

pensylvanica. 26. M. nigra opaca tota.
Degeer inf. 5. *p.* 16. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1. Cantharis pensylvanica.
Habitat in Pensylvania. *)

Marci. 13. M. nigra, pedibus ferrugineis, palpis clavatis crispis.
Habitat Calmariae Succorum, *an hujus generis?*

melanura. 30. M. elytris flavis: maculis quatuor apiceque nigris, antennis clavatis. *Petagn. inf. Calabr. p.* 127. *n.* 136. *f.* 13.
Habitat Brancalemi *in* Calabria *in frumenti spicis, m. cichorei similima, sed major.*

ochroptera. 31. M. nigra, elytris croceis basi nigris: utrinque gutta crocea ante et pone medium, fascia interrupta apiceque nigris.
Mus. Lesk. p. 43. *n.* 952.
Habitat extra Europam.

32. M.

*) *Huic tribui inserendae videntur species ab Ill.* Pallas *descriptae, et in ic. inf. Roff. delineatae* luxata T. B. *f.* 5. a. b. variabilis *t.* E. *f.* 7. *et* 14. b. *et* lenica *t.* E. *f.* 12. *de speciebus* 13. 22. 26 *magis dubium.*

bicolor. 32. M. nigra, elytris flavis: basi utrinque punctulo, in medio fascia ad margines externos latiore apiceque nigris. *Mus. Lesk. p.* 43. *n.* 953.
Habitat extra Europam.

⊢ ⊢ *maxilla integra*, Cerocomata Fabricii.

Schaefferi. 12. M. viridis, antennis pedibusque luteis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 358. *n.* 1. Cerocoma.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 12. Meloë alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis brevibus irregularibus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 13.
Schaeff. el. t. 37.
ic. t. 53. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis australi et* Sibiria, *statura vesicatoriae, sed dimidio minor.*

Vahlii. 27. M. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Barbariae *umbellatis, statura et magnitudine m. Schaefferi.*

Schreberi. 28. M. viridis, antennis pedibus abdominisque segmentis tribus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in Europa *magis australi, m. Schaefferi nimis affinis, at duplo major, antennis flavis.*

Gouani. 29. M. atra, elytris apice fasciaque sanguineis. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1068. *n.* 11.
Habitat in Gallia, *pediculi magnitudine; an hujus ordinis?*

12punctata M. in Italia. Cyrillo Entomologia neapolitana

216. MORDELLA.

Antennae moniliformes, aut pectinatae.

Palpi quatuor, anteriores clavati, posteriores filiformes.

Caput deflexum sub collo, in territa.

Elytra deorsum curva apicem versus.

Ante femora lamina lata ad basin abdominis.

* *antennis pectinatis.*

ferruginea. 7. M. rufa, pectore ano pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Habitat in India.

nasuta. 8. M. corpore atro immaculato. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 66. *f.* 77. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Japonia, *glabra, aculeata quadruplo major.*

pectinata. 9. M. rufa, elytris nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in America.

paradoxa. 1. M. thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Fn. suec.* 831.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 4.
Habitat rarior in Europae *plantis umbellatis.*

fiabellata. 10. M. testacea, ore pectore abdominisque dorso atris. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 5.
Habitat in Italia, *ferrugineae affinis, at duplo fere minor.*

punctata. 11. M. thorace testaceo nigro punctato, elytris nigris: margine testaceo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *statura pectinatae, atra, capite testaceo.*

** *antennis moniliformibus.*

sexmaculata. 12. M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: macula nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 7.
Habitat in America.

13. M.

bimaculata. 13. M. ferruginea, pectore atro, elytris testaceis: macula nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 8.
Habitat in Hungaria, *magna.*

dimidiata. 14. M. atra, elytris basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 9.
Habitat - - - *statura sexmaculatae, abdomine obtuso fere truncato.*

limbata. 15. M. ferruginea, vertice thoracis disco elytrisque atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 10.
Habitat - - - *statura sexmaculatae, antennis serratis, pedibus nigris.*

aculeata. 2. M. atra, ano spina terminato. *Fn. suec.* 832. *Scop. ent. carn.* 192.
Fn. suec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 333. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 11. Mordella ano aculeato, corpore atro immaculato.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 353. *n.* 1. Mordella atra caudata unicolor.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 46.
Schaeff. elem. t. 84.
ic. t. 127. *f.* 7.
β) *Lepech. it.* 2. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat frequens in Europae *borealis floribus semiflosculosis, umbellatis, in* Calabriae *thapsia.*

fasciata. 16. M. nigra, ano aculeato, elytris fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 333. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 12. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 354. *n.* 2. Mordella atra caudata, fasciis villoso-aureis.
Habitat in Germaniae *et* Europae *magis australis floribus, an varietas aculeatae?*

octopunctata. 17. M. ano aculeato, elytris nigris: punctis quatuor flavis; primo lunato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 333. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 13.
Habitat in America *septentrionali et* Bavaria.

testacea. 18. M. atra, elytris testaceis: marginibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 14.
Habitat in Africae *dauco, statura et magnitudine aculeatae, ano aculeato.*

19. M.

abdominalis. 19. M. nigra, thorace abdomineque fulvis, ano aculeato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 15. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 7. *f.* 15. Mordella bicolor. *Habitat in* Germania.

humeralis. 3. M. atra, ore lateribus thoracis pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 16. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 682. *n.* 3? *Fn. ſuec.* 833.* Mordella atra, lateribus thoracis baſeosque elytrorum flaveſcentibus. *Habitat in* Europae *floribus.*

frontalis. 4. M. atra, fronte pedibusque flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 834.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 17. *Habitat in* Europae *borealis floribus.*

thoracica. 5. M. atra, capite thoraceque flavis. *Fn. ſuec.* 835.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 333. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 18. *Habitat in* Europae *floribus.*

flava. 6. M. flava, elytrorum apicibus nigris. *Fn. ſuec.* 836.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 334. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 19. *Habitat frequens in* Europae *floribus umbellatis.*

tricuſpidata. 20. M. flava, lamina abdominali cyanea, elytrorum punctis tribus nigris thorace poſterius tricuſpidato. *Lepech. it.* 1. *t.* 19. *f.* 8. *Habitat in deſerto* Uralenſi.

murina. 21. M. pubeſcens undulata, cinerea thoracis maculis tribus nigris. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 148. *n.* 3. *Habitat* Berolini, *ſtatura et magnitudine faſciatae.*

ſexpunctata. 22. M. atra nitida, elytrorum punctis tribus albis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 148. *n.* 4. *Habitat in* Marchia, *murinae fere major.*

oxyacanthae. 23. M. teſtacea, capite nigro, thorace fuſco. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 63. *n.* 63. *Habitat in* Angliae *floribus crataegi oxyacanthae, aculeatae fere magnitudine.*

melanopus. 24. M. nigra, elytris, thorace capite pedibusque teſtaceis. *Forſt. ſp. inſ. nov.* 1. *p.* 64. *n.* 64. *Habitat cum m. oxyacanthae, magnitudine pediculi majoris.*

bicolor. 25. M. atra, elytris teſtaceis apice nigris faſciaque nigra in medio. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 65. *n.* 65.

Habitat

Habitat in Anglia, *frequens in floribus crataegi, rumicis, umbellatarum, pediculi magnitudine.*

perlata. 26. M. nigra nitida subpilosa, thoracis margine posteriore, elytrorumque maculis quatuor perlatis. *Sulz. hist. inf. p.* 67. *t.* 7. *f.* 14.
Habitat in Rhaetia.

rufipes. 27. M. fusca, pedibus ferrugineis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 355. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

*** *antennis clavatis.*

clavicornis. 28. M. tota picea. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 66. *n.* 66.
Habitat in Anglia, *cursitans in rhei rhabarbari floribus, thoracicae magnitudine, vel paulo major; utrum hujus, an perinde ac* 1. 7-11. *proprii generis?*

217. STAPHYLINUS.

Antennae moniliformes.
Palpi quatuor.
Elytra dimidiata. *Alae* tectae.
Cauda simplex, exserens duas vesiculas oblongas.

* *palpis omnibus filiformibus.*

aureus. 27. St. capite thorace elytrisque villoso-aureis, abdomine nigro: fasciis cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 1.
Habitat in Siam, *hirti magnitudine.*

hirtus. 1. St. hirsutus niger, thorace abdomineque posterius nigris. *Fn. suec.* 839.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 2.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 363. *n.* 7. Staphylinus niger villosus &c.
Degeer inf. 4. *p.* 20. *n.* 5. Staphylinus bombylius.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 16.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 12.
ic. t. 36. *f.* 6.
Habitat in Europae *arenosis.*

2. St.

murinus. 2. St. pubescens cinereus nigro-nebulosus. *Fn. suec.* 840.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 3. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 362. *n.* 6. Staphylinus villosus e fusco cinereoque viridi tessellatus. *Degeer inf.* 4. *p.* 12. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Staphylinus villosus. *Schaeff. ic. t.* 4. *f.* 11. *Stroem. act. Nidr.* 6. *Habitat in* cadaveribus, fimo, *elytris subtus caeruleis.* Larva *hexapus, nuda, pallida, capite segmentisque tribus anterioribus fuscis; cauda setis duabus articulatis subtusque tuberculo pediformi cylindrico tubuloso.*

olens. 28. St. niger opacus immaculatus, capite thorace latiore. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 4. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1090. *Fn. Fridrichsd. p.* 23. *n.* 28. Staphylinus totus niger, capite thoraceque scabriusculo. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 6. *p.* 149. *n.* 4. Staphylinus unicolor. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 360. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 1. Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunulato. *Raj. inf. p.* 109. *n.* 1. Staphylinus major totus niger. *Habitat in* Europae *cadaveribus.*

maxillosus. 3. St. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine capitis. *Fn. suec.* 841.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 220 *n.* 5. *Degeer inf.* 4. *p.* 18. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 7. 8. Staphylinus balteatus. *List. loq.* 391. Scarabaeus majusculus niger, forcipibus infestis. *Mouff. inf.* 197. *Gron. zooph.* 630. *Jonst. inf. t.* 17. *f.* 1–3. *Bocc. mus.* 2. *t.* 31. *f.* A. A. *Habitat in* Europae *silvis, victitans rapina.*

oculatus. 29. St. ater nitidus, capite utrinque macula fulva. *Fabr. sp. inf* 1. *p.* 335. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 6. *Habitat in novis* Hollandia *et* Seelandia.

30. St.

Staphylini *voracissimi, rapina insectorum victitant, mordaces, humentibus ut plurimum delectantur, vesiculas caudales periculo imminente exserunt; larvae subterraneae: Spec.* 7-9. 21. 30. 96-100. *thorace scutiformi, abdomine utrinque pilis bispido apice setoso gaudent.*

dilatatus. 30. St. thorace marginato, atro nitidulo, elytris fuscis, antennis ferratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 7.
Habitat Halae Saxonum, *erythroptero major.*

bicolor. 96. St. ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 45. *n.* 997.
β) Staphylinus ater, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis. *Muf. Lesk. p.* 45. *n.* 999.
Habitat in Europa.

fuscus. 97. St. fuscus, elytris pedibusque testaceis. *Muf. Lesk. p.* 45. *n.* 1000.
Habitat in Europa.

clavatus. 98. St. ater glaber, elytris testaceis: marginibus externis fuscis, antennis clavatis, pedibus fusco-testaceis. *Muf. Lesk. p.* 44. *n.* 1001.
Habitat in Europa.

flavus. 99. St. niger, thorace marginibus externis late, anteriore posteriorique summo elytrisque flavis: vitta media margineque externo fuscis, antennis pedibusque flavis. *Muf. Lesk. p.* 45. *n.* 1004.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 100. St. thorace capiteque rufis, oculis, nucha abdomineque nigris, elytris pedibusque testaceis. *Muf. Lesk. p.* 45. *n.* 1005.
Habitat in Europa.

erythropterus. 4. St. ater, elytris, antennarum basi pedibusque rufis. *Fn. suec.* 842.* *Scop. ent. carn.* 306. *Stroem. act. nidr.* 3. *p.* 404. *t.* 6. *f.* 8. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 335. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 8.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 364. *n.* 9. Staphylinus ater non nitens.
Frisch inf. 5. *p.* 49. *t.* 25. Scarabaeus rapax elytris brevibus.
Degeer inf. 4. *p.* 21. *n.* 6.
Schaeff. elem. t. 117.
icon. t. 2. *f.* 2.
β) Staphylinus ater, capitis vertice, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuscis. *Muf. Lesk. p.* 44. *n.* 968?
Habitat saepius in Europae *fimo.*

erythrocephalus. 31. St. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 335. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

piloſus. 32. St. piloſus niger, abdomine fuſco, elytris ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *parvus, brevis, craſſus.*

politus. 5. St. niger, thorace elytrisque nitidis. *Fn. ſuec.* 843.* *Scop. ent. carn.* 304. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 11.
Fn. ſuec 605. Staphylinus niger, thorace aeneo-nitido, elytris atro-caeruleis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 361. *n.* 3. Staphylinus ater &c.
Degeer inſ. 4 *p.* 22. *n.* 7. Staphylinus niger nitidus &c.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 12.
Habitat in Europae *cadaveribus, recens odorem ambroſiacum ſpargens.*

brunnipes. 33. St. niger, pedibus antennarum baſi apiceque ferrugineis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 336. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 12.
Habitat in Anglia, *ſtatura et magnitudine politi.*

nitidus. 34. St. ater nitidus, elytris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 13.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine politi, an ejus varietas?*

fulgidus. 35. St. ater nitidus, elytris plantisque teſtaceis, capite punctulato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 14.
Habitat Kilonii, *ſtatura politi, at tenuior.*

margina- tus. 36. St. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 15. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 332. *n.* 33.

obtuſus. 9. St. teſtaceus, elytris anterius anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 17.
Habitat in Germania, Anglia, *pediculi magnitudine, pectore inter femora poſteriora fuſco.*

lignorum. 10. St. fuſcus, elytris ſutura abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 848.*
Habitat in Europa.

ſilphoides. 11. St. niger, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis: margine maculaque longitudinali nigris.
Habitat in Europa, *obtuſo ſimilis.*

ſubterra- neus. 12. St. niger, elytris anterius extrorſum flavis, pedibus nigris. *Fn. ſuec.* 849.*
Habitat in Europa.

13. St.

flaveſcens. 13. St. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. ſuec.* 850.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 16.
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 15. St. niger, elytris puncto fulvo. *Fn. ſuec.* 851.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 336. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 20. Staphylinus niger, elytris puncto albido, oculis prominulis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 371. *n.* 24?
Müll. zool. dan. prodr. p. 99. *n.* 1123?
Habitat ad littora maris baltici.

cicindeloides. 37. St. niger rugoſus, antennis pedibusque teſtaceis: geniculis nigris. *Schaller Abh. der. hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 324.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura et magnitudine biguttati.*

bipuſtulatus. 16. St. niger, elytris puncto ferrugineo. *Fn. ſuec.* 847.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali, antennis extrorſum craſſioribus.*

analis. 38. St. ater nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 19.
Habitat Kilonii, *bipuſtulato major.*

clavicornis. 39. St. niger immaculatus, thorace rotundato laevi, antennis extrorſum craſſioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 371. *n.* 25?
β) Scop. ent. carn. n. 303. Staphylinus clavicornis.
Habitat Kilonii, *β) pedibus rufis ſub* Carnioliae *pyri cortice.*

Cantharellus. 17. St. niger, elytris glaucis apice flavicantibus.
Habitat in Suecia *ad* Hammarby, *cantharidi biguttatae ſimillimus.*

littoreus. 18. St. niger, elytris anterius griſeis, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 852.* *It. gotl.* 173.
Habitat in littoribus.

ſanguineus. 19. St. niger, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 853.*
Habitat in Europa.

caraboides. 20. St. flavus immaculatus. *Fn. ſuec.* 854.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33.
Fn. ſuec. 613. Staphylinus totus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 25. *n.* 12. Staphylinus fulvus.
Habitat in Europa *boreali.*

chrysomelinus. 21. St. niger, thorace elytris pedibusque testaceis. *Fn. suec.* 855.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 685. *n.* 21. *mant. inf.* 1, *p.* 221. *n.* 28.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 368. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali.*

fuscipes. 22. St. niger, elytris pedibusque testaceis. *Fn. suec.* 857. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 22.
Habitat in Europae *stercore.*

hypnorum. 40. St. ater laevis, thoracis lateribus, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 23.
Habitat in Angliae *hypnis.*

nitidulus. 41. St. ater, thoracis marginibus flavescentibus, elytris ferrugineis: margine nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 337. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 24.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. St. thorace rufo, elytris fuscis: puncto baseos margineque posteriore albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 337. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 25.
Habitat in Anglia.

marginellus. 43. St. ater, elytrorum margine laterali et posteriore ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 337. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 26.
Habitat in Angliae *stercore*, *mediae magnitudinis.*

canaliculatus. 44. St. flavus, capite abdominisque cingulo atris, thorace canaliculato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 29.
Habitat Kilonii, *parvus.*

tricolor. 45. St. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 30.
Habitat in Daniae *boletis*, *parvus.*

rufipes. 24. St. ater glaber, pedibus rufis. *Fn. suec.* 858.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 337. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 31.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 367. *n.* 19. Staphylinus niger &c.
Degeer inf. 4. *p.* 24. *n.* 11. *t.* 1. *f.* 14. Staphylinus ovatus glaber &c.
Habitat in Europa, *interdum testaceus*, *aut niger*, *pedibus testaceis.*

46. St.

melanocephalus. 46. St. ferrugineus, capite atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *minutus.*

rugoſus. 47. St. niger, thorace elytrisque rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 24. *mant inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 34.
Habitat in Anglia.

piceus. 25. St. nigér, elytris piceis, thorace depreſſo: lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 35.
Habitat in Europa *boreali, pediculi magnitudine, ſed magis oblongus.*

boleti. 26. St. fuſcus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque lividis. *Fn. ſuec.* 859.*
Habitat gregarius in boletis abietinis, *quorum fiſtulas tanquam apis ſuas fiſtulas intrat, pulice dimidio minor.*

obſcurus. 48. St. niger opacus obſolete punctatus, antennis baſi fuſcis, verſus apicem incraſſatis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 149. *n.* 8.
Habitat Berolini, *magnitudine politi, ſtatura murini.*

tricornis. 49. St. niger, fronte bicuſpidata, thorace poſterius cornuto, elytris rubris: margine ſuperiori et interiori nigricante. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 149. *n.* 9. *t.* 30. *f.* 8. c.
Habitat rarior Berolini, *polito tertia parte minor.*

blattinus. 50. St. ater, thorace lato, elytris pedibusque teſtaceis nitidis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 236. *n.* 447.
Habitat in Auſtria *in terra, habitu blattae lucifugae.*

minor. 51. St. niger glaber, elytris pallide, antennis baſi fuſcis, pedibus luteis. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 97. *n.* 1096.
Habitat in Europa *boreali, ultra* 3 *lineas longus.*

ſaxatilis. 52. St. ater nitidus ſubpubeſcens, elytris pedibus abdominisque apice teſtaceis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 234. *n.* 442. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 13.
Habitat in Germania *et* Gallia, *in terra ſub lapidibus, minore minor.*

ſimilis. 53. St. niger, pedibus luteis: femorum apice nigro. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 151. *n.* 15.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine biguttati.*

Domicella. 54. St. niger, thorace elytris pedibusque badiis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 235. *n.* 444.
Habitat in Auſtria *ſuperiori*, 2 *lineas longus.*

glaberrimus. 55. St. niger nitidus, antennis apicem verſus incraſſatis: articulo primo longiſſimo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 6. *p.* 151. *n.* 17.
Habitat Berolini, 4 *circiter lineas longus.*

buphthalmos. 56. St. niger immaculatus, oculis magnis exſertis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 72. §. 21. *inſ. auſtr. p.* 235. *n.* 445.
Habitat in Auſtria *ad hortorum muros.*

ophthalmicus. 57. St. atro-caeruleus punctatus, oculis macula pallida lunulata ſuffuſis. *Scop. ent. carn. n.* 300.
Habitat in Carniolia.

fulvipes. 58. St. atro caeruleus, palpis pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 301.
Habitat in Carniolia.

braſſicae. 59. St. ferrugineus, capite et corpore nigris, elytris punctatis, antennis extrorſum craſſioribus villoſis. *Scop. ent. carn. n.* 309.
Habitat in Carnioliae *braſſica.*

arnicae. 60. St. niger, thorace antennisque ferrugineis, pedibus teſtaceis. *Scop. ent. carn. n.* 310.
Habitat in Carnioliae *arnica.*

hellebori. 61. St. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n.* 311.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 366. *n.* 14?
Habitat in Carnioliae *helleboro*, *et* Gallia.

foſſor. 62. St. fuſco rufus, elytris apice pedibusque rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 105.
Habitat in fungis metallorum Schemnizenſium.

fodinarum. 63. St. caeruleſcens villoſus, tarſis rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 106.
Habitat ad ligna cuniculorum Schemnizenſium, *ſtatura foſſoris.*

niger. 64. St. totus niger, capite thoraceque nitido non punctato. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 98. *n.* 1109. *Fn. Fridrichsd. p.* 23. *n.* 229.
Habitat in Dania.

65. St.

cursor. 65. St. niger, thorace depresso: litura duplici, elytris pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1095.
Habitat in Dania.

agarici. 66. St. luteus, capite nigro, abdomine rufo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1097.
Habitat in Daniae *agaricis.*

latus. 67. St. niger, elytrorum summo margine posteriori pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1011.
Habitat in Dania.

penetrans. 68. St. niger, antennis elytris pedibusque castaneis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1102.
Habitat in Dania.

vernalis. 69. St. fulvus, elytris anterius, abdomineque posterius nigris, medio rufo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1103.
Habitat in Dania, *facie chrysomelini, vere potissimum conspicuus.*

marginalis. 70. St. niger, thoracis marginibus, elytris, pedibus abdominisque apice flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1107.
Habitat in Dania.

fuscicornis. 71. St. niger, capite thoraceque nitidis, elytris margine inferiore antennisque lividis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1112.
Habitat in Dania.

floreus. 72. St. niger, thorace convexo punctulato, elytris pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1117.
Habitat in Daniae *floribus.*

fracticornis. 73. St. linearis niger, pedibus antennisque fuscis: infimo articulo atro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1118.
Habitat in Dania.

formicarius. 74. St. linearis niger, infimo antennarum articulo atro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1119.
Habitat in Dania, *aliquando rufus, capite et abdomine, aut etiam thorace, aut infimul elytris nigris.*

punctatus. 75. St. atro-caeruleus, femoribus testaceis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1121. *Act. Nidros.* 4. *p.* 36.
Habitat in Dania.

ſtriatus. 76. St. ater, thorace punctato ſtriatoque. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1122. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 35.
Habitat in Dania.

ſpinipes. 77. St. niger, pedibus teſtaceis, tibiis ſpinoſis. *Pontopp. Naturg. Dännem. p.* 211. *n.* 9. *t.* 16.
Habitat in Dania.

tataricus. 78. St. totus ater nitidus, thorace cylindrico capite anguſtiore, elytris ſubtiliſſime punctatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 74.
Habitat ad lacum Tatariae *ſalſum* Inderienſem, *maximus, gracilis, longus, glaberrimus.*

pubeſcens. 79. St. villoſus nigro-fuſcus, nigro viridi griſeoque maculatus, ſubtus argenteus, abdominis apice ſubrotundato. *Degeer inſ.* 4. *p.* 17. *n.* 2.
Habitat in Europa *in terra et fimo*, $6\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

chalcocephalus. 80. St. obſcure fuſcus, capite thoraceque aeneis nitidis, tibiis faſciisque rufo-fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 22. *n.* 8.
Habitat in Europa, *polito paulo minor.*

aeneus. 81. St. glaber aeneo-viridis nitidus, abdomine pedibusque nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 23. *n.* 9.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 367. *n.* 17.
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1110.
Habitat in Europa, 4 *lineas longus.*

glaber. 82. St. niger nitens, elytris laevibus pedibusque teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 364. *n.* 10.
Müll. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1106.
Habitat in Europa.

glaucus. 83. St. atro caeruleſcens, extremo antennarum articulo lunulato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 361. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

macropterus. 84. St. ater, elytris thorace duplo longioribus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 362. *n.* 4.
Habitat in Gallia.

ochrocephalus. 85. St. pubeſcens, capite flavo, thorace elytrisque fuſco nigroque nebuloſis: punctis impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 363. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

86. St.

Cui tribui accenſendae ſpecies 56-92, incertum.

punctulatus. 86. St. niger nitens, elytris punctatis pedibusque teſtaceis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

curtulus. 87. St. niger nitens, thorace plano marginato, elytris punctatis pedibusque fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ſulcatus. 88. St. niger, thorace marginato ſulcato, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 730. *n.* 45.
Habitat in Gallia.

limbatus. 89. St. niger, elytris fuſcis: margine flavo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 368. *n.* 19.
Habitat in Gallia, *flaveſcente multo major.*

maculatus. 90. St. niger, thorace utrinque elytrisque macula flava. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 369. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

rubricollis. 91. St. atro-caeruleſcens, thorace rubro. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 370. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

cylindricus. 101. St. cylindricus totus ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 967.
Habitat in Europa.

dichrous. 102. St. ater, capite thoraceque glabris, elytris fuſco-ferrugineis, antennarum baſi et articulis quinque ultimis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 970.
Habitat in Europa.

picatus. 103. St. ater, capite thoraceque piceis glabris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 972.
Habitat in Europa.

glaber. 104. St. ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 973.
Habitat in Europa.

erythropus. 105. St. ater, antennis pedibus elytrisque rufis: his baſi nigris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 974.
Habitat in Europa.

cruentatus. 106. St. ater, elytris ſingulis diſco gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 975.
Habitat in Europa.

lugubris. 107. St. niger, antennis, elytris pedibusque fuscis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 976.
β) St. ater, elytris antennis pedibusque fusco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 982.
Habitat in Europa.

biclavatus. 108. St. ater glaber, elytris pedibusque fusco-teſtaceis, antennis biclavatis: baſi longa clavata atra. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 978.
Habitat in Europa.

rufeſcens. 109. St. capite thoraceque atris punctatis, abdomine nigro, elytris antennis pedibusque fuſco-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 979.
Habitat in Europa.

cephalotes. 110. St. ater, capite magno, elytris fuſcis, antennis ferrugineis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 980.
Habitat in Europa.

brevipes. 111. St. ater, elytris pedibusque teſtaceis, tibiis brevibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 981.
Habitat in Europa.

marginellus. 112. St. niger, thoracis abdominisque marginibus, antennarum baſi, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 982.
Habitat in Europa.

haemorrhoidalis. 113. St. ater, thorace utrinque impreſſo, elytris pedibus, ore anoque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 983.
Habitat in Europa.

craſſipes. 114. St. ater, thorace longo ſubquadrato glabro, elytris fuſcis, antennis pedibusque ruteſcentibus, femoribus anticis craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 986.
Habitat in Europa.

flavicornis. 115. St. ater, punctis elevatis minimis undique obſeſſus, antennis flavis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 990.
Habitat in Europa.

lituratus. 116. St. ater, elytris teſtaceis, baſi macula communi et in medio ad marginem externum utrinque macula fuſca, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 991.
Habitat in Europa.

117. St.

alatus. 117. St. fuscus, elytris longis, pedibus rufo-fuscescentibus. *Mus. Losk. p.* 44. *n.* 992.
Habitat in Europa.

** *palpis posterioribus securiformibus*, Oxypori Fabricii.

rufus. 6. St. rufus, capite elytrorum abdominisque posterioribus, femoribus basi nigris. *Fn. suec.* 844. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 307. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 370. *n.* 22. Staphylinus flavus.
Gadd sat. 80. Staphylinus pallide rufus elytris caerulescentibus, capite et apice abdominis nigris.
Degeer inf. 4. *p.* 24. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
Schaeff. ic. 1. 35. *f.* 3.
Habitat in Europae *boletis.*

lunulatus. 7. St. rufus, capite abdominis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. suec.* 845.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 2. Oxyporus flavus, elytris nigris basi apiceque pallidis.
Habitat in Europae *boletis.*

parvus. 92. St. flavus, elytris basi anoque atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *antennis flavis apice fuscescentibus.*

thoracicus. 93. St. nigricans, thorace rufo, elytris fuscis basi albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 338. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 4.
Habitat Kilonii *in boletis.*

pygmaeus. 94. St. nigricans, thorace elytrisque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 5.
Habitat Kilonii *in boletis.*

flavipes. 22. St. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 856.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 339. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 6. Oxyporus niger, elytris tibiisque fuscis.
Habitat in Europae *boletis.*

abdominalis. 95. St. rufus, abdomine atro nitido. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 7.
Habitat in Norwegia, *reliquis hujus tribus minor.*

*** *pal-*

*** *palpis anterioribus clavatis:* Paederi Fabricii.

riparius. 9. St. rufus, elytris caeruleis, capite abdominisque apice nigris. *Fn. fuec.* 846.* *It. gotl.* 173. *Degeer inf.* 4. *p.* 28. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 1.
Scop. ent. carn. 308. Staphylinus gregarius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 369. *n.* 21.
Schaeff. ic. t. 71. *f.* 3.
Habitat ad Europae *ripas frequens.*

ruficollis. 96. St. niger, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inf. 8. *t.* 48. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germania *ſub lapidibus.*

elongatus. 14. St. niger, elytris poſterius pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 3. Paederus niger, elytris poſtice pedibusque fulvis.
Habitat in Europa *boreali.*

218. FORFICULA. *Antennae* ſetaceae. *Palpi* inaequales, filiformes. *Elytra* dimidiata. *Alae* tectae. *Cauda* forcipata.

auricularia. 1. F. elytris apice albis, antennis 14articulatis. *Fn. ſuec.* 860. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 375. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 312. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 340. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 1.
Degeer inf. 3. *p.* 545. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 16. Forficula major.
Mouff. inf. 171. *f. inf.* Forficula auricularia vulgaris.
Petiv. gaz. t. 74. *f.* 5. Forficula vulgaris.
Liſt. ſcar. angl. p. 391. *mut. t.* 31. *f.* A. Scarabaeus ſubrufus, cauda furcata.
Friſch inſ. 8. *p.* 31. *t.* 15. *f.* 1. 2. Vermis auricularius.
Jonſt. inſ. t. 16. *f.* 2.
Merian. inſ. t. 30.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 50.
hiſt. inſ. t. 7. *f.* 17.

Schaeff.

Forficulae *larvae agiles curſitant.*

Schaeff. elem. t. 63.
icon. t. 144. *f.* 3. 4.
Habitat in Europae *fructibus frequens, aures dormientium interdum intrans, ſpiritu fumenti pellenda.*

gigantea. 3. F. pallida ſupra nigro variegata, ano bidentato: forcipe porrecta unidentata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 1. Forficula bilineata.
Habitat in Europa *magis auſtrali, maxima.*

bipunctata. 4. F. nigra capite poſterius pedibusque rufis, elytris macula alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 340. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 3.
Habitat in Italia, *antennis* 11 *articulatis.*

albipes. 5. F. atra, thorace poſterius, elytris baſi alis pedibusque albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 4.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis, mediae magnitudinis.*

minor. 2. F. elytris teſtaceis immaculatis, antennis 10 articulatis. *Fn. ſuec.* 861.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 376. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ* 1. *p.* 340. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 5.
Fn. ſuec. 600. Forficula alis elytro concoloribus.
Degeer inſ. 3. *p.* 553. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 26. 27.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 12. 13.
Habitat rarior in Europa, *antennarum apice albido.*

flexuoſa. 6. F. forcipe flexuoſa, elytris punctis duobus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 6.
Habitat in Cayenna.

dentata. 7. F. fuſca, antennis 10 articulatis, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe baſi dentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 7.
Habitat in Madera.

parallela. 8. F. nigra, thoracis marginibus elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 8.
Habitat in Madera.

9. F.

Morio. 9. F. atra, antennis fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 9.
Habitat in Tahiti.

pallipes. 10. F. forcipe elongata unidentata nigra, pedibus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 10.
Habitat in insulis promontorii viridis.

livida. 11. F. livida minima, forcipe ad lentem dentata. *Mus. Lesk. p.* 46. *n.* 3.

II. HEMIPTERA.

Os roſtrumque inflexum verſus pectus.

Alae hemelytratae: ſuperioribus ſemicoriaceis (per ſuturam rectam minime conniventibus) ſed margine interiore impoſitis.

219. BLATTA.

Caput inflexum.
Antennae ſetaceae.
Palpi inaequales, filiformes.
Elytra alaeque planae, ſubcoriaceae.
Thorax planiuſculus, orbiculatus, marginatus.
Pedes curſorii.
Cornicula duo ſupra caudam (plurimis)

gigantea. 1. Bl. livida, thoracis clypeo macula quadrata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 106. *Gron. zooph.* 633. *t.* 16. *f.* 3.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 1. 2. *et* 4. *t.* 85. *f.* 17. 18.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in Aſia *et* America, *diametro ovi gallinacei.*

maderae. 11. Bl. fuſca, thorace elytrisque lividis fuſco variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 2.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura giganteae, at paulo minor.*

aegyptiaca. 2. Bl. atra, thoracis margine anteriori albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 107.* *Gron. zooph.* 637. *t.* 15. *f.* 2.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 342. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 3.
Drury inſ. 2. *t.* 36. *f.* 3.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 4.
Habitat in Aegypto, Oriente.

occidentalis. 12. Bl. thorace atro: margine omni pallido punctisque duobus baſeos fulvis, elytris olivaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 4.
Habitat in America, *aegyptiaca minor.*

3. Bl.

surinamensis. 3. Bl. livida, thoracis margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 5.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 1.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 8.
Habitat in Surinamo.

americana. 4. Bl. ferruginea, thoracis clypeo posterius exalbido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 6.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 381. *n.* 2. Blatta fusco-flavescens.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 1. 2. 3. Blatta ferruginea.
Raj. inf. 623. Blatta molendinaria ab insula Jamaica allata major.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 8. *t.* 49. *f.* 5.
Merian. surin. 1. *t.* 1.
β) Blatta alata. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 8. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in America, *cum saccharo in* Europam *delata.*

australasiae. 13. Bl. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris basi linea alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 7.
Capta frequens in navi ex oceano *australi reduce.*

erythrocephala. 14. Bl. atra, capite pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 342. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 8.
Habitat - - - - . *magna.*

capensis. 15. Bl. fusca, capite pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 77. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 9.
Habitat ad caput bonae spei, *statura et magnitudine americanae, glabra.*

indica. 16. Bl. grisea, thorace atro: margine anteriori albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 225. *n.* 10.
Habitat in India.

nivea. 5. Bl. alba, antennis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 11.
Degeer inf. 3. *t.* 44. *f.* 10.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 1.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 8. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnitudine tabani.*

irrorata. 17. Bl. pallida, thorace elytrisque fusco irroratis, alis disco nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 343. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 12.

Thunb.

Thunb. nov. inſ. ſp. 4. p. 76? Blatta pallida thorace elytrisque fuſco irroratis, alis baſi nigris.
Habitat ad caput bonae ſpei *et in* nova Hollandia, *giganteae fere magnitudine.*

viridis. 18. Bl. viridis, antennis thoracisque linea laterali flavis, alis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 13.
Habitat in America.

braſilienſis. 19. Bl. pallida, abdomine atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 538. *n.* 3. *t.* 44. *f.* 5. Blatta abdomen nigrum.
Habitat in Braſilia.

Petiveriana. 20. Bl. nigra, elytris maculis quatuor flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 15.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 578. *n.* 28. Caſſida petiveriana.
Pallas ſpic. zool. 9. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 5. Blatta heteroclita.
Petiv. gaz. t. 71. *f.* 1. Cimici affinis niger.
Seb. muſ. 4. *t.* 95. *f.* 21.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* A. B.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 7.
Habitat in India, *ſtatura caſſidae.*

Orientalis. 7. Bl. ferrugineo-fuſca immaculata, elytris abbreviatis: ſulco oblongo impreſſo. *Fn. ſuec.* 862.* *Scop. ent. carn.* 313. *Gron. zooph.* 635. 636. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 380. *t.* 7. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 343. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 16. *Kalm it.* 2. *p.* 406.
Degeer inſ. 3. *p.* 530. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 1. 2. Blatta culinaris.
Friſch inſ. 5. *t.* 3. Blatta lucifuga ſ. molendinaria.
Mouff. inſ. 138. *f.* 2. 3. Blatta molendinaria.
Raj. inſ. 68. *n.* 1. Blatta prima ſ. mollis Mouffeti.
Column. ecphr. 1. *p.* 40. *t.* 36. Scarabaeus alter teſtudinatus minor atque alatus.
Jonſt. inſ. t. 13. *f.* A. Grylli.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 47.
hiſt. inſ. t. 8. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 6. 7.
Sonner. it. t. 12.
Habitat in America, *hoſpitatur in* Oriente *et* Europa, *a* 200 *inde annis in* Bohemia, *a* 1739 *in* Belgio, *et antea in*

in Finlandia, *et* Ruſſia, *frequens in farina, pane, aliis cibariis, calceis &c. quae conſumit, lucifuga, velociſſime curreus, a tenuivedine magna caerulea infeſtatur.*
Femina *aptera larvae ſimilis parit ovum magnitudine dimidia abdominis ſubcylindricum; carina crenulata.*

cincta. 21. Bl. flaveſcens, thoracis elytrorumque marginibus albis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 226. *n.* 17.
Habitat in America, *ſtaturae et magnitudine orientalis, corpore fuſco, elytris nunc breviore, nunc longiore, pedibus albidis.*

picta. 22. Bl. atra, elytris vitta ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 18.
Habitat in Braſilia.

variegata. 23. Bl. thorace flaveſcente, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

lapponica. 8. Bl. flaveſcens elytris nigro maculatis. *Fn. ſuec.* 863.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 20.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 381 *n.* 3. Blatta flaveſcens &c.
Degeer inſ. 3. *p.* 533. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 8. 9. Blatta nigro-fuſca.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 26. *f.* 2.
icon. t. 88. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa, *cibaria conſumens, in auſtralioris tamen humidis ſilvis minus noxia, thorace interdum toto, frequentius margine tantum flaveſcente.*

germanica. 9. Bl. livida, corpore flaveſcente, thorace lineis duabus paralielis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 344. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 21.
Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29. Blatta transfuga.
Habitat in Europa, Braſilia, *inſulis oceani auſtralis, magnitudine lapponicae.*

ruficollis. 24. Bl. thorace ferrugineo, corpore pallido teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 22.
Habitat in India, *ſtatura et magnitudine germanicae.*

25. Bl.

Blattae *lucifugae cum tarvis ſuis rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celeri curſu ſe ſubtrahentes, fumo lithantracis occid: cum gryllis.* Scopoli. *An a Seba delineatae fuſca muſ.* 4. *t.* 85. *f.* 13. 14. *et cinereo-fuſca f.* 15. 16. *propriae ſpecies?*

maculata. 25. Bl. thorace nigro: margine albido, elytris pallidis: maculæ magna apicis nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 23.
Schreber Naturf. 15. *p* 89. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Germaniae *pinetis et ericetis.*

margina- ta. 26. Bl. nigra thorace rufo albo marginato, elytris nigris: limbo albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 502. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 24.
Schreber Naturf. 15. *p.* 88. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat in Italia, *maculata paulo minor.*

oblonga- ta. 10. Bl. oblonga livida, thorace punctis duobus lunulaque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 25.
Degeer inſ. 3. *p.* 541. *n.* 9. *t.* 44. *f.* 11. Blatta oblonga.
Habitat in Surinamo, *forma cantharidis.*

nitidula. 27. Bl. thorace ferrugineo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 26.
Habitat in Surinamo, *minuta, nitida.*

fuſca. 28. Bl. fuſca immaculata capite, antennis, pedibus, thoracis hemelytrorumque marginibus ferrugineis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. 77.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine americanae, glabra.*

deuſta. 29. Bl. fuſca immaculata, capitis hemelytrorumque baſibus rufis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 77.
Habitat ad caput bonae ſpei, *germanica paulo major.*

chloro- tica. 30. Bl. polita ex griſeo lutea, elytris ſubpellucidis virenti-venoſis: margine craſſiore opaco praſino; margine extimo baſique lutescentibus. *Pallas ſpic. zool.* 9. *p.* 11. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine et ſtatura fere orientalis.*

latiſſima. 31. Bl. fuſca punctata, thoracis margine anoque flavis, abdomine ſubtus nigro, tibiis ſpinuloſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 184. *n.* 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

aterrima. 32. Bl. nigra immaculata, tarſis albis, geniculis fuſcis, tibiis ſpinoſis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 185. *n.* 8. *t.* 49. *f.* 9.
Habitat in India.

perſpicillaris. 33. Bl. flaveſcens, thorace medio fulvo: margine hyalino. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 186. *n.* 12. *t.* 49. *f.* 11. *Habitat in* Marchia, *an varietas lapponicae, cui perquam affinis?*

aſiatica. 34. Bl. griſea, oblonga elytris alisque abdomine longioribus apice anguſtatis. *Pallas it.* 3. *p.* 263. *Habitat in* Aſia *auſtrali, cum mercibus* Sinarum *in* Sibiriam *delata, germanica major.*

Schaefferi. 35. Bl. nigricans, thorace elytrorumque margine flaveſcente, pedibus luteis: femoribus nigris. *Schaeff. ic. t.* 158. *f.* 2.

ſylveſtris. 36. Bl. ſubtus nigra, antennis nigris, thoracis margine elytrisque teſtaceis. *Scop. ent. carn. p.* 104. *n.* 314. *Poda muſ. graec. p.* 50. *Habitat in* Carniolia.

penſylvanica. 37. Bl. fuſca, thoracis clypeo albido: medio nigro-fuſco, elytris flavo-fuſcis anterius albidis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 537. *n.* 2. *t.* 44. *f.* 4. *Habitat in* Penſylvania, *pollicem longa.*

livida. 38. Bl. fuſca, corpore ſubtus pedibusque fulvo-griſeis, alis longitudine abdominis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 538. *n.* 4. *t.* 44. *f.* 6. *Habitat in* Surinamo, $8\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

rufa. 39. Bl. oblonga rufa, pedibus teſtaceis, alis abdomine longioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 539. *n.* 5. *t.* 44. *f.* 7. *Habitat in* Surinamo, 9 *lineas longa.*

griſea. 40. Bl. oblonga cinereo-griſea: punctis aliquot fuſcis minutiſſimis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 540 *n.* 7. *t.* 44. *f.* 9. *Habitat in* Surinamo, $10\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

minutiſſima. 41. Bl. ovata nigro-fuſca, antennis brevioribus, thoracis lateribus alisque hyalinis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 542. *n.* 10. *t.* 44. *f.* 13. 14. *Habitat in* Surinamo, *cimicis lectularii magnitudine.*

aptera. 42. Bl. aptera fuſca punctata, abdominis ſegmentis margine poſteriori tibiisque lividis, alis ferrugineis, tibiis ſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 5. *Habitat extra* Europam.

43. Bl.

punctulata. 43. Bl. fusca, thorace punctis elevatis impressisque variegato, alis albis. *Mus. Lesk. p.* 46. *n.* 7.
Habitat extra Europam, *statura et facie orientalis, an varietas?*

ocellata. 44. Bl. brunnea, fronte thoracisque disco macula rubra: posteriori ocellis duobus fuscis varia, abdominis segmentis margine anteriore supra infraque rubris. *Mus. Lesk. p.* 46. *n.* 8.
Habitat extra Europam.

PNEUMORA.

Corpus ovatum, inflatum, hyalinum.
Caput inflexum, maxillosum.
Thorax convexus, subtus carinatus.
Elytra deflexa, membranacea.
Pedes cursorii.

immaculata. 1. Pn. elytris immaculatis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 255. *t.* 7. *f.* 1.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 363. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 12. Gryllus (papillosus) viridis, albo maculatus scutello carinato utrinque dentato, abdomine vesiculoso variegato.
Habitat ad caput bonae spei, *in floebe cernua, a Septembri ad Novembrem frequens; viridis, elytris aliquando minutissime nigro-punctatis, rarius flavescens aut rubescens, gryllo domestico duplo major.*

maculata. 2. Pn. elytris viridibus: maculis quadratis albis. *Thunb. act. Stockh.* 1775. 3. *p.* 256, *t.* 7. *f.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 693. *n.* 4. *Mus. Lud. Ulr.* 120.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 363. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 13. Gryllus (varioloso) viridis calloso-punctatus abdomine vesiculoso albo variegato.
Habitat ad caput bonae spei, *in floebe annua, Novembri et Decembri conspicua, immaculatae magnitudine, tota viridis, albo-maculata.*

sexguttata. 3. Pn. elytris viridibus: maculis tribus argenteis. *Thunb. act. Stock.* 1775. 3. *p.* 257. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 3.
Fabr.

Pneumorae *quasi totae membrana cava constant, pedes dentatos ad corpus fricando, crepusculo et nocte sonum edunt, lucem emicantem petunt.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 363. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 11. Gryllus (inanis) viridis, elytris maculis duabus albis abdomine veſiculoſo: utrinque maculis tribus albis.
Habitat ad caput bonae ſpei, *Decembri conſpicua, maculata quadruplo major, viridis.*

220. MANTIS. *Caput* nutans, maxilloſum, palpis filiformibus inſtructum.
Antennae ſetaceae.
Alae 4 membranaceae, convolutae: inferiores plicatae.
Pedes anteriores compreſſi, ſubtus ſerrato-denticulati, armati ungue ſolitario et digito ſetaceo, laterali, articulato.
poſteriores 4 laeves, greſſorii.
Thorax linearis, elongatus, anguſtatus.

filiformis. 15. M. corpore filiformi aptero. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 1. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 187. *n.* 5. *t.* 51. *f.* 2. 3?
Scop. delic. inſubr. 1. *p.* 60. *t.* 24. *f.* A. 1–3. Plocaria domeſtica?
Habitat in America, India, Italia, *fuſca, pedibus corpore longioribus, antennis nigris.*

Gigas. 1. M. thorace teretiuſculo ſcabro, elytris breviſſimis, pedibus ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 109.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 345. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 2.
Marcgr. braſ. 251. Arumatia.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 19. *f.* 9. 10.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 6.
Petiv. gaz. t. 60. *f.* 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 1. 2.
Habitat in Aſia, *alis maximis.*

cylindrica. 54. M. thorace cylindrico, pedibus anterioribus thoraci anterius annexis, elytris griſeis baſi ſubtusque rufis, alis fuſcis albo guttatis. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 12.

Habitat

Habitat extra Europam, *alarum guttis vagis, feneſtratis, ſpina proſtrata utrinque ad baſin elytrorum abdomen reſpiciente.*

phthiſica. 2. M. thorace teretiuſculo muricato, elytris breviſſimis, pedibus inermibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 110.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſiccifolia. 3. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 111.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 16.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 17. *f.* 4. 5.
Edw. glean. t. 258.
Merian. ſurin. t. 66.
Seligm. av. 7. *t.* 48.
Habitat in America *auſtrali et* India.

gongyloides. 4. M. thorace ſubciliato, femoribus anterioribus ſpina terminatis; reliquis lobo. *Muſ. Lud. Ulr.* 112.* *Gron. zooph.* 639.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 10.
Amoen. acad. 1. *p.* 504. Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.
Aldr. inſ. t. 13. *f.* 21. Mantis.
Maregr. braſ. 246. Gaayra.
Act. angl. 301. *t.* 20. *f.* 3.
Seb. muſ. 4. *t.* 68. *f.* 9–12.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 56.
Aubent. miſc. t. 65. *f.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 56. *f.* 2.
Habitat in Africa *et* Aſia, *capitis vertice ſubulato bifido, antennis rarius pectinatis.*
Larvae *pedes lobis membranaceis alati.*

paupera. 16. M. thorace lineari ſpinuloſo, femoribus anterioribus ſpina terminatis; reliquis lobo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 346. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 227. *n.* 11.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 61. Mantis thorace apice dilatato ſpinuloſo, femoribus lobo ſimplici terminatis.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 51. *f.* 1.
Habitat in India, *gongyloda minor et anguſtior.*

mendica. 17. M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis: margine albo-punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 347. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 12.
Habitat Alexandriae.

religiosa. 5. M. thorace laevi subcarinato elytrisque viridibus immaculatis. *Scop. ent. carn.* 315.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 7. 8.
Sulz. hist. inf. t. 8. *f.* 4.
Schaeff. elem. t. 81.
Seligm. av. t. 4.
Habitat in Sibiria, Austria, Africa, *tota viridis, an mera varietas oratoriae?*

oratoria. 6. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra anterius rufescentibus. *Mus. Lud. Ulr.* 115.*
Fabr. Sp. inf. 1. *p.* 348. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 21. Mantis thorace laevi, elytris viridibus immaculatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 399. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 4. Mantis.
Mouff. inf. 118. *f.* 3.
Aldr. inf. 4. *t.* 3. *f.* 10.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 9. 10.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 1. 2.
Degeer inf. 3. *t.* 37. *f.* 2.
Habitat in Oriente *et australi* Europa Francofurtum ad Moenum *usque.*

irrorata. 7. M. thorace laevi subcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis vagis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 29. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 348. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali, precariae similis.*

precaria. 8. M. thorace subciliato, elytris virescentibus; ocello ferrugineo. *Mus. Lud. Ulr.* 114.* *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 349. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 22.
Merian. surin. t. 66.
Seb. mus. 4. *t.* 67. *f.* 3–6.
Degeer inf. 3. *p.* 406. *n.* 3. *t.* 36. *f.* 4.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 8. *t.* 50. *f.* 1.
Habitat in America *et* Africa, *elytrorum ocello anterius dimidiato albo, aut toto interdum albo.*

sancta. 18. M. viridi-flavescens, thorace serrulato, elytris viridibus immaculatis, alis subhyalinis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 23.
Habitat in Gallia *magis australi, statura oratoriae, at triplo minor.*

19. M.

monacha. 19. M. teſtacea, thorace laevi, elytris alisque viridi-hyalinis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 228. *n.* 24.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura precariae, at duplo minor.*

obſcura. 20. M. obſcure griſea, thorace ſerrulato, elytris macula baſeos, alis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 25.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura precariae, at minor.*

hyalina. 21. M. thorace ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, fronte bidentata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 26.
Degeer inſ. 3. *p.* 410. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America.

feneſtrata. 22. M. thorace laevi, alis hyalinis, elytrorum margine exteriori fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 349. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 27.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura hyalinae.*

bidens. 23. M. thorace ſcabro, elytris viridibus: faſciis nigris, alis fuſcis diſco atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 28.
Habitat in America.

miniſtralis. 24. M. thorace ſcabro crenato longitudine capitis anterius ferrugineo, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 29.
Habitat in nova Hollandia.

urbana. 25. M. thorace integro, elytris viridibus: puncto faſciaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 30.
Habitat in America *auſtrali et* India.

ruſtica. 26. M. thorace laevi fuſco, elytris ala brevioribus fuſco-hyalinis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 350. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 31.
Habitat ad Patagoniae *littora, paganae magnitudine.*

An forſan hujus generis inſectum a Queronio fuco adhaerens in mari mediterraneo repertum in act. pariſ. extr. 9. p. 329. ſub nomine puce de mer arpenteuſe deſcriptum et delineatum? repugnat habitatio in mari.

nasuta. 27. M. thorace spinoso ciliatoque, fronte porrecta spinosa emarginata. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 32.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

lobata. 28. M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, oculis conico-acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 33.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 62. *f.* 73. Mantis virescens, capitis cornu oculisque conico-acuminatis.
Habitat ad caput bonae spei, *parva.*

pulchra. 29. M. viridis, thorace integro, alis fusco-hyalinis basi ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 34.
Habitat Tranquebariae, *parva.*

fausta. 30. M. linearis cinereo-fusca immaculata. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 63. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 229. *n.* 35.
Habitat ad caput bonae spei, *numen tutelare Hottentottorum.*

perspicua. 31. M. obscura, elytris alisque hyalinis, alis macula marginali apiceque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *statura minutae, at paulo major.*

pagana. 32. M. alis reticulatis albis: macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 37.
Pall. spic. zool. 9. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 8. Mantis Perla.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 916. *n.* 2. Raphidia (mantispa) pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus.
Scop. ent. carn. 712.
Poda inf. 101. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in Calabria, Gallia, *et* Germania.

minuta. 33. M. thorace cylindrico flavescente, elytris hyalinis: costa virescente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 350. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, et circa* Aurelianum.

pusilla. 34. M. thorace cylindrico flavescente, elytris alisque hyalinis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 351. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 39.
Pall. spic. zool. 9. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 9. Mantis pusilla.
Habitat in Africa, *raphidia ophiopsi major.*

9. M.

carolina. 9. M. thorace ſubciliato carinato, elytris albidis fuſco nebuloſis. *Amoen. acad. 6. p. 396. n. 28.**
Habitat in Carolina, *precariae ſimilis, elytris alisque abdomine brevioribus.*

pectinicornis. 10. M. thorace laevi, elytris viridibus, alis oblique ſtriatis, vertice ſubulato, antennis pectinatis. *Amoen. acad. 6. p. 396. n. 27.* Fabr. ſp. inſ. 1. p. 347. n. 15. mant. inſ. 1. p. 228. n. 17.*
Drury inſ. 1. t. 50. f. 1.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. t. 50. f. 2.
Habitat in India, *auſtrali* America, Jamaica.

oculata. 35. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 348. n. 16. mant. inſ. 1. p. 228. n. 18.*
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis, capite pallido, thorace teſtaceo, elytris alisque albo-hyalinis, pedibus obſcuris.*

ſuperſtitioſa. 36. M. thorace filiformi triangulo anterius ſerrulato, elytris vireſcentibus, alarum coſta tranſverſe ſtriata. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 348. n. 17. mant. inſ. 1. p. 228. n. 19.*
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

bicornis. 11. M. thorace laevi, capite bipartito ſubulato. *Muſ. Lud. Ulr. 116.**
Habitat in America *auſtrali et* India, *pedibus inermibus.*

tricolor. 12. M. thorace lateribus expanſo-lobato, capite cornuto, pedibus anterioribus latiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr. 117.* Fabr. ſp. inſ. 1. p. 347. n. 12. mant. inſ. 1. p. 228. n. 14.*
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. t. 51. f. 4.
Habitat in India, *oculis in cornicula auriformia acuta deſinentibus.*

cancellata. 37. M. thorace utrinque dilatato membranaceo plano. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 347. n. 13. mant. inſ. 1. p. 228. n. 15.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſtrumaria. 13. M. thorace utrinque membranaceo dilatato obcordato. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 347. n. 11. mant. inſ. 1. p. 228. n. 13.*
Roeſ. inſ. 2. gryll. t. 3.
Merian. ſurin. t. 27.
Seb. muſ. 4. t. 69. f. 7. 8.
Habitat in America *auſtrali et* India.

necydaloides. 14. M. thorace scabro, elytris ovatis angulatis breviſſimis, alis oblongis. *Amoen. acad. 6. p. 397. n. 3. Fabr. ſp. inſ. 1. p. 345. n. 2. mant. inſ. 1. p. 227. n. 3.*
Roeſ. inſ. 2. gryll. t. 19.
Degeer inſ. 3. t. 36. f. 2.
Habitat in Aſia; *mas anguſtior, femina craſſior, thorace laevi.*

atrophica. 38. M. thorace quadriſpinoſo, elytris breviſſimis baſi ariſtato-mucronatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 345. n. 3. mant. inſ. 1. p. 227. n. 4.*
Pall. ſpicil. zool. 9. t. 1. f. 7.
Habitat in inſula Java, *capite inermi.*

ſpinoſa. 39. M. capite thoraceque ſpinoſis, elytris breviſſimis acutis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 346. n. 4. mant. inſ. 1. p. 227. n. 5.*
Habitat in India.

biſpinoſa. 40. M. thorace teretiuſculo anterius biſpinoſo, elytris breviſſimis: margine flavo. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 346. n. 5. mant. inſ. 1. p. 227. n. 6.*
Habitat in America.

jamaicenſis. 41. M. linearis viridis, elytris breviſſimis: margine exteriori flavo. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 346. n. 6. mant. inſ. 1. p. 227. n. 7.*
Drury inſ. 2. t. 49. f. 1.
Habitat in Jamaica.

lateralis. 42. M. linearis nigra, elytris breviſſimis gibbis: lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 346. n. 7. mant. inſ. 1. p. 227. n. 8.*
Habitat in Braſilia.

linearis. 43. M. linearis fuſca, elytris breviſſimis baſi ſubſpinoſis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 227. n. 9.*
Habitat in India, *antennis filiformibus.*

labiata. 44. M. linearis vireſcens inermis, capitis lateribus viridibus. *Thunb. nov. inſ. ſp. 3. p. 61.*
Habitat in India.

45. M.

An huc omnes ſpecies a Seba *in theſauri vol. IV. delineatae? tridens t. 68. f. 7. 8. clavata (an varietas gongylodis?) t. 68. f. 11. 12. parvula t. 68. f. 13-16. tricornis t. 69. f. 1. 2. exhibitata t. 69. f. 3. 4. octoſetoſa t. 69. f. 5. 6. aeruginoſa t. 70. f. 7. 8. rubro-maculata t. 70. f. 9. 10. plumbea t. 70. f. 13. 14. nigro-venulata t. 73. f. 6. paradoxa t. 73. f. 9. 10. nigro-punctata t. 75. f. 3. 4. biſulcata t. 75. f. 11. falcataria t. 76. f. 1-4. dentata t. 76. f. 5. 6. pater noſter t. 76. f. 7-12. ſpuria t. 76. f. 13. 14. teſſulata t. 78. f. 1-4. ſoliata t. 80. f. 13. 14. Species hujus generis inſecta alia venantur; larva puppaque hexapode agili, illa penitus aptera.*

maculata. 45. M. cinerea, thorace alato spinuloso, pedibus intus nigro-maculatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 61.
Habitat in Japonia, *bipollicaris.*

capensis. 46. M. cinerea, thorace inermi, capite conico integro.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 62. Mantis nasuta.
Habitat ad caput bonae spei *et in* India, *sesquipollicaris.*

parva. 47. M. livida laevis, elytris alisque hyalinis; abdominis segmentis nigro-marginatis.
Drury inf. 2. *p.* 75. *t.* 39. *f.* 5.
Habitat in America, *fere sesquipollicaris.*

cingulata. 48. M. thorace subfusco, elytris viridibus atro-reticulatis: maculis quatuor nigricantibus, alis nigricantibus nigro-lineatis: margine ex fusco flavescente.
Drury inf. 2. *p.* 89. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Jamaica, *abdomine nigro-cingulato, apice bispinoso.*

gigantea. 49. M. fuscescens, collo, thorace femoribusque serratis.
Drury inf. 2. *p.* 89. *t.* 50.
Habitat in Italia *superiori, 8 fere pollices longa.*

angusta. 50. M. virescens, cauda bifurca, antennis longitudine corporis filiformibus. *Drury inf.* 1. *p.* 130. *t.* 50. *f.* 3.
Habitat in insula Antigua.

sibirica. 51. M. corpore flavo fuscoque vario, alis hyalinis: nervulis rufescentibus. *Lepech. it.* 1. *p.* 271. *t.* 17. *f.* 8.
Habitat in Sibiriae *helianthemo et umbellatis; an pusillae varietas?*

brachyptera. 52. M. cinerea, thorace dentato, alis abdomine dimidio brevioribus. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat in desertis aridissimis, etiam salsis, ad Irtin *sitis, rarior in* Uralensibus, *oratoria major.*

pennicornis. 53. M. verticis spina conica, antennis pennatis linearibus, femoribus posterioribus lobo terminatis. *Pall. it.* 2. *app. n.* 81.
Habitat rarior in desertis, mari caspio *finitimis, australibus, forma et colore gongylodis.*

221. GRYLLUS. *Caput* inflexum, maxillosum, palpis filiformibus instructum.
Antennae setaceae vel filiformes.
Alae quatuor, deflexae, convolutae: inferiores plicatae.
Pedes posteriores saltatorii. *Ungues* ubique bini.

* *antennis ensiformibus, capite conico thorace longiori,* Acridae sive Truxalides Fabricii.

nasutus. 1. Gr. corpore viridi. *Mus. Lud. Ulr.* 118.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 1.
Mouff. inf. 119. Mantis africana.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 4.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 57.
hist. inf. t. 8. *f.* 5.
Drury inf. 2. *t.* 40. *f.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 96. *f.* 41.

turritus. β) Gryllus capite conico, antennis ensiformibus, alis hyalinis.
Syst. nat. X. *p.* 427.
Seb. mus. 4. *t.* 80. *f.* 1. 2.
t. 96. *f.* 46.
Habitat in omni Africa, *in* Sicilia, Calabria, *ad mare* Caspium, *ore ad basin, antennis ad apicem capitis positis, thorace non longioribus.*

conicus. 62. Gr. corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi, linea punctorum alborum. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 2. *mant.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia, *nasuto nimis affinis.*

vittatus. 63. Gr. testaceus, capite prominulo thorace femoribusque vitta laterali argentea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3.
Habitat in Sina, *nasuti magnitudine.*

brevicornis. 2. Gr. viridis, capite prominulo, antennis compressis longitudine thoracis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 37.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 352. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 4.
Degeer inf. 3. *p.* 499. *n.* 16. *t.* 41. *f.* 7. Acrydium enficorne.
Habitat in America *meridionali.*

64. Gr.

gigan-teus. 64. Gr. viridis, vittis duabus rubescentibus, antennis ferruginis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 191. *n.* 1. *t.* 52. *f.* 6.
Habitat in America, *nasuto major.*

ungaricus. 65. Gr. obscure viridis, pedibus spadiceis, thorace lineis tribus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 192. *n.* 2. *t.* 52. *f.* 7.
Habitat in Ungaria.

oxycephalus. 66. Gr. capitis apice spatulato, elytris abdomine longioribus: striga longitudinali fusca, alis flavescentibus margine hyalinis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 54.
Habitat in desertis Russiae *australibus, inter glycyrrhizam vagans, Augusto vulgaris, nasuto perquam similis.*

foliaceus. 67. Gr. alis flavescentibus, antennis foliaceis.
Seb. mus. 4. *t.* 74. *f.* 9. 10.
Habitat in Asia.

** *Thorace carinato, antennis filiformibus longiore, palpis aequalibus:* Bullae s. Acrydia Fabricii.

unicolor. 3. Gr. unicolor, thorace brevissimo, antennis scutello brevioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 119.*
Habitat in America *australi et* India *flavus aut ruber, variolosо similis, sed thorace non cristato, an hujus tribus?*

afer. 68. Gr. thoracis scutello plano acuminato abdominis longitudine. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon, *niger; bipunctati magnitudine.*

carinatus. 6. Gr. thorace cymbiformi laevi, vertice depresso. *Mus. Lud. Ulr.* 122.*
Habitat in America *australi et* India; *an hujus tribus?*

bipunctatus. 7. Gr. fuscescens, thoracis scutello longitudine abdominis. *Fn. suec.* 864.* *Scop. ent. carn.* 316. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 351. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 2.

Fn.

An species a Seba *musei vol.* IV. *delineatae, tapetum persicum t.* 74. *f.* 1. *viridi-maculatus t.* 74. *f.* 3. *pallidissime-virens t.* 74. *f.* 4. *griseo-rubicundus t.* 74. *f.* 5. *nigro-fuscus t.* 74. *f.* 6. *nigricans t.* 79. *f.* 5. 6. *albo-maculatus t.* 80. *f.* 3. 4. *coffens t.* 83. *f.* 6. *testaceus t.* 83. *f.* 7. *obscure flavus t.* 83. *f.* 8. *rufescens t.* 83. *f.* 10. *cinereus t.* 83. *f.* 11. *nigro-maculatus t.* 84 *f.* 7. *purpurascens t.* 84. *f.* 8. *nigro-striatus t.* 84. *f.* 9. *versicolor t.* 84. *f.* 10. *ad hanc tribum referendae?*

Fn. ſuec. 1. *n.* 623. Gryllus elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenſo: macula utrinque nigra rhombea.
Geoffr. inſ. par. II. *p.* 394. *n.* 5. Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine aequali.
Degeer inſ. 1. *p.* 483. *n.* 11. *t.* 23. *f.* 15. Acrydium ſcutellatum.
Raj. inſ. 60. Locuſta minor fuſceſcens, cucullo longo rhomboideo.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 6.
Herbſt apud Fueſſli arch. inſ. 8. *t.* 52. *f.* 1.

ſtriatus. β) Gryllus linea albida a fronte per medium ſcutellum percurrente. *Lepech. it.* 2. *p.* 211. *t.* 10. *f.* 17.
Habitat in Europae *collibus arenoſis apricis.*

ſubulatus. 8. Gr. thoracis ſcutello abdomine longiore. *Fn. ſuec.* 865.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 351. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 3.
Degeer inſ. 3. *p.* 484. *n.* 12. *t.* 23. *f.* 17.
Fn. ſuec. 624. Gryllus elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 395. *n.* 6. Acrydium elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.
Sulz. hiſt. inſ. t. 8. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 154. *f.* 9. 10. *t.* 161. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa *ad foſſas et aquas ſtagnantes, bipunctato valde affinis, nunc griſeus, nunc fuſcus.*

opacus. 69. Gr. ſpadiceus aut niger, thorace carinato ad latera ſinuato abdominis longitudine. *Herbſt aud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 3. *t.* 52. *f.* 2.
Habitat Berolini *in foſſis ſubuloſis, ſtatura bipunctati, at minor.*

bifaſciatus. 70. Gr. fuſcus albo-maculatus: faſciis duabus lateralibus ochroleucis. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 4 *t.* 52. *f.* 3.
Habitat Berolini *in arenoſis, ſtatura et magnitudine opaci.*

bimaculatus. 71. Gr. thorace fuſco: utrinque lunula ochroleuca. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 190. *n.* 5. *t.* 52. *f.* 4.
Habitat Berolini, *ſtatura et magnitudine ſubulati.*

granulatus. 72. Gr. ex griſeo viridi nigricanteque varius punctis elevatis aſper ad latera complanatus, thorace ſubovali gibbo. *Herbſt apud Fueſſli arch. inſ.* 8. *p.* 198. *n.* 6. *t.* 52. *f.* 5.

leucoſtictos. 219. Gr. fuſcus, thoracis ſcutellique dorſo elevato pallido, ſcutello utrinque baſi macula alba. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 16. b.
Habitat in Europa.

griſeus. 220. Gr. griſeus ſcutello baſi et pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. c.
Habitat in Europa.

binotatus. 221. Gr. griſeus, ſcutello verſus apicem laminae alarum macula utrinque ferruginea. *Muſ. Lesk. p.* 47. *n.* 16. d.
Habitat in Europa.

*** *antennis ſetaceis, palpis inaequalibus, thorace rotundato cauda, biſeta:* Achetae.

Gryllotalpa. 10. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tomentoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 123.* *Fn. ſuec.* 866. *Scop. ent. carn.* 317. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 387. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 231, *n.* 1. *Degeer inſ.* 3. *p.* 517. *n.* 2. Gryllus ſupra fuſcus, ſubtus ferrugineo-flavus &c.
Raj. inſ. 64. *Jonſt. inſ. t.* 12. *f. ult.* Gryllotalpa.
Mouff. inſ. 104.
Aldr. inſ. 571.
Welſch hecaſt. 1. *p.* 39.
Goed. inſ. 1. *t.* 76.
Barthol. act. Hafn. 4. *p.* 5. *f.* 1-6.
Blanck. herb. t. 81. *f.* 10.
Imperat. nat. 921. *f.* 2.
Friſch inſ. 11. *t.* 5.
Seb. muſ. 4. *t.* 89. *f.* 3. 4.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 14. 15.
Catesb. Carol. 1. *t.* 8.
Sulz. inſ. t. 9. *f.* 59.
Schaeff. ic. t. 37. *f.* 1.
Habitat in Europae, *borealis* Americae *et* Aſiae, *ipſius* Javae (*minor tamen*) *cutis, hortorum peſtis, fimo equino allicienda, porcino pellenda.*

monſtroſus. 73. Gr. elytris alisque caudato-convolutis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 353. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 231. *n.* 2.
Drury inſ. 2. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in India.

minutus. 11. Gr. flavescens, alis caudatis, tibiis posterioribus trispinosis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 355. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 14.
Degeer inf. 3. *p.* 524. *n.* 8. *t.* 43. *f.* 8. Gryllus testaceus.
Habitat in America *meridionali, semipollicaris, statura domestici, subtus fuscus.*

domesticus. 12. Gr. alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco. *Fn. suec.* 868. *Scop. ent. carn.* 318.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 353. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 389. *n.* 2. Gryllus pedibus anticis simplicibus.
Degeer inf. 3. *p.* 509. *n.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. Gryllus griseofuscus pallidus &c.
Raj. inf. 63. *Mouff. inf.* 135. Gryllus domesticus.
Jonst. inf. t. 12.
Hufn. inf. 11. *f.* 4.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 24.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 12.
Hospitatur hodie in Europae *muris domesticis, in* Guinea *sextuplo major, tota nocte, praesertim pluvia ingruente stridens, caloris fornacum amans, sanie et liquore carnium vescens, blattis, ut fertur, non cohabitans, pilulis ex arsenico et dauci recente radice farinae tritici immistis, aut nympheae radicibus lacti incoctis, ut perhibent, necandus, a campestri, si inquilinum se reddiderit, pellendus.*

assimilis. 74. Gr. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stilis duobus apice fissis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 344. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 4.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

reticulatus. 75. Gr. niger, elytris rufo-reticulatis, antennis albo-annulatis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 354. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 5.
Habitat ad caput bonae spei, *antennis corpore duplo longioribus.*

76. Gr.

Grylli, *si primum tribum exceperis, quae aliis insectis victitant, plantis vescuntur, achetae potissimum radicibus, tettigoniae et locustae foliis; larva et puppa omnium hexapus, agilis, imagini simillima, illa aptera; sub terra saepe habitans, haec non raro cum imagine vorans; paucis speciebus elytra aut alae nullae, et tum interdum modo feminis; in paucis ocellus elytrorum vitreus stridoris est instrumentum; japonicae oryzam infestant.*

brasilien- sis. 76. Gr. fuscus, alis caudatis elytris longioribus, dorso pallidiore, cauda adscendente longitudine corporis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 6.
Habitat in Brasilia.

orientalis. 77. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 7.
Habitat Tranquebariae.

capensis. 78. Gr. niger, alis caudatis elytris longioribus, elytris fuscis basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 8.
Habitat ad caput bonae spei.

Morio. 79. Gr. alis caudatis elytris longioribus albis apice nigris, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 354. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 9.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura et magnitudine campestris.*

campe- stris. 13. Gr. alis elytro brevioribus, corpore nigro: stylo lineari. *Mus. Lud. Ulr.* 124. *Scop. ent. carn.* 319. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 10.
Raj. inf. 63. Gryllus campestris Mouffeti.
Frisch inf. 1. *t.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 23. *et t.* 96. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 66.
icon. t. 157. *f.* 2-4.
Habitat in Europa *magis australi, a primo Maji die ad aequinoctium usque stridens.*

umbracu- latus. 14. Gr. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo.
Habitat in Mauritania, *facie campestris, at capite magis ferrugineo, et membrana obovata ante caput deflexa distinctus.*

convolu- tus. 15. Gr. corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis.
Amoen. acad. 6. *p.* 399. *n.* 38.*
Habitat in Surinamo.

hospes. 80. Gr. alis caudatis elytro longioribus albis: costa fusca, elytris nigris albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 11.
Habitat in America.

Crucis. 81. Gr. fuscus, alis caudatis elytro longioribus, elytrorum margine flavo nigro-punctato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 12.
Habitat in insula S. Crucis, *statura campestris.*

Allioni. 82. Gr. capite thoraceque flavescentibus, elytris aqueis longitudine alae. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 355. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 13.
Habitat in Italia, *parvus.*

gryllodes. 83. Gr. griseus, thorace depresso, abdomine fuscescente elytris paulo breviore, alis elytris longioribus reticulatis griseo-hyalinis. *Pall. spic. zool.* 9. *p.* 16. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Jamaica, *habitu ferme domestici, sed gracilior et longior; an huc spectat?*

binotatus. 84. Gr. niger, elytrorum basi maculis binis flavis, antennis corpore brevioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 338. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 4.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 53. *f.* 1. Acheta bimaculatus
Habitat in Europa.

pellucens. 85. Gr. albidus, thorace trapeziformi. *Scop. ent. carn.* 324. *delic. insubr.* 1. *p.* 65. *t.* 24. *f.* E.
Habitat in Carniolae *et* Italiae *vineis et hortis semipollicaris, aestate tota fere nocte stridens, habitu domestici, at duplo major, capite lucido, thoracis maculis tribus fuscis, elytris flavescentibus distinctus.*

Gigas. 86. Gr. badius.
Sulz. hist. inf. p. 83. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in America, *domestico dimidio major.*

tessellatus. 87. Gr. ex fusco testaceus, alis albo nigroque tessellatis.
Drury inf. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in insula S. Johannae.

membranaceus. 88. Gr. pallide testaceus, thorace collari flavescente, alis ochraceis caudatis. *Drury inf.* 2. *p.* 81. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat - - -

desertus. 89. Gr. alis caudatis elytro longioribus, corpore nigro. *Pall. it.* 1. *app. n.* 53.
Habitat terrestris in desertis australibus Uralensibus, *domestico affinis.*

90. Gr.

surinamensis. 90. Gr. griseo-fuscus, thorace plano, elytris macula oblonga nigra, pedibus posterioribus corpore duplo longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 519. *n.* 1. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Surinamo.

muticus. 91. Gr. capite elytrisque badiis, pedibus testaceis, cauda feminae mutica. *Degeer inf.* 3. *p.* 520. *n.* 2. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Surinamo.

ater. 92. Gr. ex nigro fuscus, cauda feminae mutica. *Degeer inf.* 3. *p.* 520. *n.* 3. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in Surinamo.

fasciatus. 93. Gr. fuscus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus fulvis. *Degeer inf.* 3. *p.* 522. *n.* 5. *t.* 43. *f.* 5.
Habitat in Pensylvania.

niveus. 94. Gr. albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, antennis femoribusque posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 522. *n.* 6. *t.* 43. *f.* 6.
Habitat in Pensylvania.

punctulatus. 95. Gr. ex griseo fuscus, elytris hyalinis: puncto fusco, alis carneis antennisque longissimis, thorace elongato. *Degeer inf.* 3. *p.* 523. *n.* 7. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Pensylvania.

**** *antennis setaceis, palpis inaequalibus, cauda feminis ensifera*, Tettigoniae, Fabricio Locustae.

citrifolius. 16. Gr. thorace tetragono angulis scabro. *Mus. Lud. Ulr.* 125. *Gron. zooph.* 657.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 356. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 1. Locusta thorace tetragono, angulis crenatis.
Degeer inf. 3. *p.* 437. *n.* 7. *t.* 37. *f.* 3. Locusta viridis.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 1.
Habitat in America *australi et* India.

laurifolius. 17. Gr. thorace subtetragono laevi trilobo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 126.* *Fabr. sp. inf.* 4. *p.* 356. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 2.
Degeer inf. 3. *p.* 445. *n.* 6. *t.* 38. *f.* 2. Locusta oblongifolia.
Sloan. jam. 2. *p.* 101. *t.* 236. *f.* 1. Locusta maxima viridis, alis latissimis.
Marcgr. bras. 246. Tucurubi.
Habitat in America, nova Hollandia.

myrtifolius. 18. Gr. thorace subtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 356. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 3. Locusta thorace subtetragono laevi, alis deflexis elytro longioribus, ense brevissimo recurvo.
Degeer inf. 3. *p.* 447. *n.* 8. *t.* 38. *f.* 4. Locusta viridis, pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus.
Drury inf. 2. *t.* 41. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *laurifolio quadruplo minor.*

camillifolius. 96. Gr. thorace deflexo, elytris concavis apice rotundatis ala longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 356. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 4.
Degeer inf. 3. *p.* 438. *n.* 2. *t.* 37. *f.* 5. Locusta siccifolia.
Habitat in America.

thymifolius. 97. Gr. thorace tetragono laevi, elytris sublinearibus fuscopunctatis, alis brevioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia, *nunc viridis*, *nunc ferrugineus.*

graminifolius. 98. Gr. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis ala brevioribus, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 6.
Habitat ad caput bonae spei.

speculatis. 99. Gr. thorace deflexo, elytris concavis viridibus: basi ocello dorsali vitreo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 7.
Habitat in America.

australis. 100. Gr. virescens, thorace rotundato, elytris alis aequalibus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 8.
Habitat in insula Amsterdam, *spinipedi affinis*, *at major.*

spinipes. 101. Gr. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis ala brevioribus, pedibus anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 9.
Habitat in Brasilia.

maxillosus. 102. Gr. viridis, antennis maxillisque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 10.
Habitat in insulis Americae *oppositis.*

19. Gr.

conocephalus. 19. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis ala breviori-bus, tibiis muticis, capite conico obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 18.
Habitat in Africa, *viridis, magnitudine domestici.* Brünniche.

elongatus. 20. Gr. thorace subquadrato laevi, elytris alisque griseis corpore longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 127.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 11.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 7.
Habitat in India.

femoratus. 103. Gr. thorace scabro griseo, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus, femoribus subtus membranaceis dentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 12.
Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine elongati.*

lamellosus. 21. Gr. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora posteriora. *Mus. Lud. Ulr.* 128.*
Habitat in America *australi et* India, *magnus.*

ocellatus. 22. Gr. thorace rotundato, alis ocello notatis. *Mus. Lud. Ulr.* 129.* *Gron. zooph.* 649.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 14.
Seb. mus. 4. *t.* 73. *f.* 7. 8.
Habitat in America *australi et* India.

lanceolatus. 104. Gr. thorace rotundato laevi, elytris oblongis alae aequalibus, fronte porrecta lanceolata subtus unidentata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 357. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 15.
Habitat in Sierra Leon Africae.

pallens. 105. Gr. albidus, thorace laevi, alis lanceolatis elytris longioribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *parvus, tener.*

acuminatus. 23. Gr. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus longitudine corporis. *Mus. Lud. Ulr.* 130.* *Gron. zooph.* 650* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 17.
Degeer inf. 3. *p.* 443. *n.* 4. *t.* 37. *f.* 8. Locusta acuminata.
Sloan. jam. 2. *p.* 202. *t.* 236. *f.* 3.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

triops. 24. Gr. thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 131.*

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 358. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 19. Locusta vertice acuminato subtus puncto ocellari nigro, elytris alae aequalibus.

Habitat in America *australi et* India, *abdomine brevi, ensem non superante.*

rugosus. 25. Gr. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato, femoribus posterioribus subtus repandis. *Mus. Lud. Ulr.* 132.*

Habitat in America *australi et* India, *crista compressa crenata versus apicem thoracis.*

coronatus. 26. Gr. thorace spinis erectis coronato, elytris varioloso-concavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 20.

Degeer inf. 3. *p.* 448. *n.* 9. *t.* 38. *f.* 5. Locusta coronata.

Habitat in America *australi et* India, *antennis corpore triplo longioribus, ense lanceolato longo.*

aquilinus. 27. Gr. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis quindecim. *Mus. Lud. Ulr.* 133.*

Habitat in America *australi et* India, *magnus, elytris lanceolatis, tibiis quadrifariam spinosis.*

melanopterus. 28. Gr. thorace rotundato laevi, elytris abdomine dimidio brevioribus, alis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 134.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 21.

Habitat in America *australi et* India, *elytris ovatis.*

fastigiatus. 29. Gr. thorace rotundato laevi, elytris ovatis, alis truncatis, spinis tibiarum filiformibus. *Mus. Lud. Ulr.* 135.*

Habitat in America *australi et* India.

coriaceus. 30. Gr. thorace rotundato laevi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *Mus. Lud. Ulr.* 136.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 358. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 22.

Habitat in America *australi et* India, *magnus, colore flavo corii, femoribus teretibus.*

albifrons. 106. Gr. thorace posterius rotundato laevi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido, ense apice serrato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 23.

Habitat in insula Madera.

falx. 107. Gr. fuscus, thorace laevi posterius rotundato, capite pallido, ense falcato atro. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 24.
Habitat in insula Madera.

grisеus. 108. Gr. fuscus, thorace posterius carinato rotundato, ense falcato atro basi utrinque pallido. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 25.
Habitat in Italia, *antennis flavescentibus longitudine corporis, pedibus virescentibus, elytris fusco cinereoque variis.*

viridissimus. 31. Gr. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *Fn. suec.* 869.* *Scop. ent. carn.* 320. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 359. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 26. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 397. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 3. Locusta cauda ensifera recta.
Degeer inf. 3. *p.* 428. Locusta viridis cantatrix.
List. goed. 301. *t.* 121. Agrigoneus.
Goed. inf. 2. *p.* 165. *t.* 40.
Zinann. obs. t. 7. *f.* 7.
Robert. ic. t. 27.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 10. 11.
Schaeff. elem. t. 79.
icon. t. 139. *f.* 3. 5.
Habitat in Europae *arboribus, graminosis, agris hordeaceis, sub canicula noctu stridulus, totus viridis.*

cinerarius. 32. Gr. antennis longissimis, elytris deflexis verticalibus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 31.*
Habitat in Brasilia.

verrucivorus. 34. Gr. thorace subquadrato laevi, alis viridibus fusco-maculatis, antennis setaceis longitudine corporis. *Fn. suec.* 870.* *Scop. ent. carn.* 321.
It. wgoth. 253. Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi.
Fabr. Sp. inf. 1. *p.* 359. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 27. Locusta alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 398. *n.* 1. Locusta cauda ensifera curva.
Degeer inf. 3. *p.* 430. *n.* 2. *t.* 21. *f.* 1. 2. Locusta verrucivora.
Raj. inf. 61. Locusta viridis major.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 1. 2. Locusta major viridis.
Mouff. inf. 117. *f.* 5.

Rob. ic. t. 27.
Jonst. inf. t. 11. *f.* 1-3.
Merian. inf. t. 176.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 8.
Sulz. inf. t. 9. *f.* 61.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 5.
Habitat in Europa, *e murino fuscescens, a rusticis Suecis manuum verrucis admotus, quas praemordet, et liquorem in vulnus evomendo, ut contabescat, efficit.*

varius. 109. Gr thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 28.
Degeer inf. 3. *p.* 433. *n.* 3. Locusta thalassina.
Goed. inf. 2. *p.* 142. *t.* 40.
Frisch inf. 12. *t.* 2. *f.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 8. *f.* 9.
Habitat in Lipsiae *hortis, viridissimo affinis, at quadruplo minor.*

brachypterus. 110. Gr. griseo-fuscus, elytris alisque corpore dimidio brevioribus. *Fn. suec.* 868. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 29.
Degeer inf. 3. *p.* 434. *n.* 4. *t.* 22. *f.* 2. 3. Locusta brachyptera.
Habitat in Europae *borealis graminosis, ense elongato recurvo.*

Papus. 34. Gr. apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 322. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 360. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 30.
Degeer inf. 3. *p.* 453. *n.* 13. *t.* 39. *f.* 5. Locusta Papa spinosa.
Pet. gazoph. t. 13. *f.* 7. Locusta talpa capensis pedibus longis.
Kundm. promtuar. 118. *n.* A. 184.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 6. *f.* 3.
Habitat in Aethiopia, *scutello magno rotundato spinis ciliato, femoribus posterioribus subtus quadridentatis.*

spinulosus. 59. Gr. thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 31.
Edw. glean. 2. *p.* 161. *t.* 285. *f.* 3-5.
Habitat in America *australi et* India, *ense recurvo, abdomine nigro: maculis testaceis.*

111. Gr.

Onos. 111. Gr. thorace laevi nigro: lateribus griseis, corpore aptero. *Pall. spic. zool.* 9. *p.* 18. *t.* 2. *f.* 1. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 32.
Petiv. gazoph. t. 39. *f.* 9? Locusta echinata impennis e Chulan.
Habitat in Sibiria, *ense longitudine abdominis.*

ephippiger. 112. Gr. thorace posterius elevato, elytris brevissimis fornicatis. *Fiubig Schr. der naturf. berl. Ges.* 5. *t.* 3. *f.* 6-8. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 33.
Habitat in Europae *magis australis pratis, magnus.*

dubius. 113. Gr. thorace laevi posterius rotundato, elytris brevissimis apice capiteque albidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 34.
Habitat in Italia, *statura ephippigeri.*

Laxmanni. 114. Gr. thorace posterius marginato dentato, ense recurvo apice deflexo, femina aptera. *Pall. it.* 1. *app. n.* 52. *spic. zool.* 9. *p.* 20. *t.* 2. *f.* 2. 3. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 361. *n* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 35.
Habitat in Sibiria.

glaber. 115. Gr. fuscus, thorace subdepresso laevissimo, elytris medio viridibus fusco maculatis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 8. *p.* 193. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania *verrucivoro affinis.*

indicus. 116. Gr. viridis, fronte obtuse conica, thorace anterius et posterius elevato, medio excavato, abdomine alisque fuscis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 8. *p.* 193. *n.* 7. *t.* 53. *f.* 2.
Habitat in India, *ephippigero affinis.*

leucostictos. 117. Gr. fusco-testaceus, elytris margine maculisque flavis, femoribus in junctura puncto albissimo notatis.
Roesel inf. 2. *gryll. p.* 128. *t.* 20. *f.* 8-10.
Habitat in Germania, *femina virescens.*

palpatus. 118. Gr. apterus fusco testaceus, palpis anterioribus pedibusque posterioribus longissimis.
Sulz. hist. inf. p. 83. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Sicilia.

cantans. 119. Gr. thorace rotundato maculato, elytris rotundatis: macula bascos rotunda hyalina antennis longissimis. *Fuesslii inf. helv. p.* 23. *n.* 439. *f.* 5. a. 5. b.

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. p. 101. *n.* 1144? Locuſta viridis.
Habitat in Europa, *viridiſſimo affinis, at paulo minor, elytris brevioribus.*

falcatus. 120. Gr. elytris viridibus ala brevioribus, antennis longiſſimis enſe inflexo ferrugineo quadruplici. *Scop. ent. carn. p.* 108. *n.* 322.
Fueſſli inſ. helv. p. 23. *n.* 440.
Lepechin it. 1. *p.* 79. d.
Poda muſ. graec. p. 52.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 1-3.
Habitat in Germania, Helvetia, Sibiria.

Pedo. 121. Gr. gracilis mollis, pedibus poſterioribus longioribus gracillimis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 51.
Habitat in Sibiria.

flaveſcens. 122. Gr. flaveſcens; elytris rubeſcentibus atro reticulatis, enſe ex flavo atro.
Schaeff. ic. t. 91. *f.* 6.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori, oculis caeruleis, enſe adſcendente.*

bipuſtulatus. 123. Gr. fuſcus, enſe thoracisque punctis binis atris, elytris ſubflaveſcentibus atro teſſulatis ala brevioribus.
Schaeff. ic. t. 138. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

marginatus. 124. Gr. viridis variegatus, thoracis margine flavo.
Schaeff. ic. t. 236. *f.* 1-4.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori.*

rubicundus. 125. Gr. capite femoribusque rubicundis atro-ſquamatis.
Schaeff. ic. t. 242. *f.* 5. 6.
β) Schaeff. ic. t. 249. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania, *ſtatura verrucivori.*

rufipes. 126. Gr. viridis, enſe femorumque nodulis fuſcis, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 255. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

luteus. 127. Gr. luteus, alis intime virideſcentibus, enſe aterrimo.
Schaeff. ic. t. 258. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

128. Gr.

cinereus. 128. Gr. griseus, capite thoraceque fasciis duabus nigris, femina aptera.
Degeer inf. 3. *p.* 436. *n.* 5. Locusta griseo-aptera.
Habitat in Suecia, *brachyptero major, antennis longissimis.*

cornutus. 129. Gr. viridis, thorace rotundato, capitis vertice cornuto rugoso, femoribus spinosissimis, antennis setaceis elytro brevioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 441. *n.* 3. *t.* 37. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 3 *lineas ultra* 2 *pollices longus.*

tuberculatus. 130. Gr. thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis angustis, antennis setaceis longitudine elytrorum. *Degeer inf.* 3 *p.* 444. *n.* 5. *t.* 38. *f.* 1.
Habitat in Surinamo, *viridis, acuminato minor.*

curvicaudus. 131. Gr. totus viridis, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. *p* 446. *n.* 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in Pensylvaniae *pratis, laurifolio paulo minor.*

vulturinus. 132. Gr. thorace angulato laevi, femoribus anterioribus muticis, fronte macula abdomineque subtus fascia nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 451. *n.* 11. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *vix* 2 *pollices longus.*

falconarius. 133. Gr. thorace rotundato, femoribus teretibus longis; intermediis muticis, elytris lanceolatis, antennis longissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 452. *n.* 12. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *ultra* 2 *pollices longus.*

capitatus. 134. Gr. capite magno, thorace plano laevi: fasciis binis longitudinalibus nigris, elytris longitudine abdominis. *Degeer inf.* 3. *p.* 455. *n.* 14. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat - - - - *sesquipollicaris.*

spinifrons. 135. Gr. thorace planiusculo laevi, vertice spinoso, fronte nigra, corpore rufo fusco, elytris viridi-purpureis pallidis. *Degeer inf.* 3. *p.* 456. *n.* 15. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Surinamo, *pollicem longus.*

agilis. 136. Gr. griseo-viridis, abdomine fusco, thorace planiusculo, pedibus posterioribus antennisque longissimis, alis elytro longioribus *Degeer inf.* 3. *p.* 457. *n.* 16. *t.* 40. *f.* 3.
Habitat in Pensylvania, *vix pollicem longus.*

137. Gr.

fasciatus. 137. Gr. viridis, abdomine fasciis sulphureis fuscisque, thorace planiusculo, alis elytro longioribus, pedibus posterioribus longissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 458. *n.* 17. *t.* 40. *f.* 4.
Habitat in Pensylvania, 9 *modo lineas longus.* *)

teres. 138. Gr. ex flavo lividus, oculis maximis, alis elytro longioribus, pedibus anterioribus spinosissimis. *Degeer inf.* 3. *p.* 458. *n.* 18. *t.* 40. *f.* 5.
Habitat in Surinamo, 7 *modo lineas longus.*

muticus. 222. Gr. thorace oblongo-quadrato marginato, femoribus tibiisque bifariam spinosis, ense laevi adscendente longitudine fere abdominis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 22.
Habitat extra Europam.

macropterus. 223. Gr. thorace rotundato alis albidis fusco lineatis elytra pallide immaculata superantibus, abdomine filis quatuor terminato, femoribus posterioribus subtus tibiisque quatuor anterioribus bifariam spinosis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 13. C.
Habitat extra Europam.

nigromaculatus. 224. Gr. thorace rotundato laevi, capite elytrisque pallidis, antennis longissimis, alis caeruleo-virescentibus: maculatum nigrarum undulatarum ordinibus septem transversis. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 24.
Habitat extra Europam, *pedibus pallidis, tibiis anterioribus longis spinis armatis.*

testaceus. 225. Gr. testaceus, abdomine elytris longiore subtus et thoracis margine externo flavo, ense adscendente quadrivalvi. *Mus. Lesk. p.* 47. *n.* 28.
Habitat in Europa.

fulvicornis. 226. Gr. fusco cinereoque varius, antennis flavescentibus longitudine corporis, thorace plano posterius subcarinato, elytris fusco-griseis: punctorum pallidorum ordine obsoleto, ense adscendente. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 33.
Habitat in Europa.

227. Gr.

*) *An propriae species huc referendae a* Seba *mus. vol.* 4. *delineatae? flavus t.* 70. *f.* 11. 12. *tessulatus t.* 71. *f.* 7. 8. *nigro-notatus t.* 72. *f.* 1. 2. *chloropterus t.* 75. *f.* 5. 6. *duplicatus t.* 75. *f.* 7-10. *subulatus t.* 78. *f.* 6. *bifurcatus t.* 79. *f.* 13-16. *albo-punctatus t.* 80. *f.* 7. 8. *capite et cauda subulatis t.* 83. *f.* 9. *ensiferi consueti t.* 96. *f.* 39. 40.

longicornis. 227. Gr. thorace rotundato supra testaceo, capite viridi: fronte acuminata testacea antennis longissimis, elytris testaceis abdomine dimidio brevioribus, ense adscendente testaceo basi viridi. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 34.
Habitat in Europa.

***** *antennis filiformibus, palpis simplicibus, cauda simplici*, Locustae, Grylli Fabricii.

reticulatus. 4. Gr. thorace cymbiformi posterius producto acuto, elytris reticulatis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 7.
Habitat in Bengala, *magnitudine fere serrati.*

serripes. 139. Gr. thorace cymbiformi posterius producto, elytris fuscis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 8.
Habitat in America *australi et* India, *magnitudine fere serrati.*

serratus. 5. Gr. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine caeruleo. *Mus. Lud. Ulr.* 121.* *Gron. zooph.* 142.*
Fabr. Sp. inf. 1. *p.* 363. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 9. Gryllus thorace cymbiformi carinato serrato postice producto acuto.
Degeer inf. 3. *p.* 493. *n.* 10. *t.* 41. *f.* 6. Acrydium serratum.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 16. *f.* 2.
Sulz. inf. t. 8. *f.* 58.
Habitat ad caput bonae spei.

turcicus. 140. Gr. cinereus, thorace cymbiformi, elytris basi fasciaque fuscis, alis basi atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in India, *parvus.*

Lunus. 9. Gr. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris nigris: fasciis albis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 397. *n.* 30. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali, alis nigris immaculatis.*

Elephas. 35. Gr. thorace carinato integro, corpore aptero. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 361. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 1.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 6 *f.* 2.
Habitat in Africa, *reliquis hujus tribus major et ponderosior, viridis femoribus muticis, rudimentis alarum duarum.*

succinctus. 36. Gr. thoracis carina margineque posteriori elytrorumque margine dorsali flavis, gula cornuta. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 36. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 2.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 8. *t.* 54. *f.* 2.
Habitat in America *australi, et duplo major in* India, *antennis flavis, tibiarum posteriorum spinis luteis apice atris.*

cristatus. 37. Gr. thorace cristato, carina quadrifida, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 137.* *Amoen. acad.* 1. *p.* 21. *t.* 17. *f.* 4. *Gron. zooph.* 658. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 3.
Hasselq. it. 413. Gryllus arabicus.
Olear. mus. t. 17. *f.* 5. Gryllus ex Aegypto.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 1.
Seb. mus. 4. *t.* 72. *f.* 11. 12.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 5.
Edw. glean. t. 312.
Habitat frequens in Arabia, Aegypto, *Arabibus esculentus.*

Dux. 141. Gr. thorace carinato scabro, elytris viridibus, alis rufis fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 4.
Drury inf. 1. *t.* 44.
Habitat in America *meridionali, magnus, virescens, capite flavescente, antennis nigris.*

aegyptiacus. 142. Gr. thorace cristato: carina trifida, alis fascia nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 362. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 5.
Habitat in Aegypto.

morbillosus. 38. Gr. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis albopunctatis, alis rufis. *Mus. Lud. Ulr.* 141.* *Gron. zooph. p.* 179. *n.* 662. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 364. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 15.
Seb. mus. 4. *t.* 79. *f.* 7. 8.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 18. *f.* 6.
Seligm. av. 1. *t.* 43.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 8. *t.* 54. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae spei.

punctatus. 143. Gr. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, alis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 364. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 16.

Sulz.

Sulz. hist. inf. t. 9. f. 3.
Drury inf. 2. t. 41. f. 4.
Habitat in India.

squamosus. 144. Gr. viridis, thorace subarticulato: articulis utrinque subtricuspidibus, alis rubris nigro punctatis. *Mant. p. 533.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 364 n. 15. mant. inf. 1. p. 236. n. 17.
Gryllus thorace subtriarticulato, articulis utrinque spinosis, alis rubris nigro punctatis.
Drury inf. 1. t. 49. f. 1.
Habitat in Africa.

miliaris. 39. Gr. thorace subquadrato dentato verrucoso, elytris punctis callosis albis. *Mus. Lud. Ulr. 142.**
Degeer inf. 3. p. 486. n. 1. t. 40. f. 6. Acrydium verrucosum.
Habitat in America *meridionali, morbilloso affinis.*

haematopus. 40. Gr. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femoribus piloso ciliatis. *Mus. Lud. Ulr. 143.** *Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 16. mant. inf. 1. p. 237. n. 18.*
Degeer inf. 3. p. 490. n. 6. t. 40. f. 10. Acrydium rubripes.
Habitat in America *australi et* India, *elytris cinereis, alis nigro-venosis.*

flavicornis. 145. Gr. viridis, thorace subcarinato, elytris immaculatis, alis basi rufis, tibiis posterioribus sanguineis flavo-serratis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 232. n. 19.*
Habitat in Sina, *magnus.*

pictus. 146. Gr. elytris viridibus albo punctatis apice rufescentibus, corpore caeruleo flavoque variegato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 365. n. 17. mant. inf. 1. p. 237. n. 20.*
Habitat in Cayenna.

migratorius. 41. Gr. thorace subcarinato: segmento unico capite obtuso, maxillis atris. *Mus. Lud. Ulr. 140.** *Fn. suec. 871.*
Scop. ent. carn. 323.
Fabr. sp. inf. 1. p. 265. n. 19. mant. inf. 1. p. 237. n. 22.
Gryllus thorace subcarinato, segmento unico, mandibulis caeruleis.
Frisch inf. 9. t. 1. f. 8. Gryllus migratorius.
Degeer inf. 3. p. 466. n. 1. t. 23. f. 1. Acrydium migratorium.
Seb. mus. 4. t. 65. f. 21.
Roesel inf. 2. gryll. t. 24.
Edw. glean. t. 208.
Seligm. av. 6. t. 103.

Habitat in Tataria, *variis annis numerosissimis gregibus in* Europam *migrans, et omnia vegetabilia exedens, ab Aegyptiis vivus prunis injectus, rejectis alis pedibusque esitatur.*

tataricus. 42. Gr. thorace subcarinato: segmentis tribus, capite rotundato: maxillis concoloribus. *Mus. Lud. Ulr.* 139.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 365 *n.* 18 *mant. inf.* 1. *p.* 237 *n.* 21. Gryllus thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandibulis concoloribus.
Roes. inf. gryll. t. 18. *f.* 8.
Drury inf. 1. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Africa, *elytris praesertim cinerascentibus fusco maculatis, migratorio affinis.*

ruficornis. 147. Gr. thoracis dorso nigro: carina flava, antennis tibiisque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Sierra Leon Africae, *statura migratorii, at paulo minor.*

Lineola. 148. Gr. thorace subcarinato fusco: linea dorsali rufa, femoribus posterioribus intus sanguineis, tibiis caeruleis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 365. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 24.
Habitat in Italia, *magnitudine migratorii.*

variegatus. 43. Gr. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis caeruleis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 25.
Herbst apud Fuesslı arch. inf. 8. *t.* 53. *f.* 3.
Habitat in America, *fronte rubra atro maculata, antennis nigris rubro annulatis.*

vocans. 149. Gr. thorace carinato, elytris pallidis: maculis ocellaribus fuscis, alis basi ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

luridus. 150. Gr. niger, thorace subcarinato, pectoris macula abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 23.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnitudine striduli.*

musicus. 151. Gr. thorace carinato, elytris anterius nigris fascia alba, posterius griseis nigro variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

152. Gr.

scaber. 152. Gr. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus posterioribus supra infraque carinatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 30.
Habitat in Jutlandiae *arenosis.*

cisti. 153. Gr. thorace scabro: crista bifida, alis rubris: fascia nigra: femoribus posterioribus canaliculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 29.
Habitat in cisto halimifolio, *stridulo paulo major.*

caerulescens. 44. Gr. thorace subcarinato, alis virescenti-caeruleis: fascia nigra. *Mus. Lud. Ulr.* 145.* *Scop. ent. carn.* 325. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 369. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 43. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 392. *n.* 2. Acrydium elytris nebulosis, alis caeruleis extimo nigro.
Degeer inf. 3. *p.* 473. *n.* 3. Acrydium caeruleipenne.
Raj. inf. 60.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 3.
Seb. mus. 4. *t.* 65. *f.* 19.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 4.
Sulz. inf. t. 9. *f.* 60.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 6. 7.
Habitat in Sibiria *et* Europa *magis australi.*

surinamus. 45. Gr. thorace lineis quatuor flavis, alis caeruleis, elytris viridibus. *Mus. Lud. Ulr.* 146. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 34.
Habitat in America *meridionali, femorum basi sanguinea.*

italicus. 46. Gr. fuscus, thorace carinato, alis rubris, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 147.* *Scop. ent. carn.* 327. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 35.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis australi.*

thalassinus. 154. Gr. thorace laevi viridi, alis hyalinis latere tenuiori viridibus, apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 37.
Habitat in Italia, *capite thoraceque viridi, ore oculisque fuscis, tibiis sanguineis.*

germanicus. 155. Gr. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus posterioribus nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 36.
Roes. inf. 2, *gryll. t.* 21. *f.* 7.
Habitat in Germaniae *agris.*

virginianus. 156. Gr. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris basi virescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 38.
Habitat in America *boreali.*

stridulus. 47. Gr. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris. *Fn. suec.* 872.* *Scop. ent. carn.* 326. *Fabr. s. inf.* 1. *p.* 366. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 31.
It. oel. 158. Gryllus elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.
Uddm. diss. 50.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 393. *n.* 4. Acrydium elytris nebulosis, alis rubris externe nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 472. *n.* 2. Acrydium rubripenne.
Frisch inf. 9. *t.* 1. *f.* 2.
Seb mus. 4. *t.* 65. *f.* 20.
Roes. inf. 2. *gryll. t.* 21. *f.* 1.
Schaeff. elem. t. 15.
icon. t. 27. *f.* 10. 11.
Habitat in Europae *siccis arenosis, tota die in seram noctem stridens, niger, aut nigro flavoque varius.*

ferrugineus. 157. Gr. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis, alis ferrugineis, capite acuminato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 367. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 33.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

morio. 158. Gr. obscurus, thorace subcarinato, alis atris immaculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 32.
Habitat in Africa, *stridulo affinis, at paulo minor.*

caerulans. 48. Gr. thorace laeviusculo, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore caerulescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 33. *mant. inf. p.* 238. *n.* 39.
Habitat in Europae *magis australis campestribus.*

carolinus. 49. Gr. thorace subcarinato, alis nigris: margine posteriore flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 368. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 238. *n.* 40.
Catesb. carol. 2. *p.* 89. *t.* 89. Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis.
Degeer inf. 3. *p.* 491. *n.* 7. *t.* 41. *f.* 2. 3. Acrydium carolinum.
Habitat in America *boreali, elytris obscuris fusco punctatis.*

50. Gr.

obscurus. 50. Gr. thorace subcarinato, alis disco rubro fascia nigra, apice hyalinis. *Mus. Lud. Ulr.* 144. *Fabr. sp. ins.* 1. *p.* 368. *n.* 35. *mant. ins.* 1. *p.* 230. *n.* 41.
Degeer ins. 3. *p.* 492. *n.* 8. *t.* 41. *f.* 4. Acrydium obscurum.
Seb. mus 4. *t.* 80. *f.* 15. 16.
Drury ins. 2. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in Africa, *femoribus interne basi atris.*

fibiricus. 51. Gr. thorace subcarinato, antennis clavatis, tibiis anterioribus ovato-clavatis crassis. *Fabr. sp. ins.* 1. *p.* 368. *n.* 36. *mant. ins.* 1. *p* 238. *n.* 42.
Pall. it. 1. *app. n.* 48. *spicil. zool.* 9. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 11. Gryllus clavimanus.
Laxmann nov. comm. Petrop. 14. *t.* 25. *f.* 8.
Habitat in Sibiria, *femina tibiis simplicibus.*

cinerascens. 159. Gr. thorace carinato, elytris margine tenuiore viridibus, alis basi flavescentibus apice cinereis. *Fabr. sp. ins.* 1. *p.* 369. *n.* 38. *mant. ins.* 1. *p.* 239. *n.* 44.
Habitat in Italia, *flavo affinis, at duplo major.*

sulphureus. 160. Gr. obscurus thorace carinato, alis flavissimis apice nigricantibus. *Fabr. sp. ins.* 1. *p.* 369. *n.* 39. *mant. ins.* 1. *p.* 239. *n.* 45.
Habitat in America *boreali, parvus.*

flavus. 52. Gr. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra apice cinereis. *Fabr. sp. ins.* 1. *p.* 369. *n.* 40. *mant. ins.* 1. *p.* 239. *n.* 46.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 702. *n.* 52. Gryllus thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis.
Scop. delic. insubr. 1. *p.* 63. *t.* 24. *f.* C. Gryllus alis semiluteis: fascia fusca, corpore subtus fusco-ferrugineo.
Degeer ins. 3. *p.* 493. *n.* 9. *t.* 41. *f.* 5? Acrydium nigrofasciatum.
Petiv. gazoph. 6. *t.* 3. *f.* 6. Locusta capensis, alis inferioribus luteis.
Habitat in Europa *magis australi, et* Africa, *tibiis posterioribus sanguineis, elytris fuscis: maculis obsoletis albis.*

insubricus. 161. Gr. elytris testaceis, alis basi rubris: fascia fusca. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 64. *t.* 24. *f.* D.
Habitat in Insubria, *italico minor.*

nitidulus. 162. Gr. viridis, capite lucido luteo. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* B.
Habitat circa Mediolanum, *bipollicaris, ad tettegonias remittendus.*

cyanipes. 163. Gr. fuscus, linea dorsali flava, tibiis posterioribus flavis apice cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 47.
Degeer inf. 3. *p.* 489. *n.* 4. *t.* 40. *f.* 3. Acrydium flavofasciatum.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

rusticus. 164. Gr. griseus, elytris basi fuscis flavo maculatis apice cinereo fuscoque variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 48.
Habitat in Insulis Americae *meridionali oppositis.*

lateralis. 165. Gr. thorace fusco: margine punctoque utrinque tibiisque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 49.
Habitat in insulis Americae *meridionali oppositis.*

velox. 166. Gr. fuscus, thoracis plani margine pedibusque virescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 50.
Habitat in Sina, *parvus.*

apricarius. 53. Gr. thorace cruciato, antennis longitudine corporis. *Fn. suec.* 873.* *It. oel.* 157.
Habitat in Europae *campis siccissimis.*

viridulus. 54. Gr. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fn. suec.* 874.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 51.
It. wgoth. 276. Gryllus capite, thorace elytrisque superne viridibus.
Degeer inf. 3. *p.* 480. *n.* 7. Acrydium albo marginatum.
Frisch inf. 9 *t.* 1. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 141. *f.* 2. 3.
Habitat frequens in Europae *arvis sterilioribus.*

biguttulus. 55. Gr. thorace cruciato, elytris nebulosis: puncto oblongo albo versus apices. *Fn. suec.* 875. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 370. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 51.
Degeer inf. 3. *p.* 479. *n.* 6. Acrydium biguttulum.
Schaeff. icon. t. 190. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *magis borealis arvis sterilioribus, frequens.*

56. Gr.

rufus. 56. Gr. thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis acutis. *Fn. suec.* 876.* *Scop. ent. carn.* 329. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 55. Gryllus fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis. *Schaeff. ic. t.* 136. *f.* 4. 5.
Habitat in Europae *arvis sterilioribus frequens.*

captivus. 167. Gr. fuscus thorace cruciato, femoribus tibiisque posterioribus fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 54.
Habitat in nova Hollandia.

danicus. 57. Gr. thorace subcarinato femoribusque virescentibus, tibiis posterioribus sanguineis.
Habitat in Dania, *verrucivori magnitudine.* Brünniche.

grossus. 58. Gr. femoribus sanguineis, elytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fn. suec.* 877.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 53.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 393. *t.* 8. *f.* 2. Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.
Degeer inf. 3. *p.* 477. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 4. Acrydium rubripes.
Hollar. inf. t. 10. *f.* 5. 6.
Frisch inf. 9. *p.* 5. *t.* 4.
Habitat in Europae *arvis arenosis frequens.*

pedestris. 60. Gr. corpore incarnato aptero. *Fn. suec.* 878.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Degeer inf. 3. *p.* 474. *n.* 4. *t.* 239. *f.* 8. 9. Acrydium apterum.
Habitat in Europa, *et ad* Sibiriae *montem* Tscheremschan.

perspicillatus. 61. Gr. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. *n.* 34. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 371. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 57.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 357. *n.* 11? *mant. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 13? Locusta (specularis) thorace rotundato, elytris griseis basi ocello dorsali vitreo, antennis longissimis.
Habitat in America *australi et* India.

annulatus. 168. Gr. thorace planiusculo, fronte gibbosa, alis caerulescenti-nigris intus caeruleis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 8. *p.* 195. *n.* 5. *t.* 53. *f.* 4.
Habitat in America, *punctis elevatis scaber, ex rubescente griseus, abdominis annulis aliquot virescentibus, antennis flavicantibus nigro annulatis.*

triangularis. 169. Gr. spadiceus, scutello abdominisque segmento primo macula triangulari, elytris margine flavis, alis flavescentibus.
Roesel inf. 2. *gryll. p.* 138. §. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

versicolor. 170. Gr. viridi rubro flavoque varius, capite cum antennis elytrorumque margine viridi, thorace elytrisque fuscis.
Sulz. hist. inf. p. 84. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Insubria.

Centurio. 171. Gr. fuscus atro maculatus, alis ruberrimis: basi margine striisque tenerrimis undulatis atris.
Drury inf. 2. *p.* 78. *t.* 41. *f.* 3.

caeruleus. 172. Gr. viridis, alis caeruleis apice cinereis, femoribus viridi-flavis, tibiis nigerrimis.
Drury inf. 2. *p.* 79. *t.* 42. *f.* 1.
Habitat in Africa.

Miles. 173. Gr. viridis, frontis fasciis thoracisque punctis binis flavis, elytris spadiceis, alis alternatim rufescentibus et atris.
Drury inf. 2. *p.* 80. *t.* 42. *f.* 2.
Habitat in America.

lunulatus. 174. Gr. thorace subcucullato: lineis tribus elevatis; lateralibus lunulatis.
Roef. inf. 2. *gryll. p.* 128. §. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. p. 110. *n.* 328.
Habitat in Germania.

subcarinatus 175. Gr. thorace subcarinato viridescente, alis basi luteis: apicis macula nigricante. *Lepech. it.* 1. *p.* 256. c. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Sibiriae *desertis* Uralensibus.

176. Gr.

An huc referendi, tanquam propriae species, a reliquis distinctae, Gryllus femoratus Lepech. it. 1. *t.* 19. *f.* 1. 2. *t.* 20. *f.* 5. *plurescque a* Seba *Mus. vol.* 4. *delineati, cyaneus t.* 65. *f.* 18. *singularis t.* 65. *f.* 22. *fuscus t.* 67. *f.* 11. *purpurascens t.* 70. *f.* 3. 4. *albo-marginatus t.* 70. *f.* 5 6. *pallide flavus t.* 71. *f.* 1. 2. *taeniolatus t.* 71. *f.* 3. 4. *luteo-fuscus t.* 71. *f.* 5. 6. *hyalinus t.* 71. *f.* 11. 12. *cinereus t.* 72. *f.* 7. 8. *cinereo-fuscus t.* 72. *f.* 9. 10. *capito. t.* 75. *f.* 1. 2. *fusco-maculatus t.* 79. *f.* 1. 2. *viridi-purpurascens t.* 79. *f.* 9. 10. *olivaceus t.* 79. *f.* 11. 22. *Locustella t.* 80. *f.* 5. 6. *cinnabarinus t.* 80. *f.* 9. 10. *capensis t.* 80. *f.* 11. 12. *exiguus t.* 87. *f.* 19. *aliique anonymi t.* 69. *f.* 9-12. *t.* 96. *f.* 34-38. *depicti, minutus et virens* Hermanni?

fuscus. 176. Gr. fuscus, elytris fasciis duabus albis. *Lepechin it.* 1. *p.* 314.
Habitat in desertis Uralensibus.

Lepechini. 177. Gr. thoracis scutello abdominis longitudine: linea albida a fronte per medium scutellum decurrente. *Lepechin it.* 2. *t.* 10 *f.* 17.
Habitat in Sibiria.

fuliginosus. 178. Gr. thoracis dorso triangulo, elytris ex griseo fuscescentibus, alis fuliginosis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 77.
Habitat in Sibiriae *campestribus*, *italici magnitudine.*

muricatus. 179. Gr. thorace pentagono, alis flavescentibus: arcu fusco, femoribus posterioribus exterius muricatis. *Pallas it.* 1. *app. n.* 47.
Habitat in desertis Uralensibus, *obscuro major*, *colore varians.*

miniatus. 180. Gr. thorace subcarinato, alis miniatis: apicis arcu nigro. *Pallas it.* 1. *app. n.* 49.
Habitat in desertis australibus ad fluvium Ural, *caerulescentis forma et magnitudine.*

variabilis. 181. Gr. thorace subcarinato, alis nigro reticulatis: area ad marginem crassiorem atra apice fusco-hyalino. *Pallas it.* 1. *app. n.* 52.
Habitat in campis per fluvium Samara *irrigatis*, *magnitudine facieque striduli*, *alis nunc hyalinis*, *nunc albicantibus*, *nunc pallidis*, *nunc caerulescentibus.*

salinus. 182. Gr. thorace subcarinato, alis fascia nigra lata, basi roseis, apice hyalinis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78.
Habitat in desertis salsis aridissimis ad fluvios Ural *et* Irtisch *sitis*, *facie fere caerulescentis.*

tibialis. 183. Gr. elytris nebulosis, alis caerulescentibus fusco reticulatis, tibiis albidis longius spinosis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 78. b.
Habitat in regionibus australibus Uralensibus, *facie et magnitudine salini.*

barabensis. 184. Gr. elytris pallidis punctis fuscis irroratis, alis hyalino-flavescentibus: margine et apice venis punctisque fuscis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 79. 3. *p.* 433.
Habitat in pinetis arenosis deserti Barabensis, *magnitudine tibialis*, *chenopodii amans.*

numidicus. 185. Gr. thorace carinato, alis minimis squameis. *Poiret Journ. de physiq.* 1787. *Apr. p.* 242. *t.* 1. *f.* 1.

cruentatus. β) Gr. maculis sanguineis coopertus. *Poiret Journ. de phys.* 1787. *Apr. p.* 244.
Habitat in Numidia, *voracissimus, glaberrimus, totus viridis, elephante minor, sed longior, ova glutine coacta in arena sepeliens.*

cinereus. 186. Gr. fusco punctatus, thorace subcarinato, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 100. *n.* 1138.
Habitat in Dania.

flavescens. 187. Gr. flavescens, elytris fuscescentibus obsolete maculatis, alis flavo nigroque reticulatis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

rhomboideus. 188. Gr. elytris cinereis apice albidis: maculis atris rhomboideis.
Schaeff. ic. t. 228. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

angulatus. 189. Gr. flavescens, abdomine fusco: annulorum segmentis obtuse angulatis.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 2. 3.
Habitat in Germania.

rubicundus. 190. Gr. capite, thorace elytrorumque margine anteriore viridi, elytris lunula media albida, alis cinereis, abdomine posterius pedibusque rubicundis.
Schaeff. ic. t. 241. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania.

pullus. 191. Gr. atro-fuscus, thorace quadrato: margine flavescente.
Schaeff. ic. t. 232. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

lineatus. 192. Gr. virideſcens, thoracis linea longitudinali elytrorumque futura aurantiis.
Schaeff. ic. t. 243. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

sphaericus. 193. Gr. virideſcens, elytrorum basi maculis binis albis sphaericis.
Schaeff. icon. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

194. Gr.

rubricollis. 194. Gr. flavidus, thorace rubro: margine flavo.
Schaeff. ic. t. 247. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

rosaceus. 195. Gr. varius, thorace viridi: margine rosaceo.
Schaeff. ic. t. 252. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

similis. 196. Gr thorace subcarinato, alis atris: disco et margine rubris.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 1. 2.
β) Gryllus alis apice maculatis.
Schaeff. ic. t. 253. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *stridulo affinis, an varietas?*

purpureus. 197. Gr. alis elytrisque pallidis maculatis, thoracc abdominisque annulis tribus anterioribus purpureis.
Schaeff. ic. t. 263. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

flavens. 198. Gr. flavescens, thorace lineis duabus longitudinalibus obscurioribus.
Schaeff. ic. t. 264. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

viridis. 199. Gr. viridis, hinc inde flavescens.
Schaeff. icon. t. 265. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania; *an propria species?*

sexmaculatus. 200. Gr. subfuscus, alis flavescentibus: maculis sex fuscis longitudinaliter positis.
Schaeff. ic. t. 265. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania, *parvus.*

maculosus. 201. Gr. elytris maculosis, alis rosaceis apice cinerascentibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

polystictos. 202. Gr. fuscescens hinc inde pallide punctatus, alis rufescentibus: apice anis nigricantibus.
Schaeff. icon. t. 267. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

limbatus. 203. Gr. viridis, elytris apice et margine exteriore rufis.
Degeer inf. 3. *p.* 481. *n.* 8. Acrydium rufo-marginatum.
Habitat in Europae *pratis*, 9 *lineas longus.*

pratensis. 204. Gr. viridis, elytris apice nigris, antennis corporis dimidio longitudine.
Degeer inf. 3. *p.* 481. *n.* 9. Acrydium nigro-terminatum.
Habitat in Europae *pratis*, *limbato minor.*

albipes. 205. Gr. thorace cristato: segmento quadruplici, elytris obscure virentibus, alis violaceis, femoribus posterioribus albo maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 487. *n.* 2. *t.* 40. *f.* 7.
Habitat in Surinamo, 2½ *pollices longus.*

roseus. 206. Gr. viridis, antennis flavis, alis dimidiato tibiisque posterioribus roseis. *Degeer inf.* 3. *p.* 488. *n.* 3. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in Sina, 2½ *pollices longus.*

sanguinolentus. 207. Gr. capite flavo rubro nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus, tibiis rubro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 489. *n.* 5. *t.* 40. *f.* 9.
Habitat - - - *sesquipollicaris.*

denticulatus. 208. Gr. viridis thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, falciis binis longitudinalibus griseis.
Degeer inf. 3. *p.* 495. *n.* 11. *t.* 42. *f.* 2. Acrydium serrato falciatum.
Habitat in Surinamo, *gracilis*, 2 *pollices longus.*

dentatus. 209. Gr. fuscus nebulosus, thorace cymbiformi rugoso: carina laevi, femoribus posterioribus denticulatis, capite ovato. *Degeer inf.* 3. *p.* 496. *n.* 12. *t.* 42. *f.* 3.
Habitat in India, 2½ *pollices longus.*

chloropterus. 210. Gr. fuscus, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus posterioribus linea flava.
Degeer inf. 3. *p.* 497. *n.* 13. *t.* 42. *f.* 4. Acrydium flavolineatum.
Habitat in Surinamo, 15 *lineas longus.*

erythropus. 211. Gr. griseo-fuscus, femoribus posterioribus subtus rubris, intus flavescentibus nigro maculatis, tibiis posterioribus rubris.
Degeer inf. 3. *p.* 498. *n.* 14. *t.* 42. *f.* 5. Acrydium Femur rubrum.
Habitat in Pensylvania, *pollicem longus.*

chrysomelas. 212. Gr. viridis, thorace carinato, elytris fuscis: margine inferiore viridi, alis nigris basi luteis.
Degeer inf. 3. *p.* 498. *n.* 15. *t.* 42. *f.* 6. Acrydium viridi fasciatum.
Habitat in Pensylvania, *pollicem longus.*

213. Gr.

varius. 213. Gr. viridi-obscurus, alis caeruleis, corpore fasciis maculisque flavis, femoribus basi sanguineis.
Degeer inf. 3. *p.* 500. *n.* 17. *t.* 42. *f.* 8. Acrydium variegatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

longipennis. 214. Gr. viridi-flavus, elytris abdomine duplo longioribus capite thoraceque fasciis binis nigris. *Degeer inf.* 3. *p.* 501. *n.* 18. *t.* 42. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longus.*

acutus. 215. Gr. thorace nigro: macula flavo-viridi, elytris fuscis: macula viridi, femoribus posterioribus fasciis tribus nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 54. *n.* 19. *t.* 42. *f.* 10. Acrydium acuminatum.
Habitat in Surinamo, 9 *lineas longus.*

chalcops. 216. Gr. griseo-fuscus, thorace fasciis binis nigris, elytris unica grisea, femoribus posterioribus intus tibiisque sanguineis.
Degeer inf. 3. *p.* 501. *n.* 20. *t.* 42. *f.* 11. Gryllus aeneo-oculatus.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

fictitius. 217. Gr. griseo-fuscus, elytris lineis punctatis nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 503. *n.* 21. *t.* 42. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, 10 *lineas longus.*

hamatus. 218. Gr. thoracis scutello abdomine longiore anterius hamato, antennis longitudine abdominis, alis nigris, elytris nullis. *Degeer inf.* 3. *p.* 503. *n.* 22. *t.* 42. *f.* 13.
Habitat in Surinamo.

rugosus. 228. Gr. apterus, viridis cinereo varius, capite vesiculoso: fronte rugis duabus dentatis et utrinque ruga minore denticulata, vertice impresso: margine elevato dentato, thorace morbilloso spinoso: crista elevata compressa rugoso-dentata. *Mus. Lesk. p.* 48. *n.* 39.
Habitat extra Europam, *interdum cinereus fusco varius, abdominis segmentis singulis utrinque macula fusca notatis, utrinque dentibus* 2, *et praeterea crista dentata armatis, femoribus tibiisque posterioribus supra infraque dentatis.*

lunaris. 229. Gr. thorace carinato, alis basi rufis: lunula media margine anteriori maculisque tribus versus apicem ad margi-

nem

nem poſteriorem fuſcis, tibiis poſterioribus albis nigro-ſpinoſis, griſeo-villoſis. *Muſ. Lesk. p.* 48. *n.* 49.
Habitat - - -

flavipes. 230. Gr. thorace ſupra elytrisque brunneis: margine anteriori viridi-flavis, femoribus poſterioribus ſubtus ſanguineis tibiisque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 50.
Habitat in Europa.

griſeus. 231. Gr. thorace cruciato ſupra fuſco, elytris griſeo-fuſco-nebuloſis, pedibus quatuor anterioribus griſeo-fuſco-maculatis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 51.
Habitat in Europa.

cruciger. 232. Gr. thorace cruciato viridi: cruce alba elytris dorſo viridibus margine inflexo fuſcis apice albis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nubilus. 233. Gr. thorace carinato viridi: utrinque linea fracta alba, elytris fuſco nebuloſis ſupra viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 53.
Habitat in Europa.

virens. 234. Gr. viridis, thorace cruciato, antennis corpore longioribus. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 56.
Habitat in Europa.

venoſus. 235. Gr. thorace cruciato rufo, elytris hyalinis rufo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 58.
β) Gr. elytrorum maculis ſex fuſcis ſeriatis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 59.
Habitat in Europa.

bicolor. 236. Gr. griſeus apterus, femoribus poſterioribus ſubtus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 60. b.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 237. Gr. apterus viridis, femina dorſo, mare femoribus poſterioribus virideſcente. *Muſ. Lesk. p.* 49. *n.* 61. c.
Habitat in Europa.

222. FULGORA. *Caput* fronte producta, inani.
Antennae breves infra oculos: articulis duobus; exteriore globoso majore.
Roſtrum inflexum, elongatum: vagina quinquearticulata.
Pedes greſſorii.

Laternaria. 1. F. fronte roſtrata recta, alis lividis: poſterioribus ocellatis.
Muſ. Lud. Ulr. 152.* *Gron. zooph.* 668. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 1.
Grew. muſ. 158. *t.* 13. Cucujus peruvianus.
Merian. ſurin. t. 49. Laternaria.
Reaumur inſ. 5. *t.* 20. *f.* 6. 7.
Roeſel inſ. 2. *gryll. t.* 28. 29.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 3. 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 195. *n.* 1.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, prominente fronte noctu luceat vividiſſimam ſpargens.*

ferrata. 10. F. fronte roſtrata adſcendente quadrifariam ſerrata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 2.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Lindenb. Naturf. 13. *p.* 19. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Habitat in Surinamo.

Diadema. 2. F. fronte roſtrata muricata: apice trifido, alis nigris rubro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 3.
Drury inſ. 3. *t.* 50. *f.* 4. Fulgora armata.
Seb. muſ. 4. *t.* 77. *f.* 7. 8.
Lindenb. Naturf. 13. *p.* 20. *t.* 3. *f.* 3.
Stoll. cicad. 1. *t.* 5. *f.* 22.
Habitat in India, *candelaria major.*

Candelaria. 3. F. fronte roſtrata adſcendente, elytris viridibus luteo maculatis, alis flavis apice nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 153.* *Act. Stockh.* 1746. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 5. 6. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 260. *n.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 197. *n.* 2.

Roeſ.

Roef. inf. 2. gryll. p. 189. t. 30.
Edw. av. t. 120.
Sulz. inf. t. 10. f. 62.
Habitat in Sina.

phosphorea. 4. F. fronte roſtrata ſubulata adſcendente, corpore griſeo glauco. *Fabr. ſp. inf. 2. p. 314. n. 5. mant. inf. 2. p. 313. n. 5.*
Degeer inf. 3. p. 201. n. 4. t. 32. f. 6. Cicada filiroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

noctivida. 5. F. fronte roſtrata acuminata adſcendente, corpore viridi, alis hyalinis. *Fabr. ſp. inf. 2. p. 314. n. 6. mant. inf. 2. p. 313. n. 6.*
Degeer inf. 3. p. 202. n. 5. t. 32. f. 4. Cicada coniroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

lucernaria. 6. F. fronte roſtrata prominente, corpore ſupra virideſcente, ſubtus flavo. *Fabr. ſp. inf. 2. p. 314. n. 7. mant. inf. 2. p. 313. n. 7.*
Degeer inf. 3. p. 202. n. 6. t. 32. f. 6. Cicada breviroſtris.
Habitat in America *meridionali.*

flammea. 7. F. fronte roſtrata adſcendente tereti truncata. *Amoen. ac. 6. p. 399. n. 39. Fabr. ſp. inf. 2. p. 314. n. 8. mant. inf. 2. p. 260. n. 8.*
Stoll. cicad. t. 2. f. 7.
Habitat in America *meridionali.*

tenebroſa. 11. F. fronte roſtrata recta truncata, elytris griſeis ſcabris. *Fabr. ſp. inf. 2. p. 314. n. 9. mant. inf. 2. p. 260. n. 9.*
Degeer inf. 3. p. 200. n. 3. t. 32. f. 1. Cicada laternaria fuſca.
Habitat in Guinea.

obſcurata. 12. F. fronte roſtrata recta truncata, elytris cinereis nigro maculatis. *Fabr. ſp. inf. 2. p. 315. n. 10. mant. inf. 2. p. 260. n. 10.*
Stoll. cicad. 1. t. 6. f. 28.
Habitat in nova Hollandia.

adſcendens. 13. F. fronte roſtrata ſubulata adſcendente, elytris ferrugineo-fuſcis albo punctatis. *Fabr. mant. inf. 2. p. 260. n. 11.*
Habitat in Cayenna, *parva.*

14. F.

fasciata. 14. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo-fuscis: fasciis duabus punctoque posteriore viridibus. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *adscendentis statura, an varietas?*

truncata. 8. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 13.
Amoen. acad. 6. *p.* 399. *n.* 40. Cicada viridi-albicans, alis deflexis compressis postice truncatis.
Habitat in India.

plana. 15. F. flavescens, fronte porrecta plana, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *parva.*

pallipes. 16. F. fronte porrecta plana, elytris viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *statura planae.*

hyalina. 17. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: striga atra. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 16.
Habitat in Bengala, *obscurata major.*

festiva. 18. F. fronte conica, elytris fuscis: margine exteriori virescente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 17.
Habitat in Coromandel.

fenestrata. 19. F. fronte conica bisulcata, elytris hyalinis: macula marginali fusca. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 18.
Habitat in Africa *aequinoctiali, europaea minor.*

europaea. 9. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis, plantis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 261. *n.* 19.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 5.
Schulz. Naturf. 9. *t.* 2.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 51.
Habitat in Europa *australi, cicadae spumantis magnitudine.*

minuta. 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescentibus: linea dorsali, elytris albidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 20.
Habitat Halae Saxonum, *parva cicadae statura.*

Folium. 21. F. flavo-viridis, fronte roſtrata brevi recta, alis ampliſſimis verticalibus compreſſis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 204. *n.* 7. *t.* 32. *f.* 7.
Habitat in America.

223. CICADA. *Roſtrum* inflexum.
Antennae ſetaceae.
Alae quatuor membranaceae deflexae.
Pedes (plerisque) ſaltatorii.

* *antennis ſubulatis fronti inſertis*, Membracides Fabricii.

† *thorace compreſſo-membranaceo, corpore majore*, Foliaceae.

inflata. 52. C. thoracis folio inflato teſtaceo reticulato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnitudine et ſtatura foliatae.*

rhombea. 1. C. folio thoracis rhombeo poſterius latiore. *Backer act. angl.* 1765. *p.* 55. *t.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 262. *n.* 2.
Habitat in America.

foliata. 2. C. thorace rotundato atro: arcubus albis. *Gron. zooph.* 677. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 3.
Fabr. mant. inſ. 2 *p.* 262. *n.* 5. Membracis (lunata) thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.
Degeer inſ. 3. *p.* 205. *n.* 8. *t.* 32. *f.* 9. 10. Cicada foliata faſciata.
Merian. ſurin. t. 5. *f. ult.*
Habitat in America *meridionali.*

flaveola. 53. C. thorace rotundato flavo: faſcia maculaque atris.
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 262. *n.* 4. Membracis foliacea.
Stoll. cicad. t. 1. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, ſtatura foliatae, at paullo major.*

54. C.

Cicadae *ſuccis plantarum vivunt; larva aptera, pupa ſolis alarum rudimentis inſtructa, ceterum utraque hexapus, currens imagini ſimillima, cercopidum agillima; imago gryllorum inſtar ſtridula;* mannifera*rum larvae, veterum* Tettigometrae, *per annum ſodiunt, et ſub terra latent, declaratae maſculae lamellis duabus abdomen ſubtus obtegentibus ſonorae in arbuſtis ſtridentmutasque in venerem feminas provocant.*

fasciata. 54. C. thorace rotundato atro: fasciis duabus; anteriore fulva, posteriore alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *statura foliatae.*

bracteata. 55. C. thorace viridi immaculato. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *parva.*

fronditia. 3. C. thoracis dorso repando sinuato: apice porrecto obtusissimo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 262. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 705. *n.* 3. *Gronov. zooph.* 676.* Cicada foliacea, dorso repando, rostro obtusissimo.
Degeer inf. 3. *p.* 208. *n.* 11. *t.* 32. *f.* 15. 16. Cicada foliata sinuata.
Stoll cicad. 1. *t.* 6. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in Surinamo.

squamigera. 4. C anterius posteriusque rostrata acuta.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 8. Membracis thorace foliaceo antice posticeque acuto griseo.
Degeer inf. 3. *p.* 209. *n.* 12. *t.* 32. *f.* 17. 18. Cicada hastata.
Habitat in America *meridionali.*

genistae. 56. C. thorace fusco posterius producto, abdomine dimidio breviore. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 27.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 424. *n.* 19. Cicada thorace inermi pone producto.
Habitat in Angliae *genista tinctoria.*

inermis. 57. C. thorace virescente posterius subulato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 26.
Habitat in Americae *plantis.*

mutica. 58. C. thorace ferrugineo posterius producto carinato longitudine abdominis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 25.
Habitat in America *boreali.*

convoluta. 59. C. thorace laevi virescente: margine flavo posterius producto abdomine longiore. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 24.
Habitat in Bratilia, *mediae magnitudinis, flavo capite, thorace flavescente, apice atro.*

arcuata. 60. C. nigro fusca, thorace compresso verticali: arcu flavescente. *Degeer inf.* 3. *p.* 206. *n.* 9. *t.* 32. *f.* 10.
Habitat in Surinamo.

fusca. 61. C. tota fusca, thorace compresso verticali. *Degeer inf.* 3. *p.* 208. *n.* 10. *t.* 32. *f.* 14.
Habitat in Surinamo.

gibbosa. 62. C. nigra, thorace carinato gibbo, anterius obtuso, posterius acuto, elytris flavo-lividis, pedibus fulvis. *Degeer inf.* 3. *p.* 311. *n.* 13. *t.* 32. *f.* 20. 21.
Forst. nov. inf. spec. 1. *p.* 67. *n.* 67. Cicada carinata.
Habitat in America.

binotata. 63. C. thorace subinermi posterius producto, abdomine breviore testaceo, elytris macula baseos nigra. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia.

†† *thorace utrinque cornuto:* Cruciatae.

Crux. 5. C. thorace cruciformi corpus totum tegente. *Mus. Lud. Ulr.* 154.*
Habitat in America *australi et* India.

hastata. 64. C. thoracis cornu supra caput porrecto compresso carinato, corpore griseo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 9.
Habitat in America *meridionali, parva.*

lanceolata. 65. C. thoracis cornu supra caput porrecto incurvo, corpore atro: maculis duabus dorsalibus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *parva.*

spinosa. 66. C. thorace tricorni posterius producto longitudine alarum. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 11. *Sulz. hist. inf. t.* 9. *f.* 6.
Habitat in America *australi et* India.

acuminata. 67. C. thorace tricorni: cornu intermedio longiori compresso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 12.
Habitat in Pensylvania.

cornuta. 6. C. thorace bicorni nigro posterius subulato longitudine abdominis, alis fuscis. *Fn. suec.* 879.* *Scop. ent. carn.* 435. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 19. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 2. *p.* 423. *n.* 18. Cicata thorace acute bicorni, pone producto.
Schreb. inf. 7. *f.* 3. 4. Cicada cornuta.
Degeer inf. 3. *p.* 181. *n.* 3. *t.* 11. *f.* 22. Cicada fusca.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 2. 3. Ranatra cornuta.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 63.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 2.
Habitat in carduis, salicibus.

Taurus. 68. C. thorace bicorni fusco posterius producto filiformi longitudine abdominis: cornubus arcuatis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 10 *mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 20.
Habitat in Coromandel.

Vitulus. 69. C. thorace bicorni viridi posterius subulato longitudine abdominis, alis albis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 21.
Habitat in America.

Bonasia. 70. C. thorace bicorni posterius producto: margine albo, alis puncto baseos albo. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 23.
Habitat in America.

aurita. 7. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 13.
Geoffr. inf. par. 2. *p.* 422. *n.* 17. Cicada thorace obtuse bicorni.
Schreb. inf. 8. *f.* 1. 2. Cicada cristata, thorace bicorni, corniculis subrotundis.
Sulz. hist. inf. t. 9. *f.* 7.
Schaeff. icon. t. 96. *f.* 3.
Habitat in quercu, corylo, *tabani magnitudine, tota cinerea.*

sinensis. 71. C. thorace bicorni posterius producto abdomine longiori atro: margine flavescente. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 263. *n.* 14.
Stoll cicad. 1. *t.* 11. *f.* 53. B.
Habitat in Sina, *magna.*

horrida. 72. C. thorace bicorni posterius producto biclavato apice trispinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 264. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

trifida. 73. C. piloſa, thorace quadricorni poſterius producto trifido: laciniis ſubulatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 16.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c. tauri.*

elavata. 74. C. thorace quadricorni poſterius producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clavatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parva.*

braſilienſis. 75. C. thorace bicorni albo punctato poſterius producto abdomine longiori. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 264. *n.* 18.
Habitat in Braſilia.

** *non ſaltantes*, Manniferae, Tettigoniae Fabricii.

ciliaris. 8. C. alis poſterioribus ferrugineo-fuſcis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis ſegmentis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 155.*
Rumpf amb. 3. *p.* 210. *t.* 135? Folium ambulans.
Habitat in America *auſtrali et* India.

fornicata. 11. C. thorace vireſcente, abdomine fornicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 156. *
Habitat in America *auſtrali et* India.

ſtridula. 12. C. elytris margine dilatato: punctis ſeptem albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 157.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 13. Cicada villoſa, elytris griſeis, alis flavis: omnibus margine hyalino.
Drury inſ. 2. *t.* 37. *f.* 2. Cicada catenata.
Habitat ad caput bonae ſpei.

cingulata. 76. C. thorace maculato, elytris hyalinis: coſta maculaque fuſcis, abdomine atro: faſciis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia.

villoſa. 77. C. thorace fuſco viridique variegato, pectore albo villoſo.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *minor*, *fronte viridi*, *utrinque atro-ſtriata.*

cruentata. 78. C. thorace variegato, elytris hyalinis: coſta flaveſcente, abdomine atro: faſciis ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

79. C.

conſpurcata. 79. C. atra, elytris baſi flavo maculatis, ano flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.*320. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 17.
Habitat in India.

capenſis. 13. C. alis inferioribus limbo poſteriore fuſceſcente palmato picto. *Muſ. Lud. Ulr.* 158.
Petiv. gaz. 7. *t.* 4. *f.* 1. Cicada capenſis variegata, marginibus tranſparentibus.
Habitat ad caput bonae ſpei.

haematodes. 14. C. nigra immaculata, abdominis inciſuris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 347.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 7.
Gron. zooph. 675.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 452.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Europa *magis auſtrali, mediae magnitudinis, gibboſa.*

plebeja. 15. C. ſcutelli apice bidentato, elytris anaſtomoſibus quatuor lineisque ſex ferrugineis. *Scop. entom. carn.* 345.
Mouff. inſ. 127.
Aldrov. inſ. 307.
Matthiol. Dioſc. 264.
Habitat in Italia, Africa, *maxima.*
Et cantu querulae rumpent arbuſta cicadae. Virgil.

orni. 16. C. elytris intra marginem tenuiorem punctis ſex concatenatis anaſtomoſibusque interioribus fuſcis. *Scop. ent. carn.* 346.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 320. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 19. Cicada nigra flavo maculata, alis albis baſi flavis: maculis duabus nigris.
Reaum. inſ. 5. *t.* 5. *f.* 16-19.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 4. 5.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. t.* 25.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 65.
Schaeff. icon. t. 4. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali; larva eduli.*
Sole ſub ardenti reſonant arbuſta cicadis. Virgil.

repanda. 17. C. elytris linea flexuoſa, alis margine hyalino. *Muſ. Lud. Ulr.* 159.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 321. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 267. *n.* 20.

Degeer inf. 3. *p.* 219. *n.* 15. *t.* 33. *f.* 1. Cicada nigra.
Habitat in India.

reticulata. 78. C. griſea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis.
Fabr. ſp. inf. 2. *p.* 321. *n.* 17. *mant inf.* 2. *p.* 267. *n.* 21.
Degeer inf. 3. *p.* 227. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 15. 16. Cicada fuſco-teſtacea.
Habitat in America *meridionali.*

atrata. 80. C. atra alis albis baſi nigris: venis teſtaceis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 22.
Habitat in Sina.

ſanguinea. 81. C. nigra, ore, thoracis maculis duabus abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 24.
Degeer inf. 3. *p.* 221. *n.* 18. *t.* 33. *f.* 17. Cicada ſanguinea.
Habitat in Sina.

teſtacea. 82. C. nigra, abdomine ſanguineo, elytris alisque teſtaceis: venis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 23.
Stoll cicad. 1. *t.* 8. *f.* 41. C.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſplendidula. 83. C. elytris fuſco-aureis, tibiis anterioribus incraſſato-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 321. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 25.
Habitat in Sina.

muta. 84. C. elytris hyalinis: coſta ſanguinea, abdomine linea dorſali ſanguinea. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 322. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 26.
Habitat in nova Scelandia.

groſſa. 85. C. thorace viridi nigro ſublineato, alis albis poſterioribus macula baſeos flava. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 1.
Habitat in Braſilia.

javana. 86. C. capite thoraceque nigris rufo maculatis, elytris nigris: faſcia abbreviata alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 2.
Stoll cicad. 1. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Java, *magna.*

griſea. 87. C. griſea, elytris aqueis: margine poſteriori nigro punctato, coſta anterius alba. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 265. *n.* 3.
Habitat in inſulis Americae *oppoſitis.*

88. C.

limbata. 88. C. thoracis margine dilatato acuto, alis atris: margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 265. *n.* 4. *Stoll cicad.* 1. *t.* 12. *f.* 57.
Habitat in America.

dilatata. 89. C. atra, thoracis margine dilatato, alis albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 5.
Habitat in Jamaica.

biſpinoſa. 90. C. fuſca, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris obſcuris: ſtriga maculari nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 6.
Habitat in Sumatra, *magna.*

vaginata. 91. C. teſtacea, elytris albidis: coſta nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 7.
Habitat in Sumatra, *magna.*

Tibicen. 19. C. elytris anaſtomoſibus ferrugineis, ſcutelli apice emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 160.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 8. Tettigonia ſcutello emarginato, alarum coſta vireſcente.
Degeer inſ. 3. *p.* 212. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 23. Cicada Lyricea.
Brown jam. 436. *t.* 43. *f.* 15. Panorpa.
Marcgr. braſil. 256. Gueruca Eremenbi.
Merian. inſ. ſurin. t. 49. Tibicen.
Seb. muſ. 4. *t.* 85. *f.* 9. 10.
Habitat in America, *thorace nunc nigro, nunc nigro brunneoque vario.*

ſeptendecim. 20. C. nigro vireſcens, elytris margine flaveſcente, capite utrinque octoſtriato.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 319. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 9. Tettigonia nigra, elytris albis, coſta flava.
Kalm act. Stockh. 1756. *p.* 101. Cicada maxilla utraque lineis octo transverſis concavis, alarum margine inferiore luteſcente.
Collinſ. act. angl. 1765. *p.* 65. *t.* 8.
Habitat in America.

catena. 92. C. thorace variegato, elytris hyalinis anterius nervis punctatis, poſterius ſtrigis duabus undatis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 266. *n.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei.

pustulata. 93. C. atra, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculata. 94. C. atra, thorace elytris alisque flavo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 266. *n.* 12.
Drury inf. 2. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in Siria.

violacea. 21. C. violacea, alis apice fuscis. *Mus. Lud. Ulr.* 162.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 322. *n.* 22. *mant. inf.* 2. *p.* 267. *n.* 27.
Fuesslı inf. helv p. 24. *n.* 455.
Habitat in Europa *magis australi.*

querula. 95. C. capite thoraceque griseis: characteribus maculisque nigris. *Pallas it.* 2. *app. n.* 83.
Habitat in australibus circa fluvium Ural, *haematodi affinis.*

prasina. 96. C. dilute viridis, thoracis maculis fuscis inauratis. *Pallas it.* 2. *app. n.* 84.
Habitat in desertis magis australibus circa fluvios Ural *et* Irtis, *Junio frequens, querula minor.*

marginella. 97. C. pallida, thoracem inter et alas nigra: macula alba acuminata, thorace marginato. *Scop. entom. carn. p.* 116. *n.* 342.
Habitat in Carnioliae *salicetis.*

graminis. 98. C. elytris albidis: lineis tribus ocellisque duodecim. *Scop. ent. carn. p.* 116. *n.* 343.
Habitat in Carnioliae *gramine.*

notata. 99. C. pallide flavicans, elytris albidis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. p.* 117. *n.* 344.
Habitat in Carnioliae *plantis variis.*

montana. 100. C. abdominis segmentis margine rubellis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 108.
Habitat in Carnioliae *montanis circa* Idriam, *c. orni duplo minor.*

Schaefferi. 101. C. ex fusco lutea, elytris alisque flavo-fenestratis.
Schaeff. icon. 2. *t.* 121. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

*** *antennis filiformibus, ſub oculis inſertis.*
† *roſtri vagina porrecta, obtuſa, ſuperne canaliculata.*
Cercopides Fabricii.

afra. 102. C. elytris fuſco-griſeis: macula marginali fulva cinereaque.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 328. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 1. Cercopis groſſa.
Habitat in Africa *aequinoctiali, in hac tribu magna.*

atra. 103. C. atra, elytris utrinque vitta marginali ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali, magna.*

maculoſa. 104. C. thorace atro: faſcia fulva, elytris fulvis: maculis apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoctiali, ſtatura afrae.*

quadrifaſciata. 10. C. flava: faſciis quatuor fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 9.
Degeer inſ. 3. *p.* 225. *n.* 21. *t.* 33. *f.* 11. Cicada flava, faſciis quatuor transverſis nigris.
Habitat in America *meridionali.*

bifaſciata. 11. C. flaveſcens elytris fuſcis: faſciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 20.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 706. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 898.* *Fn. ſuec.* 1. *n.* 633. Cicada fuſca, faſciis alarum binis albis.
Degeer inſ. 3. *p.* 186. *n.* 6. *t.* 11. *f.* 25. Cicada trifaſciata.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

ſanguinolenta. 22. C. atra, elytris maculis duabus faſciaque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 330.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 418. *t.* 8. *f.* 5. Cicada nigra, elytris maculis ſex rubris.
Goeze Naturf. 6. *t.* 2.
Fueſſli inſ. Helv. p. 24. *n.* 456.
Habitat in Europae *ſalicibus et gramine.*

Schach. 105. C. nigra, elytris fuſcis: faſcia interrupta ſanguinea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 5.
Habitat in America *ſeptentrionali, ſtatura ſanguinolentae.*

23. C.

An huic etiam inſerendae tanquam propriae ſpecies cicadae a Seba *muſei vol.* 4. *delineatae, fuſca t.* 85. *f.* 1. 2. *albo-guttata t.* 85. *f.* 3. 4. *ſcutata t.* 85. *f.* 7. 8. *et fuſco-maculata t.* 85. *f.* 11. 12?

coleoptrata. 23. C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus griſeis fuſco irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 14.
Habitat in Germaniae *plantis, mediae magnitudinis, capite thoraceque flaveſcentibus, abdomine fuſco.*

ruſtica. 106. C. griſea immaculata, alis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 15.
Habitat in Europae *plantis.*

gibba. 107. C. nigra, elytris albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 334. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 16.
Habitat in Daniae *nemoribus.*

biguttata. 108. C. nigra flavo-maculata, elytris fuſcis: puncto marginali albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 17.
Habitat in Germania, *ſtatura leucophthalmae.*

kilonienſis. 109. C. flaveſcens, elytris obſcuris: faſcia maculisque duabus oppoſitis albidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *ſtatura et magnitudine biguttatae.*

unifaſciata. 110. C. cinerea, elytris faſcia obliqua fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 12. *mant inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 19.
Habitat in agro Pedemontano, *gibba major.*

ſpumaria. 24. C. fuſca, elytris maculis binis albis lateralibus: faſcia duplici interrupta albida. *Fn. ſuec.* 881.* *Scop. ent. carn.* 331. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 329. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 10. *Fueſſli inſ. helv. n.* 450.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 415. *n.* 2. Cicada faſcia duplici albida interrupta transverſa.
Degeer inſ. 3. *p.* 163. *n.* 1. *t.* 11. *f.* 1-21. Cicada ſpumaria graminis.
Degeer act. Stockh. 1741. *p.* 221. *t.* 7.
Reaumur act. pariſ. 1705. *p.* 162.
Raj. inſ. 67.
Swammerd. quart. p. 83.
bibl. 1. *p.* 215.
Merian. inſ. 77. *t.* 51.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 9.
Blanck. inſ. 97. *t.* 11. *f.* N. O. P.
Friſch inſ. 8. *p.* 26. *t.* 12.
Roeſ. inſ. 2. *gryll. p.* 139. *t.* 23.

Sulz.

Sulz. inſ. t. 10. *f.* 64.
Schaeff. elem. t. 42.
Habitat in Europae *plantis variis, frequens in* roſis, graminibus, ſalice *viminali, more plurium hujus et ſequentis tribus ramis inſidendo ano evacuans numeroſas veſiculas, quaſi ſpumam, intra quam latitat.*

aurea. 111. C. cinereo-aurea nitida immaculata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 11.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

hafnienſis. 112. C. nigra, capite, thorace elytrorumque margine albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 12.
Habitat Hafniae, *ſtatura ſpumariae.*

albifrons. 27. C. nigra, fronte alba. *Fn. ſuec.* 884.*
Habitat in Europa, *an hujus tribus?*

ſtriata. 30. C. elytris albido nigroque ad angulum acutum ſuturae dorſalis ſtriatis. *Fn. ſuec.* 887.*
Raj. inſ. 68. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 424. *n.* 20.
Habitat in Europa, *an ex hac tribu.*

lineata. 31. C. flaveſcens, coleoptris ſtriis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 330. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 709. *n.* 31? *Fn. ſuec.* 888? Cicada exalbida; linea utrinque longitudinali nigra.
Habitat in Europa, *mediae magnitudinis.*

populi. 32. C. ſubtus flaveſcens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis. *Fn. ſuec.* 890.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 331. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 21. Cercopis nebuloſa, vertice punctis duobus, abdomineque baſi atris.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

rubra. 45. C. alis deflexis fuſcis: faſciis duabus flavis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 329. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 274. *n.* 6. Cercopis (cruentata) rufa, elytris nigris: faſciis duabus flavis.
Degeer inſ. 3. *p.* 224. *n.* 20. *t.* 33. *f.* 8.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 10. C.
Habitat in America *meridionali, alis inferioribus hyalinis immaculatis.*

Carnifex. 113. C. sanguinea, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 329. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 274. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

varia. 114. C. capite thoraceque virescentibus, elytris fuscis: maculis duabus baseos strigaque posteriore flavis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 274. *n.* 8.
Habitat in Cayenna, *atra*, *abdomine rufo.*

lineolata. 208. C. elytris griseis fusco lineolatis: disci litura transversa. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 46.
Habitat in Europa.

guttata. 209. C. fusca, elytris maculis lacteis. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 47.
Habitat in Europa.

unicolor. 210. C. pallida immaculata. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 48.
Habitat in Europa.

bicolor. 211. C. grisea, thorace supra sanguineo. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 49.
Habitat in Europa.

punctulata. 212. C. fusca, thorace anterius punctis impressis, elytris maculis duabus albis lateralibus. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 50.
Habitat in Europa.

leucoptera. 213. C. elytris albis: striis fuscis interruptis. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 51.
Habitat in Europa.

venosa. 214. C. alis hyalinis albo venosis: posterius fasciis duabus fuscis irregularibus. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 52.
Habitat in Europa.

nebulosa. 215. C. alis albis luteo-nebulosis. *Musf. Lesk. p.* 117. *n.* 53.
Habitat in Europa.

†† *rostri vagina brevissima, membranacea, cylindrica, obtusa*, Cicadae Fabricii.

† *saltatoriae*, Ranatrae.

perspicillata. 115. C. atra, alis macula ocellari albo-hyalina, abdomine apice flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 322. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 268. *n.* 1.
Stoll cicad. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in India, *in hac tribu magna.*

116. C.

elongata. 116. C. thorace rubro flavo lineato, elytris longissimis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 22.
Habitat in nova Hollandia, *parva, gibba.*

cayennensis. 117. C. capite thoraceque fusco-aureis nigro variis, elytris hyalinis apice obscurioribus: macula aurea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *fusca, femoribus posterioribus flavis, statura ferrugineae.*

aurulenta. 118. C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice cinereis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *statura et magnitudine obtusae.*

obtusa. 119. C. nigra, elytris apice cinereo-hyalinis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *statura ferrugineae.*

ferruginea. 120. C. capite, thorace scutelloque nigro punctatis, elytris rufis, alis atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 269. *n.* 17.
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

nervosa. 25. C. fusca, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis. *Fn. suec.* 882.* *Scop. ent. carn.* 341. *Fuessli inf. Helv.* *p.* 24. *n.* 459.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 327. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 48. Cicada alis fuscis, nervis albo nigroque punctatis.
Degeer inf. 3. *p.* 182. *n.* 4. *t.* 12. *f.* 1. 2. Cicada nervoso-punctata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 415. *n.* 1.
Habitat in Europae *plantis.*

variegata. 121. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus costalibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 49.
Habitat in Germania.

lyncea. 122. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellaribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 37. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 50.
Habitat in India.

fulgida. 123. C. flava, elytris fusco-auratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 51.
Habitat in Angliae *plantis.*

124. C.

punctata. 124. C elytris flavescentibus fusco punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 39. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 52.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 417. *n.* 4. Cicada fusco-pallida &c.
Habitat in Europae *nemoribus.*

leucophthalma. 26. C. nigra, oculis albis. *Fn. suec.* 883.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 28.
Habitat in Europae *borealis plantis.*

leucocephala. 28. C. nigra, capite albo. *Fn. suec.* 885.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 23 *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 29.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 421. *n.* 13.
β) Schaeff. ic. t. 237. *f.* 6.
Habitat in Europae *plantis.*

lateralis. 29. C. nigra, elytris latere albis. *Fn. suec.* 886.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 324. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 24. *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 460.
Raj. inf. 68 2. Locusta pulex fusca, utrinque in lateribus alarum arcu albicante.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 416. *n.* 3.
Habitat in Europae *pratis.*

bimaculata. 125. C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsalibus margineque exteriori flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 25.
Habitat in Brasilia.

fenestrata. 126. C. supra nigra, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 325. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 26.
Habitat in insula Tahiti *oceani australis.*

flavipes. 127. C. nigra, capite pedibusque flavis, elytris apice hyalinis nigro striatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 270. *n.* 27.
Habitat in insula Rotterdam *oceani australis*, *fenestratae proxime affinis.*

flavicollis. 33. C. fusca, capite thoraceque flavis. *Fn. suec.* 891.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 325. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 271. *n.* 33.
Cicada nigra, capitis margine posteriori thoraceque flavis
Habitat in Europae *graminibus.*

flava. 34. C. flava unicolor. *Gron. zooph.* 681.
Habitat in Europa.

35. C.

interrupta. 35. C. elytris flavis: linea nigra duplici interrupta longitudinali. *Fn. fuec.* 889.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 325. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 30.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 419. *n.* 9.
Petiv. gazoph. t. 61. *f.* 10.
Degeer inſ. 3. *p.* 186. *n.* 7. *t.* 12. *f.* 6.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 462.
Habitat frequens in Europae *plantis.*

Hybneri. 128. C. pallida, capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 31.
Habitat Halae Saxonum, *ſtatura interruptae.*

abbreviata. 129. C. flaveſcens, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 32.
Habitat Hafniae, *ſtatura interruptae.*

vittata. 36. C. flava: vitta ferruginea longitudinali duplici repando-dentata. *Fn. fuec.* 889.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 463. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 23.
Habitat in Europae *hortis.*

Lanio. 37. C. viridis, capite thoraceque carneis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 464. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 27. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 38.
Habitat in Europae *plantis.*

ochromelas. 130. C. nigra, capite faſciis duabus flavis, elytris albo ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 39.
Habitat in Kilouni *plantis*, *ſtatura viridis.*

ignita. 131. C. vireſcenti-nitidula, capite ſcutello abdomineque fulvis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *parva.*

turca. 132. C. atra, abdomine flavo, alis apice fuſcis: lunula hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 41.
Habitat in Europae *plantis.*

maura. 133. C. nigra, pectore abdomineque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 42.
Habitat in nova Hollandia.

nebuloſa. 134. C. nigra, elytris hyalinis baſi fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 43.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *mediae magnitudinis.*

hyalina. 135. C. fusca, elytris fascia abbreviata margineque posteriori hyalinis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 326. *n.* 31. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 44.
Fabr. syst. entom. p. 688. *n.* 1. Gercopis fenestrata.
Habitat in India.

pellucida. 136. C. grisea, elytris fascia media hyalina. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 326. *n.* 32. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 45.
Habitat in nova Hollandia.

cynosbatos. 137. C. fusca, alis albo-hyalinis: margine fusco punctato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 33. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 46.
Habitat in Daniae *rosis.*

ferratulae. 138. C. flava, elytris albis: puncto fasciisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 327. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 272. *n.* 47.
Habitat in Angliae *carduis.*

aptera. 38. C. aptera atra, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis. *Fn. suec.* 894.*
Habitat in Sudermania *ad* Akeroum, *pulicis magnitudine.*

tricolor. 139. C. elytris lacteis: punctis nigris, capite thoraceque virentibus. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 21. *n.* 36.
Habitat Upsaliae *frequens et* Lutatiis, *pediculo vix duplo major.*

reticulata. 140. C. elytris hyalinis fusco reticulatis, capite thoraceque albis nigro maculatis. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat Upsaliae, *interrupta paulo major.*

variabilis. 141. C. elytris fusco-flavescentibus: margine maculis duabus pallidis, capite thoraceque flavescentibus. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 22. *n.* 38.
Habitat frequens Upsaliae, *interrupta vix major, elytris nunc flavescentibus, nunc fusco flavoque variis, nunc fuscis.*

cincta. 142. C. elytris fuscis: margine maculis duabus albis, capite thoraceque fuscis. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 23. *n.* 39.
Habitat Upsaliae, *magnitudine nervosae, variabili sextuplo major.*

exclamationis. 143. C. elytris nigris: linea punctoque albis, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Upf.* 4 *p.* 24. *n.* 40.
Habitat Upsaliae, *bifasciatae magnitudine, supra nigra, subtus flavescens.*

144. C

guttata. 144. C. fuſco varia, capite thorace elytrisque ferrugineis: punctis flavis albisque, tergo coccineo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 68. *n.* 68.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine ſpumariae, an ejusdem tribus?*

cruenta. 145. C. capite thorace alisque ſubfuſcis, abdomine nigro, elytris ruberrimis apice flavis.
Drury inſ. 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 5. 6. Cicada ſanguinea.
Habitat in Jamaica.

ſalicina. 146. C. griſea, pedibus rufo-teſtaceis.
Degeer inſ. 3. *p.* 180. *n.* 2. Cicada ſpumaria ſalicis.
Habitat in ſalice, *an ad cercopides releganda?*

muſcaeformis. 147. C. fronte quadrata, thorace breviſſimo, ſcutello albido: punctis duobus impreſſis, alis fuſceſcentibus: baſi faſciaque abrupta albis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 253. *n.* 482.
Habitat in Auſtria *ſuperiore, infra* 3 *lineas longa.*

bicincta. 148. C. pallide fuſca, capite thoraceque faſcia albida. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 26. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 483.
Habitat in Auſtria *ſuperiori, infra* 3 *lineas longa.*

decimaquarta. 149. C. pallida, elytris numero 14 nigro notatis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 76. §. 28. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 485.
Habitat in Auſtria, *infra* 3 *lineas longa.*

quadrimaculata. 150. C. ferruginea, elytris ad marginem exteriorem maculis duabus albis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 30. *inſ. auſtr. p.* 254. *n.* 486.
Habitat Siennae auſtriae, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Schrankii. 151. C. fuſca ſubtus flava, alis hyalinis: apice nervis nigris feneſtratis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 74. §. 24. *inſ. auſtr. p.* 255. *n.* 487.
Habitat in Auſtria *ſuperiore,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

auſtriaca. 152. C. nigra, pedibus pallidis, oculorum baſi alba, alis hyalinis: faſciis ſubtribus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 73. §. 23. *inſ. auſtr. p.* 255. *n.* 488.
Habitat in Auſtria, $2\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

haemorrhouſa. 153. C. nigra, thorace maculis duabus ſanguineis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 256. *n.* 490.
Habitat in Auſtriae *arbuſtis, vix ultra* 2 *lineas longa.*

trilineata. 154. C. ferruginea, lineis tribus longitudinalibus nigris. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 75. §. 27. *inf. auſtr. p.* 258. *n.* 496.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

erythrophthalma. 155. C. flaveſcens, oculis rubris, tibiis anterioribus nigro marginatis, alis hyalinis: lineolis obſcuriuſculis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 77. §. 31. *inf. auſtr. p.* 258. *n.* 498.
Habitat in Auſtria.

melanoſticta. 156. C. ſulphurea, capite punctis duobus, elytris maculis aliquot nigris: apice fuſco. *Schranck inf. auſtr. p.* 259. *n.* 499.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 426.
Habitat in Auſtria *ſuperiore et* Gallia, *ſeſquilineam longa.*

arunci. 157. C. tota ferruginea, oculis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 332.
Habitat in Spiraea Arunco.

marginalis. 158. C. fuſca, elytri margine externo pedibusque flaveſcentibus, corpore luteo. *Scop. ent. carn. p.* 113. *n.* 333.
Habitat in Carnioſia.

bicordata. 159. C. elytris nigris: latere utroque et linea media, pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 334.
Habitat in Carnioliae *corylo, frontis macula media nigra, cujus apici utrique inſidet macula obcordata nigra.*

oenotherae. 160. C. flaveſcens, oculis nigris, elytris rivulis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 336.
Habitat in Carnioliae *oenothera bienni, ſpumans, ſpumaria major; an ex cercopidum tribu?*

carniolica. 161. C. nigricans, elytris margine omni lineolisque tribus longitudinalibus luteis. *Scop. ent. carn. p.* 114. *n.* 337.
Habitat in Carnioliae *fruticibus.*

pallida. 207. C. pallida thorace punctis ſex impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 419 *n.* 8.
Habitat in Gallia *et* Calabria.

biguttata. 216. C. nigra, thorace utrinque gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 20.
Habitat in Europa.

217. C.

rivuloſa. 217. C. teſtacea, elytris ferrugineo variis: rivulis transverſis albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 25.
Habitat in Europa.

ſtrigoſa. 218. C. ſcutello thoraceque transverſim ſtrigoſo rufeſcentibus, elytris fuſco, rufo cinereoque variis, ano ſetoſo, pedibus poſterioribus longis: tibiis ſpinis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 26.
Habitat in Europa.

caſta. 219. C. fuſco-pallida immaculata. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 28.
Habitat in Europa.

quadri-ſtriata. 220. C. elytris nervoſis elevato-punctatis rugoſis tibiarumque apice griſeis, thorace depreſſo: ſtriis quatuor longitudinalibus, pedibus anterioribus latis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 27.
Habitat in Europa.

lutea. 221. C. lutea, elytris ad ſcutelli margines albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 29.
Habitat in Europa.

bipuncta-ta. 222. C. flava, fronte punctis duobus fuſcis, elytris albis luteo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 30.
Habitat in Europa.

flavi-frons. 223. C. lutea fronte flava: punctis duobus minimis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 31.
Habitat in Europa.

reticulata. 224. C. flava, elytris albis luteo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 32. 35.
Habitat in Europa.

lineolata. 225. C. fuſca, elytris albidis fuſco venoſis: lineolis interruptis albis. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 33.
Habitat in Europa.

vireſcens. 226. C. ex flavo vireſcens. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 34.
Habitat in Europa.

lugubris. 227. C. elytris albis: margine interno poſteriorique nigro, dorſo interrupto. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 36.
Habitat in Europa.

hyalina. 228. C. elytris hyalinis albo venoſis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 37.
Habitat in Europa.

lactea. 229. C. pallida, alis lacteis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 38.
Habitat in Europa.

denigrata. 230. C. flava, alis albis, abdomine ſupra nigro. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 39.
Habitat in Europa.

maculoſa. 231. C. fuſca, elytris albidis fuſco maculatis. *Muſ. Lesk. p.* 118. *n.* 40.
Habitat in Europa.

pallens. 232. C. aptera pallida. *Muſ. Lesk. p.* 116. *n.* 42.
Habitat in Europa.

†† *alis deflexis, latera obvolventibus*, Deflexae.

ocellata. 162. C. elytris compreſſis adſcendentibus viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 2.
Degeer inſ. 3. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat Tranquebariae.

aequinoctialis. 163. C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori baſi nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 3.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magna.*

marginata. 39. C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 4.
Habitat in America, *lateralis magnitudine, alis pallidis.*

phalaenoides. 40. C. exalbida, alis patulis, elytris anterius nigro punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 5.
Degeer inſ. 3. *p.* 222. *n.* 19. *t.* 33. *f.* 6. Cicada flava, alis ampliſſimis deflexis albidis nigro punctatis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 9. *f.* 10.
Stoll cicad. t. 2. *f.* 9.
Habitat in America *meridionali, hemerobio perlae ſimilis.*

bipunctata. 41. C. exalbida, elytris deflexis griſeis, thoracis margine anteriori punctis duobus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali, cornutae magnitudine.*

retuſa. 164. C. exalbida immaculata, capite anterius retuſo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine marginatae.*

165. C.

griſea. 165. C. griſea, elytris deflexis, capite apice punctato nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 8. *Habitat in inſulis* Americae *meridionali oppoſitis.*

tripuncta- ta. 166. C. elytris deflexis viridibus: punctis tribus albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 9. *Habitat in* America *meridionali, viridis, vivida major.*

vivida. 167. C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 10. *Habitat in inſulis*, Americae *meridionali oppoſitis*, *in* nova *quoque* Hollandia.

minuta. 168. C. elytris deflexis viridibus: dorſo ſcabro, capitis margine poſteriori thoraceque linea dorſali ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 11. *Habitat in* nova Hollandia.

lanata. 42. C. alis nigris: punctis caeruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. *Muſ. Lud. Ulr.* 163.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 13. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 9. *f.* 11. *Drury inſ.* 2. *t.* 37. *f.* 11. *Stoll cicad.* 1. *t.* 10. *f.* D. 49. *Habitat in* America *auſtrali et* India, *nigricans, oculis ſpinoſis.*

tomen- toſa. 169. C. elytris deflexis viridibus fulvo ſubfaſciatis, alis albis: faſciis duabus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 14. *Habitat in* India.

barbata. 170. C. fuſca, abdomine vireſcente, ano lanato niveo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 15. *Habitat in* India.

atrata. 171. C. atra, thorace maculis quatuor griſeis, abdominis margine flavo: punctis niveis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 269. *n.* 16. *Habitat in* Cayenna, *ſtatura et magnitudine lanatae, antennis teſtaceis, genubus flavis.*

villoſa. 172. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 324. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 270. *n.* 21. *Habitat in* America *meridionali.*

leporina. 43. C. alis exalbidis: anterius anaſtomoſibus pallidis ſupra lineolam nigricantem, ano lanato. *Fn. ſuec.* 895.*
Habitat in Europa.

cunicularia. 44. C. alis hyalinis: ſtriga faſcia punctisque fuſcis, ano lanato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 323. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 268. *n.* 12.
Habitat in India, *fronte ovata ferruginea.*

viridis. 46. C. elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris. *Fn. ſuec.* 896. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 417. *n.* 5. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 465. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 326. *n.* 26. *mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Raj. inſ. p. 68. *n.* 3. Locuſta pulex paulo minor.
Petiv. gaz. 73. *t.* 76. *f.* 6. Kanatra virideſcens.
Habitat in Europa, *elytris rarius caeruleſcentibus.*

laeta. 173. C. ſupra nigra nitida: punctis caeruleſcentibus. *Fabr. mant.* 2. *p.* 271. *n.* 34.
Habitat in Cayenna, *viridi minor, ſubtus flaveſcens, ano coccineo.*

quadriguttata. 174. C. elytris rufeſcentibus: maculis duabus viridibus apice hyalinis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 271. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis, ſubtus flaveſcens.*

marginella. 175. C. nigra, capitis thoracis elytrorumque margine coccineis. *Fabr. mant. inſ* 2. *p.* 271. *n.* 37.
Habitat in Cayenna, *parva.*

compreſſa. 47. C. flava compreſſa. *Fn. ſuec.* 897.*
Habitat in Europa.

aurata. 48. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris poſteriusque auratis. *Fn. ſuec.* 899.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 55. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 466.
Habitat in Europae *magis borealis plantis.*

ulmi. 49. C. alis viridi luteis: apicibus nigricantibus inauratis. *Fn. ſuec.* 900.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 56. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 427. *n.* 27.
Degeer inſ. 3. *p.* 189. *n.* 8. Cicada muſciformis ulmi.
Habitat in Europae *ulmis.*

nitidula. 176. C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 57.
Habitat Halae Saxonum, *parva, flava.*

177. C.

cuſpidata. 177. C. griſea, capite depreſſo plano apice fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 43. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 58.
Habitat in Angliae *plantis.*

quercus. 178. C. flaveſcens, elytris ſanguineo apice fuſco maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 328. *n.* 44. *mant. inſ.* 2. *p.* 273. *n.* 59.
Habitat in quercu.

roſae. 50. C. flava, alis albis apice fuſco ſtriatis. *Fn. ſuec.* 902.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 428. *n.* 28. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 327. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 53.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 467.
Degeer inſ. 3. *p.* 103. *n.* 9. Cicada muſciformis roſae.
Reaum. inſ 5. *t.* 20. *f.* 10-14.
Friſch inſ. 11. *p.* 13. *t.* 20.
Habitat in roſae *foliis.*

fuſcata. 179. C. griſea, elytris punctis apiceque fuſcis, alis albis apice fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 272. *n.* 54.
Habitat in Europa, *ſtatura et magnitudine C. roſae.*

coryli. 51. C. alis fuſcis convolutis: faſcia albida pone maculam cordatam caeruleſcentem. *Fn. ſuec.* 901.*
Habitat in corylo.

coccinea. 180. C. flava, capite thorace ſcutello tergo elytrisque coccineis, elytris lineis duabus longitudinalibus obliquis virentibus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 69. *n.* 69.
Habitat in America *ſeptentrionali, compreſſae circiter magnitudine.*

americana. 181. C. elytris maculatis, ano lanato.
Habitat in America, *an vere diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

albida. 182. C. albida, elytris nigro punctatis.
Habitat in America; *an diſtincta a* 42, 169-172 *ſpecies?*

globulifera. 183. C. atra, capite conico in ſpinam longiſſimam deſinente: pedunculis quatuor globuliferis. *Pall. miſcell. zool. p.* 187. *ſpicil. zool.* IX. *p.* 22. *t.* 1. *f.* 12. D. E. F.
Habitat - - - - *pediculo duplo vel triplo major.*

erythroptera. 184. C. fuſca, capite flavicante, elytris rubris: ſtrigis quatuor nigris. *Lepechin it.* 2. *p.* 209. *t.* 11. *f.* 24.
Habitat in Sibiria.

nitens. 185. C. griseo-viridis, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anterioribus tridentatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 220. *n.* 17. *t.* 33. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, 11 *lineas longa.*

collaris. 186. C. flavo-fulva, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 226. *n.* 22. *t.* 33. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muscae minoris magnitudine.*

melanoptera. 187. C. fusca: utrinque linea laterali flava, alis nigris. *Degeer inf.* 3. *p.* 226. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 14.
Habitat in Surinamo, *statura et magnitudine collaris.*

gibberula. 188. C. fusco-viridis reticulata, alarum basi dilatata. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 418. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

sexpunctata. 189. C. flavescens, thorace punctis sex impressis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 429. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

crocata. 190. C. nigra, thorace elytrisque fascia crocea. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 422. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

castaneae. 191. C. tota nigra. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 422. *n.* 15.
Habitat in Galliae *castanea.*

tristriata. 192. C. fusca, elytris albidis: fasciis tribus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 425. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

bistriata. 193. C. flava, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 425. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

tripunctata. 194. C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris apice fuscis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 426. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

geographica. 195. C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis. *Geoffr. inf. par.* 3. *p.* 427. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

squalida. 196. C. fusca elytris nebulosis: nervis albidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1152. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 422. *n.* 14.
Habitat in Europa.

197. C.

quadrinotata. 197. C. nigricans, thorace bipunctato, elytris totis coriaceis: fascia duplici interrupta alba. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1149.
Habitat in Dania.

pallescens. 198. C. elytris abbreviatis striatis fusco maculatis, alis albis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1150.
Habitat in Dania.

fusca. 199. C. flavescens, elytris fuscis nervosis, oculis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 102. *n.* 1151.
Habitat in Dania.

pusilla. 200. C. pallida, alis membranaceis albis: punctis raris nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1163.
Habitat in Dania, *adeo exilis, ut saliens tantum oculis percipiatur.*

diaphana. 201. C. luteo-alba, oculis cinereis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1169.
Habitat in Dania.

arvensis. 202. C. lutea, fronte, abdomine subtus, lateribusque nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103, *n.* 1170.
Habitat in Daniae *arvis.*

neuroptera. 203. C. flavescens, alis hyalinis nervosis: maculis subfulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1171.
Habitat in Dania.

cancellata. 204. C. lutea, scutello tripunctato apice fusco, alis albis reticulatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1172.
Habitat in Dania.

glabra. 205. C. fusca, thorace nigro, elytris politis fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1173.
Habitat in Dania.

amphibia. 206. C. antennis crassis elevatis, alis nullis, pedibus posterioribus natatoriis. *Pontopp. Naturg. Daennem. p.* 214. *n.* 13. *t.* 16. a. b. *atl. dan.* 1. *t.* 29.
Müll. zool. dan. prodr. p. 103.
Habitat in Dania, *magnitudine pulicis, feminae abdomine saccifero; an hujus generis?*

224. NOTONECTA.

Roſtrum inflexum.
Antennae thorace breviores.
Alae quatuor cruciato-complicatae, anterius coriaceae.
Pedes poſteriores piloſi, natatorii.

* *labio elongato.*

glauca. 1. N. elytris griſeis margine fuſco punctatis apice bifidis. *Fn. ſuec.* 903.* *Scop ent. carn.* 348. *Fueſſli inſ. helv. p.* 24. *n.* 468. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 476. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 6. Notonecta capite luteo &c.
Degeer inſ. 3. *p.* 382. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 16. 17. Nepa notonecta.
Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 6. Notonecta vulgaris nigro pallidoque mixta.
Raj. inſ. 58. Cicada aquatica Mouffeti.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. E.
Hufn. inſ. t. 12. *f.* 19.
Friſch inſ. 6. *p.* 28. *t.* 13.
Roeſ. inſ. 3. *app.* 1. *p.* 165. *t.* 27.
Pod. inſ. t. 1. *f.* 5.
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 67.
Schaeff. elem. t. 90.
icon. t. 33. *f.* 5. 6.
Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* IX. X.
Habitat in Europae *aquis, piſcibus moleſta.*

americana. 4. N. griſea, poſterius nigra, ſcutello atro, utrinque puncto baſeos flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 2.
Habitat in Americae *aquis.*

5. N.

Notonectae et Nepae *ſub aquis degunt, animalculis aquaticis victitantes; larva et puppa hexapus, agilis, natans imagini ſimillima, haec cum alarum rudimentis illa aptera.*

nivea. 5. N. elytris albis immaculatis apice rotundatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 3.
Habitat in India.

minutiſſima. 3. N. griſea, capite fuſco elytris truncatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 275. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 713. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 905. Notonecta elytris cinereis maculis fuſcis longitudinalibus.
Fn. ſuec. 1. *n.* 690. Notonecta arenulae magnitudinis.
Geoffr. inſ. par. 1. p. 477. *n.* 2. Notonecta cinerea anelytra.
Fueſſli inſ. helv. p. 24. *n.* 470.
Habitat in Europae *aquis.*

minuta. 6. N. capite flavo, thorace elytrisque viridibus: lineis transverſis fuſcis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 91. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in Europae *aquis.*

noveboracenſis. 7. N. flaveſcens, elytris concoloribus: maculis tribus nebuloſis fuſcis longitudinalibus. *Forſt. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 70. *n.* 70.
Habitat in Noveboraco.

octopunctata. 8. N. capite flavo, thorace ſubfuſco, ſcutello nigro: punctis quinque albis, elytris fuſcis: margine albo; punctis quatuor atris.
Schaeff. ic. t. 97. *f.* 1.
Habitat in Germania, *magnitudine ſtriatae.*

indica. 9. N. glauca, elytris apice nigris. *Mant.* 2. *p.* 534.
Habitat in India.

atomaria. 10. N. alba, ſupra elytrisque pallide griſeis, alis lacteolis.
Pall. it. 1. *app. n.* 55.
Habitat in fluento Ruſſiae Volchova *ad* Novogrodium, *pediculi magnitudine.*

lutea. 11. N. elytris albidis: ſtriga marginali nigra. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 103. *n.* 1175.
Habitat in Daniae *aquis.*

marginata. 12. N. elytris nigris: margine ſuturaque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 104. *n.* 1176.
Habitat in Dania. *De his* 6-12 *dubium, utrum huic, an ſequenti tribui accenſendae.*

** *la-*

** *labio nullo*, Sigarae Fabricii.

lineata. 13. N. elytris fuscis: lineis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *statura striatae, at paulo major.*

striata. 2. N. elytris fuscis: lineolis transversis undulatis numerosissimis fuscis. *Fn. suec.* 904.* *Scop. ent. carn.* 349. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Petiv. gazoph. t. 72. *f.* 7. Notonecta vulgaris compressa fusca.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 478. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 7. Corixa.
Degeer inf. 3. *p.* 389. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 1. 2. Nepa striata.
Joblot microsc. 1. *p.* 1. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *p.* 177. *t.* 29.
Schaeff. elem. t. 50.
icon. t. 97. *f.* 2.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* XIII. B.
Habitat in Europae *aquis frequens, magnitudine varians.*

coleoptrata. 14. N. elytris totis coriaceis fuscis: margine exteriori flavo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Habitat in Kilonii *aquis.*

225. NEPA. *Rostrum* inflexum.
Antennae breves.
Alae quatuor cruciato-complicatae: anterius coriaceae.
Pedes anteriores cheliformes; reliqui quatuor ambulatorii.

* *antennis palmato-divisis, labio nullo.*

grandis. 1. N. ecaudata testacea flavo maculata. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 1.
Syst. nat XII. 2. *p.* 713. *n.* 1. *Mus. Lud. Ulr.* 164* *Gron. zooph.* 685. Nepa testacea scutello laevi, alis albis maculis venisque flavis.
Degeer inf. 3. *p.* 379. *n.* 4. Nepa surinamensis.
Marcgr. bras. 250. *f.* 259. Insectum magnitudine bruci.
Merian. inf. surin. t. 56.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *t.* 26.
Habitat in Americae *aquis.*

2. N.

rubra. 2. N. fusca, abdomine supra alarumque nervis rubris. *Mus. Lud. Ulr.* 165.*
Fabr. mant. inf. 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biseta corpore ovato, cauda corpore longiore.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* V. Scorpio aquaticus.
Habitat Tranquebariae.

annulata. 8. N. ecaudata subrotunda, pallide fusca, tibiis anterioribus pallidis fusco annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *congeneribus latior, magis rotundata.*

rustica. 9. N. ecaudata fusca, thoracis elytrorumque margine anteriore albido. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 276. *n.* 3.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 2. Nepa plana.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* VI.

fusca. 3. N. fusca, cauda biseta, scutello rugoso, alis niveis. *Mus. Lud. Ulr.* 166.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 333. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Indiae *aquis, cauda corporis longitudine.*

grossa. 10. N. cauda biseta, corporis ovati longitudine. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 5.
Habitat in Sina, *rubra major, cinerea, abdomine supra rubro, medio nigro, ano cinereo.*

atra. 4. N. atra thorace inaequali, corpore oblongo.
Habitat in Africa, *cinereae simillima, at duplo major et duplo longior.*

cinerea. 5. N. cinerea, thorace inaequali, corpore oblongo ovato. *Fn. suec.* 906. *Scop. ent. carn.* 350. *Fuessli inf. helv. p.* 24. *n.* 471.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 333. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 6. Nepa cauda biseta, corpore ovato.
Fn. suec. 1. *n.* 691. Nepa abdominis margine integro.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 481. *n.* 2. Nepa corpore ovato.
Degeer inf. 3. *p.* 361. *n.* 1. *t.* 18. *f.* 1. Nepa Scorpio aquaticus.
Mouff. inf. 321. Scorpio palustris.
Raj. inf. 58. Scorpio palustris ad cimices referenda.
Jonst. inf. t. 25. *f.* 1. 2. Scorpiones aquatici.

Pet.

Pet. gazoph. t. 74. *f.* 4. Scorpio vulgaris aquaticus.
Bauh. ballon. 212. *f.* 2. Araneus aquaticus.
Swammerd. bibl. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Bradl. natur. t. 26. *f.* 2. C.
Frisch inf. 7. *t.* 15.
Hufn. inf. t. 11. *f.* 2.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *p.* 136. *t.* 22. *f.* 6-8.
Sulz. inf. t. 10. *f.* 68.
Schaeff. elem. t. 69.
icon. t. 33. *f.* 7. 9.
Stoll cimic. t. 1. *f.* 11. a.
Habitat in Europae *aquis, abdomine supra rubro, antennis palmato-bifidis.*

maculata. 11. N. nigra, thorace scutelloque ferrugineo maculatis, alis nigris, cauda bifeta. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 334. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 227. *n.* 8.
Habitat in Indiae *aquis.*

linearis. 7. N. linearis, manibus spina laterali pollicatis. *Fn. suec.* 908. *Gron. zooph.* 683.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 334. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 277. *n.* 9. Nepa cauda bifeta corpore lineari.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 480. *t.* 10. *f.* 1. Nepa corpore lineari.
Degeer inf. 3. *p.* 369. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Fuesslii inf. helv. p.* 25. *n.* 473. Nepa linearis.
Raj. inf. 59. Locusta aquatica Mouffeti.
Swammerd. bibl. nat. 1. *p.* 233. *t.* 3. *f.* 9.
Frisch inf. 7. *p.* 24. *t.* 16.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *p.* 141. *t.* 23.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 5. *f.* 5. 6.
Habitat in Europae *et* Indiae *aquis.*

** *labio porrecto rotundato,* Naucorides Fabricii.

cimicoides. 6. N. abdominis margine serrato. *Fn. suec.* 907. *Gron. zooph.* 686. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 474. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *g.* 277. *n.* 1. *Fuesslii inf helv. p.* 24. *n.* 472.
Degeer inf. 3. *p.* 375. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 8. 9. Nepa Naucoris.
Frisch inf. 6. *p.* 31. *t.* 14. Cimex aquaticus latior.
Roes. inf. 3. *app.* 1. *p.* 176. *t.* 28.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 3.
Schaeff. elem. t. 87.

Schaeff.

Schaeff. icon. t. 33. *f.* 3. 4.
Stoll cimic. 2. *t.* 12. *f.* VIII. C. B.
β) Naucoris ſutura integra. *Muſ. Lesk. p.* 117. *n.* 62.
Habitat in Europae *aquis.*

antiguenſis. 12. N. abdominis margine integro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 277. *n.* 2. Naucoris nepaeformis.
Habitat in inſula Antigua.

226. CIMEX. *Roſtrum* inflexum. *Antennae* thorace longiores. *Alae* quatuor cruciato-complicatae: ſuperioribus anterius coriaceis. *Dorſum* planum: thorace marginato. *Pedes* curſorii.

* *antennis ante oculos inſertis.*
† *labio nullo*, Acanthiae Fabricii.
† *apteri.*

lectularius. 1. C. apterus. *Fn. ſuec.* 909. *Scop. ent. carn.* 354. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 434. *n.* 1. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 474. *Degeer inſ.* 3. *t.* 17. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 1.
Mouff. inſ. 269. *f. ſuperiores.* Cimex domeſticus.
Bonann. microſc. t. 65.
Aldr. inſ. 534.
Jonſt. inſ. 89.
Raj. inſ. 7.
Ledermüll. microsc. t. 52. 63.
Sonthall tr. of Buggs. Lond. 1730. *oct.*
Sulz. inſ. t. 10. *f.* 69.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 131.
Habitat in Europae *domibus, exoticus, ante epocham ſalutarem jam in* Europa, *vix ante* 1670. *in* Anglia, *nocturnus, foetens, ſanguiſugus, rarius, aliquando tamen, teſtibus* Scopolio *et* Hermanno, *alatus, vivus facile occidendus, nidore carbonum, terebinthinae oleo accenſo, mentha arvenſi, lepidio ruderali, myrica, geranio robertiano,*

agarico muſcario, cimicifuga, cannabis ſeminibus herbaque, opuli baccis, ledo paluſtri, tabaci oleo, capſici fumo, plumbaginis europaeae infuſo, acoro paluſtri, melolontheo oleo infuſo, meduſa, cimice perſonato, formicis rubris pellendus.

†† *elytris fere totis coriaceis*, coleoptrati.

Zoſterae. 122. C. niger, elytris abdomine longioribus apice hyalino ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 335. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 2.
Fabr. it. norw. Acanthia pellucens.
Habitat ad littora maris, *velociſſime ſupra fucos zoſteramque decurrens*, Kilonii *frequens.*

ater. 123. C. ater nitidus, elytris apice palleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *c. zoſterae duplo minor.*

grylloides. 13. C. apterus niger, elytris ovatis margine luteis abdomine brevioribus. *Fn. ſuec.* 910.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 335. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 4. Acanthia (coriacea) aptera, elytris coriaceis nigro-griſeis.
Habitat in Europa, *thorace gryllum referens.*

clavipes. 124. C. apterus niger, pedibus piceis: femoribus anterioribus incraſſatis dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 5.
Habitat Tranquebariae, *magnitudine c. zoſterae.*

pedemontanus. 125. C. apterus, elytris connatis abbreviatis cinereis, ano ſetoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 6.
Habitat in agro Pedemontano, *parvus, totus cinereus.*

littoralis. 14. C. elytris ſordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 914. 915.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 12.
Degeer inſ. 3. *p.* 278. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 17. 18. Cimex ovatus nigricans.
Habitat in Europae *littoribus.*

15. C.

Cimices *plurimi foetent, omnes, reduviis exceptis, plantarum, omnes animalium, praeſertim inſectorum molliorum ſucco victitant. quem, volatilium more, roſtro ſugunt; larva et puppa hexapus, agilis, obambulat, imagini ſimillima, illa aptera, haec alarum rudimentis inſtructa.*

rugoſus. 15. C. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anterioribus craſſiſſimis. *Fn. ſuec.* 916. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 13.
Habitat in Europa *boreali.*

lunatus. 126. C. thorace lunato: margine prominente, abdomine ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 14
Stoll cimic. 2. *t.* 13. *f.* 84.
Habitat in America *auſtrali et* India.

clavicornis. 16. C. elytris nervoſo-carinatis reticulato-punctatis, antennis clavatis. *Fn. ſuec.* 911.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 7. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 480. *Reaum. inſ.* 3. *t.* 34. *f.* 1-4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 461. *n.* 56.
Habitat in Europae *hortis.*

ſerratulae. 127. C. niger, elytris palleſcentibus, alis apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 336. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 9.
Habitat in Angliae ſerratulis.

lavaterae. 128. C. niger, elytris abdomineque baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p* 278. *n.* 8.
Habitat in Barbariae *lavateris, parvus in hac tribu.*

faſciatus. 129. C. ater, elytris palleſcentibus: faſciis duabus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 278. *n.* 10.
Habitat Kilonii, *parvus, nitidus.*

Müllerі. 130. C. niger, pedibus fulvis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1188.
Habitat in Dania.

maculatus. 131. C. fuſcus, thorace albo trimaculato, abdomine ſubtus albo: margine nigro-punctato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 11.
Habitat Tranquebariae, *parvus.*

TTT *membranacei et valde depreſſi.*

corticalis. 17. C. abdominis margine imbricatim ſecto, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 917. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 337. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 279. *n.* 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 6. 7.
Habitat in Europae *arboribus ſilvaticis.*

paradoxus. 132. C. thorace abdomineque lobatis ciliato-spinosis. *Sparrm. act. Stockh.* 1777. *p.* 234. *t.* 6. *f.* A. B. C. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 510. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 16.

Habitat ad caput bonae spei, *statura corticalis, folia decidua emortua aemulans.*

laevis. 133. C. niger, abdomine laevi brunneo, alis pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 17.

Habitat in Anglia.

betulae. 18. C. thorace denticulato, capite muricato, elytris anterius dilatatis. *Fn. suec.* 918. *Fabr. sp. inf* 2. *p.* 337. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 18.

Degeer inf. 3. *p.* 305. *n.* 36. *t.* 15. *f.* 16. 17. Cimex depressus betulae.

Habitat in Europae *borealis betula alba.*

crassipes. 134. C. abdomine incrassato fusco: apice flavescente, tibiis anterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 19.

Habitat Dresdae.

erosus. 19. C. abdomine flavo: fascia nigra, thoracis margine sinuato, tibiis anterioribus incrassatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 20.

Degeer inf. 3. *p.* 350. *n.* 25. *t.* 35. *f.* 13. 14. Cimex Scorpio.

Habitat in America *meridionali.*

niger. 585. C. niger, thorace ferrugineo marginato conico: apice truncato, elytris abdomine dimidio brevioribus margine externo ferrugineis, abdomine supra albo maculato: lobis utrinque sex ferrugineis, totidemque subtus paribus guttarum albarum. *Mus. Lesk. p.* 117. *n.* 66. b.

Habitat extra Europam.

umbraculatus. 135. C. ferrugineus, thorace marginato: margine anterius scutelloque apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 337. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 21.

Habitat Hafniae.

leucopterus. 136. C. thoracis margine serrato, corpore griseo, alis albis fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 338. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 22.

Habitat - - - - -

filicis. 20. C. elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. *Fn. fuec.* 919.*
Habitat in filicibus.

cardui. 21. C. scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn. fuec.* 920.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 338. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 280. *n.* 24
Degeer inf. 3. *p.* 309. *n.* 38. *t.* 6. *f.* 1. Cimex depressus ovatus griseus nigro-maculatus.
Habitat in Europae *borealis cardui capitulis.*

pyri. 137. C thorace trialato: scutello foliato, elytris reticulatis basi gibbis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 338. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 280. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 461. *n.* 57.
Habitat in pyri *communis foliorum pagina inferiori, quam maculat.*

rhombeus. 22. C. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo posterius texdentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 338. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 280 *n.* 26.
Habitat in Africae *arboribus.*

sylvestris. 111. C. ater, elytris albis: arcu apicis nigro. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 23.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 731. *n.* 111. *Fn. fuec.* 965. Cimex oblongus niger, alis elytrisque albo fuscoque caeruleis, pedibus rufis.
Habitat in Europae *silvis, parvus.*

corticatus. 138. C. thoracis denticulati corporis pedumque cortice nigricante viridi, antennis clavatis.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 7.
Drury inf. 2. *p.* 76. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in Brasilia.

†† *labio elongato, subulato, annulato.*

† *scutello longitudine abdominis*, Scutellati.

Stockerus. 2. C. corpore viridi: maculis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 167.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 280. *n.* 1. Cimex scutellaris ovatus, corpore viridi, maculis nigris abdomine ferrugineo.
Pet. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 12. Stockerus benghalensis viridis nigro-maculatus.

Stoll cimic. 2. *t.* 3. *f.* C.
Habitat in Sina, *nobili affinis, ſubtus ferrugineus: lateribus cyaneis.*

nobilis. 3. C. viridi-auratus nigro maculatus. *Amoen. acad.* 6. *p.* 409. *n.* 46.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 2. Cimex ſcutellaris oblongus caeruleo-auratus nigro maculatus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* C.
Schroet. Abh. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Stoll cimic. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Aſia, *ſubtus rufus, faſciis lateralibus caeruleo auroque nitentibus.*

regalis. 139. C. thorace ſcutelloque aureis, thorace punctis duobus, ſcutello maculis duabus caeruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

imperialis. 140. C. thorace ſcutelloque rufis, abdomine cyaneo: margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

nigellae. 141. C. niger obſcurus, thorace anterius, abdominis margine pedibusque albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 339. *n.* 5. Cimex (ruſticus) ſcutellaris niger obſcurus, abdominis margine ferrugineo, pedibus pallidis.
Habitat in Barbariae *nigella, elytris intus ſanguineis.*

cerinthes. 142. C. niger obſcurus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 280. *n.* 6.
Habitat in Africae *nigella ſativa, ſtatura et magnitudine c. nigellae.*

annulus. 143. C. vireſcens, maculis annularibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 7.
Drury inſ 3. *t.* 46. *f.* 9. Cimex Argus.
Habitat ad fluvium Senegal, *alis apice nigris, interdum obſcure pallidus.*

ſexguttatus. 144. C. ſupra teſtaceus, thorace punctis duobus, ſcutello quatuor cyaneo-nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 339. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 8.

Habitat

Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis, antennis nigris.*

Druraei. 145. C. ſanguineus, punctis maculisque nigris, ſubtus atro-caeruleſcens. *Mant. p.* 534.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 339. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 9. Cimex ſcutellaris ſupra rufus, maculis difformibus nigris.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 5.
Drury inſ. 1. *t.* 42. *f.* 1. 5.
Habitat in America *meridionali.*

Fabricii. 146. C. purpureus: punctis ſanguineis, ſubtus atro-caeruleſcens. *Mant. p.* 534.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340 *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p* 281. *n.* 10. Cimex ſcutellaris ſubpurpuraſcens fulvo-punctatus.
Habitat in Cayenna, *altero ſexu ſupra rufeſcente, altero obſcure caeruleſcente.*

Argus. 147. C. niger: punctis ocellaribus fulvis numeroſis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 11.
Stoll cimic. 2. *t.* 7. *f.* 50.
Habitat in Surinamo, *ſtatura et magnitudine c. Fabricii, ſubtus flavus nigro varius.*

Schulzii. 148. C. atro-aeneus, ſcutello utrinque macula baſeos coccinea.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p* 281. *n.* 12.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine ſcarabaeoidis, praecedentibus minor.*

paganus. 149. C. cyaneus, ſcutello abdomineque rufis cyaneo maculatis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 13.
Habitat in nova Hollandia, *thorace interdum macula rufa, abdomine medio punctis* 4 *cyaneis inſignito.*

illuſtris. 150. C. glaucus, thorace ſcutelloque punctis duobus fuſcis.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 340. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 14.
Stoll. cimic. 2. *t.* 24. *f.* 166.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnus.*

lineola. 151. C. ſupra cyaneus, capite thoraceque linea dorſali, ſcutello punctis duobus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 340. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 15.
Habitat ad caput bonae ſpei, *mediae magnitudinis, antennis nigris.*

trilineatus. 152. C. niger, lineis tribus flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 340. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 281. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali*, *lineato minor*, *subtus niger*, *viridi irroratus*, *abdomine utrinque linea punctorum rubrorum insignito.*

scarabaeoides. 4. C. corpore atro-aeneo. *Fn. suec.* 912.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 342. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 29. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 475.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 435. *n.* 2. Cimex hemisphaericus nigro-aeneus &c.
Sulz. inf. p. 26. *t.* 11. *f.* 70.
Habitat in Europa, *frequentius in ranunculi floribus.*

pallipes. 153. C. nigro-aeneus, scutelli abdominisque margine pedibusque pallidis. *Fabr sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 30.
Thunb. nov. inf. sp. 2. *p.* 29. Cimex (acaroides) scutellatus ater, thorace scutello abdomineque albo marginatis.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *flavipedi affinis*, *at paulo major.*

flavipes. 154. C. nigro-aeneus, margine omni pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 343. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

Vahlii. 155. C. ater nitidus, capite lituris duabus, thorace scutellique margine pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 32.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

maurus. 5. C. corpore griseo. *Fn. suec.* 913.* *Scop. ent. carn.* 352. *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 476.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 342. *n.* 20. *mant. inf.* 2 *p.* 282. *n.* 23. Cimex scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* d.
Schaeff. ic. t. 43. *f.* 3. 4. 15. 16.
Habitat in Oriente, Calabria, *in* Europa *quadruplo minor.*

costatus. 156. C. griseus, alarum costa basi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 282. *n.* 22.
Habitat in insula Rotterdam *oceani australis*, *mauro proxime affinis.*

157. C.

hottentotta. 157. C. ferrugineus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 21. *mant. inſ.* 2 *p.* 282. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 435. *n.* 3? Cimex fuſcus &c.
Habitat in Arabia.

leucogrammes. 158. C. griſeus albo ſtriatus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 25.
Habitat in Italia, *minor.*

ruſticus. 159. C. fuſcus, capite thoracisque anteriore ferrugineis, ſubtus albo fuſcoque varius. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 26.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis, antennis ferrugineis apice fuſcis.*

irroratus. 160. C. vireſcens fuſco irroratus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 23. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 27.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

lanatus. 161. C. aeneo niger griſeo-hirtus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 282. *n.* 28.
Pall. it. 2. *app. p.* 729. *n.* 82.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 61.
Habitat in Sibiria, *oblongus, chryſomelae majoris magnitudine, frequens ad ſpicas elymi canini.*

lineatus. 6. C. niger, thorace lineis quinque, ſcutello tribus aurantiis, abdomine flavo punctis nigris. *Scop. ent. carn.* 351.
Gron. zooph. 689. *Fueſſli inſ. helv. t.* 20. *f.* 6.
Mouff. inſ. 174 *f.* 5.
Poda inſ. 55. *n.* 2.
Buchholz de hepatomphal. Arg. 1768. *t.* 2. *f.* 3.

nigrolineatus. *β*) C. ruber, thorace lineis quinque, ſcutello tribus nigris, abdomine flavo: punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 17.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 6.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 1.
icon. t. 2. *f.* 3.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 9.
Habitat in Europae *magis auſtralis potiſſimum montoſis, in floribus mali et ſambuci.*

ſemipunctatus. 162. C. ſupra rufus, thorace punctis decem, ſcutello lineis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 18.

Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 8.
Habitat in America, Europa *auſtrali.*

anchorago. 163. C. cyaneus, ſcutello baſi apiceque flaveſcente, abdominis margine flavo nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 19.
Habitat in America *boreali, ubi mas rufus, ibi femina flava.*

grammicus. 7. C. corpore flaveſcente: ſupra lituris longitudinalibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 341. *n.* 18. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 20.
Habitat in Africa, *mediae magnitudinis.*

Allioni. 164. C. fuſcus, atomis numeroſiſſimis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 342. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 281. *n.* 21.
Habitat in agro Pedemontano, *grammico paulo minor.*

fuliginoſus. 8. C. ſcutello fuliginoſo: lituris quinque nigris; poſteriore alba bifida. *Fn. ſuec.* 914.* *Fueſſli inſ. helv.* *p.* 25. *n.* 478. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 28. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 33. *Schaeff. ic. t.* 11. *f.* 10-12.
Habitat in Europa *et* Oriente.

litura. 165. C. niger, ſcutello lituris tribus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 29. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 34.
Habitat in Arabia.

tuberculatus. 166. C. obſcurus, ſcutello ſcabro ante apicem tuberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 30. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 35.
Habitat in Italia, *litura paulo minor.*

inunctus. 167. C. ater, ſcutello baſi pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 343. *n.* 31. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 36.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

arabs. 9. C. thorace ſpinoſo, corpore ovato livido, ano bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 168.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 32. *mant. inſ.* 2. *p.* 383. *n.* 37.
Sloane jam. 2. *t.* 237. *f.* 15. 16. Cimex ſylveſtris foetens viridis triangularis.
Habitat in America *meridionali.*

ſerratus. 10. C. thorace ſpinoſo, corpore livido, abdominis marginibus ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 169.*
Habitat in Arabia.

ſtolidus. 11. C. thorace ſubangulato, corpore ſupra viridi ſubtus flavo, ano bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 170.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 344. *n.* 33. *mant. inſ.* 2. *p.* 283. *n.* 38.
Degeer inſ. 3. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali et* India.

Hiſtrio. 12. C. thorace ſcabro depreſſo griſeo pallidoque vario.
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſilphoides. 168. C. niger, thorace poſterius, ſcutello anterius margine linea media maculisque duabus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 29.
Stoll cimic. p. 19. *t.* 4. *f.* 21.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber*, *ovatus*, *magnitudine c. baccarum*, *facie ſilphae.*

diophthalmus. 169. C. ruber, thorace punctis duobus nigris, pedibus cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30. *f.* 45.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

multipunctatus. 170. C. ruber, thorace ſcutelloque punctis minutiſſimis plurimis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 30.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 60.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *glaber*, *ſubtus griſeus*, *magnitudine griſei.*

grandis. 171. C. rufus, maculis thoracis tribus ſcutellique quinque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 31. *f.* 46.
Habitat in India, *oblongus*, *convexus*, *glaber*, *ſubtus violaceus*, *magnitudine fere ſcarabaei ſtercorarii.*

liligerus. 172. C. ferrugineus, ſcutello punctis nigris duobus faſciaque undulata albida. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32.
Stoll cimic. p. 40. *t.* 9. *f.* 59.
Habitat in interioribus regionibus ad caput bonae ſpei, *ovatus*, *convexus*, *glaber*, *magnitudine ſtockeri.*

guttigerus. 173. C. cinereus, ſcutello baſi punctis duobus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 2. *p.* 32. *f.* 47.
Habitat in Japonia, *ſcarabaeoide vix major.*

ocellatus. 174. C. ſupra purpureus, thorace ſpinoſo, ſcutello ocellis ſenis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 60. *f.* 72.
Habitat

An huc quoque referendi a Seba *muſ. vol.* 4. *delineati cimices, nigro-punctulatus t.* 95. *f.* 26. *et nigro denſe punctatus t.* 95. *f.* 27?

Habitat in Japonia *et* Sina, *oblongus, convexus, rufipedis magnitudine.*

surinamensis. 175. C. niger, scutelli appendice rubra, elytris rubellis posterius nigricantibus. *Schroet. Abh. zur Naturg. p.* 338. *t.* 2 *f.* 4.
Habitat in Surinamo.

exanthematicus. 176. C. nigricans: supra punctis confertis albis. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 353.
Habitat prope Tergestum.

torridus. 177 C. fuscus: punctis miniatis. *Scop. ann. histor. nat.* 5. *p.* 110. *n.* 109.
Habitat in America *torrida.*

Frischii. 178. C. nigricans excavato-punctatus, elytris coriaceis connatis, alis nigris.
Frisch inf. 13. *p.* 26. *n.* 28. *t.* 24.
Habitat in Germania, *rostro rufescente, antennarum articulis* 4.

Schranckii. 179. C. obscure ferrugineus subtus flavus, scutello carinato; carina et ad basin utrinque macula flavis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 78. §. 32.
Habitat in Austria.

variegatus. 180. C. fuscus, abdominis limbo pedibusque luteo fuscoque variis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 467. *n.* 65.
Habitat in Gallia.

fuscus. 181. C. nigro-ferrugineus, scutello ad anum usque producto. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 467. *n.* 66.
Habitat in Gallia.

cucullatus. 182. C. ater punctatus, scutello ad anum usque producto. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 468. *n.* 67.
Habitat in Gallia.

sagittifer. 183. C. supra ater, infra exalbidus nigro punctulatus, scutello atro albo-punctato posterius sagittato.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 1-3.
Habitat in Germania.

carneus. 184. C. thorace croceo, elytris incarnatis.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 3.
Habitat in Germania.

185. C.

flavo-viridis. 185. C. flavo-virescens, scutelli apice nitide albo.
Schaeff. ic. t. 109. *f.* 8. 9.
Habitat in Germania.

caruncu-latus. 186. C. flavo viridique varius, abdomine atro: margine flavo, ano tuberculis sex sanguineis.
Schaeff. ic. t. 244. *f.* 1. 2.
Habitat in Germania.

†† *thorace utrinque spina armato*, spinosi.

Taurus. 187. C. griseus, thoracis spinis porrectis compressis truncatis.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 344. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

Cervus. 188. C. viridis, elytris fuscis: margine albo, thoracis spinis obtusis subbifidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 40.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

bidens. 23. C. ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis.
Fn. suec. 921.* *Fuesslii inf. helv. p.* 25. *n.* 482. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 41.
Degeer inf. 3. *p.* 259. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 9. Cimex ovatus fuscus &c.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 72.
Habitat in Europa.

sanguinipes. 189. C. fuscus, thoracis spinis obtusis, scutello apice albido, abdominis margine maculato, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 42.
Habitat in Italia, *statura grisei.*

rufipes. 24. C. ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris.
Fn. suec. 922.* *Fuesslii inf. helv. p.* 25. *n.* 483. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 344. *n.* 37. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 43.
Degeer inf. 3. *p.* 253. *n.* 2.
Raj. inf. p. 54. *n.* 2.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa *frequens.*

lentiginosus. 586. C. ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, elytrorum punctis antennisque fuscis; articulis 2. 3. 4. lividis, membrana maculis lentiginosis adspersa. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 78. b.
Habitat in Europa.

587. C.

multicolor. 587. C. ovatus fuscus, thorace elytrisque rufo-griseis, antennis albo-annulatis, femoribus nigris basi albis, tibiis albis: apice plantisque nigris. *Müs. Lesk. p.* 118. *n.* 78. c.
Habitat in Europa.

luridus. 190. C. thorace obtuse spinoso subvirescente, elytris griseis: macula fusca, clypeo emarginato. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 283. *n.* 44.
Habitat in Angliae *nemoribus.*

nigricornis. 191. C. subferrugineus, thorace obtuse spinoso, spinis antennisque nigris. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 39. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 45.
Habitat in Saxonia.

nigrispinus. 192. C. supra griseus, thorace obtuse spinoso, capite spinisque nigris, antennis annulo albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 46.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine nigricornis.*

ictericus. 25. C. ovatus incarnatus subtus flavus, thorace acute spinoso. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 41.
Fabr. Sp. inf. 2. *p.* 345. *n.* 40. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 47. Cimex thorace spinoso, oblongus supra rufescens subtus flavus.
Habitat in America *et* Calabria.

floridanus. 26. C. ovatus niger rubro varius, scutello maculis tribus rubris. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 52.
Habitat in America, *mediae magnitudinis.*

armatus. 193. C. thorace acute spinoso, scutello nigro: punctis duobus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 45. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

haemorrhous. 27. C. oblongus niger, abdomine rufo, elytris punctis lineariibus quinque nigris. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 45. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 46. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 54.
Habitat in America.

28. C.

An huc etiam referendae species a Seba *vol. mus.* 4. *delineatae, flavo-tessulatus t.* 95. *f.* 25. *spinosus t.* 95. *f.* 31, 32. *quadrispinosus t.* 95. *f.* 33. 34. *bispidus t.* 97. *f.* 35.

marginatus. 28. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acuto, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 70. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 82.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 719. *n.* 28. *Fn. suec.* 923.* *Scop. ent. carn.* 363. *Fuesslı inf. helv. p.* 25. *n.* 484. Cimex oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.
Fn. suec. 1. *n.* 662. Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.
Degeer inf. 3. *p.* 272. *n.* 17. Cimex auriculatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 446. *n.* 20.
Schaeff. ic. t. 41. *f.* 415.
Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Europae *plantis.*

spiniger. 194. C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 71. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 83.
Habitat in Italia, *statura marginati, at duplo minor.*

pugnator. 195. C. oblongus supra fuscus subtus flavescens, thorace acute spinoso, antennis rufis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 84.
Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine spinigeri.*

fasciculatus. 196. C. cinereus, thorace subspinoso, alis fuscis, pedibus fasciculato-tuberculatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 72. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 85.
Habitat ad caput bonae spei, *marginato duplo minor.*

insidiator. 197. C. supra rufus subtus flavescens, thorace acute spinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 86.
Habitat in Barbaria, *quadrato minor, alis albidis.*

quadratus. 198. C. supra fuscus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, abdomine quadrato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 73. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 87.
Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 36.
Habitat in Germania.

hastatus. 199. C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris: striga posteriore alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 88.
Habitat Tranquebariae, *statura quadrati, at minor.*

200. C.

velox. 200. C. thorace acute spinoso bipunctato, elytris puncto baseos strigaque flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 74. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 88.
Habitat in America.

Merianae. 201. C. thorace subspinoso, elytris fuscis albo reticulatis, abdominis basi spinosa. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 350. *n.* 75. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 89.
Merian. inf. surin. t. 51.
Habitat in Surinamo.

bipustulatus. 29. C. oblongiusculus niger, punctis verticis duobus coccineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 47. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 55. Cimex thorace spinoso niger, elytris lividis, capite punctis duobus coccineis.
Degeer inf. 3. *p.* 334. *n.* 8. *t.* 34. *f.* 10. Cimex balteatus.
Habitat in America *meridionali.*

scaber. 30. C. oblongiusculus testaceus, thorace angulato-spinoso, alis nigris, femoribus denticulatis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 43.*
Habitat in Java.

punicus. 31. C. ovatus niger, scutello lunula apiceque rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 48. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 56.
Habitat in Africa, *magnitudine c. baccarum.*

Ypsilon. 32. C. ovatus lividus, scutello ypsilo flavo inscripto. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 49. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 57.
Degeer inf. 3. *p.* 332. *n.* 6. *t.* 34. *f.* 7. 8. Cimex ypsilon aeneus.
Habitat in America *meridionali.*

clypeatus. 33. C. ovatus viridis, fascia flavicante, capite clypeato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 50. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 58.
Gron. zooph. 691. Cimex ovatus, thorace utrinque aculeato fascia transversali flavicante, scutello gibboso, capite clypeato, ano serrato.
Habitat in Sina.

albicollis. 202. C. supra viridis, thorace dentato, capite thoracisque anteriore scutellique basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 51. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 59.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 4. Cimex flavicollis.
Habitat in Jamaica, *subtus flavescens.*

punctatus. 34. C. ovatus punctatus, tibiis annulo albo. *Fn. suec.* 924.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 41. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 48. Cimex thorace subspinoso fuscus, abdominis margine variegato, tibiis annulo albo.
Degeer inf. 3. *p.* 269. *n.* 14.
Habitat in America *boreali, subtus griseus, antennis nigris.*

varius. 203. C. supra rufus subtus flavescens, thorace obtuse spinoso, scutello nigro basi apiceque albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 49.
Habitat in Hispania, *statura et magnitudine albipedis, capite antennisque nigris, pedibus rufis.*

albipes. 204. C. supra nigricans, thoracis subspinosi margine scutellique apice albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 345. *n.* 42. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 50.
Habitat in Italia, *subtus pallidus, statura punctati.*

dentatus. 205. C. thorace acute spinoso serrulato, corpore cinereo nigroque vario. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 346. *n.* 43. *mant. inf.* 2. *p.* 284. *n.* 51.
Habitat in India.

haemorrhoidalis. 35. C. ovato-oblongus griseus, thorace acute spinoso, antennis nigris, sterno porrecto. *Fn. suec.* 925.* *Fuessli inf. helv. p.* 25. *n.* 485.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 347. *n.* 52. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 60. Cimex thorace obtuse spinoso subviresceus, antennis nigris, sterno porrecto.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 465. *n.* 63.
Degeer inf. 3. *p.* 254. *n.* 3. *t.* 35. *f.* 7.
Sulz. hist. inf. t. 11. *f.* 72.
Schaeff. ic. t. 57. *f.* 8?
Habitat in Europae *graminosis.*

spinidens. 206. C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice elytris margine albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 61.
Habitat Tranquebariae, *magnus, spinis unidentatis.*

oculatus. 207. C. griseus, scutello punctis duobus flavis, tarsis anterioribus apice compresso membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 53. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 62.
Habitat in Sina.

annulatus. 208. C. griseus, tibiis albo annulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 54. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 63.
Habitat in Virginia.

quadripustulatus. 209. C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloque punctis duobus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 55. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 64.
Habitat in America.

maculatus. 210. C. virescens, thorace obtuse spinoso: maculis quatuor, scutello elytrisque apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 347. *n.* 56. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 65.
Habitat in America, *elytrorum apice varius concolore.*

pugnax. 211. C. oblongus virescens, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 57. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 66.
Habitat in America.

emeritus. 212. C. virescens, thorace acute spinoso, abdomine lineis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 58. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 67.
Habitat in nova Hollandia.

gladiator. 213. C. thorace acute spinoso scutelloque flavescentibus nigro punctatis elytris punctis albis scabris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 59. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 68.
Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in America *et ad* caput bonae spei.

furcatus. 214. C. fuscus, thorace acute spinoso serrato, clypeo acuminato bifido. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 60. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 69.
Habitat in Patagonia, *nonnunquam totus griseus.*

pugillator. 215. C. fuscus, subtus fulvus nigro punctatus: margine flavo thorace acute spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 61. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 70.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

victor. 216. C. fuscus, thorace acute spinoso, scutello apice rufo, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 62. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 71.
Habitat in Brasilia, *et insulis* Americae *oppositis.*

ciliatus. 217. C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro: margine fasciaque posteriore flavis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 63. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 72.
Habitat in America.

bellator. 218. C. supra fuscus subtus flavescens, antennis atris albo annulatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 73.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

armiger. 219. C. griseus, thorace acute spinoso, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 348. *n.* 64. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 74.
Habitat in Africa *aequinoctiali.*

scorbuticus. 220. C. fuscus, thorace obtuse spinoso, pedibus pallidis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 65. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 75.
Habitat in America.

delirator. 221. C. flavescens nigro punctatus, thorace acute spinoso posterius elytrisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 76.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

melacanthus. 222. C. obscure ferrugineus, thoracis spinis acutis atris, abdomine atro: vittis flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 66. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 77.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *parvus.*

aggressor. 223. C. corpore flavescente, thoracis spinis acutis subconcoloribus, ano quadridentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 67. *mant. inf.* 2. *p.* 285. *n.* 78.
Habitat in nova Hollandia.

vittatus. 224. C. virescens, thorace subspinoso, elytris vitta submarginali flava. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 68. *mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 79.
Habitat ad caput bonae spei, *antennis ferrugineis*, *alis albidis.*

hamatus. 225. C. viridis, thorace acute spinoso, abdomine serrato: denticulis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 286. *n.* 80.
Habitat in India, *magnus*, *antennis nigris.*

defensor. 226. C. corpore viridi, thoracis spinis acutis nigris, ano quadridentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 349. *n.* 69. *mant. inf.* 2. *p.* 287. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

valgus. 36. C. oblongus niger, thorace serrato, femoribus posterioribus incurvis tibiisque posterioribus unidentatis. *Mus. Lud. Ulr.* 171.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 76. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 91.

Habitat ad caput bonae spei, *basi abdominis nunc inermis nunc quadridentata.*

tragus. 227. C. thoracis spinis compresso-lunatis serratis, tibiis posterioribus membranaceo-serratis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 92.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine valgi.*

tenebrosus. 228. C. thorace serrulato, femoribus posterioribus incurvis clavatis, abdomine basi trispinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 93.
Habitat in India, *statura et magnitudine valgi.*

fulvicornis. 229. C. fuscus, thorace serrato, femoribus bidentatis: posterioribus multidentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 94.
Habitat in India, *magnus, antennis ferrugineis.*

femoratus. 230. C. thorace serrulato, femoribus posterioribus incurvis dentatis, tibiisque posterioribus compressis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 77. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 95.
Habitat in India.

curvipes. 231. C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posterioribus incurvis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 78. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 96.
Habitat in Africa *aequinoctiali, statura femorati.*

magnipes. 232. C. obscurus, thorace serrato, femoribus multispinosis: posterioribus incrassatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 97.
Habitat in Sina, *femorato triplo minor.*

membranaceus. 233. C. thorace acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 79. *mant. inf.* 2. *p.* 288. *n.* 98.
Habitat in insula S. Jago *promontorii viridis.*

quadrispinosus. 37. C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 91. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 115.
Degeer inf. 3. *p.* 347. *n.* 22. *t.* 35. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali, antennis longissimis capillaribus.*

phyllopus. 113. C. nigricans, thorace immaculato, elytris fascia albicante, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 80. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 99.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 54.
Habitat in America *australi, mediae magnitudinis.*

auctus. 235. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fulvis, elytris fascia flava, tibiis posterioribus membranaceis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 81. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 100.
Habitat in Cayenna, *phyllopodi proxime affinis.*

Gonagra. 236. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: puncto cinereo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 351. *n.* 82. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 101.
Habitat in insula S. Thomae *in* oceano americano.

kermesinus. 116. C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posterioribus multidentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 83. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 102.
Degeer inf. 3. *p.* 337. *n.* 11. *t.* 34. *f.* 15. Cimex rubro balteatus.
Habitat in Surinamo, *antennis fuscis.*

australis. 237. C. oblongus niger, thorace subspinoso: fascia anteriore rubra, tibiis posterioribus basi membranaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 84. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 103.
Habitat in insula Tahiti *maris australis.*

cruciger. 238. C. oblongus supra niger, thorace acute spinoso lineis, elytris cruce ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 85. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 104.
Habitat in Brasilia.

sanctus. 239. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso elytris nigris: cruce ferruginea. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 86. *mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 105.
Habitat in Brasilia.

laetus. 240. C. viridis capite fascia elytrorum abdominisque femoribusque flavis, elytris atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 106.
Habitat in Cayenna, *magnus, oblongus.*

lunatus. 241. C. niger, thorace arcu anteriore, elytris fascia, corpore maculis albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 289. *n.* 107.
Habitat in Cayenna, *statura laeti.*

elatus. 242. C. thorace acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis ferrugineis, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 108.
Habitat in Cayenna, *lunato minor.*

balteatus. 243. C. oblongus ferrugineus, elytris linea transversa flava, femoribus posterioribus multidentatis. *Mant. p.* 534. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 352. *n.* 87. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 109. *Drury inf.* 1. *t.* 43. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali.*

sinuatus. 244. C. lividus, thorace acute spinoso, tibiis posterioribus compressis sinuatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *statura serripedis, at major.*

serripes. 245. C. oblongus rufus, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 88. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 111.
Habitat in nova Hollandia.

dentipes. 246. C. elongatus, femoribus posterioribus elongatis serratis, corpore fusco subtus lateribus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 112.
Habitat in Sierra Leon Africae, *lineari proxime affinis.*

linearis. 247. C. elongatus fuscus, thorace acute spinoso, femoribus posterioribus elongatis denticulatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 89. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 113.
Habitat in Sina.

crenulatus. 248. C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus posterioribus dentatis, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 90. *mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 114.
Drury inf. 1. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis, capite nigro, rubro-lineato.*

spinifex. 249. C. linearis cinereus, scutello bispinoso. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 33. *f.* 48.
Habitat - - - *facie et magnitudine tipularii.*

setosus. 250. C. oblongus griseus, thorace capite pedibusque hispidis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 33.
Habitat in America *australi et* India, *annulati magnitudine, at duplo angustior.*

acutus. 251. C. linearis cinereus, thoracis margine albido, abdomine punctis sex nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34.
Habitat - - - *magnitudine et facie clavati.*

252. C.

clavatus. 252. C. linearis-oblongus ferrugineus, femoribus posterioribus incrassatis, scutello immaculato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34. *f.* 49.
Habitat in Japonia, *annulati magnitudine, sed paulo angustior.*

Jaculus. 253. C. linearis fuscus, femoribus posterioribus incrassatis spinosis, scutello linea alba. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 34. *f.* 50.
Habitat - - - *magnitudine et facie pilosi.*

pilosus. 254. C. linearis ferrugineus, linea capitis pectorisque laterali albida. *Thunb. nov. inf. sp.* 2 *p.* 35.
Habitat - - - *clavato paulo minor, subtus pallidus.*

villosus. 255. C. spinoso-tuberculatus totus piceus villosus. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 13. *f.* 90.
Habitat - - - *annulato major.*

Crux. 256. C. niger, thorace flavo: cruce nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 35.
Stoll cimic. t. 9. *f.* 65.
Habitat ad caput bonae spei, *personati magnitudine.*

pungens. 257. C. oblongus supra fuscus subtus albidus, pectore abdominisque lateribus nigro punctatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 36.
Habitat ad caput bonae spei, *annulati magnitudine, glaber.*

notatus. 258. C. oblongus supra ferrugineus subtus cinereus, abdomine sextuplici serie punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 37.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, vix annulati magnitudine.*

trigonus. 259. C. testaceus, elytris scutelloque puncto albo. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 37.
Stoll cimic. t. 11. *f.* 78. 79.
Habitat in Japonia *et* Surinamo, *glaber, c. abietis magnitudine.*

muricatus. 260. C. oblongus cinereus muricatus, tibiis posterioribus basi dilatatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 38. *f.* 51.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine c. hyoscyami, femorato similis.*

unipunctatus. 261. C. oblongus testaceus, elytris puncto nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 38. *f.* 52.
Habitat in Japonia, *glaber, trigono plus quam duplo major.*

thoracicus. 262. C. oblongus viridi-aureus, thoracis margine luteo. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 8. *f.* 55. A.
Habitat in India *et* Surinamo, *annulati magnitudine, sed longior.*

analis. 263. C. oblongus viridis, abdomine rubro, ano nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 39.
Stoll cimic. t. 10. *f.* 72. B.
Habitat in India *et* Surinamo, *thoracici magnitudine, sed paulo latior.*

transversus. 264. C. rotundatus viridis, capite thoraceque anterius flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 40. *f.* 53.
Habitat in Africa, *juniperini magnitudine, glaber.*

humeralis. 265. C. ovatus viridis, elytris basi luteis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 40. *f.* 54.
Habitat - - - *juniperino quadruplo major, punctis impressis.*

subulatus. 266. C. ovatus virescens, scutelli linea elevata subulata. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 41. *f.* 55.
Habitat - - - *humeralis magnitudine et facie, subtus albidus.*

Comma. 267. C. rotundatus cinereus, scutello linea flava. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 41. *f.* 56.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine c. baccarum.*

reticulatus. 268. C. cinereus nigro varius, thorace serrato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 42.
Stoll cimic. t. 16. *f.* 111.
Habitat ad caput bonae spei, *glaber, magnitudine c. baccarum.*

Fullo. 269. C. ovatus niger, albo irroratus, capite thoraceque linea alba. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 42. *f.* 57.
Habitat in Japoniae *insula* Dezima, *rufipede major, scarabaeo fulloni similis.*

tibialis. 270. C. ovatus brunneus albo fuscoque lineatus, scutello maculis tribus albis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 43. *f.* 58.
Habitat - - - *magnitudine c. baccarum, glaber.*

sulcatus. 271. C. ovatus cinereus fusco-nebulosus, abdomine sulcato. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 43.
Stoll cimic. t. 6. *f.* 47.
Habitat in Indiâ, *c. baccarum paulo major.*

fuscus. 272. C. oblongus ferrugineo-fuscus, antennis pedibusque hirsutis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 44.
Habitat - - - - valgi fere magnitudine.

sordidus. 273. C. cinereus, thorace denticulato, antennis pedibusque piloso-hispidis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 44.
Habitat in Japoniâ, *marginati magnitudine.*

senegalensis. 274. C. thorace acute spinoso flavo: maculis nigricantibus, scutello viridi-striato posterius flavo, elytris dimidiato nigricantibus: striis obliquis viridibus, posterius fuscis: striis longitudinalibus nigris, corpore rubro: margine nigro maculato.
Drury inf. 2. *p.* 70. *t.* 38. *f.* 4. Cimex variegatus.
Habitat ad fluvium Senegal, *ano denticulato, alis cinerascentibus nigro-reticulatis.*

bidentatus. 275. C. longus fuscus, rostro arcuato, thorace subtus anterius bidentato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

Leviathan. 276. C. planus fuscus, thorace elytrisque alatis, capite anterius cornuto, antennis brevibus crassis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 439. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

rostratus. 277. C. oblongus fuscus immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennas bidentato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 446. *n.* 21.
Habitat in Gallia.

acutangulus. 278. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine laevi. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 447. *n.* 22.
Habitat in Gallia.

immaculatus. 279. C. oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque acute angulato: margine spinoso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 447. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

porphyropterus. 280. C. ovatus flavo-viridis, thorace angulato, elytris pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roseis. *Degeer inf.* 3. *p.* 258. *n.* 5. *t.* 13. *f.* 152.

Habitat in Europae *arboribus herbisque, mediae magnitudinis, an hujus tribus?*

pustulatus. 281. C. ovatus rufus: maculis flavescentibus sparsis, thorace angulato, scutello elongato. *Degeer inf.* 3. *p.* 329. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2.
Habitat in India, *varioloso paulo minor, an hujus tribus?*

leucostictos. 282. C. ovatus flavo-griseus, thorace acute spinoso scutelloque punctis excavatis nigris, elytris punctis elevatis albis. *Degeer inf.* 3. *p.* 331. *n.* 5. *t.* 34. *f.* 6.
Habitat in Surinamo, *satis magnus.*

pensylvanicus. 283. C. subrotundus totus viridis, thorace angulato. *Degeer inf.* 3. *p.* 330. *n.* 4. *t.* 34. *f.* 5.
Habitat in Pensylvania; *an hujus tribus?*

litteratus. 284. C. oblongo-ovatus griseus, scutello ypsilo flavo inscripto, antennis pedibusque testaceis.
Degeer inf. 3. *p.* 333. *n.* 7. *t.* 34. *f.* 9. Cimex Ypsilon griseus.
Habitat in Surinamo, *ypsilo affinis.*

tigripes. 285. C. oblongus supra fuscus subtus griseus, femoribus dentatis nigro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 335. *n.* 10. *t.* 34. *f.* 12.
Habitat in Surinamo, *muscae domesticae magnitudine.*

austriacus. 286. C. ovatus ferrugineus, scutello interstincto: fascia nigra. *Schranck Beytr. z. Naturg.* §. 33. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat prope Mauer Austriae *inferioris.*

chalybeus. 588. C. nigro-aeneus immaculatus. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 78. d.
Habitat in Europa.

beryllinus. 589. C. thorace obtuse spinoso utrinque dentato, spinarum apicibus clypeoque bifido ex caeruleo virescentibus. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 79.
Habitat in Europa, *antennarum articulo quarto posterius dimidio albo.*

adustus. 590. C. thorace acute spinoso, capite, spinarum apice, scutelli medio, elytris utrinque ad basin scutelli membranarumque marginibus externis nigris. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 80.
Habitat in Europa.

591. C.

bidens. 591. C. thorace obtuse spinoso, elytrorum margine interno et posteriore anoque bidentato sanguineis, elytris pallidis. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 81.
Habitat in Europa.

bilobus. 592. C. thorace obtuse dentato, elytris griseis punctatis aut rufescentibus, ano bilobo. *Mus. Lesk. p.* 118. *n.* 82.
Habitat in Europa.

distinctus. 593. C. oblongus, thorace obtuse spinoso subtus luteo, supra antennisque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 83.
Habitat in Europa.

rubricornis. 594. C. thorace hispido obtuse spinoso, antennis hispidis coccineis: articulo ultimo nigro. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 84.
Habitat in Europa.

aculeatus. 595. C. griseus, thorace spinoso: spinis anterius antennarumque articulis secundo tertioque nigris. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 85.
Habitat in Europa.

conspersus. 596. C. thorace obtuse spinoso: anterius punctis duobus impressis, abdomine subtus utrinque nigro punctato, gutta ad anum nigra. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 86.
Habitat in Europa.

†††† *thorace mutico.*

† *rotundati s. ovati.*

aurantius. 287. C. aurantius, capite, thoracis margine anteriori, abdominis maculis marginalibus pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 290. *n.* 116. *Sulz. hist. inf. t.* 10. *f.* 10.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 5. Cimex incarnatus.
Thunb. nov. inf. sp. 2. *p.* 46.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 39. *et. t.* 2. *f.* 10. A.
Habitat in Java, Zeilona, India, *magnus.*

Punctum. 288. C. supra nigricans, thorace posterius aurantio, elytris albis: puncto nigro. *Fabr. mant. inf.* 2, *p.* 291. *n.* 117.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 9. Cimex nigripes.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 40.
Habitat in Java, *magnus.*

melanopus. 289. C. supra sanguineus, scutello maculis duabus, elytris unica nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 353. *n.* 92. *mant. inf.* 2, *p.* 291. *n.* 118.

Drury

Drury inſ. 2. t. 36. f. 5. Cimex incarnatus.
Stoll cimic. 2. t. 2. f. 10.
Habitat in India, *ſcutelli maculis interdum nullis.*

torquatus. 290. C. viridis, capite thoraceque anterius flaveſcentibus.
Fabr. ſp. inſ. 2. p. 353. n. 93. mant. inſ. 2. p. 291. n. 119.
Habitat in India, Italia.

rutilans. 291. C. viridi-aeneus, thorace faſcia anteriore ſanguinea, ſcutello elytrisque anterius flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 353. n. 94. mant. inſ. 2. p. 291. n. 120.*
Stoll cimic. 2. t. 18. f. 122. A.
Habitat in Africa *aequinoctiali, magnus, antennis nigris.*

guttatus. 292. C. viridi-aeneus albido punctatus, tibiis anterioribus membranaceis dilatatis. *Fabr. mant. inſ. 2. p. 291. n. 121.*
Habitat in Siam, *magnus.*

viridulus. 39. C. ſupra flavus: punctis viridibus, ſubtus viridis. *Muſ. Lud. Ulr. 172.* Fabr. ſp. inſ. 2. p. 354. n. 95. mant. inſ. 2. p. 291. n. 122.*
Habitat in America *auſtrali et* India.

peregrinator. 40. C. ſuborbiculatus depreſſus griſeo pallidoque varius, thorace ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr. 173.**
Habitat in America *auſtrali et* India.

bipunctatus. 41. C. pallide griſeus: puncto albo utrinque ad baſin ſcutelli. *Muſ. Lud. Ulr. 174.*
Habitat in Syria.

ſexpunctatus. 42. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo: punctis ſex nigris. *Muſ. Lud. Ulr. 175.* Fabr. ſp. inſ. 2. p. 355. n. 105. mant. inſ. 2. p. 293. n. 136.*
Habitat in America *auſtrali*, India, Sibiria.

ſignatus. 293. C. griſeus, ſcutello vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 355. n. 106. mant. inſ. 2. p. 293. n. 137.*
Habitat in Sierra Leon Africae.

gravis. 294. C. fuſcus, ſcutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 355. n. 107. mant. inſ. 2. p. 293. n. 138.*
Habitat in nova Seelandia, *mediae magnitudinis.*

Forskåhlii. 295. C. viridis, thoracis abdominisque margine ſanguineo. *Fabr. ſp. inſ. 2. p. 356. n. 108. mant. inſ. 2. p. 293. n. 139.*
Habitat in Oriente.

296. C.

Hybneri. 296. C. virescens, thorace fascia sanguinea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 140.
Habitat Tranquebariae, *statura et magnitudine cincti, subtus flavescens.*

cruentus. 297. C. viridis, thoracis abdominisque marginibus, antennis pedibusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 109. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 141.
Habitat in Surinamo.

geniculatus. 298. C. obscurus, thoracis abdominisque margine flavescente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293, *n.* 142.
Habitat in Cayenna, *magnus, capite nigro.*

mixtus. 299. C. punctatus griseus nigro maculatus, abdominis margine nigro: punctis flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 143.
Habitat in Cayenna, *magnus, antennis fuscis.*

tripterus. 300. C. flavo rufoque varius, antennis nigris: ultimo articulo apice albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 144.
Habitat in Cayenna, *statura mixti, at paulo minor.*

griseus. 43. C. griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 926.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 356. *n.* 110. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 145. Cimex ovatus griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, ventre antice spinoso.
Degeer inf. 3. *p.* 261. *n.* 8. *t.* 14. *f.* 9. Cimex betulae.
Habitat in Europa, *antennis nigris flavo annulatis.*

interstinctus. 44. C. griseus, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albis, sterno porrecto. *Fn. suec.* 927.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 356. *n.* 111. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 146. Cimex ovatus griseus, abdominis margine nigro maculato.
Habitat in Europae *cultis.*

papillosus. 301. C. fuscus, antennis nigris, sterno gibbo compresso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 112. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 147.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Drury inf. 1. *t.* 43. *f.* 2.
Habitat in Sierra Leon Africae.

fenebris. 302. C. ater, antennis, pedibus alisque concoloribus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 356. *n.* 113. *mant. inf.* 2. *p.* 294. *n.* 148.
Habitat in Sierra Leon Africae.

303. C.

ruficornis. 303. C. ater, antennis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 114. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 149.
Habitat in India.

baccarum. 45. C. ſubfulvus, abdominis margine fuſco maculato. *Fn. ſuec.* 928. *Scop. ent. carn.* 360. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 356. *n.* 115. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 150. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 486.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 466. *n.* 64. Cimex fuſcus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 257. *n.* 4. *t.* 14. *f.* 5. Cimex verbaſci.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 2. Cimex ſcapulis magnis exſtantibus, macula e flavo rubente in centro crucis dorſalis.
Liſt. loq. 396. *mut. t.* 31. *f.* 19. Cimex ex luteo vireſcenti infuſcatus ad alvi margines nigris maculis.
Jonſt. inſ. t. 17. *f.* 9.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *baccis frequens.*

Cribrum. 304. C. fuſcus, thorace ſcutelloque punctatis, abdominis punctis genubusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 116. *mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 151.
Habitat in America, *magnus, antennis nigris.*

brevicornis. 305. C. obſcure cupreus, antennis brevibus compreſſis, femoribus anterioribus dentatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 294. *n.* 152.
Habitat in Sina, *ſtatura c. baccarum.*

glaucus. 306. C. glaucus, elytris apice puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 117. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 153.
Habitat in nova Hollandia.

Janus. 307. C. rotundatus ſupra ſanguineus, capite ſcutelli baſi alisque atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 357. *n.* 118. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 154.
Drury inſ. 3. *t.* 46. *f.* 7. Cimex afer.
Stoll cimic. 2. *t.* 6. *f.* 41.
Schroet. Abh. 1. *t.* 2. *f.* 4.
Habitat in America.

dumoſus. 46. C. ſubrotundus griſeus, margine undique ſanguineo. *Fn. ſuec.* 929.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 101. *mant. inſ.* 2. *p.* 293. *n.* 131.
Habitat in Europa.

tripunctatus. 308. C. rotundatus flavescens, capite lineis, scutello punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 102. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 132.
Habitat in America.

atomarius. 309. C. griseo fuscoque varius, alis albis fusco punctatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 103. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 133.
Habitat in insula terrae novae.

nubilus. 310. C. griseo nigroque varius, alis albis nigro striatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 355. *n.* 104. *mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 134.
Habitat ad caput bonae spei.

tristriatus. 311. C. flavescens, elytris apice puncto ocellari atro, abdomine lineis tribus albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 293. *n.* 135.
Habitat in agro Pedemontano, *statura parva nubili.*

variolosus. 47. C. flavus, thorace subspinoso punctis fuscis excavatis variolosо, scutello basi gibbo.
Habitat in America *majusculus, annon ad praecedentem tribum relegandus?*

juniperinus. 48. C. subrotundus viridis, margine undique scutelloque apice flavo. *Fn. suec.* 930.* *Scop. ent. carn.* 359. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 354. *n.* 98. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 125. *Fuesslı inf. helv. p.* 25. *n.* 487.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 464. *n.* 61. Cimex subrotundus viridis.
Raj. inf. p. 53 *n.* 1. Cimex sylvestris viridis.
Degeer inf. 3. *p.* 231. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *juniperetis.*

smaragdulus. 312. C. viridis, scutello punctis tribus baseos flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 354. *n.* 99. *mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 126.
Habitat in insula Madera.

Beryllus. 313. C. pallidus, thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 127.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

calidus. 314. C. supra fuscus, subtus testaceus, antennis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 292. *n.* 128.
Habitat in Sierra Leon Africae, *mediae magnitudinis.*

315. C.

caelebs. 315. C. fuſco griſeus, ſcutello punctis tribus apiceque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 355. *n.* 100. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 129.
Habitat in nova Hollandia.

iratus. 316. C. viridi-fuſcus, thorace faſcia flava. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 130.
Habitat in Cayenna, *parvus*, *antennis nigris.*

praſinus. 49. C. ſubrotundus totus viridis, ſcutello concolore. *Fn. ſuec.* 931. *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 488.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 354. *n.* 96. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 123. Cimex ovatus viridis immaculatus, antennis apice albo fuſcoque annulatis.
Degeer inſ. 3. *p.* 266. *n.* 9. Cimex viridis totus.
Stoll cimic. 2. *t.* 19. *f.* 127.
Habitat in ſilvis Europae *et ad* caput bonae ſpei.

diſſimilis. 317. C. ſupra viridis ſubtus ferrugineus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 354. *n.* 97. *mant. inſ.* 2. *p.* 292. *n.* 124.
Habitat in Germania, *praſino proxime affinis.*

caeruleus. 50. C. caeruleus immaculatus. *Fn. ſuec.* 933.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 489. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 129. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 169.
Degeer inſ. 3. *p.* 268. *n.* 11.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 75.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 4.
Stoll cimic. t. 31. *f.* 221.
Habitat in Europae *theſio.*

Morio. 51. C. ater, plantis rufis. *Fn. ſuec.* 932.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 491. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 130. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 170.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 77.
Schaeff. icon. t. 57. *f.* 11. *et t.* 82. *f.* 6.
Stoll cimic. t. 32. *f.* 223.
Habitat in Europae *oleraceis.*

triſtis. 318. C. ater, clypeo orbiculato, thorace retuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 131. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 171.
Degeer inſ. 3. *p.* 269. *n.* 13. Cimex niger ſpinipes.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 470. *n.* 70.
Habitat in Europae *plantis.*

ſpinipes. 319. C. ater, pedibus piceis, tibiis ſpinoſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 132. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 172.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, magnitudine et ſtatura morionis.*

Aethiops. 320. C. ater, thorace ſtriga media impreſſa, tibiis ſpinoſiſſimis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 173.
Habitat in Cayenna, *ſtatura et magnitudine oleracei.*

lugens. 321. C. fuſcus, thoracis lineola, ſcutello abdominisque margine albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 133. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 174.
Habitat in America.

melanocephalus. 322. C. ſubrotundus griſeus, capite ſcutellique baſi nigro-aeneis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 134. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 175.
Habitat in Anglia *et* Italia.

Lineola. 52. C. thorace laevi anterius atro, poſterius livido diſtincto punctis excavatis.
Habitat in America, *magnitudine fere tabani, capite atro, abdomine flavo, elytris incarnatis pallidisque.*

oleraceus. 53. C. caeruleo-aeneus, thorace lineola, ſcutello apice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. ſuec.* 934.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 25. *n.* 492. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 126. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 165.
Raj. inſ. p. 54. *n.* 6. Cimex ſylveſtris caeruleſcens.
Geoffr inſ. par. 1. *p.* 471. *n.* 74.
Degeer inſ. 3. *p.* 266. *n.* 10. *t.* 15. *f.* 22.
Schaeff. icon. t. 46. *f.* 4. 5.
Stoll cimic. 2. *t.* 5. *f.* 32. 33.
Habitat in Europae *tetradynamis, quas* 1760 *in* Suecia *devaſtavit.*

pictus. 323. C. ſubrotundus ſupra ater, thorace lineis tribus, ſcutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 359. *n.* 127. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 166.
Habitat in India.

verſicolor. 324. C. varius, capite abdomineque atris albo lineatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 167.
Habitat Tranquebariae, *ſtatura et magnitudine picti.*

bigutta-tus. 54. C. niger, margine undique albo, elytris puncto albo. *Fn. suec.* 935.* *Scop. ent. carn.* 356. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 359. *n.* 128. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 168. *Fuesslı inf. helv. p.* 25. *n.* 493.

Habitat in Europae *plantis.*

bicolor. 55. C. elytris nigro alboque variis, alis albis. *Fn. suec.* 936.* *Scop. ent. carn.* 357. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 125. *mant. inf.* 2. *p.* 296. *n.* 164. *Fuesslı inf. helv. p.* 126. *n.* 494. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 470. *n.* 73. Cimex ovatus niger, thoracis lateribus elytrorumque maculis quatuor albis.

Degeer inf. 3. *p.* 268. *n.* 12. Cimex ovatus niger nitidus, thorace elytris tibiisque spinosis albo maculatis.

Raj. inf. p. 54. *n.* 5. Cimex colore nigro splendente, maculis albis picto.

List. scar. p. 396. *n.* 38. Cimex niger, maculis candidis notatus.

Petiv. gazoph. t. 14. *f.* 7. Cimex niger albo maculatus.

Schaeff. icon. t. 41. *f.* 8. 9.

Stoll cimic. t. 32. *f.* 224.

Habitat in Europae *hortis.*

ornatus. 56. C. nigro rubroque varius, capite alisque nigris. *Fn. suec.* 937.* *Scop. ent. carn.* 361. *Fuesslı inf. helv. p.* 26. *n.* 495. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 357. *n.* 119. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 155.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 469. *n.* 69.

Sulz. inf. t. 11. *f.* 73.

Schaeff. icon. t. 60. *f.* 10.

Stoll cimic. 2. *t.* 2. *f.* 11.

Habitat in Europa *et* Oriente.

festivus. 57. C. nigro rubroque varius, thorace punctis sex nigris, alis fuscis: margine albido. *Fuesslı inf. helv. p.* 26. *n.* 490. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 120. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 156.

Scop. ent. carn. 362. Cimex dominulus.

Habitat in America *boreali*, Carniolia, Calabria, *statura bicolaris, sed magis oblongus.*

rutilus. 325. C. thorace abdomineque rufis, thorace maculis quatuor, abdomine fasciis nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 358. *n.* 121. *mant. inf.* 2. *p.* 295. *n.* 157.

Habitat in nova Hollandia.

cruciatus. 326. C. nigro pallidoque varius, ſcutello nigro: cruce alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 122. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 158. *Habitat in* India.

diſcoideus. 327. C. flaveſcens, capite diſco communi pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 159. *Habitat in* Cayenna, *ſtatura et magnitudine ornati.*

biocula-tus. 328. C. rotundatus ſupra niger, thorace rufo: punctis duobus nigris, ſcutello margine rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 123. *mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 160. *Habitat in* America.

gramineus. 329. C. rotundatus viridis immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 161. *Habitat* Tranquebariae, *parvus.*

fimbriatus. 330. C. rotundatus viridis, elytris griſeis: macula fuſca margineque viridi. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 295. *n.* 162. *Habitat in* Sina, *parvus.*

italicus. 331. C. obſcure rufus, ſcutello punctis duobus apiceque albis, abdominis margine nigro punctato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 358. *n.* 124. *mant. inſ.* 2. *p.* 296. *n.* 162. *Habitat in* Italia, *magnitudine oleracei.*

ruber. 58. C. ruber, alis fuſcis, elytris lineola tranſverſa alba. *Fn. ſuec.* 938.* *Habitat in* Europae *urticis aliisque plantis.*

acuminatus. 59. C. ovalis anterius attenuatus cinereo-exalbidus, antennis incarnatis. *Fn. ſuec.* 939.* *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 498. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 360. *n.* 135. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 176. Cimex ovalis antice attenuatus exalbidus fuſco ſtriatus, antennis apice rufis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 271. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 12. 13. Cimex roſtratus. *Raj. inſ. p.* 56. *n.* 6. Muſca cimiciformis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 472. *n.* 77. *Liſt. mut. t.* 31. *f.* 20. *Schaeff. icon. t.* 42. *f.* 11. *Habitat in* Europae *plantis.*

minutus. 61. C. elytris lividis apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 941.* *Habitat in* Europa.

collaris. 63. C. roſtro arcuato, corpore nigro, thorace poſterius elytrisque anterius ferrugineis, elytris poſterius alisque nigris.
Habitat in Guinea, *oblongus, magnitudine et ſtatura perſonati, an forte ejusdem cum eo tribus?*

javanicus. 332. C. luteus ano obtuſo, antennis pedibusque ferrugineis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45.
Stoll cimic. t. 1. f. 2.
Habitat in Java, *glaber, inter maximos hujus generis.*

ſinenſis. 333. C. flaveſcens, ano quadridentato, ſterno porrecto. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45. f. 59.*
Habitat in Japonia *et* Sina, *glaber, inter maximos hujus generis.*

brunneus. 334. C. ſupra brunneus ſubtus fuſcus, antennis piloſis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 45.*
Habitat in India, *rufipede paulo major, glaber.*

Anchora. 335. C. rotundatus thorace elytrisque maculis ſex nigris, ſcutello anchora alba. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 47. f. 60.*
Habitat in Japonia *et* Sina, *griſei magnitudine, cruciato affinis.*

capenſis. 336. C. rotundatus niger, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 47. f. 61.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *oleraceo paulo major, glaberrimus.*

Thunbergii. 337. C. rotundatus nigro cinereoque varius ſcutello punctis duobus flavis, capite thoraceque albo lineatis. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 48. f. 62.*
Habitat - - - - griſei magnitudine, punctatiſſimus.

venoſus. 338. C. rotundatus ruber fuſco pictus, abdomine ſerie ſextuplici punctorum nigrorum. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 49.*
Habitat ad caput bonae ſpei, *oleracei magnitudine.*

coſtatus. 339. C. cinereus, linea elytrorum nigra. *Thunb. nov. inſ. ſp. p. 50. f. 63.*
Habitat in regionibus interioribus capitis bonae ſpei, *oleraceo paulo major, glaber.*

cornutus. 340. C. depreſſus cinereus, thorace lineis tribus elevatis, antennis fuſiformibus. *Thunb. nov. inſ. ſp. 2. p. 50.*
Habitat in Japonia, *facie et magnitudine c. cardui, an hujus tribus?*

341. C.

melaleucos. 341. C. ater, elytris albis: maculis duabus nigris. *Thunb nov. inf. fp.* 2. *p.* 50.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine ſcarabaeoidis, nitidus.*

hirtus. 342. C. ater, totus hirtus. *Thunb. nov. inf. fp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *magnitudine oleracei, opacus.*

niger. 343. C. ater, thorace tibiiſque ciliatis. *Thunb. nov. inf. fp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae ſpei, *in* America *auſtrali,* India, *oleracei magnitudine, aterrimus.*

aterrimus. 344. C. ater, elytris dimidiato hyalinis. *Forſter nov. inf. fp.* 1. *p.* 71. *n.* 71.
Habitat in Hiſpania, *circa* fretum Gaditanum, *magnitudine ornati.*

flavatus. 345. C. niger, ſcutello elytrisque apice lateribusque flavis, thoracis margine lineaque media flavis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 79. §. 34.
Habitat Vindobonae.

viennenſis. 346. C. caeruleo-aeneus, elytris margine albo. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80. §. 35.
Habitat Vindobonae.

venuſtiſſimus. 347. C. argenteus, capite thoracis ſcutellique baſi violaceo-aeneis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 80 §. 36.
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

dubius. 348. C. atro-caeruleus punctatus nitens, thoracis elytrorumque margine exteriore albo. *Scop. ent. carn. p.* 121. *n.* 355.
Habitat in Carniolia.

aeneus. 349. C. pallide aeneus: punctis impreſſis nigris, ſcutello abdomen ſubaequante: baſi punctis duobus albis. *Scop. ent. carn. p.* 122. *n.* 358.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

danicus. 350. C. niger, elytris faſciis duabus luteis. *Müll. Fn. Fridrichsd. p.* 29. *n.* 274. *zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1202.
Habitat in Dania.

roſeus. 351. C. fuſcus, abdomine incarnato, pedibus pallidis: femoribus puncto nigro. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 105. *n.* 1197.
Habitat in Dania.

alatus. 352. C. rufus elytris alas mentientibus, antennis clavatis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1204.
Habitat in Dania.

rufescens. 353. C. thorace obtuse angulato, corpore e viridi rubroque nebuloso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 465. *n.* 62.
Habitat in Gallia.

pullus. 354. C. ex fusco niger, alis pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 470. *n.* 71.
Habitat in Gallia.

leucomelas. 355. C. niger, elytrorum limbo exteriore albo. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 470. *n.* 72.
Habitat in Gallia.

arboreus. 356. C. supra fusco-viridis, subtus flavescens, thorace linea transversa flava, elytris rubro marginatis, ano bidentato rubro. *Degeer inf.* 3. *p.* 260. *n.* 7.
Habitat in Europae *arboribus*, 5 *lineas longus.*

pusillus. 357. C. griseus albo marginatus nigro punctatus, abdomine aeneo nigro. *Degeer inf.* 3. *p.* 270. *n.* 15.
Habitat in Europa.

parnassiae. 584. C. thorace rubro, alis fuscis, corpore nigro. *Mayer Abh. boehm. Ges.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *floribus parnassiae palustris, minimus, lente incedens, volatu agilis.*

fulvus. 597. C. fulvus, alis posterius ex fusco violaceis, abdomine subtus pallido: apice quadridentato. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 88.
Habitat extra Europam.

varius. 598. C. rotundatus ater, scutelli abdominisque marginibus, elytris thoraceque rubris: hoc anterius linea atra, membranis fuscis, alis luteis apice fuscis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 89.
Habitat extra Europam.

tricolor. 599. C. subrotundus virescens, margine undique flavo, antennis rufis. *Mus. Lesk. p.* 119. *n.* 91.
Habitat in Europa.

600. C.

albidus. 600. C. ſubrotundus albidus, antennis nigris: geniculis albis, elytris livido rufoque variis, ſcutelli apice albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 93.
Habitat in Europa.

undatus. 601. C. ovalis pallidus, capite acuminato: lineis quatuor, ſcutelli thoracisque punctis, antennis elytrorumque rugis transverſis undatis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 97.
Habitat extra Europam.

palleſcens. 602. C. pallidus nigro punctatus thoracis ſcutellique apice elytrorumque marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 98.
Habitat in Europa.

nigerrimus. 603. C. niger immaculatus. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 103.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 604. C. ovatus niger, thorace elytrorumque margine exteriore albo. *Muſ. Lesk. p.* 119. *n.* 104.
Habitat in Europa.

ciliatus. 605. C. niger, capite, thorace elytrisque ciliatis et pedibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 105.
Habitat in Europa.

exciſus. 606. C. griſeus, elytrorum membrana extus exciſa, abdomine nigro. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 106.
Habitat in Europa.

†† *Oblongi.*

⊥ *antennis apice capillaribus.*

trifaſciatus. 67. C. corpore nigro rubroque vario.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 202. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 267. Cimex oblongus niger, antennis apice capillaribus, elytris faſciis tribus ruſis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 8.
Habitat in Europa.

olivaceus. 358. C. elytris fuſco-ferrugineis baſi coccineis: puncto atro.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 372. *n.* 203. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 268.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania.

setiicornis. 359. C. ater, elytris fuscis basi pallidis apiceque puncto coccineo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 204. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 269.
Habitat Lipsiae, *capite varius rufo.*

capillaris. 360. C. flavescens, elytris apice coccineis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 205. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 270.
Habitat in Lipsiae *hortis.*

semiflavus. 68. C. corpore nigro, thorace pedibusque testaceis.
Habitat in Suecia, *statura atri, capite antennarumque basi pilis albis hirta testaceis.*

erythropus. 69. C. rostro arcuato, thorace posterius emarginato, pedibus rubris.
Habitat in Barbaria, *nigro rubroque varius, antennis fuscis, elytris rufis, abdomine nigro: margine albo nigroque vario; an forte ad ultimam cimicum tribum relegandus?*

ater. 72. C. corpore atro. *Fn. suec.* 944. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 371. *n.* 197. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 261.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 460. *n.* 54. Cimex oblongus ater, antennis seta terminatis.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria.

tyrannus. 361. C. ater, rostro femoribusque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 371. *n.* 198. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 262.
Habitat in Italia, *atro proxime affinis.*

Schach. 362. C. ater, capite scutello maculisque duabus elytrorum coccineis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 371. *n.* 199. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 263.
Habitat in Italia, *statura tyranni.*

gothicus. 73. C. niger, scutello elytrorumque apicibus coccineis. *Fn. suec.* 966.* *Scop. ent. carn.* 381. *Fuesslı inf. helv. p.* 26. *n.* 501. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 206. *mant. inf.* 2. *p.* 305. *n.* 271.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 445. *n.* 19. Cimex oblongus niger, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo variegatis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 5.
Habitat in Europa, *frequens.*

tricolor. 363. C. ater, elytris apice macula coccinea. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 272.

Habitat

Habitat in Hiſpaniae *urtica, gothico proxime affinis, alis nigris, macula marginali transverſa pallida.*

umbratilis. 90. C. niger, elytris albo maculatis. *Fn. ſuec.* 951.*
Fabr. mant. inſ. 2. *p.* 305. *n.* 265. Cimex oblongus niger, elytris flavo lineatis apice faſcia alba, antennis apice capillaribus.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis, pedibus piceis.*

flavicollis. 364. C. niger, capite thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 201. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 266.
Habitat in Anglia.

inclavatus. 97. C. niger, elytris fuſcis: faſciis duabus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 371. *n.* 200? *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 264? Cimex (biſaſciatus) oblongus fuſcus, elytris faſciis duabus albis, antennis apice capillaribus.
Habitat Lipſiae.

cimbricus. 365. C. thorace elytrisque rubellis: apice macula coccinea, nigra duplicique alba. *Müll. prodr. zool. dan. p.* 106. *n.* 1212.
Habitat in Dania; *an varietas gothici?*

trilineatus. 366. C. niger, thorace pedibusque cinereis, elytris fuſcis: lineolis transverſis tribus candidis. *Müll zool. dan. prodr. p.* 106. *n.* 1213.
Habitat in Dania.

ſpiſſicornis. 367. C. niger, pedibus flavis, antennis incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 207. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 273.
Habitat Hamburgi.

planicornis. 368. C. niger, alis lacteſcentibus, pedibus ex griſeo luteſcentibus, antennarum articulo medio compreſſo maximo. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Belgio, *parvus.*

haſticornis. 369. C. rufus, pectore abdomineque faſciis albis nigrisque, antennarum articulo penultimo compreſſo rotundato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53. *f.* 64.
Habitat in Aittonia *capenſi, ad* caput bonae ſpei, *Decembri frequens, glaber, perſonati magnitudine.*

punctipes. 607. C. flaveſcens, femoribus fuſco punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 137.
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 608. C. flavescens, thorace maculis quatuor fuscis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 138.
Habitat in Europa.

fuliginosus. 609. C. niger, capite thorace elytrisque rufescentibus, thorace posterius fusco, scutello flavescente, elytrorum apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 139.
Habitat in Europa.

erythrochlorus. 610. C. oblongus rufescens, thorace scutelloque flavis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 140.
Habitat in Europa.

chrysocephalus. 611. C. niger, capite flavo: linea longitudinali nigra, elytris ex fusco rufis: apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 141.
Habitat in Europa.

strathineus. 612. C. niger, elytris pallidis: apice inflexo coccineo. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 142.
Habitat in Europa.

concolor. 613. C. fuscus, capite thoraceque rufis, antennis scutelloque flavis, pedibus pallidis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 143.
Habitat in Europa.

tomentosus. 614. C. capite thoraceque fuscis fulvo tomentosis, abdomine rufo, elytris fusco pallidis: apice inflexo flavo, puncto extremo nigro. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 144.
Habitat in Europa.

melanochrysos. 615. C. niger, scutello posterius, elytris apice inflexo flavis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 145.
Habitat in Europa.

bivenis. 616. C. niger, elytris e flavo fuscis: apice inflexo flavo venisque duabus rubris. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 146.
Habitat in Europa.

leucozonias. 617. C. angustus niger, antennis basi rubris, thorace posterius scutelloque flavis, elytris rufis: fascia obliqua apiceque inflexo albis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 147.
Habitat in Europa.

tricolor. 618. C. niger, elytris flavis: fascia transversa apiceque fuscis. *Mus. Lesk. p.* 122. *n.* 148.
Habitat in Europa.

ochromelas. 619. C. niger, antennarum elytrorumque basi, horum apice inflexo pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 149.
Habitat in Europa.

exoletus. 620. C. niger, thorace posterius tibiis elytrisque pallidis, horum apice inflexo rufo marginato. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 150.
Habitat in Europa.

phoenicopterus. 621. C. fuscus, capite thorace elytrisque rufescentibus, antennis pedibusque pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 151.
Habitat in Europa.

fuscoculus. 622. C. flavus, oculis fuscis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 152.
Habitat in Europa.

leucogrammus. 623. C. supra rufescens, capite dorsali, abdomine subtus utrinque linea alba, thoracis tribus, elytris medio et margine externo albis: apice inflexo flavo. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 153.
Habitat in Europa.

expallescens. 624. C. fuscus, capite ventre elytrisque pallidis, his fusco subnebulosis, thorace subconico: lineolis tribus fuscis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 154.
Habitat in Europa.

flavescens. 625. C. pallide flavus. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 155.
β) Cimex flavescens, capite utrinque, scutello basi elytrisque apice inflexo fuscis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 156.
Habitat in Europa.

pallescens. 626. C. pallidus rufo adspersus. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 158.
β) Cimex pallidus rufescens, scutello flavo. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 159.
Habitat in Europa.

leucodermis. 627. C. ovatus pallidus: membrana elytrorum alba. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 162.
Habitat in Europa.

discolor. 628. C. niger, elytris griseis: apice membranarumque apice albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 160.
Habitat in Europa.

imperialis. 629. C. niger, elytrorum margine externo, basi et apice inflexo flavis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 161.
Habitat in Europa.

630. C.

melanorhous. 630. C. antennis, thoracis margine, ſcutelli apice, pedibus et abdomine flavis, hujus apice nigro. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 163.
Habitat in Europa.

vittatus. 631. C. niger, thorace anterius poſteriusque ſcutelloque flavis, antennarum baſi elytrisque rufis: vitta apiceque inflexo albis. *Muſ. Lesk. p.* 122. *n.* 164.
Habitat in Europa.

melanogaſter. 632. C. ovatus rufeſcens abdomine medio ſubtus atro. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 166.
Habitat in Europa.

ſordens. 633. C. ovatus niger, thorace pedibusque rufis, his fuſco variis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 167.
Habitat in Europa.

vitellinus. 634. C. ovatus flavus, elytris apicem verſus rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 168.
Habitat in Europa.

haematocephalus. 635. C. ovatus niger, elytris rufo-fuſcis: apice capiteque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 169.
Habitat in Europa.

leoninus. 636. C. ovatus flavo-rufus, thorace anterius maculis duabus nigris, elytris pallidis: apice inflexo fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 170.
Habitat in Europa.

carbonarius. 637. C. ovatus totus niger. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 171.
Habitat in Europa.

notatus. 638. C. ovatus pallidus, elytrorum apice inflexo: ſingulis angulo puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 172.
Habitat in Europa.

diſcors. 639. C. ovatus ſupra pallidus ſubtus flavus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 173.
Habitat in Europa.

fuſceſcens. 640. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis: margine externo apiceque inflexo fuſceſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 174.
Habitat in Europa.

641. C.

melanopterus. 641. C. ovatus fuscus, elytris nigris: basi, medio marginis antici apiceque inflexo, capite et thorace anterius flavis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 175.
Habitat in Europa.

leucoceras. 642. C. fuscus, antennis, elytris pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 176.
Habitat in Europa.

ochropterus. 643. C. ater, thorace, elytris pedibusque flavescentibus. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 177.
Habitat in Europa.

melanoleucos. 644. C. ovatus niger, capite, thoracis dorso, elytrorumque fascia media et apico inflexo albis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 178.
Habitat in Europa.

erythrogaster. 645. C. ovatus, thorace anterius nigro capite elytrisque pallidis: punctis apiceque inflexo fuscis, abdomine rufescente. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 179.
Habitat in Europa.

sticticus. 646. C. ovatus niger, capite elytrisque pallidis, femoribus nigro punctatis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 180.
Habitat in Europa.

nubilus. 647. C. ovatus niger, elytris albis fusco nebulosis, pedibus rufescentibus. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 181.
Habitat in Europa.

leucopus. 648. C. fuscus, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 182.
Habitat in Europa.

conspersus. 649. C. ovatus rufescens, elytris albis rufo adspersis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 183.
Habitat in Europa.

chloropterus. 650. C. pallidus, thorace, elytris abdomineque virescentibus. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 184.
Habitat in Europa.

albicans. 651. C. ovatus pallidus, alis albis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 185.
Habitat in Europa.

albidus. 652. C. ovatus rufescens, elytris antennis pedibusque albidis. *Mus. Lesk. p.* 123. *n.* 186.
Habitat in Europa.

653. C.

brunneus. 653. C. ovatus brunneus, alis albis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 187.
Habitat in Europa.

chryſopus. 654. C. ovatus niger, capite elytrorum margine externo pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 123. *n.* 188.
Habitat in Europa.

11 *antennis clavatis.*

Branderi. 66. C. roſtro arcuato, thorace ſubſexſpinoſo, elytris punctis tribus albis.
Habitat in Barbaria, *mediae magnitudinis, griſeus, ſubtus teſtaceus, antennis rufis, ſtatura perſonati.*

craſſicornis. 92. C. ſubgriſeus rubro punctatus. *Fn. ſuec.* 952.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 139.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Colon. 370. C. rubro nigroque varius, membranis elytrorum albis: puncto nigro. *Thunb. nov. inſ. ſpec.* 3. *p.* 57.
Habitat in Japonia, *campeſtris magnitudine.*

deuſtus. 371. C. rufo-fuſcus, ſcutelli apice, thoracis abdominisque marginibus rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 58.
β) Stoll cimic. t. 13. *f.* 87.
Habitat - - - *magnitudine c. hyoſcyami.*

tuberculoſus. 372. C. abdomine ſupra rufo, antennarum nodis binis: extremo longiore. *Scop. ent. carn. p.* 128. *n.* 372.
Habitat prope Idriam Carnioliae.

Oculus cancri. 373. C. ex livido flavus: maculis ſanguineis, oculis capitulo cylindrico inſidentibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 18. *t.* 34. *f.* 24.
Habitat in Surinamo.

moeſtus. 374. C. fuſcus, ſubtus rufo-lividus, thoracis margine livido. *Degeer inſ.* 3. *p.* 340. *n.* 14. *t.* 34. *f.* 20.
Habitat in Penſylvania.

ſubrufus. 677. C. pallide rufus, elytrorum feneſtratorum apice, clava, ſcutelloque rufis, hujus apice pallido. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 119.
Habitat in Europa.

ſtictopterus. 678. C. niger, elytris griſeis punctatis: apice maculis tribus fuſcis, membrana alba truncata, antennis pallidis: clava nigra. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 120. b.
Habitat in Europa.

ictericus. 679. C. fuſcus, capite thoraceque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 130.
Habitat in Europa.

111 *antennis filiformibus.*
→ *pedibus muticis.*

leucocephalus. 60. C. niger, capite pedibusque fulvis. *Fn. ſuec.* 940.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 192. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 255.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 472. *n.* 76.
Degeer inſ. 3. *p.* 290. *n.* 28.
Habitat in Europa.

transverſalis. 375. C. viridis, thorace lineola interrupta, elytris macula fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 256.
Habitat Kilonii, *ſtatura leucocephali, at duplo minor.*

haematodes. 376. C. ſanguineus, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 193. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 257.
Habitat in Germania.

tripuſtulatus. 377. C. niger, ſcutello maculisque elytrorum tribus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 194. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 258.
Habitat in urticae dioicae *racemis*, Hafniae *frequens*, *parvus.*

Indus. 74. C. abdomine rubro bidentato, elytris fuſcis pallide ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 176.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 140. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 183.
Habitat in America *auſtrali et* India.

militaris. 378. C. rufus nigro maculatus, alis exalbidis: ſtriga baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 141. *mant. inſ.* 2. *p.* 297. *n.* 184.
Habitat in Oriente.

laniarius. 75. C. rufus, elytris apice ſanguineis, thorace nigricante, abdomine flavo.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.*

hyoſcyami. 76. C. rubro nigroque varius, alis fuſcis immaculatis. *Fn. ſuec.* 945.* *It. oel.* 155.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 144. *mant.*

mant. inſ. 2. *p.* 298. *n.* 189. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 502.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 441. *n.* 12. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, ſcutelli nigri apice rubro.
Degeer inſ. 3. *p.* 274. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 14. 15. Cimex oblongus ruber nigro maculatus &c.
Liſt. ſcar. angl. p. 397. *n.* 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus.
Raj. inſ. p. 55. Cimex ſylveſtris minor, corpore oblongo anguſto.
Petiv. gazoph. t. 62. *f.* 2.
Merian. inſ. eur. t. 51. *f.* 1.
Sulz. inſ. t. 11. *f.* 75.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 1.

familiaris. 379. C. rubro nigroque varius, alis fuſcis: puncto baſeos albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 145. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 190. *Habitat in* Europae *et* Indiae *plantis, ſtatura et magnitudine c. hyoſcyami.*

roſtratus. 380. C. rufus, ſcutello vitta marginali flava. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 146. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 191. *Habitat in* Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

malabaricus. 381. C. fuſceſcens, thorace ſcutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 147. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 192. *Habitat ad littora* malabarica.

aulicus. 382. C. rubro nigroque varius, elytris faſcia atra, alis atris: lineola baſis alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 148. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 193.
β) Cimex irroratus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 55. *f.* 65.
Habitat in inſulis Americae *meridionali oppoſitis, β*) *ad* caput bonae ſpei.

383. C.

Huc inter oblongos ſcilicet cimices referas plures a Seba *muſ. vol.* 4. *delineatas ſpecies, producliorem t.* 95. *f.* 28. *pallide vireſcente flavum t.* 95. *f.* 29. *ſphaerico-collarem t.* 95. *f.* 30. *ſetaceum t.* 95. *f.* 35-37. *luteo-ſuſcum t.* 97. *f.* 3. *nigro-rufum t.* 97. *f.* 5. *apterum ſerratum t.* 97. *f.* 12. *informem t.* 97. *f.* 21. 22. *nigricantem t.* 97. *f.* 23. *brunneo-atrum t.* 97. *f.* 24. 25. *ſetipedem t.* 97. *f.* 28. 29. *ſordidum t.* 97. *f.* 30. 31. *fuſco diſcolorem t.* 97. *f.* 32. *nigro-cineraſcentem t.* 97. *f.* 33. 34. *ovatis contra accenſeas foliaceum t.* 96. *f.* 28. *peltoidem t.* 96. *f.* 29. *rubripedem t.* 97. *f.* 2. *et plures a* Schaeffero *in iconibus depictos t.* 46. *f.* 6. *t.* 46. *f.* 7. 8. *t.* 57. *f.* 4. *t.* 57. *f.* 5. *t.* 57. *f.* 10. *t.* 57. *f.* 11. *t.* 79. *f.* 4. *t.* 170. *f.* 4. 5. *t.* 210. *f.* 3. a. b. *t.* 219. *f.* 3. a. b. *t.* 250. *f.* 5. 6. *t.* 272. *f.* 3. 4. *t.* 272. *f.* 5. 6. *quorum deſcriptio ab* Hahnero *exſpectanda.*

varicornis. 383. C. variegatus, capite pedibusque rufis, thoracis marginibus pallidis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 194.
Habitat in India, *magnus.*

pallens. 384. C. palleſcens, thorace elytrisque fuſcis: margine pallido. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 363. *n.* 149. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 195.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

cingulatus. 385. C. thorace teſtaceo anterius nigro: margine albo, elytris puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 150. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 196.
Habitat in nova Hollandia.

ſuperſtitioſus. 386. C. rufus, antennis, thoracis baſi, faſcia elytrorum aliſque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 151. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 197.
Thunb. nov. inſ. ſp. 3. *p.* 55. *f.* 66. Cimex oblongus rufus, thorace faſcia nigra albo adjecta, elytris puncto nigro.
Habitat in America *et ad* caput bonae ſpei, *equeſtris magnitudine.*

erythromelas. 387. C. rufus, elytris nigris: faſcia alba. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 152. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 198.
Degeer inſ. 3. *p.* 335. *n.* 9. *t.* 34. *f.* 11. Cimex albo faſciatus.
Habitat in Surinamo, *thoracis elytrorumque margine albido.*

ruficollis. 388. C. glaucus, capite atro, thorace anterius rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 153. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 199.
Habitat in Braſilia.

ſcabroſus. 389. C. niger, thoracis margine elytrorumque faſciis duabus rufeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 154. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 200.
Habitat in America.

leproſus. 390. C. thorace nigro, baſi margine punctisque duobus rubris, elytris atris immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 155. *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 201.
Habitat in America.

leucurus. 391. C. niger, capite elytrisque rubris, alis atris baſi apiceque albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 299. n. 202.
Habitat in inſula oceani auſtralis Amſterdam, *magnitudine c. Koenigii.*

Koenigii. 392. C. teſtaceus, elytris puncto nigro, alis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 364. *n.* 156 *mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 203.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat Tranquebariae.

Slanbuſchii. 393. C. ſanguineus, thorace faſcia abbreviata, ſcutello, elytris puncto alisque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 299. *n.* 204.
Habitat in Sina, *ſtatura et magnitudine c. Koenigii.*

equeſtris. 77. C. rubro nigroque maculatus, thorace anterius poſteriusque atro, alis atris albo maculatis. *Fabr. mant.* 2. *p.* 298. *n.* 185.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 726. *n.* 777. *Fn. ſuec.* 946.* *It. oel.* 155. *Muſ. Lud. Ulr.* 177. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 142. Cimex oblongus rubro nigroque varius, alis fuſcis albo maculatis.
Scop. ent. carn. 369. Cimex ſpecioſus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 442. *n.* 14.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 19.
Schaeff. elem. t. 44. *f.* 2.
icon. t. 48. *f.* 8.
Habitat in Europae *potiſſimum vincetoxico, c. hyoſcyami duplo major.*

civilis. 394. C. rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigris, alis fuſcis albo maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 186.
Habitat Tranquebariae, *equeſtri affinis.*

crudelis. 395. C. rubro nigroque varius, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 362. *n.* 143. *mant. inſ.* 2. *p.* 298. *n.* 187.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura equeſtris.*

apterus. 78. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: punctis duobus nigris, alis nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 366. *n.* 169. *mant. inſ.* 2. *p.* 301. *n.* 222. *Scop. ent. carn.* 370. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 504.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 440. *n.* 11. *t.* 9. *f.* 4.
Degeer inſ. 3. *p.* 276. *n.* 20.
Raj. inſ. p. 55. *n.* 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 14.
Stoll cimic. 2. *t.* 15. *f.* 103.
Habitat gregarius in Europa, *rarius in malva ſilveſtri, interdum alatus.*

striatulus. 396. C. flavescens, scutello elytris alisque fuscis, elytris apice cinereis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 170. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 224.
Habitat in Brasilia.

nussax. 397. C. fuscus, abdominis margine maculato, tibiis anterioribus femoribusque posterioribus basi pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 171. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 223.
Habitat in Italia, *mediae magnitudinis.*

aegyptius. 79. C. rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro. *Mus. Lud. Ulr.* 178.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 364. *n.* 157. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 205.
Habitat in Aegypto.

mendicus. 398. C. rubro fuscoque varius, alis atris: apice lineolaque baseos albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 158. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 200.
Habitat in Malabaria.

servus. 399. C. rubro nigroque varius, elytris apice albis, alis nigris apice albidis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 207.
Habitat in Sina, *parvus, statura mendici.*

famelicus. 400. C. supra ater thorace elytrisque punctis duobus flavescentibus, alis linea baseos alba. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 159. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 208.
Stoll cimic. 2. *t.* 8. *f.* 56?
Habitat ad caput bonae spei, *mediae magnitudinis.*

quadriguttatus. 401. C. elytris rufis: fascia nigra, alis punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 160. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 209.
Habitat in nova Hollandia.

discolor. 402. C. niger, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 161. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 210.
Habitat in Italia, *parvus.*

australis. 403. C. elytris rufis: striga undata nigra, alis nigris: puncto medio albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 162. *mant. inf* 2. *p.* 300. *n.* 211.
Habitat in nova Hollandia.

sanguinolentus. 404. C. sanguineus, antennis elytris pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 163. *mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 212.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

hispanicus. 405. C. thorace elytrisque rufis: maculis duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 300. *n.* 213.
Habitat in Hispania, *magnitudine et statura sanguinolenti.*

cruentatus. 406. C. rufus, thoracis maculis duabus, antennis, alis pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 214.
Habitat in India, *sanguinolento proxime affinis.*

futuralis. 407. C. rufus, antennis alisque nigris: futuris omnibus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 164. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 215.
Habitat in insulis, Americae *meridionali oppositis.*

rubiginosus. 408. C. supra rufus, alis albidis: macula magna fusca. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 216.
Habitat ad caput bonae spei, *futurali major.*

excavatus. 409. C. rufus, antennis, pectore, ano pedibusque atris, scutello canaliculato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 365. *n.* 165. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 217.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

fuscatus. 410. C. sanguineus, thoracis lineis, scutello, alis, ano pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 218.
Habitat in Guinea, *magnus.*

Carnifex. 411. C. rufus, antennis tibiisque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 166. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 219. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 51.
Habitat ad caput bonae spei, *potissimum in tanaceto crithmifolio*, *magnitudine c. Rolandri.*

Augur. 412. C. rufus, antennis alis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 167. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 220. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 57.
Stoll cimic. 2. *t.* 18. *f.* 124.
β) Stoll cimic. 2. *t.* 13. *f.* 89.
Habitat ad caput bonae spei, India, Sina, *carnifici affinis, equestri major.*

mactans. 413. C. supra rufus, thorace scutelloque punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 366. *n.* 168. *mant. inf.* 2. *p.* 301. *n.* 221.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

80. C.

Andreae. 80. C. sanguineus, antennis tibiis rostro alisque nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 179.*
Sloane jam. 2. *p.* 237. *f.* 29. 30. Cimex sylvestris oblongus e cinereo et nigro variegatus, supina parte cruce S. Andreae notatus.
β) Cimex ruficollis. *Mus. Lud. Ulr.* 180.
γ) Cimex thoracе nigro. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 56.
Habitat in America. γ) *in* Japonia.

saxatilis. 81. C. niger, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris. *Scop. ent. carn.* 371. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 298. *n.* 188.
Habitat in Europa *magis australi, subtus rubro nigroque varius, capitis macula rubra anterius bifida.*

succinctus. 82. C. thoracis elytrorumque margine exteriore femorumque basi rufis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 400. *n.* 44. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 369. *n.* 185. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 241.
Degeer inf. 3. *p.* 339. *n.* 13. *t.* 34. *f.* 19. Cimex rubrocinctus.
Habitat in Americae *borealis plantis.*

tunicatus. 414. C. supra ferrugineo-fuscus, corpore elytrorumque margine flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 369. *n.* 186. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 242.
Habitat in Germania, *antennis rufis: articulorum apice nigro.*

pubicornis. 415. C. rufus, antennis, pectore elytris tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 369. *n.* 187. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 243.
Habitat in America.

Kalmii. 83. C. viridis, scutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fn. suec.* 948.*
Habitat in Europa.

supercilio sus. 84. C. niger, palpebra elytrorumque margine albis.
Habitat in Suecia, *mediae magnitudinis.* Modeer.

pratensis. 86. C. flavescens, elytris viridibus. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 370. *n.* 190. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 247.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 728. *n.* 86. *Fn. suec.* 949.* *Scop. ent. carn.* 386. Cimex oblongus griseus, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 451. *n.* 33.
Habitat in Europae *pratis frequens.*

floralis. 416. C. supra obscure griseus, elytris apice puncto rubro, femoribus posterioribus elongatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 248.

Habitat in Hafniae *floribus, ſtatura pratenſis, antennis pallidis.*

norwegicus. 417. C. viridis, thorace bipunctato, elytris pallidioribus: puncto apicis flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 191. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 249.
Habitat in Norwegiae *plantis.*

inquinatus. 418. C. flaveſcens, elytris nigris albo variis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 250.
Habitat Kilonii, *mediae magnitudinis.*

naſſatus. 419. C. viridis, antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 251.
Habitat Hafniae *in tilia, parvus, immaculatus.*

tiliae. 420. C. vireſcens, faſciis tribus fuſcis; media angulata. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 218. *mant. inſ.* 2. *p.* 304. *n.* 252.
Habitat Kilonii.

campeſtris. 87. C. flaveſcens, elytris macula ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 370. *n.* 189. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 246.
Syſt. nat. XII. 2. *p* 728. *n.* 87. *Fn. ſuec.* 950.* Cimex oblongus viridis, ſcutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 452. *n.* 34.
Habitat in Europae *campis.*

nemoralis. 421. C. niger, thorace elytrisque flaveſcentibus, ſcutello macula diſci nigra. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 245.
Habitat in Barbaria, *ſtatura et magnitudine campeſtris.*

melanocephalus. 88. C. niger, thorace, elytris antennis pedibusque pallidis.
Habitat in Suecia, *parvus.* Solander.

hiſtrionicus. 89. C. niger, ſcutello flavo, elytris pedibusque teſtaceis.
Habitat in Europa, *magnitudine culicis.*

nemorum. 91. C. niger, elytris alisque fuſco alboque variis, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 953.*
Habitat in Europa.

ſaltatorius. 93. C. niger, elytris ſtriatis, alis poſterius flavo maculatis. *Fn. ſuec.* 954.* *It. oel.* 121. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 196. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 260.
Raj. inſ. p. 57. *n.* 2. Cimex brevis et fere rotundus nigricans.
Habitat in Europa *ad littora.*

94. C.

trigutta-tus. 94. C. niger, elytris alisque apice puncto nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 371. *n.* 195. *mant. inſ.* 2. *p.* 305. *n.* 259. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 729. *n.* 94. Cimex oblongus niger, elytris teſtaceis: punctis tribus niveis; interiore minore. *Habitat in* Europa, *pediculi magnitudine.*

arenarius. 95. C. niger, elytris cinereis, alis albis. *Fn. ſuec.* 955.* *It. oel.* 121. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 369. *n.* 184. *mant. inſ.* 2. *p.* 303. *n.* 240. *Habitat in* Europa *boreali frequens.*

pini. 96. C. ater, elytris fuſcis: macula rhombea atra. *Fn. ſuec.* 956. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 173. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 227. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 449. *n.* 28. *Degeer inſ.* 3. *p.* 279. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 22. *Schaeff. icon. t.* 42. *f.* 12. *Habitat frequens in* Europae *borealis pinetis.*

ſylvaticus. 422. C. ater, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 174. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 228. *Habitat in* Europae *borealis nemoribus.*

Rolandri. 97. C. ater, alis macula rhombea flava. *Fn. ſuec.* 957. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 367. *n.* 175. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 229. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 511. *Degeer inſ.* 3. *p.* 294. *n.* 33. Cimex fulvo maculatus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 459. *n.* 51. *Sulz. inſ. t.* 11. *f.* 76. *Schaeff. icon. t.* 87. *f.* 7. β) Cimex bimaculatus. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 449. *n.* 76. *Habitat in* Europae *pinetis.*

Forſteri. 423. C. ater, ſcutelli apice, thoracis elytrorumque margine ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 176. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 230. *Habitat ad* caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine c. Rolandri.*

ſqualidus. 424. C. niger; thorace poſterius, elytris pedibusque griſeis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 231. *Habitat* Tranquebariae, *mediae magnitudinis.*

ſexpuſtulatus. 425. C. niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 368. *n.* 177. *mant. inſ.* 2. *p.* 302. *n.* 232. *Habitat in* Jamaica.

lynceus. 426. C. niger, elytris griseis: apice macula nigra; puncto albo.
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 368. *n.* 178. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 233.
Habitat in Angliae *et* Calabriae *plantis.*

urticae. 427. C. niger, elytris griseis, alis albis: puncto nigro. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 368. *n.* 179. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 234.
Habitat in Angliae *urtica.*

Lundii. 428. C. niger, elytris fuscis apice nigro punctatis, alis nigris puncto baseos apicisque albo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 368. *n.* 180. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 235.
Habitat Hafniae, *parvus statura lyncei.*

lunaris. 429. C. niger, thorace maculato, elytris lunula marginali flava. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 237.
Habitat in Cayenna, *statura lyncei.*

ferrugineus. 99. C. ferrugineus, capite thorace scutelloque nigris.
Habitat in Suecia, *c. Rolandri similis.*

populi. 109. C. albo fuscoque nebulosus. *Fn. suec.* 963. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 374. *n.* 219. *mant. inf.* 2. *p.* 304. *n.* 253.
Habitat in Europae *populo tremula.*

coryli. 121. C. niger, pedibus antennisque flavis. *Fn. suec.* 974.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 369. *n.* 188. *mant. inf.* 2. *p.* 303. *n.* 244.
Habitat in Europae *borealis corylo.*

S. Crucis. 430. C. supra obscure griseus, scutello linea dorsali albida.
Fabr. mant. inf. 2. *p.* 302. *n.* 226.
Habitat in insula S. Crucis oceani americani, *parvus.*

agilis. 431. C. thorace atro: margine posteriore flavo, elytris fuscis, basi apiceque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 374. *n.* 220. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 274.
Degeer inf. 3. *p.* 295. *n.* 34. Cimex flavo quadrimaculatus.
Habitat in Germania, *statura et magnitudine c. populi.*

Daldorfii. 432. C. flavescens, capite scutellique margine atris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 275.
Habitat Kiloniі, *parvus.*

multicolor. 433. C. supra sanguineus, thorace elytris scutelloque albo marginatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 2. *p.* 52.
Habitat ad caput bonae spei, *magnitudine pratensis, subtus cinereus vel lividus, glaber, capite rufescente.*

434. C.

adſperſus. 434. C. ſupra ferrugineus: margine fuſco, ſubtus cinereus nigro punctatus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 53.
Habitat - - - *magnitudine equeſtris, glaber.*

hexophthalmus. 435. C. ſupra cinereus, ſubtus albus pectore faſciis tribus ſanguineis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 54.
Habitat ad caput bonae ſpei, *annulati magnitudine, capite rubro medio nigro, antennis pedibusque nigris.*

albidus. 436. C. rubro nigroque varius, membrana elytrorum nivea. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 56.
Stoll cimic. t. 2. *f.* 80.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* Surinamo, *punctis lineisque rubris nigrisque varius, equeſtris magnitudine, antennis, roſtro, ſcutello pedibusque nigris.*

purpureus. 437. C. ſanguineus, capite, membrana elytrorum pedibusque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 57. *f.* 67.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaberrimus, ſtatura annulati, at multo anguſtior, immaculatus, capite antennisque nigris.*

nebuloſus. 438. C. flaveſcens, thorace lineis quatuor, elytris faſciis tribus fuſcis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59.
Habitat ad caput bonae ſpei, *ſtatura et magnitudine campeſtris, glaber.*

cafer. 439. C. niger, thorace faſcia alba, elytris ferrugineis: maculis quatuor albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 59. *f.* 70.
Habitat ad caput bonae ſpei, *glaber, ſtatura et magnitudine arenarii.*

Candelabrum. 440. C. niger, rubro viridique notatus, thoracis baſi rubra candelabrum referente: candela ſupra caput porrecta.
Drury inſ. 1. *p.* 107. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in inſula Antigua.

claviger. 441. C. niger, elytris maculatis, abdominis inciſuris rubris, thorace incarnata: ſtriis obliquis nigris, maculaque clavaeformi cinerea.
Drury inſ. 1. *p.* 109. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Antigua *inſula.*

triops. 442. C. griſeus, elytris punctis tribus nigris in longitudinem diſpoſitis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 107. *n.* 1216.
Habitat in Dania.

inauratus. 443. C. flavescens, thorace linea interrupta nigra, elytris duabus obliquis luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 107. *n.* 1221.
Habitat in Dania.

hirtus. 444. C. niger, elytris litura longitudinali pallida. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1234.
Habitat in Dania.

cantharinus. 445. C. niger, thorace unidentato: circulo albo, elytris cinereis: maculis quatuor scutelloque luteis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1235.
Habitat in Dania.

sexmaculatus. 446. C. ater, elytris maculis sex pedibusque flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1238.
Habitat in Dania.

deses. 447. C. niger, thorace lineis tribus scutello margineque elytrorum flavis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1239.
Habitat in Dania.

rubellus. 448. C. sanguineus, elytris membranaceis albis, antennis pedibusque pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1241.
Habitat in Dania.

ochromelas. 449. C. luteus, thorace punctis quatuor elytrisque striis sex nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1242.
Habitat in Dania.

leucostictos. 450. C. sanguineus, thorace linea transversa nigra, elytris apicem versus puncto albo. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 108. *n.* 1243.
Habitat in Dania.

gallorum. 451. C. niger, antennis brevioribus, elytris fuscis: macula flavescente alboque. *Degeer inf.* 3. *p.* 279. *n.* 23.
Habitat in plantarum *partibus ab aphidibus devastatis et relictis, pediculi magnitudine.*

fulvus. 452. C. flavo-fulvus, elytris fuscis: vasis fulvis, pedibus nigro maculatis. *Degeer inf.* 3. *p.* 341. *n.* 16. *t.* 34. *f.* 22.
Habitat in Surinamo.

erythrochlorus. 453. C. fuscus, thorace anterius flavo, elytrorum basi rubra: macula media flava. *Degeer inf.* 3. *p.* 342. *n.* 17. *t.* 34. *f.* 23.
Habitat in Surinamo, *muscae domesticae magnitudine.*

454. C.

nanus. 454. C. flavo-teſtaceus, oculis nigris prominentibus, thorace maculis quatuor, elytrisque faſciis nigris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 343. *n.* 19. *t.* 34. *f.* 25.
Habitat in Surinamo.

arcuatus. 455. C. niger, roſtro arcuato, elytris albidis: macula alba arcuque nigro, femoribus quatuor clavatis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 346. *n.* 21. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Surinamo, *muſcae domeſticae magnitudine; an hujus tribus?*

erythrozonias. 456. C. nigro-fuſcus, roſtro arcuato, thoracis abdominisque margine faſciisque transverſis rubris. *Degeer inſ.* 3. *p.* 349. *n.* 24. *t.* 35. *f.* 12.
Habitat in India, *magnus.*

bifurcatus. 457. C. nigricans, abdomine luteo bifurcato.
Schaeff. icon. t. 11. *f.* 15. 16.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

triangularis. 458. C. luteo-nigricans, thorace nigro triangulari: macula media lutea, elytrorum apice maculis binis coccineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 2.
Habitat in Germania, *antennarum articulis tribus.*

haematoſtictos. 459. C. luteus, elytris maculis duabus ſanguineis.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 3.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

digrammus. 460. C. flavicans: maculis rubentibus, elytrorum apice lineolis duabus albidis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 9.
Habitat in Germania.

quinquepunctatus. 461. C. fuſco-nigricans: dorſo punctis quinque albis.
Schaeff. icon. t. 13. *f.* 12.
Habitat in Germania.

Rubecula. 462. C. collo thoraceque rubicundo, pedibus rubris.
Schaeff. ic. t. 112. *f.* 7.
Habitat in Germania.

ſtolatus. 463. C. laete ſanguineus, elytris ſtriis duabus nigris longitudinalibus.
Schaeff. icon. t. 119. *f.* 3.
Habitat in Germania.

464. C.

sexstriatus. 464. C. fulvo-nigricans, elytrorum margine striis tribus nigris.
Schaeff. icon. t. 185. *f.* 4. 5. a. b.
Habitat in Germania.

M flavum. 465. C. nigricans, thorace elytrorumque marginibus M flavum referentibus.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 4. 5.
Habitat in Germania.

V. flavum. 466. C. flavo luteoque varius, thoracis margine V flavum referente.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania.

Circulus. 467. C. nigricans, elytris maculis quatuor albis, thorace sphaerico: margine albo punctato.
Schaeff. ic. t. 248. *f.* 3. 4.
Habitat in Germania.

insignitus. 468. C. aterrimus, elytris litura rubra.
Schaeff. icon. t. 266. *f.* 4. a. b.
Habitat in Germania.

celer. 469. C. aeneo-fuscus, impresso punctatus, abdomine supra rubro apice emarginato. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 366.
Habitat in littoribus austriacis maris adriatici.

rugosus. 470. C. capite utrinque dentato abdomine rubello, dorso plicis quatuor longitudinalibus. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 367.
Habitat in Carniolia *superiore.*

Pandurus. 471. C. rubro nigroque varius, thorace rubro nigro lineato, elytris rubris: macula media nigra, apiceque punctis tribus albis. *Scop. ent. carn. p.* 126. *n.* 368.
Habitat in Carniolia.

trinervis. 472. C. elytris membranaceis: nervis fusco punctatis punctoque ferrugineo trigono marginali. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 373.
Habitat Idriae *circa fossorum et rusticorum aedes.*

maritimus. 473. C. nigricans, elytris testaceis fusco punctatis: macula cordata nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 374.
Habitat circa littora maris Adriatici.

474. C.

alpinus. 474. C. nigricans, elytrorum corio ferrugineo-punctato, membrana fuſco lineata, pedibus ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 129. *n.* 375.
Habitat in alpibus Vachinenſibus.

idriacus. 475. C. nigricans, elytris pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 377.
Habitat Idriae.

hybridus. 476. C. niger, roſtro areuato, abdomine elytrique corio rubro: maculis duabus atris, membrana fuſceſcente: macula ad baſin nigra. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 380.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

meriopterus. 477. C. roſtro pedibusque citrinis, antennarum articulo ſecundo compreſſo villoſo articulis binis ſetaceis pallidis terminato. *Scop. ent. carn. p.* 131. *n.* 382.
Habitat in Carniolia, *in origani vulgaris et eupatorii cannabini floribus; an hujus tribus?*

aequinoctialis. 478. C. elytris totis coriaceis villoſis albidis: nervis fuſco punctatis, femoribus anterioribus craſſioribus. *Scop. ent. carn. p.* 132. *n.* 383.
Habitat in Carnioliae *floribus, praeſertim cynogloſſo omphalode, circa aequinoctium vernum frequens.*

umbellatarum. 479. C. ferrugineus, abdomine apicisque femorum faſciis fuſcis. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 385.
Habitat in Carnioliae *umbellatis.*

euonymi. 480. C. niger, thoracis macula media oblonga, ſcutelli lineis duabus, elytrorum ſtriis elevatis flavis: unica ramoſa. *Scop. ent. carn. p.* 133. *n.* 387.
Habitat in euonymo.

avellanae. 481. C. niger, elytrorum corio fuſco: baſi apiceque albis, pedibus fulvis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 388.
Habitat in corylo avellana.

geniſtae. 482. C. fuſcus ſubvilloſus, alis hyalinis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in geniſta tinctoria.

hortenſis. 483. C. niger, antennis trinodiis, roſtro pedibusque flavis. *Scop. ent. carn. p.* 134. *n.* 390.
Habitat in Carnioliae *hortis.*

pellucidus. 484. C. fusco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis: apice fusco. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

marmoratus. 485. C. luteo nigroque varius, oculis crassissimis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 438. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

trigonus. 486. C. niger, thorace elytrisque rubris, elytris apice macula triangulari nigra. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 439. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

leucopterus. 487. C. rubro nigroque varius, alis basi albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 442. *n.* 13. *Raj. inf. p.* 55. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

maculosus. 488. C. rubro nigroque varius, elytris puncto nigro, alis fuscis: maculis albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 443. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

tessellatus. 489. C. thorace nigro: lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque tessellatis: limbis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 443. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

croceus. 490. C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 444. *n.* 17.
β) Cimex niger, pedibus rufis.
γ) Cimex niger, capite, thorace pedibusque rufis.
Habitat in Gallia, *an hujus tribus?*

subfuscus. 491. C. viridi-fuscus, elytrorum nervis punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 448. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

melanochros. 492. C. fuscus, antennis, pedibus abdominisque margine nigro luteoque variis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 449. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

naevius. 493. C. cinereo nigroque varius, alis glaucis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 449. *n.* 27.
Habitat in Gallia.

cinereus. 494. C. niger, thorace posterius cinereo, elytris fuscis: apice albo. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 450. *n.* 29.
Habitat in Gallia.

virideſcens. 495. C. pallide virideſcens, femoribus nigro punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 450. *n.* 30.
Habitat in Gallia.

496. C.

erythropterus. 496. C. niger, elytris anterius rufis, alis albo maculatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 451. *n.* 31.
Habitat in Gallia.

punctulatus. 497. C. atro fuscus punctatus, alis venosis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 451. *n.* 32.
Habitat in Gallia.

cordiger. 498. C. spadiceus, scutello macula cordata lutea, elytris apice luteis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 453. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

rectricornis. 499. C. flavescens, thorace fasciis duabus nigris, scutello maculis flavis, antennis apice porrectis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 453. *n.* 36.
Habitat in Gallia.

termaculatus. 500. C. niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello elytrorumque apice maculis luteis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 454. *n.* 37.
Habitat in Gallia.

Chloris. 501. C. viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

obfuscatus. 502. C. viridis, elytris macula fusca. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 40.
Habitat in Gallia.

lineolatus. 503. C. viridis, elytrorum apice albido, scutello lineola fusca. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 455. *n.* 41.
Habitat in Gallia.

viridiusculus. 504. C. viridis, thorace scutelloque lineis quatuor nigris, elytris interius fuscis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 456. *n.* 42.
Habitat in Gallia.

conicus. 505. C. fusco-cinereus, oculis prominulis, elytris nervosis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 458. *n.* 49.
Habitat in Gallia.

adustus. 506. C. niger, capite, elytrorum apice genubusque ferrugineo-rubris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 459. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

chloromelas. 507. C. niger, pedibus viridi nigroque variis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 459. *n.* 52.
Habitat in Gallia.

508. C.

atratus. 508. C. totus ater, alis atris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 460. *n.* 53.
Habitat in Gallia.

brachypterus. 655. C. pallidus, corpore lineari, elytris abdomine tertia parte brevioribus. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 189.
Habitat in Europa.

luteſcens. 656. C. flaveſcens, abdomine luteſcente. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 190.
Habitat in Europa.

gramineus. 657. C. pallidus, thorace utrinque linea fuſca, elytris vireſcentibus, abdomine luteſcente. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 191.
Habitat in Europa.

herbaceus. 658. C. vireſcens, capite antennisque ruſeſcentibus. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 194.
Habitat in Europa.

pictus. 659. C. pallidus, thorace lineis tribus fuſcis, abdomine nigro: margine dilatato rubro flavove ſubtus fuſco medio pallido. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 195.
Habitat in Europa.

rubellus. 660. C. ruſeſcens. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 196.
Habitat in Europa.

albipes. 661. C. niger, thoracis lateribus elytris pedibusque albidis. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 197.
Habitat in Europa.

ſquamatus. 662. C. niger, pedibus pallidis, elytrorum loco ſquamis albis. *Muf. Lesk. p.* 124. *n.* 198.
Habitat in Europa.

purus. 663. C. ater immaculatus. *Muf. Lesk. p.* 120. *n.* 113.
Habitat in Europa.

annulatus. 664. C. niger, elytris anterius, thoracе poſterius griſeis, pedibus fuſco annulatis. *Muf. Lesk. p.* 120. *n.* 114.
Habitat in Europa.

macropus. 665. C. niger, elytris griſeis ad membranam nigro maculatis, femoribus anticis craſſiſſimis, tibiis ruſeſcentibus. *Muf. Lesk. p.* 120. *n.* 115.
Habitat in Europa.

feneſtratus. 666. C. pallidus, coleoptris feneſtratis: nervis pallide rufis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 118.
Habitat in Europa.

melanopus. 667. C. fuſcus, elytris griſeis apice fuſcis, femoribus nigris baſi griſeis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 121.
Habitat in Europa.

denigratus. 668. C. niger, elytris griſeo-fuſcis: membrana baſi maculaque apicis alba. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 122.
Habitat in Europa.

biguttatus. 669. C. fuſcus, elytris maculis albis diſco fuſcis: membrana alba: venis maculisque duabus fuſcis, pedibus pallidis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 123.
Habitat in Europa.

leucophlebs. 670. C. niger, elytris brunneis: membrana venis albis. *Muſ. Lesk. p.* 120. *n.* 124.
Habitat in Europa.

unipunctatus. 671. C. niger, elytris fuſco-luteis: puncto albo, membrana utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 125.
Habitat in Europa.

erythrurus. 672. C. rufeſcens, pedibus elytrisque pallidis, his apice rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

ochrorhous. 673. C. fuſcus, ano luteo, elytris luteo-pellucidis: diſco puncto gemino apiceque ſolitario fuſco. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 128.
Habitat in Europa.

platycerus. 674. C. rufeſcens, antennis compreſſis latis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 129.
Habitat in Europa.

quadriſtriatus. 675. C. griſeus, thorace lineis quatuor longitudinalibus elevatis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 131.
Habitat in Europa.

fuſcicaudis. 676. C. capite, thorace elytrorumque griſeorum apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 121. *n.* 132.
Habitat in Europa.

⊣ ⊣ *pedibus dentatis aut spinosis.*

Phasianus. 509. C. fuscus, femoribus arcuato-clavatis unidentatis, abdominis basi subtus gibba. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 136. *n.* 226. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 177.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *magnus.*

bellicosus. 510. C. fuscus, femoribus posterioribus arcuatis dentatis, abdomine quadrispinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 137. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 178.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *statura valgi*, *at duplo minor.*

Meleagris. 511. C. fuscus, antennarum articulo ultimo tibiisque anterioribus flavis, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 179.
Habitat in Sina, *magnus.*

Gallus. 512. C. elytris fuscis flavo striatis, abdominis disco rubro, femoribus posterioribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 138. *mant. inf.* 2. *p.* 279. *n.* 180.
Habitat in Surinamo, *statura et magnitudine indi.*

Faber. 513. C. niger, abdomine fusco: margine flavo, femoribus anterioribus apice bidentatis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 181.
Habitat in Pulicandor, *magnus.*

Harpator. 514. C. niger, subtus rubro punctatus, femoribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 361. *n.* 139. *mant. inf.* 2. *p.* 297. *n.* 180.
Habitat in America.

calcaratus. 114. C. fuscus, abdomine supra sanguineo, femoribus posterioribus sexdentatis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 367. *n.* 172. *mant. inf.* 2. *p.* 302. *n.* 225.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 114. *Fn. suec.* 968.* Cimex oblongus niger, capite linea rubra, femoribus posticis subtus sexdentatis.
Degeer inf. 3. *p.* 280. *n.* 24. *t.* 14. *f.* 23. 24.
Schaeff. icon. t. 123. *f.* 2. 3.
Habitat in Europa.

denticulatus. 515. C. thoracis margine laterali denticulato, abdomine bidentato, femoribus posterioribus spinosis. *Scop. ent. carn. p.* 125. *n.* 365.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 16.
Habitat Tergesti.

516. C.

sollium. 516. C. niger, elytris nucis colore: puncto nigro, femoribus anterioribus denticulo notatis. *Scop. ent. carn. p.* 130. *n.* 376.
Habitat in Carnioliae *collibus.*

armatus. 680. C. niger, elytris fuscis: margine externo striis, posteriore punctis griseis, femoribus anticis crassissimis dente armatis. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 116.
Habitat in Europa.

lacteolus. 681. C. niger, femoribus anterioribus crassis dente armatis, elytris basi griseis, membrana basi gutta lactea. *Mus. Lesk. p.* 120. *n.* 117.
Habitat in Europa.

setosus. 682. C. fuscus, femoribus et elytris rufescentibus, his apice fractis, tibiis albis setoso spinosis. *Mus. Lesk. p.* 121. *n.* 126.
Habitat in Europa.

⊥⊥⊥⊥ *antennis setaceis.*

⊣ *pedibus dentatis.*

abietis. 115. C. maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus crassis. *Fn. suec.* 969.* *Scop. ent. carn.* 364. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 222. *mant. inf.* 2. *p.* 307. *n.* 290.
Degeer inf. 3. *p.* 308. *n.* 37. *t.* 15. *f.* 20. 21. Cimex grossipes.
Habitat in Europae *borealis abiete.*

⊣ ⊣ *pedibus inermibus.*

pabulinus. 83. C. viridis immaculatus, alis hyalinis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 373. *n.* 210. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 279.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 727. *n.* 83. *Fn. suec.* 947.* *Scop. ent. carn.* 132. Cimex oblongiusculus flavescenti-viridis totus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 456. *n.* 53.
Degeer inf. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *pratis.*

laevigatus. 101. C. exalbidus, lateribus albis. *Fn. suec.* 958.* *Fuessli inf. helv. p.* 26. *n.* 512. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 372. *n.* 208. *mant. inf.* 2. *p.* 306. *n.* 276.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 452. *n.* 26.
Degeer inf. 3. *p.* 292. *n.* 30.
Habitat in Europae *pratis, frequens.*

lateralis. 517. C. niger, lateribus albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 372. *n.* 209. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 277.
Habitat Kilonii.

holſatus. 518. C. exalbidus, thorace lineis duabus, elytris interius fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 278.
Habitat Kilonii, *ſtatura laevigati.*

virens. 102. C. viridis, plantis antennarumque apicibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 211. *mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 280.
Habitat in Europa, *pabulino duplo major.*

pallidus. 519. C. pallidus, capite corporeque atris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 306. *n.* 281.
Habitat in Suecia, *parvus.*

dolabratus. 103. C. elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. *Fn. ſuec.* 959. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 212. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 282.
Habitat in Europae *feſtuca mutante.*

calens. 104. C. capite, thorace elytrisque nigris, ſcutello fulvo. *Gron. zooph.* 712. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 213. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 283.
Habitat in India.

ſtriatus. 105. C. niger, elytris flavo fuſcoque ſtriatis, apice pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 960.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 217. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 289.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 454. *n.* 38.
Degeer inſ. 3. *p.* 290. *n.* 29. *t.* 15. *f.* 14. 15.
Petiv. gazoph. t. 26. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 4.
Habitat in ulmi campeſtris *foliis.*

Gronovii. 106. C. thorace elytrisque atris, linea flava faſciam elytrorum formante. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 373. *n.* 214. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 284. *Gronov. zooph.* 711.*
Habitat in India.

erraticus. 107. C. nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. *Fn. ſuec.* 961.*
Habitat in Europa.

108. C.

ferus. 108. C. griſeus immaculatus. *Fn. ſuec.* 962.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 215. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 285.
Habitat in Europae *ſilvis.*

vagans. 519. C. griſeus, capite thoraceque linea nigra, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 286.
Habitat in Suecia, *ſtatura feri.*

orientalis. 520. C. fuſcus, capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni albo. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 287.
Habitat in India, *marginello proxime affinis.*

marginellus. 521. C. niger, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccineo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 374. *n.* 216. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 288.
Habitat in Italia, *ſtatura feri.*

ulmi. 110. C. ſupra rubiginoſus, elytris ſtriis ſanguineis, alis albo fuſcoque variis. *Fn. ſuec* 964.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 223. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 291.
Habitat in ulmo campeſtri.

mutabilis. 112. C. niger, alis caeruleis, antennis pedibusque flavis. *Fn. ſuec.* 967.*
Habitat in Suecia.

ſauciatus. 522. C. viridis, elytris maculis ſex roſeis, pedibus rubro tinctis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 293. *n.* 32.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 457. *n.* 4.
Habitat in Europa.

ſubapterus. 523. C. griſeus, alis breviſſimis, abdomine nigro punctato. *Degeer inſ.* 3. *p.* 287. *n.* 27. *t.* 15. *f.* 10.
Habitat in Europa.

††† *lineares, corpore anguſto elongato.*
⊥ *antennis ſetaceis.*

pedes. 524. C. fuſco flavoque varius, femoribus poſterioribus elongatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 224. *mant. inſ.* 2. *p.* 307. *n.* 292.
Habitat in India.

filiformis. 525. C. pallide vireſcens, antennis ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 375. *n.* 225. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 293.
Habitat in inſulis, Americae *meridionali oppoſitis.*

11 *antennis filiformibus.*

angustatus. 526. C. niger, capite thoraceque elongato. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 59. *f.* 71.
Habitat - - - - *tipularii magnitudine, glaber.*

squalidus. 683. C. fuscus, elytris griseo fuscoque variegatis, pedibus linearibus antennisque griseo fuscoque alternatim annulatis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 201.
Habitat in Europa.

fossarum. 527. C. supra fuscus, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 226. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 294.
Habitat in India.

lacustris. 117. C. supra niger depressus, pedibus anterioribus brevissimis. *Fn. suec.* 970. *it. wgoth.* 182. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 463. *n.* 59. *Scop. ent. car.* 394. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 375. *n.* 227. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 295.
Degeer inf. 3. *p.* 311. *n.* 39. *t.* 16. *f.* 7. Cimex Najas,
Raj. inf. p. 57. *n.* 1. Cimex aquaticus figurae longioris.
Bauh. Ballon. 213. *f.* 1. Insectum Tipula dictum.
List. mut. t. 5. *f.* 4.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 2. d.
Frisch inf. 7. *t.* 20.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 78.
Stoll cimic. 2. *t.* 9. *f.* 63.
Habitat in Europae *aquis pacatis.*

stagnorum. 118. C. teretiusculus niger, thorace medio punctis duobus globosis. *Fn. suec.* 9715. *Scop. ent. carn.* 395. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 228. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 296.
Degeer inf. 3. *p.* 322. *n.* 40. *t.* 15. *f.* 24. Cimex Acus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 463. *n.* 60.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 12.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 17.
Habitat in Angliae *lacubus frequens.*

rivulorum. 528. C. niger, albo punctatus, abdomine fulvo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 376. *n.* 229. *mant. inf.* 2. *p.* 308. *n.* 297.
Habitat in Alsatiae *rivulis montosis, lacustri quadruplo minor.*

pallipes. 529. C. niger, pedibus pallidis, pectore biſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 230. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 298.
Habitat in Italia, *ſtatura lacuſtris.*

culiciformis. 530. C. griſeus, thorace multiſpinoſo, elytris lituris nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 231. *mant inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 299.
Habitat in Americae *aquis.*

anguſtus. 531. C. ſupra griſeus ſubtus flaveſcens, antennis pedibusque ſubteſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 300.
Habitat in Sina, *ſtatura culiciformis.*

filum. 532. C. fuſcus, alis abbreviatis, pedibus longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 376. *n.* 232. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 301. *Degeer inſ.* 3. *p.* 352. *n.* 26. *t.* 35. *f.* 16? Cimex longipes.
Habitat in India.

macropus. 533. C. ater, thoracis margine elytrorumque faſcia ſanguinea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 233. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 302.
Habitat in America.

curſitans. 534. C. ſupra fuſcus ſubtus cineraſcens, pedibus longiſſimis, ano bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 303.
Habitat in nova Hollandia.

vagabundus. 119. C. griſeus, pedibus pallidis: anterioribus breviſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 236. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 305.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 732. *n.* 119. *Fn. ſuec.* 972.* Cimex linearis variegatus, pedibus anticis breviſſimis craſſis inflexis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longiſſimis albo fuſcoque variis.
Degeer inſ. 3. *p.* 323. *n.* 41. *t.* 17. *f.* 1. 2. Cimex culiciformis.
Friſch inſ. 7. *p.* 11. *t.* 6. Cimex arborum oblongus, alarum ſignatura alba.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 462. *n* 58.
Habitat in Europae *muſcis.*

linearis. 535. C. viridis, antennis antrorſum porrectis. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 519.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 458. *n.* 47.
Habitat in Valeſia.

denigratus. 536. C. albidus, oculis fuſcis, ſcutello macula nigra. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 458. *n.* 48.
Habitat in Gallia.

hortorum. 537. C. viridis, oculis fuſcis, antennarum articulo ſecundo baſi albo, tibiis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1248.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 456. *n.* 43.
Degeer inſ. 3. *p.* 293. *n.* 31.
Habitat in Europae *hortis; an forſan ad praecedentem tribum relegandus ob antennas?*

tipuloides. 538. C. griſeus, antennis rubro maculatis, femoribus apice rubris, pedibus omnibus ſubaequalibus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 27. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Surinamo.

meridionalis. 539. C. nigro-fuſcus, pedibus teſtaceis, femoribus craſſis, elytris abdomine brevioribus. *Degeer inſ.* 3. *p.* 355. *n.* 29. *t.* 35. *f.* 21.
Habitat in Surinamo.

tetragrammos. 540. C. nigricans, abdomine atro: lineis quatuor albis obliquis. *Schaeff. icon. t.* 43. *f.* 7. 8.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

araneoides. 541. C. luteus, pedibus longiſſimis.
Schaeff. icon. t. 169. *f.* 7.
Habitat in Germania, *antennarum articulis quatuor.*

111 *antennis clavatis.*

triſpinoſus. 542. C. griſeo fuſcus, antennis longis, ſpinis dorſalibus tribus erectis. *Degeer inſ.* 3. *p.* 354. *n.* 28. *t.* 35. *f.* 19.
Habitat in Surinamo.

1111 *antennis biclavatis.*

ſuecicus. 543. C. cinereus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 237. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 306.
Habitat in Suecia.

11111 *antennis bicaudatis.*

tipularius. 120. C. exalbidus, pedibus omnibus longiſſimis, femoribus clavatis. *Fn. ſuec.* 973.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 377. *n.* 234. *mant. inſ.* 2. *p.* 308. *n.* 304.

Friſch

Frisch inf. 7. *p.* 28. *f.* 20. Cimex arboreus culiciformis.
Habitat in Europae *borealis muscis.*

** *antennis supra oculos insertis, rostro arcuato.* Reduvii.

Gigas. 544. C. niger, thoracis margine elytrorumque fascia obsolete flexuosa rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 1.
Habitat in India.

Acantharis. 38. C. thorace spinoso, abdomine spinis ciliato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 29. *mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 45.
Brown jam. p. 434. *t.* 44. *f.* 11. Acantharis.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 8.
Habitat in Jamaica.

Guttula. 545. C. ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 46.
Habitat in Germania, *mediae magnitudinis.*

elongatus. 546. C. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 383. *n.* 30. *mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 47.
Habitat in Africa *aequinoctiali, reliquis hujus tribus angustior.*

cristatus. 62. C. corpore fusco-ferrugineo, scutello cristato. *Amoen. acad.* 6. *p.* 399. *n.* 42.*
Fabr. sp. inf. 2. *p.* 381. *n.* 23? *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 36? Reduvius (serratus) niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque flavis, scutello cristato serrato.
Forster nov. inf. sp. 1. *p.* 72. *n.* 72? Cimex carinatus.
Sulz. hist. inf. t. 10. *f.* 12.
Drury inf. 2. *t.* 36. *f.* 6.
Stoll cimic. 2. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

leucopus. 547. C. fuscus, antennarum annulis, tibiis abdominisque punctis lateralibus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 24. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 37.
Habitat in Europa *media, statura aegyptiaci, at paulo major.*

tessulatus. 548. C. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdomine atro: margine albo vario. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 38.
Habitat Monspelii, *statura albipedis.*

aegyptiacus. 549. C. corpore villoso griseo, abdominis margine nigro variegato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 39.
Habitat in Aegypto.

Diadema. 550. C. niger, capite thoraceque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 40.
Habitat in America *boreali.*

quinquespinosus. 551. C. thorace nigro, posterius spinis quatuor flavis, scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 41.
Habitat in India, *capite posterius attenuato, antennis rostroque pallidis.*

scutatus. 552. C. niger, elytris apice alisque medio puncto albo, scutello apice recurvo spinoso. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 42.
Habitat in Cayenna, *mediae magnitudinis.*

zonalis. 553. C. capite thoraceque nigris, elytris flavescentibus: fascia, alis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 313. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parvus, magis elongatus.*

mauritanicus. 554. C. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace anterius subspinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 382. *n.* 28. *mant. inf.* 2. *p.* 314. *n.* 44.
Habitat in Mauritania.

personatus. 64. C. antennis apice capillaribus, corpore subvilloso fusco. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 377. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 2. *Fuesslı inf. helv. p.* 26. *n.* 499.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 724. *n.* 64. *Fn. suec.* 942. *Scop. ent. carn.* 379. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 397. *n.* 38. Cimex rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo subvilloso fusco.
Degeer inf. 3. *p.* 281. *n.* 25. *t.* 15. *f.* 7. Cimex quisquilius.
List. scar. angl. p. 397. *n.* 38. Cimex maximus pullus, alis nudis ex toto membranaceis.
Frisch inf. 10. *t.* 10. Cimex stercorarius major oblongus.
Raj. inf. 56. Musca cimiciformis graviter volans.
Sulz. inf. t. 11. *f.* 74?
Schaeff. ic. t. 13. *f.* 6. 7. *et t.* 57. *f.* 9.
Habitat in Europae *quisquiliis.*
Larva *horrida consumit lectularium.*

555. C.

barbicornis. 555. C. niger, thorace abdominisque basi olivaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 3. *Drury inf.* 3. *t.* 45. *f.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africae, *thorace rarius nigro, antennis alterius sexus barbatis.*

afer. 556. C. rufus, thorace maculis quatuor, elytris tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 4.
Habitat in Africa *aequinoctiali, annulato minor.*

stridulus. 557. C. glaber niger, elytris fuscis nigro maculatis: margine rufo. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 5.
Habitat Monspelii, *parvus, primo vere agilis, antennas continuo motitans, thoracis attritu stridens.*

nitidulus. 558. C. ater, thorace olivaceo, femoribus anterioribus rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 6.
Habitat in Africa *aequinoctiali, nitidus, barbicorni affinis.*

pilipes. 559. C. ater, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pedibus hirtis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *capite posterius attenuato, alis albis.*

longipes. 65. C. ruber, elytris nigris basi fasciaque rubris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 378. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 8. *Gron. zooph.* 709.
Habitat in insula S. Thomae oceani americani, *magnitudine personati.*

Banksii. 560. C. supra rufus, alis nigris, abdomine atro: margine rufo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 9.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

erythropus. 561. C. ater, elytris griseis nigro venosis, abdominis margine pedibusque posterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 309. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

binotatus. 562. C. supra niger, elytris puncto apicis rufo. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 379. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 11.
Habitat in Surinamo, *statura annulati.*

facer. 563. C. flavescens, thoracis cruce impressa, elytris abdominisque medio nigris. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 310. *n.* 12.
Habitat in India, *mediae magnitudinis.*

guineenſis. 670. C. niger, thorace ſcutelloque acute ſpinoſis, elytris puncto albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 381. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 313. *n.* 35.
Stoll cimic. 2. *t.* 11. *f.* 64.
Habitat in Guinea, *magnitudine valgi.*

annulatus. 71. C. antennis apice capillaribus, corpore nigro ſubtus ſanguineo maculato. *Fn. ſuec.* 943.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 437. *n.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 13. *Fueſſli inſ. helv. p.* 26. *n.* 500.
Degeer inſ. 3. *p.* 286. *n.* 26. Cimex niger rufipes.
Sulz. hiſt. inſ. t. 10. *f.* 13.
Schaeff. icon. t. 5. *f.* 9-11.
Habitat in Europae *corylo.*

monſpelienſis. 564. C. rufus, capite, pectore abdominisque ſtriis macularibus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 14.
Schaeff. icon. 1. *t.* 5. *f.* 9. 10.
Habitat Monſpelii, *ſtatura et magnitudine annulati.*

praecinctus. 565. C. rufeſcens, antennis pedibusque flavo nigroque annulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 15.
Habitat in America *boreali.*

obſcurus. 566. C. ater, thorace poſterius, elytris abdominisque margine obſcure pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 16.
Habitat in Africa *aequinoctiali*, *parvus.*

cayennenſis. 567. C. obſcure fuſcus antennarum apice elytrorumque litura media albis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 310. *n.* 17.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

attelaboides. 568. C. teſtaceo nigroque varius, thorace anterius teſtaceo, dentibus duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 379. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

pilicornis. 569. C. ater, thorace poſterius, ſcutello, elytrorum margine, abdomine femoribusque baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat Tranquebariae, *mediae magnitudinis, antennis hirtis.*

570. C.

quadridentatus. 570. C. fuscus, capite, abdominis margine pedibusque olivaceis, thorace anterius quadridentato. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 20.
Habitat in Africa *aequinoctiali, mediae magnitudinis.*

nigripes. 100. C. elytrorum basi, antennis pedibusque rubris, tibiis anterioribus hirsutissimis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 21.
Degeer inf. 3. *p.* 344. *n.* 20. *t.* 35. *f.* 1. Cimex hirtipes.
Habitat in America *meridionali.*

unicolor. 571. C. ater, immaculatus, thorace subspinoso, tibiis cylindricis hirsutissimis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 22.
Habitat in Cayenna, *statura nigripedis.*

barbaricus. 572. C. niger, thorace elytrisque obscure ferrugineis, scutello lineola media alba. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 23.
Habitat in Barbaria, *statura nigripedis.*

Rohrii. 573. C. ater, thorace subspinoso, elytris lineola, abdominis margine femorumque articulatione sanguineis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 311. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *statura nigripedis.*

carbonarius. 574. C. ater, elytris posterius albis, capite posterius attenuato cylindrico. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 25.
Habitat in India, *statura attelaboidis.*

pacificus. 575. C. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 26.
Habitat in nova Hollandia.

Edleri. 576. C. niger, thorace subspinoso, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 27.
Habitat in India.

octomaculatus. 577. C. thorace posterius testaceo, elytris alisque atris: maculis quatuor laete flavis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 380. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 28.
Habitat in India, *reliquis hujus tribus minor.*

stigma. 578. C. thorace testaceo, elytris alisque nigris: macula media flava. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 29.
Habitat in India, *octomaculato proxime affinis.*

579. C.

curtipes. 579. C. niger, elytris pallidis: puncto atro, abdomine rufo: ano atro. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 30.
Habitat in India, *parvus, pedibus anterioribus brevibus.*

uncinatus. 580. C. niger, elytris basi pallidis, alis macula communi rufa, pectore spinoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 31.
Habitat in America *meridionali, mediae magnitudinis.*

iracundus. 581. C. niger, thorace abdominisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis. *Scop. ent. carn.* 378. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 381. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 32.
Schranck Beytr. p. 81. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 17. Cimex sanguineus.
Poda mus. p. 58. *n.* 17.
Habitat in Germania *superiori.*

fuscipes. 582. C. rufus, thoracis fascia, elytrorum margine interiori pedibusque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 33.
Habitat in India, *statura iracundi, at paulo minor.*

bifidus. 583. C. ater, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice bifida. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 312. *n.* 34.
Habitat in Sina, *magnus.*

membranaceus. 684. C. niger, abdominis apice membranisque duabus ovatis rufis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 202.
Habitat extra Europam.

superbus. 685. C. niger, abdomine rufo basi nigro, elytris in medio ad marginem anticum puncto coccineo notatis, femoribus apice tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 203.
Habitat extra Europam.

naevius. 686. C. griseus abdomine elytris dimidio longiore: dorso nigro, margine elevato rufo fuscoque vario. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 207.
Habitat in Europa.

quinquemaculatus. 687. C. niger, elytris abbreviatis, abdominis margine elevato: maculis quinque albis inverse conicis, pedibus griseis fusco annulatis. *Mus. Lesk. p.* 124. *n.* 208.
Habitat in Europa.

staphylinus. 688. C. apterus niger, elytris abbreviatis pedibusque rubris: femoribus quatuor anticis compressis. *Mus. Lesk. p.* 125. *n.* 209.
Habitat in Europa, *staphylinis affinis.*

MA-

MACROCEPHALUS. *Roſtrum* inflexum: vagina univalvi triarticulata ſetis tribus, maxillis palpis labioque nullis.

Antennae porrectae, breviſſimae, ſubmoniliformes, clavatae.

Caput oblongum, ſupra cylindricum.

Scutellum longitudine abdominis, depreſſum, membranaceum.

cimicoides. 1. M. griſeo-ferrugineus, ſcutello cineraſcente: macula coleoptrata flava, alis purpuraſcenti-violaceis, tibiis anterioribus incraſſatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in Georgia Americae, *cimice eroſo paulo minor.*

227. APHIS. *Roſtrum* inflexum, vagina articulorum quinque: ſeta unica.
Antennae ſetaceae, thorace longiores.
Alae quatuor erectae aut nullae.
Pedes ambulatorii.
Abdomen ſaepius poſterius bicorne.

longiroſtris. 34. Aph. cinerea, roſtro corpore triplo longiore. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 314. *n.* 1.
Habitat Dresdae, *ſub arborum corticibus, formicarum larvis vicinitans, mediae magnitudinis.*

ribis. 1. Aph. Ribis rubri. *Fn. ſuec.* 975.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 7.
Leeuwenh. arc. epiſt. 90. *p.* 545. *t.* 548.
Blank. inſ. 164. *t.* 14. *f.* D. E.
Friſch inſ. 11. *p.* 9. *t.* 14.

Reaum.

Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 7-10.
Habitat ſub ribis *rubri foliis monſtroſis puſtulatis frequens.*

arundinis. 35. Aph. arundinis epigeios. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 8.
Habitat in arundinis epigeios *foliis.*

ulmi. 2. Aph. ulmi campeſtris. *Fn. ſuec.* 976.* *It. ſcan.* 203. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 32. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 37.
Degeer inf. 3. *p.* 81. *n.* 13. *t.* 5. *f.* 7-18. Aphis (foliorum ulmi) nigricans tuberculata foliorum convolutorum ulmi.
Reaum. inf. 3. *t.* 25. *f.* 4-7.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in ulmo *campeſtri.*

papaveris. 36. Aph. papaveris ſomniferi. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 33. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 38.
Habitat in Holſatiae *papavere ſomnifero.*

paſtinacae. 3. Aph. paſtinacae ſativae. *Fn. ſuec.* 977.* *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 13.
Habitat in paſtinaca *ſativa.*

pruni. 37. Aph. pruni domeſticae. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 12. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 14.
Degeer inf. 3. *p.* 49. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 1 – 8. Aphis dilute viridis albo farinoſa, corniculis brevibus, pruni.
Reaumur inf. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruni *domeſticae foliis.*

ſambuci. 4. Aph. ſambuci nigrae. *Fn. ſuec.* 978. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 3. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 4.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 495. *n.* 3. Aphis ſambuci tota caerulea atra.
Liſt. angl. p. 397. *n.* 40. Cimex exiguus nunc niger nunc viridis, cui alae ex toto membranaceae, praegrandis.
Friſch inf. 11. *p.* 14. *t.* 18.
Reaum. inf. 3. *t.* 8. *f.* 5-15.
Habitat in Sambuci *nigrae ramis.*

ſolidagi-nis. 38. Aph. ſolidaginis virgaureae. *Fabr. ſp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 5.
Habitat in Norwegiae *ſolidaginis virgaureae caulibus, majuſcula, junior teſtacea, alias fuſca, anterius anguſtata, fronte emarginata, pedibus pallidis: geniculis nigris, corniculis elongatis ſetaceis, ſtilo duplo longioribus.*

39. C.

cerasi. 39. Aph. pruni cerasi. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 6.
Müll. zool. dan. prodr. p. 110. *n.* 1256.
Habitat in pruni *cerasi foliis.*

rumicis. 5. Aph. rumicis lapathi. *Fn. suec.* 979.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 12.
Habitat in rumice *acuto.*

acetosae. 6. Aph. rumicis acetosae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 43. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 48.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 9. Aphis (acetosae) atra, fascia transversa viridi.
Reaum. inf. 3. *p.* 286.
Habitat in rumice acetosa, acetosella.

liguslici. 40. Aph. liguslici scotici. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 44. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 49.
Habitat in Norwegiae *liguslico scotico, nigra, antennis tibiarumque basi pallida.*

lychnidis. 7. Aph. lychnidis divicae. *Fn. suec.* 980.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 2.
Fn. suec. 719. Aphis cucubali.
Habitat frequens in lychnidis divicae *caulibus.*

capreae. 41. Aph. salicis capreae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 384. *n.* 2. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 3.
Habitat in Europae *salice.*

padi. 8. Aph. pruni padi. *Fn. suec.* 981. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 389. *n.* 45. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 50.
Reaum. inf. 3. *t.* 23. *f.* 9. 10.
Habitat in pruno pado.

9. Aph.

Aphides *a vere in serum autumnum vivos pariunt foetus, autumno post copulam ova; post quartam demum metamorphosin pariunt, aliique instruuntur; a copula parentum nascuntur filiae, neptes, proneptes, abneptes; aliae apterae, aliae alatae, absque sexus discrimine in eadem specie; plurimae cornubus duobus posterioribus abdominis excernunt rorem mellenm, qui formicas allicit; ab ichneumonis specie quadam infestatae. Species difficile distinguuntur, difficilius definiuntur, nec semper in diversis plantis diversae species, adeoque pauciores aphides, quam plantae aphidiferae.*

rosae. 9. Aph. rosae. *Fn. suec.* 982.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 25. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 30.
Degeer inf. 3. *p.* 65. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 10. Aphis viridis, corniculis longissimis, rosae.
Reaum. inf. 3. *t.* 21. *f.* 1-4.
Lederm. microgr. 53. *t.* 25.
Sulz. inf. t. 12. *f.* 79.
Habitat in rosae *pedunculis.*

hortensis. 42. Aph. atriplicis hortensis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 26. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 31.
Habitat in atriplicis hortensis *summitatibus.*

picridis. 43. Aph. picridis hieracioidis. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 27. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 32.
Habitat in picridis hieracioidis *caulibus.*

aegopodii. 44. Aph. aegopodii podagrariae. *Scop. ent. carn.* 399. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 28. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 33.
Habitat in aegopodii podagrariae *foliis.*

dauci. 45. Aph. dauci carotae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 29. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 34.
Habitat in dauci carotae *umbella.*

urticata. 46. Aph. urticae dioicae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 30. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 35.
Habitat in urticae dioicae *caulibus*, *foliis.*

nymphaeae. 10. Aph. plantarum aquaticarum. *Fn. suec.* 983. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 17.
Habitat in nymphaeis, potamogetonibus.

corni. 47. Aph. corni sanguineae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 15. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 18.
Habitat in corni sanguineae *foliis.*

tiliae. 11. Aph. tiliae europaeae. *Fn. suec.* 984. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 34. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 39.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 495. *n.* 6. Aphis alis antennis pedibusque nigro punctatis.
Degeer inf. 3. *p.* 77. *n.* 12. *t.* 5. *f.* 1-5. Aphis (tiliae nigropunctata) flavo-viridis lineis punctisque nigris, alis nigro maculatis, corniculis brevioribus.
Frisch inf. 11. *p.* 1. *n.* 3. *t.* 17. Pediculus arboreus tiliae.
Reaum.

Reaum. inf. 3. *t.* 23. *f.* 1-8.
Habitat in Europae *tilia.*

juniperi. 48. Aph. juniperi communis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 35. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 40.
Degeer inf. 3. *p.* 56. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 7. 8. Aphis obſcure fuſca cinereo maculata, corniculis brevioribus groſſis, juniperi.
Habitat in juniperi communis *foliis.*

braſſicae. 12. Aph. braſſicae oleraceae. *Fn. ſuec.* 985. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 388. *n.* 36. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 41.
Friſch inf. 11. *p.* 10. *t.* 3. *f.* 15. Pediculus braſſicae.
Habitat in braſſicae oleraceae *foliorum pagina inverſa, unde tabeſcunt.*

craccae. 13. Aph. viciae craccae. *Fn. ſuec.* 986. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 46. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 51.
Degeer inf. 3. *p.* 58. *n.* 8. *t.* 2. *f.* 14. 15. Aphis nigra caeruleſcens albo farinoſa, corniculis brevioribus, viciae craccae.
Habitat in viciae craccae *foliis.*

lactucae. 14. Aph. lactucae oleraceae. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 47. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 52.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in lactuca oleracea.

ſonchi. 15. Aph. ſonchi oleracei. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 390. *n.* 48. *mant. inf.* 2. *p.* 317. *n.* 53.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 497. *n.* 13.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 3-5.
Habitat in ſoncho oleraceo.

cirſii. 16. Aph. ſerratulae arvenſis. *Fn. ſuec.* 987.* *It. wgoth.* 307.
Habitat in ſerratula arvenſi.

cardui. 17. Aph. cardui. *Fn. ſuec.* 988.* *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 13. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 15.
Habitat in carduorum *caulibus.*

achilleae. 49. Aph. flaveſcens, abdomine viridi, antennis pedibusque albidis. *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 385. *n.* 14. *mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 16.
Habitat frequens Kilonii *in achillea millefolio.*

tanaceti. 18. Aph. tanaceti vulgaris. *Fn. ſuec.* 989.* *Fabr. Sp. inf.* 2. *p.* 387. *n.* 31. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 36.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 8. Aphis tanaceti fusca, abdomine nigro caeruleo, antice viridi.
Habitat in tanaceti vulgaris *caulibus.*

absinthii. 19. Aph. artemisiae absinthii. *Fn. suec.* 990.* *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 315. *n.* 19.
Habitat in artemisia absinthio.

millefolii. 50. Aph. fusca, abdomine virescente, antennis pedibus corniculisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 16. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 20.
Degeer inf. 3. *p.* 60. *n.* 9. *t.* 4. *f.* 1-5. Aphis millefolii.
Habitat in achillea millefolio.

euonymi. 51. Aph. euonymi europaei. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 17. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 21.
Habitat in euonymi europaei *foliis.*

avenae. 52. Aph. avenae sativae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 18. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat in Europae avena sativa.

fraxini. 53. Aph. fraxini excelsioris. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 19. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 23.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 494. *n.* 2. Aphis fraxini nigro viridique variegata.
Habitat in fraxini excelsioris *ramis.*

jaceae. 20. Aph. centaureae jaceae. *Fn. suec.* 991.*
Habitat in centaurea jacea.

betulae. 21. Aph. betulae albae. *Fn. suec.* 992.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 20. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 496. *n.* 7. Aphis marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.
Degeer inf. 3. *p.* 45. *n.* 3. Aphis nigro punctata corniculata viridis, dorso tuberculis nigris, betulae.
Reaum. inf. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in betulae *albae foliis.*

alni. 54. Aph. betulae alni. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 386. *n.* 21. *mant. inf.* 2. *p.* 316. *n.* 26.
Degeer inf. 3. *p.* 47. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 15-17. Aphis flavescenti-alba tuberculata, alni.
Habitat in betulae alni *foliis.*

22. Aph.

roboris. 22. Aph. nigra, corniculis bfoletis atris medii abdominis. *Fn. fuec.* 993. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 37. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 42.
Habitat in Quercu robore.

fagi. 23. Aph. fagi ſylvaticae lanata. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 497. *n.* 2.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in fago ſylvatica.

quercus. 24. Aph. quercus roboris proboſcide longiſſima. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 388. *n.* 38. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 43.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 498. *n.* 14. Aphis fuſca proboſcide corpore triplo longiore.
Reaum. inſ. 3. *t.* 28. *f.* 5-14.
Habitat in Galliae *potiſſimum* quercu, *atra, inter maximas, alis hyalinis: margine exterius atro, antennarum pedumque articulis baſi ferrugineis, abdomine mutico.*

pini. 25. Aph. pini ſylveſtris ramulorum. *Fo. fuec.* 994. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 39. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 44.
Degeer inſ. 3. *p.* 27. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 9-16. Aphis (nuda pini) fuſca tuberculata, pedibus nudis, pini.
Habitat in pini ſylveſtris *ramis junioribus.*

pineti. 55. Aph. pini ſylveſtris foliorum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 40. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 45.
Degeer inſ. 3. *p.* 39. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 19. 33. Aphis (tomentoſa pini) nigra albo farinoſa tuberculata, pedibus villoſo tomentoſis.
Habitat in pini ſylveſtris *foliis, pedibus poſterioribus elongatis ciliatis.*

ſalicis. 26. Aph. ſalicis. *Fn. fuec.* 995.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 389. *n.* 41. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 46.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat in ſalicibus *variis.*

vitis. 56. Aph. vitis viniferae. *Scop. ent. carn.* 398. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 49. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 54.
Habitat in Europae *magis auſtralis* vite vinifera.

populi. 27. Aph. populi tremulae foliorum. *Fn. fuec.* 996.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 22. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 27.
Habitat ſub populi tremulae *foliis convolutis fornicatis.*

tremulae. 28. Aph. populi tremulae ramulorum. *Fn. fuec.* 997.*
Degeer inf. 3. *p.* 94. *n.* 15. *t.* 7. *f.* 1-7. Aphis caerulea nigro-tomentoſa, corniculis nullis, populi tremulae ramulorum.
Habitat in populi tremulae *ramulis, ubi foliis approximatis conteguntur.*

viburni. 57. Aph. viburni opuli. *Scop. ent. carn.* 396. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 386. *n.* 23. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat in viburni opuli *foliis et caulibus.*

mali. 58. Aph. pyri mali. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 387. *n.* 24. *mant. inſ.* 2. *p.* 316. *n.* 29.
Degeer inſ. 3. *p.* 53. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20. Aphis pomi flavo-viridis, corniculis longioribus pedibus antennisque nigreſcentibus.
Habitat ſub pyri mali *foliis.*

burſaria. 29. Aph. populi nigrae. *Fn. ſuec.* 998.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 9. *it. ſcan.* 311.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 497. *n.* 11. Aphis populi nigra lanata.
Hofm. altd. hort. 51.
Seb. muſ. 1. *t.* 38. *f.* 8.
Jung verm. 161. 162.
Rupp jenenſ. 3. *p.* 333.
Swammerd. bibl. 45. *f.* 22-25.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 7-11.
Hort. amb. t. 96.
Merian. inſ. europ. 1. *p.* 15. *t.* 42.
Habitat in populi nigrae *foliis ſuccatis, petiolorumque utriculis coloratis.*

aparines. 59. Aph. galii aparines. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 385. *n.* 9. *mant. inſ.* 2, *p.* 315. *n.* 10.
Habitat in galio aparine.

urticae. 30. Aph. urticae alba lanata poſterius truncata.
Friſch inſ. 8. *p.* 34. *t.* 17.
Habitat in Germaniae *urtica, inter maximas ſui generis, ſetis, ſubtus lana obtecta.*

aceris. 31. Aph. aceris platanoidis. *Fn. ſuec.* 999.*
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 385. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 315. *n.* 11. Aphis aceris campeſtris.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 495. *n.* 5. Aphis (aceris) viridis maculis nigris.
Reaum. inſ. 3. *t.* 22. *f.* 6-10.
Habitat in aceris campeſtris *et* platanoidis *foliis.*

atriplicis. 32. Aph. atriplicis. *Fn. ſuec.* 1000.
Habitat ſub atriplicis, *inprimis* littoralis, *foliis, intra cylindrum ex foliis revolutis confectum obambulans.*

piſtaciae. 33. Aph. nigra, alis albidis, tibiis longiſſimis, thorace verrucoſo.
Fabr. ſp. inſ. 2. *p.* 389. *n.* 42. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *u.* 47. Aphis piſtaciae lentiſci.
Siml. vit. geſ. 49.
Camer. epit. 51.
Lob. ic. 100.
Dodon. pempt. 780.
J. Bauh. hiſt. 1. *p.* 279.
Theodor. hiſt. 1439.
Habitat in piſtacia vera, terebintho, lentiſco, *antennis moniliformibus, oculis nigricantibus, abdomine poſterius mutico, lanugine alba globulis miſta tecto, alis interdum erectis, in folliculo, e foliorum baſi enaſcente, ventricoſo, utrinque attenuato, ſpithameo, pollice craſſiore, primo viridi, poſt exitum aphidis incarnato.*

perſicae. 60. Aph. amygdali perſicae.
Sulz. hiſt. inſ. p. 105. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in amygdalo perſica, *inter majores, viridis, capite thorace tibiisque nigris, alis longiſſimis, antennis corpore longioribus, roſtro brevi.*

polyanthis. 61. Aph. polyanthis tuberoſae.
Sulz. hiſt. inſ. p. 105. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat in polyanthe tuberoſa, *fuſca, globoſa, antennis corpori aequalibus; mare minore, dorſo griſeo, utplurimum alato.*

faligna. 62. Aph. griſeo-fuſca, roſtro longiſſimo, antennis brevioribus, corniculis nullis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 11. *f.* 6.
Habitat in ſalice.

plantaginis. 63. Aph. plantaginis. *Bonnet inſectol.* 1. *p.* 56.
Habitat in plantaginum *caulibus.*

archangelicae. 64. Aph. angelicae archangelicae. *Scop. entom. carn. p.* 137. *n.* 400.
Habitat in angelica archangelica, *nigra, roſtro et abdomine virentibus.*

leucanthemi. 65. Aph. chryſanthemi leucanthemi. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 404.
Habitat in chryſanthemo leucanthemo, *nigra, abdomine roſtroque vireſcentibus, hoc apice fuſco.*

ſcabioſae. 66. Aph. ſcabioſae. *Scop. ent. carn. p.* 138. *n.* 405.
Habitat in ſcabioſis.

fabae. 67. Aph. viciae fabae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 406.
Habitat in vicia faba, *quam ſterilem reddit.*

geniſtae. 68. Aph. geniſtae tinctoriae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 409.
Habitat in geniſta tinctoria, *nigra, alis puncto fuſco.*

coryli. 69. Aph. coryli avellanae. *Goeze entom. Beytr.* 2. *p.* 311.
Habitat in coryli avellanae *foliorum pagina inferiori, albida, minor.*

juglandis. 70. Aph. juglandis regiae.
Friſch inſ. 11. *p.* 12. *n.* 10. *t.* 16.
Habitat in juglande regia, *flavo-viridis, antennis brevioribus, corpore ſegmentis quinque ſupra nigris conſtante.*

balſamitae. 71. Aph. tanaceti balſamitae. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 109. *n.* 1252.
Habitat in tanaceto balſamita, *nigra, abdomine viridi, oculis rubris.*

gallarum. 72. Aph. gallarum ulmi. *Degeer inſ.* 3. *p.* 89. *n.* 14. *t.* 4. *f.* 15. *Reaum. inſ.* 3. *p.* 299. *t.* 25. *f.* 4-7. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 494. *n.* 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in folliculis foliorum ulmi, *nigricans, corniculis nullis.*

farinoſa. 73. Aph. ſalicis farinoſa. *Degeer inſ.* 3. *p.* 76. *n.* 11.
Habitat in ſalice, *obſcure viridis, tuberculis lanuginoſis albis, corniculis longioribus.*

xyloſtei. 74. Aph. lonicerae xyloſtei. *Degeer inſ.* 3. *p.* 96. *n.* 16. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in lonicera xyloſteo, *tomentoſa, corniculis nullis.*

75. Aph.

Mayeri. 75. Aph. rubra, antennis thorace brevioribus, abdomine extenuato, tibiis brevioribus. *Mayer Abh. boehm. Geſ.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiae *foliis* tanaceti vulgaris, *aptera.*

228. CHERMES.

Roſtrum vagina pectorali: ſetis tribus inflexis.
Antennae cylindricae, thorace longiores.
Alae quatuor deflexae.
Thorax gibbus.
Pedes ſaltatorii.

graminis. 1. Ch. airae flexuoſae. *Fn. ſuec.* 1001.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 1.
Habitat in Europae *graminibus, inprimis* aira flexuoſa.

ulmi. 2. Ch. ulmi campeſtris. *Fn. ſuec.* 1002.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 317. *n.* 2.
Habitat intra ulmi campeſtris *folia revoluta.*

ceraſtii. 3. Ch. ceraſtii viſcoſi. *Fn. ſuec.* 1003. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 4. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 4.
Habitat in ceraſtii viſcoſi *foliis, in capitulum conniventibus.*

pyri. 4. Ch. pyri communis. *Fn. ſuec.* 1004.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 390. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 3.
Degeer inſ. 3. *p.* 141. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 2. Chermes (pyri) viridi-fuſca maculis faſciisque obſcuris, alis fuſco maculatis.
Habitat in pyri communis *foliis.*

ſorbi. 5. Ch. ſorbi aucupariae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 7. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 7.
Habitat in ſorbo aucuparia, *ſupra lituris lineisque variis nigris varia, ſubtus virens, thorace flaveſcente, anterius punctis duobus, poſterius lineis quatuor nigris.*

Chermis *larvae pedatae, ſaepius villoſae; imagines ſaliunt, plantis inſident, ceterum aphidibus ſimiles.*

perſicae. 18. Ch. amygdali perſicae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 8. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 8.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 4. Chermes perſicae oblongus.
Reaum. inſ. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in amygdali perſicae *ramis.*

calthae. 6. Ch. calthae paluſtris. *Fn. ſuec.* 1005.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 9. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 9.
Habitat in calthae paluſtris *floribus.*

buxi. 7. Ch. buxi ſempervirentis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 5.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 485. *n.* 2. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis fuſco-flaveſcentibus.
Reaum. inſ. 3. *t.* 19. *f.* 1-14.
Habitat intra Europae *magis auſtralis* buxi *folia ſumma conniventia, Majo interdum* Argentorati *frequentiſſima, excrementa dulcia, cito tamen aceſcentia, et poſtea foetida excernens.*

urticae. 8. Ch. urticae dioicae. *Fn. ſuec.* 1006.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 10. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 10.
Degeer inſ. 3. *p.* 134. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 17-19. Chermes (urticae) fuſca ſ. vireſcens, abdominis lateribus albo maculatis.
Habitat in urticae dioicae *foliis.*

betulae. 9. Ch. betulae albae. *Fn. ſuec.* 1007.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 11. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 11.
Habitat in betulae albae *ramis.*

alni. 10. Ch. betulae alni. *Fn. ſuec.* 1008.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 12. *mant. inſ. p.* 318. *n.* 12.
Degeer inſ. 3. *p.* 148. *n.* 3. *t.* 10. *f.* 8. Chermes alni lanata viridis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 486. *n.* 3. Pſylla viridis, antennis ſetaceis, alis aqueis.
Friſch inſ. 8. *p.* 48. *t.* 13. Vermis ſuctorius alni.
Sulz. inſ. t. 12. *f.* 80.
Schaeff. elem. t. 39.
Habitant in betulae alni *ramulis larvae, caudis plumoſis tectae.*

quercus. 11. Ch. quercus roboris. *Fn. ſuec.* 1009.*
Habitat in quercus *foliis, ex flavo albicans ad marginem alarum interiorem litura, ad exteriorem quatuor fuſcis.*

12. Ch.

fagi. 12. Ch. fagi ſylvaticae. *Fn. ſuec.* 1010. *it. ſcan.* 65. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 391. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 317. *n.* 6.
Reaum. inſ. 3. *t.* 26. *f.* 1-6.
Habitat in fagi ſylvaticae *foliis.*

abietis. 13. Ch. pini abietis. *Fn. ſuec.* 1011.* *fl. lappon.* 218. *p.* 347. E. *it. gotl.* 180. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 487. *n.* 5. Pſylla pallide flaveſcens, oculis fuſcis, alis aqueis.
Degeer inſ. 3 *p.* 99. *n.* 17. *t.* 8. *f.* 1-3. Aphis (gallarum abietis) tomentoſa, corniculis nullis.
Friſch inſ. 12. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 3. Inſectum tuberculi muricati arboris taxi.
Cluſ. pannon. 20. 21. Picea pumila.
Habitat frequens in turionum abietis *gallis ſtrobiliformibus, ſquamatis, imbricatis.*

ſalicis. 14. Ch. ſalicis. *Fn. ſuec.* 1012. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 14.
Habitat in Europae *ſalicibus.*

fraxini. 15. Ch. fraxini excelſioris. *Fn. ſuec.* 1013. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 15.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 486. *n.* 4. Pſylla nigro lutcoque variegata, alarum ore in apicibus fuſcis.
Habitat in fraxino.

aceris. 16. Ch. aceris platanoidis. *Fn. ſuec.* 1014. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 16.
Habitat in aceris platanoidis *racemis.*

ficus. 17. Ch. ficus caricae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 392. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 17.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 484. *n.* 1. Pſylla fuſca, antennis craſſis piloſis, alarum nervis fuſcis.
Reaum. inſ. 3. *t.* 29. *f.* 17-24.
Habitat in Europae *magis auſtralis* ficu carica.

pini. 19. Ch. pini lanata. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 699.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 488. *n.* 6.
Habitat in pinu; *an eadem cum ch. abietis?*

20. Ch.

lichenis. 20. Ch. fusca nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 88. *n.* 7.
Habitat in lichenibus.

castanea. 21. Ch. fusca, antennis setaceis laevibus, alis nervosis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 489. *n.* 8.
Habitat in variis plantis.

rubra. 22. Ch. rubra, alis nervosis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 489. *n.* 9.
Habitat in variis plantis.

pruni. 23. Ch. pruni domesticae. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 414.
Habitat in pruno domestica, *abdomine rubro: punctis fasciisque lateralibus fuscis.*

crataegi. 24. Ch. crataegi oxyacanthae. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 412.
Habitat in crataego oxyacantha; *larva ex plumbeo virente: plica abdominis longitudinali media.*

euonymi. 25. Ch. euonymi europaei. *Scop. ent. carn. p.* 139. *n.* 411.
Habitat in euonymo europaeo, *nigra, pedibus pallidis.*

senecionis. 26. Ch. senecionis vulgaris. *Scop. ent. carn. p.* 140. *n.* 413.
Habitat in senecione vulgari, *ex flavo virens, antennarum articulo ultimo crassiore, duobus pilis terminato.*

229. COCCUS. *Roſtrum* vagina ſetisque pectoralibus.

Antennae filiformes.

Abdomen poſterius ſetoſum.

Alae duae erectae maſculis; *feminae* apterae.

heſperidum. 1. C. hybernaculorum. *Fn. ſuec.* 1015.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 1. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 1. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 19. §. 8.
Fn. ſuec. 722. Coccus heſperidum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 505. *n.* 2. Chermes heſperidum.
Act. Pariſ. 1692. *p.* 14. *t.* 14.
Reaum. inſ. 4. *t.* 1.
Friſch inſ. 12. *p.* 12.
Sulz. inſ. t. 12. *f.* 81.
Schaeff. elem. t. 48.
Habitat in hybernaculorum *arboribus ſempervirentibus, frequentiſſimus*, e. g. citro, lauro, quaſſia, *ſpadiceus, ovato-oblongus.*

Aonidum. 2. C. indarum arborum. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 2. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 26.
Habitat in Aſiae *arboribus ſempervirentibus*, Camellia *&c. cocco heſperidum minor, apterus, flaveſcens, oblongus, vel ſuborbicularis, antennis longitudine fere thoracis, teſta orbiculata, planiuſcula, atro-purpuraſcente: centro ſ. vertice tuberculato, rotundo, rubro, in ſeneſcentibus aperto.*

capenſis. 3. C. ovalis ſubtomentoſus conico-gibbus: apice operculato. *Amoen. acad.* 6. *p.* 401. *n.* 47.* *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 3. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 28.
Habitat ad caput bonae ſpei *in* gnaphalio muricato.

Adonidum. 4. C. rufus farinaceus piloſus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 393. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 318. *n.* 4. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 48. §. 34.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 511. *n.* 1. Coccus adonidum, corpore roſeo farinaceo, alis ſetisque niveis.
Fn. ſuec. 1. *n.* 1169. Pediculus adonidum.

β) Lederm.

β) *Lederm. microsc.* 1762. *t.* 9. Pediculus coffeae.
Habitat in Americae, Africae, *nunc in* Europae *calidioris arboribus, corpore ovato oblongiusculo albo, antennis pedibusque fuscis; linea dorsali longitudinali elevata, cum puncto elevato in singulis segmentis, laterum marginibus acutis, cum incisuris punctisque prominentibus* 14, *area inter lineam dorsalem et marginem totidem punctis secundum longitudinem dispositis conspersa, cauda bifida: Serior folliculum struit, se sexies majorem, in quo se suaque ova flava condit.*

quercus. 5. C. quercus roboris. *Fn. suec.* 1016. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 5.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 13. Chermes quercus reniformis.
Reaum. inf. 4. *t.* 6. *f.* 1-4.
Habitat in Quercu Robore.

ilicis. 6. C. quercus cocciferae. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 5. *mant. inf.* 2. *p.* 318. *n.* 6. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 24. §. 19.
Garid. aixenf. 250. *t.* 53.
Reaum. inf. 4. *t.* 5.
Geoffr. mat. med. 2. *p.* 782.
Lederm. microf. 72. *t.* 36.
Habitat in Galloprovinciae quercu coccifera, *nitens fuscus albo-villosus, aceto immersus et supra lintea exsiccatus tinctorius.*

betulae. 7. C. betulae albae. *Fn. suec.* 1017. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 8. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 10. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 23. §. 16.
Habitat in Europae betula alba, *teres, spadiceus.*

carpini. 8. C. carpini betuli. *Fn. suec.* 1018. *Fabr. sp. inf* 2. *p.* 394. *n.* 9. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 11. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 24.
Habitat

Cocci, *hybernaculorum pestis, juniores in ramis foliisque arborum decurrunt, volandoque saliunt, aliquas subeunt metamorphoses, ut tamen Adonidum, polonicus, spurius, cacti phalaridis, pilosellae, uvae ursi et alni faciem vix mutent; adultiores, feminae praesertim maribus multoties majores, oculis nigris antennis pedibusque minimis instructae, fertilissimae, ut singulae per rimam caudalem foecundatae ad 1000 ova contineant, tardi, adhaerent plantis, saepe ramis, alii radicibus, fere immobiles.*

Habitat in carpino betulo, *subsphaericus, pallide rubescens, stria ad latus elevata.*

ulmi. 9. C. ulmi campestris. *Fn. suec.* 1019. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 393. *n.* 6. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 8. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 27. §. 21.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 8. Chermes ulmi rotundus.

Degeer inf. 6. *p.* 436. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 7. Coccus ovatus albus fusco transverse striatus, ulmi.

Habitat in ulmo campestri, *brunneus; fasciis transversis fuscis.*

coryli. 10. C. coryli avellanae. *Fn. suec.* 1020. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 7. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 9. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 29. §. 23.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 10. Chermes coryli hemisphaericus.

Reaum. inf. 4. *t.* 3. *f.* 4-10.

Habitat in corylo avellana, *citreus, rubro maculatus.*

tiliae. 11. C. tiliae europaeae. *Fn. suec.* 1021. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 10. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 12. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 30. §. 25.

Geoffr. inf. par. 1. *p. p.* 507. *n.* 9. Chermes tiliae hemisphaericus.

Reaum. inf. 4. *t.* 3. *f.* 1-3.

Habitat in tilia europaea.

ruſci. 12. C. ruſci, testa octo clypeolis cincta. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 394. *n.* 11. *mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 13. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 29.

Column. purp. 16. *t.* 17. Lepas nova s. myrti morbus.

Ginann. adr. 1. *p.* 60. *t.* 3. *f.* 27. Balanus terrestris compositus e multis testis.

Klein ostr. 116. Lepas tessellata.

Bocc. mus. t. 107. *f.* XXIII. h. h.

Habitat in Apuliae myrto, ruſco; *testa truncata, octogona, perforata, clypeolis, praeter duos laterales oppositos, in medio granulo notatis.*

myricae. 13. C. myricae quercifoliae. *Fabr. mant. inf.* 2. *p.* 319. *n.* 14. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 31. §. 27.

Habitat ad caput bonae spei, *in* myrica quercifolia, *pisi minoris magnitudine, semiovatus, pallide incarnatus, vertice*

vertice obtuſe acuminato cum poro tenuiſſimo; poro alio poſterius ſupra marginem cartilagineum craſſiorem, albam, utrinque ſeptem circiter torulis protuberantem.

capreae. 14. C. ſalicis cinereae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 12. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 15. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 22. §. 15. *Degeer inſ.* 6. *p.* 440. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 13. Coccus ſubrotundus fuſcus, linea dorſali nigra, ſalicis.
Habitat in Europae ſalicibus, *quibus folia hirſuta, piſi majoris magnitudine, ſemiamplexicaulis, ovatus, anterius obtuſus et biſidus, colore ſeminis ſtaphyleae, linea media nigra, nitens, glaber.*

ſalicis. 15. C. ſalicis hermaphroditae. *Fn. ſuec.* 1022.* *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 12.
Habitat in ſalicis hermaphroditae *cortice, minimus, depreſſiuſculus, cinereus.*

vitis. 16. C. vitis viniferae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 18. *mant. inſ.* 2 *p.* 319. *n.* 25. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 20. §. 9. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 506. *n.* 6. Chermes vitis oblongus. *Act. bonon.* 2. *p.* 279. *t.* 284. *Reaum. inſ.* 4. *t.* 6. *f.* 5-7.
Habitat in vitis viniferae *ramis, cinnamomeus.*

ficus. 23. C. ficus religioſae et indicae. *Fabr. mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 7.
Kerr act. angl. 1781. *p.* 374. *f.* a. b. Coccus Lacca.
Habitat in Indiae ficu religioſa *et* indica, gummilaccam *producens, ruber, antennis ramoſis, cauda biſeta.* Swagermann.

poloni- cus. 17. C. radicis ſcleranthi perennis. *Fn. ſuec.* 1023. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 20. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 23. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 34. §. 31.
Fn. ſuec. 720. Coccus radicum purpureus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 504. *n.* 1. Chermes radicum purpureus.
Breyn act. phyſ. med. 6. 3. *app.* 5. *t.* 1. Coccus tinctorius radicum.
Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum.
Bauh. pin. 281.
Rupp. jen. 86.
Raj. hiſt. 186.
Bauh. hiſt. 3. *p.* 378.

Friſch

Frisch inf. 5. *p.* 6. *t.* 2.
Act. upf. 1742. *t.* 1.
Reaum. inf. 4. *p.* 1.
Habitat in ſcleranthi perennis *radicibus, oblongo-ovatus, purpureus aut ſpadiceus olim,* Colaccis *adhuc tinctorius.*

fragariae. 24. C. fragariae veſcae. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 205. 3. *p.* 312. *Act. angl.* 1765. *p.* 91. *t.* 10.
Mayer act. ſoc. priv. boh. 4. *p.* 152. 184. Coccus potentillae.
Habitat in Europa *et* Sibiria *ad* fragariae veſcae, potentillae vernae, reptantis, albae *radices, ruſticis Ruſſis ad tingenda colore kermeſino lintea uſitatus, roſtro nigro, thorace trirugi, ano pilis nigreſcentibus cincto.*

hyperico- nis. 25. C. hypericonis perforati. *Pallas it.* 1. *p.* 21.
Habitat in Ruſſiae hypericone perforato.

piloſellae. 18. C. radicis hieracii piloſellae. *Fn. ſuec.* 1024. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 13. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 16. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 49. §. 36.
Sim. Paul. quadr. 113.
Act. upſal. 1742. *p.* 54. *t.* 2.
Habitat in hieracii piloſellae *radicibus.*

uvae urſi. 19. C. radicis arbuti uvae urſi. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 394. *n.* 14. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 17. *Modeer act. Gotheub.* 1. *p.* 49. §. 37.
Habitat ſub muſcis ad radices arbuti uvae urſi, *tinctorius, ſpadiceus.*

phalaridis. 20. C. radicum phalaridis. *Fn. ſuec.* 1026. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 15. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 18. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 48. §. 35.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 512. *n.* 2. *t.* 10. *f.* 5. Coccus graminis, corpore roſeo.
Habitat ad graminum, *praeſertim* phalaridis canarienſis, *radices, oblongo-ovatus, albidus vel pallide rubeſcens.*

oxyacanthae. 21. C. crataegi oxyacanthae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 16. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 19. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 20. §. 10.
Reaum. inſ. 4. *t.* 6. *f.* 11. 12.
Habitat in crataego oxyacantha, *oblongus, ſpadiceus.*

ferratulae. 26. C. ferratulae arvenſis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 17. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 20.
Habitat in Angliae ferratula arvenſi.

zoſterae. 27. C. zoſterae marinae. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 19. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 22.
Habitat in maris balthici zoſtera marina.

cacti. 22. C. cacti coccinelliferi. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 395. *n.* 21. *mant. inſ.* 2. *p.* 319. *n.* 24. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 44. §. 33.
Brown jam. 435. Coccinella alis deſtituta, corpore rugoſo.
Degeer inſ. 6. *p.* 447. *n.* 1. *t.* 80. *f.* 12-14. Coccus cacti coccinelliferi.
Act. angl. 1762.
Hernand. mex. 78.
Sloan. jam. 2. *p.* 153. *praef. t.* 9.
Pet. gazoph. 3. *t.* 1. *f.* 5.
Reaum. inſ. 4. *t.* 7. *f.* 11. 12.
Rauſch hiſt. nat. de la cochinille. t. 1. *f.* 1-5.
Habitat in Americae cactis opuntiis, *depreſſus, tomentoſus, transverſe rugoſus, dorſi margine laterali utrinque duplici: ſuperiore breviore, abdomine purpuraſcente, pedibus brevibus nigris, antennis ſubulatis, corpore tertia parte brevioribus, eximie tinctorius.*

liriodendri. 28. C. liriodendri tulipiferae. *Hamburg. Magaz.* 12. *p.* 1-24.
Habitat in liriodendro tulipifera.

farinoſus. 29. C. ovatus tomentoſus pallide fuſcus albo-farinoſus. *Degeer inſ.* 6. *p.* 442. *n.* 3. *t.* 38. *f.* 16. 17. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 50. §. 38.
Habitat in betula alno, *depreſſiuſculus.*

clematidis. 30. C. clematidis oblongus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 1.
Habitat in clematidibus.

perſicae. 31. C. perſicae rotundus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 28. §. 22.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 506. *n.* 5.
Reaum. inſ. 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.
Habitat in amygdala *perſica, nitens, rubicundus, ſpadiceus aut niger,*

32. C.

abietis. 32. C. abietis rotundus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 27. §. 20.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 7.
Habitat in pinu abiete; *badius.*

fuſcus. 33. C. quercus fuſcus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 24. §. 18.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 507. *n.* 11.
Reaum. inf. 4. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in quercu robore, *albo tomento obductus.*

variegatus. 34. C. quercus rotundus ex albo, flaveſcente nigroque varius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 12.
Reaum. inf. 4. *t.* 5. *f.* 3. a.
Habitat in quercu robore.

lanatus. 35. C. quercus oblongus: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 508. *n.* 14.
Habitat in quercu robore; *nonne mera varietas fuſci?*

meſpili. 36. C. meſpili: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1, *p.* 508. *n.* 16.
Habitat in meſpilis.

conchiformis. 37. C. arborum linearis. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 22. §. 14.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 509. *n.* 17.
Reaum. inf. 4. *t.* 5-7.
Habitat in ulmo, *anguſtus, fuſcus.*

aceris. 38. C. aceris ovatus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 13.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 509. *n.* 18.
Habitat in acere, *ovato-depreſſus, ſtriis ad latera longitudinalibus albis aut cinereis.*

laniger. 39. C. fuſcus: ſerico albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 512. *n.* 3.
Reaum. inf. 4. *t.* 7. *f.* 1. 2. 6. 9.
Habitat in ulmo campeſtri.

dioſmatis. 40. C. dioſmatis crenatae. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 21. §. 11.
Habitat in capitis bonae ſpei dioſmate crenato *et* pulchello, *ovato-oblongus.*

alni. 41. C. betulae alni. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 23. §. 17.
Habitat in betulae alni *dichotomia ramorum, oblongo-ovatus, rubeſcens.*

Ura. 42. C. testa fusca sphaerico-gibba, subflavescente. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 32. §. 30.
Habitat in Suecia *sub lapidibus.*

spurius. 43. C. ovatus hinc inde pilosus spadiceus subtus pallide flavus. *Modeer act. Gothenb.* 1. *p.* 43. §. 32.
Habitat in ulmi *ramorum dichotomia.*

230. THRIPS.

Rostrum obsoletum, intra os absconditum.

Antennae filiformes longitudine thoracis.

Corpus lineare; *abdomen* sursum reflexile.

Alae quatuor rectae, dorso incumbentes, longitudinales, angustae, subcruciatae.

paradoxa. 1. Thr. fusca, alis abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aliformibus. *Amoen. acad. 6. p.* 401. *n.* 48.*
Habitat in Sina, *an hujus generis?*

physapus. 2. Thr. elytris glaucis, corpore atro. *Fn. suec.* 1027.* *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 385. *n.* 2. *Scop. ent. carn.* 418. *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 1. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 1.
Degeer inf. 3. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Thrips atra, alis albis, antennis sexnodiis.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Physapus ater, alis albis.
Schaeff. elem. t. 127.
Habitat frequens in Europae floribus compositis, *loti corniculatae flores clausos tumidosque reddens, secalis spicas exinaniens.*

minutissima. 3. Thr. elytris corporeque glauco, oculis fuscis. *Fn. suec.* 1028.* *Fabr. sp. inf.* 2. *p.* 396. *n.* 4. *mant. inf.* 2. *p.* 320. *n.* 4.
Habitat in Europae *floribus.*

4. Thr.

juniperina. 4. Thr. elytris niveis, corpore fuſco. *Fn. ſuec.* 1029.* *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 2. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 2.
Degeer inſ. 3. *p.* 10. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. Thrips griſeo-fuſca, oculis nigris, alis albeſcentibus.
Degeer act. Stockh. 1744. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 2. Phyſapus fuſcus, alis albicantibus.
Habitat in juniperi *gallis.*

ulmi. 6. Thr. nigra, alis niveis ciliatis, ano acuminato. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 396. *n.* 3. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 384. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 6. Thrips elytris albidis, corpore nigra abdominali ſeta.
Degeer inſ. 3. *p.* 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 8-13. Thrips (corticis) nigra, alis hyalinis niveis, barbis longiſſimis, antennis octonodiis.
Habitat gregaria in ulmi *cortice.*

urticae. 7. Thr. flava, elytris albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 397. *n.* 5. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 5.
Schranck Beytr. zur Naturg. 31. *t.* 1. *f.* 25. 26.
Habitat in urticae, vitis, coryli *aliorumque foliorum pagina inferiori, ſolitaria.*

faſciata. 5. Thr. elytris albo nigroque faſciatis, corpore fuſco. *Fn. ſuec.* 1030.* *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 385. *n.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 397. *n.* 6. *mant. inſ.* 2. *p.* 320. *n.* 6.
Degeer inſ. 3. *p.* 18. *n.* 4. Thrips atra, alis faſciis transverſis tribus albis, antennis annulo albo.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 48. b.
Habitat in Europae *floribus compoſitis.*

fuſca. 8. Thr. nigricans, elytris glaucis. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1083.
Habitat in Dania, *an forſan femina faſciatae?*

obſcura. 9. Thr. flaveſcens, elytris pallidis, oculis abdominisque annulis nigris. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 96. *n.* 1084.
Habitat in Dania.

Thripes *in floribus frequentes agiliſſimae fere ſubſiliunt, abdomine ſaepius ſurſum flexo, tarſi veſiculoſi; larvae aeque agiles currunt, ſaepius rubrae.*

rufa. 10. Thr. rufa. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. t. 16. f. 6. 7.*
Habitat in tritici *ſpicis, an forſan larva minutiſſimae?*

variegata. 11. Thr. variegata. *v. Gleichen Neueſtes im Reich der Pflanz. p. 22. t. 21. f. 6. 7.*
Habitat in linaria.