

ETUDES ENTOMOLOGIQUES,

rédigées

par

Victor de Motschoufsky,

Lieutenant-Colonel d'Etat-Major, en retraite &c.

Troisième année.

HELSINGFORS.

Imprimerie de la Société de Littérature Finnoise,

1854.

Coléoptères du nord de la Chine (Shingai)

par

V. de Motschulsky.

1, *CHLAENIUS biguttatus*, niger, punctatissimus, capite thoraceque cupreo-aeneis, opacis; elytris viridi-obscuris, testaceo-pubescentibus, macula postica sinuata, ore, antennis pedibusque testaceis. Long. $6\frac{1}{2}$ l. — lat. $2\frac{1}{2}$ l.

2, *AGRIOTES ? pectinicornis*, elongatus, convexiusculus, nigro-fuscus, punctatus, dense cinereo-pubescentibus; ore, antennarum basi pedibusque plus minusve fulvis. Antennarum articulis 4 — 11 pectinatis. Long. 11 l. — lat. 3 l.

3, *GYMNOLEURUS ruficornis*, subdepressus, nigro-subcyaneus, opacus; thorace confertissime granuloso; elytris subtilissime tuberculatis; abdominis lateribus carinatis; clypeo obtuso quadridentato. Antennarum clava flava. Long. 6 l. — lat. 4 l.

4, *ONTHOPHAGUS ibex*, niger, sub-opacus, parce punctatus; elytris profunde punctato-striatis; clypeo apice emarginato. Antennis flavis.

mas: vertex bicorni, cornibus verticalibus rectis; prothorace antice subdeclivi.

fem.: fronte carinato, postice tuberculis tribus.

Long. 4 l. — lat. 2 l.

5, *ANCYLONYCHA parallela*, nigro-picea, subopaca, grosso-parcius-punctata; thoracis lateribus arcuatis, angulis posticis rectis; elytris tricostatis. Long. 8 l. — lat. 4 l.

6, *ANCYLONYCHA ? crenicollis*, picea, nitida eroso-scribiculata; thoracis lateribus in medio subangulatis, fortiter crenulatis; elytris postice dilatatis, subcostatis; capite rugoso, opaco, in medio transverse carinulato, clypeo subemarginato; antennis femoribusque rufo-testaceis. Long. $6\frac{1}{2}$ l. — lat. 3 l.

7, *MACRONOTA sanguinosa*, elongata, postice subattenuata, supra opaca, nigra; capite, thorace, corpore subtus pygidioque pube testaceo-maculatis, elytris rufo-variegatis, in medio ad lateribus punctis minutissimis quatuor testaceis, antennis flavis; thorace angustato, subquadrato. Long. $4\frac{1}{2}$ l. — lat. $2\frac{1}{2}$ l.

8, *CHLOROPHANUS lineolus*, densissime viridi-squammosus, thoracis lateribus, elytrorum lineis, corpore subtus pedibusque albescentibus; rostro in medio carinato; thorace subconice, longitudinaliter plicato-rugoso, postice bisinuato, angulis posticis obtusis; elytris acute caudatis. Long. $5\frac{1}{2}$ l. — lat. 2 l.

9, *CLEONUS melogrammus*, ovatus, niger, tuberculatus; thoracis lateribus, vittis duabus in disco, elytrorum maculis obliquis ad apicem conjunctis, corpore subtus pedibusque albo-pubescentibus, basi suturaque nigris; fronte in medio gibboso; antennis fuscis. Long. 6 l. — lat. $2\frac{1}{2}$ l.

10, *DORCADION virgatum*, niger, cinereo-pubescent; capite thoraceque vittis mediis elytrorumque lineis septem, ad marginem dilatatis, albis, alternis subtestaceis; antennis cinereo-annulatis; thorace rugoso. Long. $7\frac{1}{2}$ l. — lat. $3\frac{1}{2}$ l.

Sur l'*Anthrenus museorum*

de De Géer et Linné,

par

V. de Motschulsky.

Cet insecte, originaire du midi, ne se trouve chez nous que dans les collections. J'en ai ramassé une grande quantité dans les boîtes qui provenaient du Musée de Berlin et de Mr Parsudaki à Paris, où une bonne partie des insectes que j'y avais acheté, fut rongé par ces ennemis implacables, quoique les boîtes fussent fermées hermétiquement. Jusqu'à-présent c'est la seule espèce d'*Anthrenus* qu'on aît observée dans les collections d'Europe. Ici, à St Pétersbourg, l'*A. verbasci*, F. (*museorum* Erichson) est des plus communs, sur les murs des maisons, les haies &c., mais jamais dans les cabinets d'histoire naturelle. Les descriptions de De Geer, et de Linné ne contiennent rien qui puissent s'appliquer à l'espèce qui dévaste les insectes, et comme ces savants appuient leur caractéristique sur les moeurs connues de chaque entomologiste, il est plus que certain qu'ils ont décrit des individus